

B. 17. 6. 15



B 17

4

15

BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE

R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
FIRENZE

LIBRI

DONATI DAL

DOTTOR ANNIBALE GIULIONI

GIURISTA

Nato a Firenze il 7 Febbraio 1807
e morto il 1° Dicembre 1895 in Firenze.

16 Maggio 1896

NOSOLOGIA METHODICA S I S T E N S MORBORUM CLASSES

Juxta Sydenhami mentem & Botanicorum ordinem.

A U C T O R E

FRANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES

*Regis Consiliario ac Medico; in Monspelienſi Univerſitate Medicinæ, olimque
Botanices, Professore Regio; Academiæ Scientiarum Monſpellienſis, Londinenſis,
Upſalienſis, Berolinenſis, Florentinæ, Phyſico-Botanica, Suecicæ, Naturæ curioſo-
rum, & Inſtituti Bononiænſis Socio.*

EDITIO ULTIMA, AUCTION, ET EMENDATIO.

TOMUS SECUNDUS.



Si morbi cujuſlibet hiftoriæ diligenter perſpectam haberem, par malo remedium num-
quam non ſcire adferre. Sydenham.



VENETIIS, MDCCXCV.

Apud Joſephum Orlandelli.

N O M I N E

FRANCISCI EX NICOLAO PEZZANA.

SUPERIORUM PERMISSU.

105 14. h. 15

CLASSIS SEPTIMÆ SYNOPSIS.

D O L O R E S.

O R D O I.

DOLORES & molestiæ vagæ sæpius universales aut cutaneæ ad phlegmalias non referendæ.

- I. ARTHRITIS, *goutte*, articulorum dolor spontaneus periodicus.
- II. OSTOCOPUS, *douleur des os*, ossium dolor non erraticus & internus in artubus.
- III. RHEUMATISMUS, *rheumatisme*, dolor diuturnus in parte carnea artuum.
- IV. CATARRHUS, *catarrhe*, collo vicinarum partium dolor a frigore suscepto, cum tussi, coryza, &c.
- V. ANXIETAS, *anxiété*, molestia quæ ad continuam loci mutationem cogit.
- VI. LASSITUDO, *lassitude*, molestia cum debilitate quæ ad quietem invitat.
- VII. STUPOR, *stupor*, molestia quæ sensum tactus obscurat.
- VIII. PRURITUS, *prurit*, molestia quæ ad scalpendum nos cogit.
- IX. ALGOR, *fraideur*, molestia qualis a summo aeris frigore exciatur.
- X. AKDOR, *chaleur*, molestia qualis a summo aeris calore produciatur.

O R D O II.

DOLORES CAPITIS, scilicet vel capillitii vel faciei.

- XI. CEPHALALGIA, *mal de tête*, gravativus capitis dolor.
- XII. CEPHALEA, *céphalée*, periodicus diuturnus tensivus capitis dolor.
- XIII. HEMICRANIA, *migraine*, dolor alterutrus lateris frontis.
- XIV. OPHTALMIA, *ophtalmie*, dolor oculi cum rubore, lucis intolerantia.
- XV. OTALGIA, *douleur d'oreille*, dolor aurium.
- XVI. ODONTALGIA, *mal de dents*, dolor maxillarum dentiumve.

O R D O III.

DOLORES PECTORIS, jugulive anhelationis expertes, anhelationibus non accensendi.

- XVII. DYSPHAGIA, *difficulté d'avaler*, molestia deglutionem impediens.
- XVIII. PYROSIS, *cremason*, ardor œsophagi ad stomachum extensus.
- XIX. CARDIOGMUS, *douleur du cœur*, dolor cordis cum ejus pulsatione.

O R D O IV.

DOLORES ABDOMINALES INTERNI.

- XX. CARDIALGIA, *cardialgie* in stomacho syncopem minitans.
- XXI. GASTRODINIA, *douleur d'estomac*, dolor vehemens epigastri stomachive.
- XXII. COLICA, *colique*, dolor intestinorum.
- XXIII. HEPATALGIA, *douleur hépatique*, dolor hypocondrii dextri hepatisve.
- XXIV. SPLENALGIA, *mal de rate*, dolor aut molestia in regione lienis.
- XXV. NEPHRALGIA, *douleur néphrétique*, dolor lumbi alterutrus ureteris ductum sequens.
- XXVI. DYSTOCIA, *difficulté d'accoucher*, dolor uterinus in gravidis cum conatibus parturitionis.
- XXVII. HYSTERALGIA, *mal de mère*, dolor uteri sine nisu parturitionis.

DOLORES partium externarum locales, atque.

XXVIII. MASTODYNIA, *douleur du sein*, dolor mammarum.XXIX. RACHIALGIA, *collique de Poitou*, dolor abdominis, & spinæ dorsi in brachiorum paralytum aut convulsionibus desinens.XXX. LUMAGO, *Ereintement*, dolor lumborum corporis erectionem impediens.XXXI. ISCHIAS, *Sciaticque*, pelvis & coxendicis dolor claudicationem sæpius inducens.XXXII. PROCTALGIA, *Mal du fondement*, dolor podicis citra tensesum.XXXIII. PUDENDAGRA, *douleur des parties honteuses*, dolor genitalium citra dysuriam.



CLASSIS SEPTIMA.

MORBI DOLORIFICI,

S E U

D O L O R E S.



ALGEMATA Græcis, quo nomine etiam *Hippocrates* nomenclata, seu morbos in genere intellexit; Gallis *Douleurs*, *maledies de douleur*; Ang'is *Pain*, *Ache*; Hispanis *Lastimas*; Italis *Dolori*.

1. *Character*. Morbi quorum præcipuum symptoma est ingrata

& molesta sensatio, aut imaginatio, qualis ex nervearum partium laceratione, rosione, ultione, pressione, aut distractione oritur.

3. Non omnis molesta sensatio dolorificos morbos determinat, cum vix ullus sit morbus qui molestant sensationem non inferat; unde *Hippocrates* morbum per molestiam definit; requiritur dolor constans, vel notabilis, qui cætera symptomata superet; si enim morbum febrilem, inflammatorium, convulsivum, vesanum, evacuatorium comitetur dolor, tunc ægrotudo ad illas classes pertinet.

Theoria Doloris Mechanica.

4. Dolor est molesta & confusa perceptio, qualis a fibrarum nervearum distractione, rosione, punctione, similive læsione oritur.

5. Perceptio molesta a sensatione, seu actione corporis cuiusvis in fibras nervæas oriunda, dolor est *sensitivus*; quæ vero ab actione simili in fibras cerebri medullares, aut sine ulla actione in corpus, ab animæ affectione dependet, dolor *imaginarius* est, qualem experiuntur somniantes, hysterice, artubus truncati, pathematis agitati, sine ullo vitio corporeo.

Savvages Nosologia Methodica. Tom. II.

6. Dolor vulgaris a sensatione oriundus pendet materialiter ab ea nervis illata violentia, ex qua rupturæ, vel dissolutionis periculum imminet; formaliter vero a perceptione & metu huius periculi proxime imminenti.

7. Causæ hujus actio est proportionalis vi fibrarum impetenti, & attentioni animæ periculum ruptionis sentienti.

8. Fibræ nervæ quæ magis exiles, nudæ, solitariae, sensæ, illæ cæteris paribus ab eadem vi facilius rumpuntur.

9. Corpora majorem vim habent ratione molli, & ea plures simul fibras lacerant, & ratione velocitatis, & ea eodem tempore altius penetrando fibras attingunt.

10. Si vis corporum in nos agentium imminuat a partium resistentia, quo major est molestia simul partibus applicata, eo dolor est magis extensus, sed minus intensus, qui corporis impetus a pluribus fibris sustinetur.

11. Si vis corporum in nos agentium partium nostrarum resistentia longe major sit, dolor quidem ab ejus actione velociori exurgens acutior est, sed tanto fugacior, quia secus fibris nervis easum sensus perit, & dolor evanescit.

12. Hinc patet cur ab eodem pondere capillorum fasciculum trahentes, nullus dolor, vel levis; si vero unicum pilum trahas, dolor acutus exurgat? Si pluma labii fibras leviter vellicet sensatio molestior est, quam si carnes abdominis manu distrahantur; quia febriliter nervæ, solitariae, nudæ, magis sensæ, magis

A 3 a tra-

2. tractatione periclitantur, quam trunci nervi crinibus immeriti, laxi.

13. Si globus in manum impingatur, actio globi est, ut ejus vis totalis, dum manus resistit immobilis; ipsius globi vi minor, quo magis cedens recedit manus; nulla, si manus pari velocitate recedat, qua globum eam premit; omnium maxima, si in globum impetentem manus ipsa moveatur. Hinc gradus collisionis, doloris a contentis instrumenti actione & reactione quique repetat.

14. Hinc sequitur sævus fore dolor, si corpus humanum in parietem impingat, siue paries in corpus humanum irruat, siue calculus, dum homo curru vehitur, in renes impetat; siue ren, vel vesica spasmodice se constringens calculum fortius comprimat.

15. Actio stimulantis in corpus nostrum, si par fuerit resistencia, est ut ejus vis, seu ut moles & velocitas quadrata conjunctim, quæcumque fuerit ejus figura. Sic globus plumbeus obulissimus, & minimus, modo summa velocitate moveatur, duriores corporis nostri partes potest diffingere.

16. Si minimæ fluidi cujusdam moleculæ valeant solidas nostras partes rodere, dissolvere, certum est eas tanto majori velocitate pollere, quo minores sunt, ut indigere tanto majori temporis spatio, ut datum effectum præstent, quo sunt pauciores.

17. Errant itaque illi, qui vim corrosivam, stimulantem, dissolventem ex sola molecularum minimarum stimulantis, vel solventis figura acuta, & rigiditate deducunt: cum figura acuta nullam viam habeat ad agendum, & tantum agat commodius, si vis sufficiens ipsi applicetur.

18. Ut aqua pura rodit durissimum metallorum, & oleum blandum dissolvit cuprum, ita moleculæ fluidi salibus, partibusque acutis ac rigidis destituti, valent nervos lacerare, rodere; ex eo quod fluidum rodit & stimulet, non sequitur illud gaudere rigidis & acutis particulis.

19. Vi adhesionis moleculæ fluidorum agunt eo fortius in solida, quo major est mutuus eorum contactus; sed mutuus contactus est major, quo major est æstivitas gravitatis specificæ, & simul molecularum & pororum eas recipientium: adeoque vi adhesionis moleculæ fluidorum possunt agere plus vel minus in fibras nervas corporis humani; licet sphæricæ & obtusæ sint, ac omnis duritiei expertæ.

20. Corpora mollissima, ut aqua, si velociter impetantur, ut a manu, non minus repercutiuntur quam si forent dura; ita non minus feriunt, si corporis solidi & resistentis partes impetant illa fluida; utrobique enim æqualis est collisio; ergo a vehementi actione corporis in nervos ad ejus duritiam non valet consequentia.

21. Si explodi possunt errores, quos in Scholas inducit Cartesiana, in mechanicis sæpius erronea, philosophia; qui tamen errores, si longis præjudiciis confirmati, vix avelli possunt.

22. Principia morborum dolorificorum sunt, vel 1. *Instrumenta* mechanice pungentia, ossa acuminata fracta, calculi asperi renibus impositi; vel prementia, ut calculi sphærici, positi; vel trahentia, ut quæ es luxant, subluxant; vel vulnerantia, aut contudentia; ut vis corporum in nos impingentium, aut corpus nostrum in dura obvia lapsu, impetu, impositum.

23. Vel 2. *Infarctus* vasorum, seu obstructio a copioso, vel spisso fluido, maxime si retrofluens fluidum urgeat infarctum; unde vasa infarcta aggravantur, distenduntur, hinc dolor gravitativus; vel etiam distrahuntur fortius, unde dolor distensivus; vel inflammata pars in acumine fere laceratur, hinc dolor punctorius, perterebans, pulsans, cum infarciuntur arteriæ, antequam in reticula, vel in venas abeant.

24. Hujus *infarctus* quantitas est eo major, quo emissaria fluidi magis ejus effluxui resistunt, vel culpa solidi contracti, compressi, vel culpa fluidi viscosi, crassi; & quo immixtura fortius immixtum recipiunt simul fluidum, ut a corde vehementer contracto ab ipso immixturio fortius pulsante, vel spasmodice se contrahente; utraque enim de causa pars infarcta fortius distenditur, premitur, concutitur, ut accidit in phlegmone; hinc dolor vehementis.

25. Vel 3. vitia solidorum dolori ansam præbent, quia majori *æstivitas* pollent, aut ob præviam tensionem, aut ob influxum fluidi nervi majorem quo tenduntur, aut ob phlogosim, aut ob sensibilitatem adauctam a metu, debilitate, pathemate, subitanea & insinuata actione, partis teneritudine. Sic metus titillationem reddit dolorificam, & intolerabilem; assuetudo tegendi caput facit ut a levi aura, si detectum fuerit, frigeat; oculi ophthalmici diu clausi, cum sanasciunt, a luce etiam læduntur; pars plinisi diu calide fota, & remota dein a minima causa dolet; ægri debilitati delicatiores sunt, & molestius afficiuntur a levibus incommodis; nervæ fibræ aeris expositæ nudæ ab aeris actu dolent acerrime; tendines tormentis distracti levi pressione dolent; oculi phlogosi affecti lucem non tolerant; convulsa intestina colicam, ileum inducunt.

26. Vel 4. *Acrlmonia* humorum, ut bilis, urinx, ichoris, puris, tabi, virus syphilitici, scabiosi, canerosi, & similia; dolores excitat maxime pruriginosos, rodentes, acres, calidos, urentes, vi adhesionis; & quoniam diversa corporis solida, viscera, ac colatoria, gaudent diversa gravitate specificâ, ut docent statica *Hambergerii* experimenta, idem fluidum acre illi potius adhæret parti quam alteri, eadem ratione quo bilis potius fecerit in hepate, quocumque gravitate specificâ affinis est, & urina in rene, & saliva in narotide, non vero e converso. Hinc intelligitur cur materies arthritica articulos, rheumatica musculos, syphilitica vetus periotheum,

scilicet.

scabiosa cutim, &c. aggreditur, ibique dolores excitet.

27. Vel §. Conatus naturæ ad expellendam, aut corrigendam materiem quævis morbificam, sive blandam, sed copia vel situ incommodam, sive conatus sit rationalis, sive erroneus, sive voluntati congruus, sive illi repugnans; atque hi conatus sunt frequentissimum dolorum principium. Dolores capitis non raro sunt a conatu naturæ ad excitandam materiem hæmorrhagiam; dolores pectoris a conatu naturæ ad expectorandam materiem morbificam; unde tot dolores pericapsitis capitis, pectoris, uteri, abortus hæmorrhagia, hæmoptyæ, catamenii evanescent. Dolores partus non certe a pondere sætus; quippe quidni pridie doleret uterus? Cur illico non mensis sine tantum illi dolores excitantur, & per intervalla deinceps continuo breviora revertuntur eodem dato pondere? Dolores illos excitant constrictiones naturales uteri, quæ ligamenta lata distrahunt; revertuntur illa iterum tormina, cum excluso sætu sequenti die excludendi sunt grumi eroris in utero concreti, orificium adhuc dolens deduci debet per violentiam quæ constringitur uterus, unde dolores atroces. Quis ignorat autem in partu, voluntatem quomodoque naturæ suppetias ferre in eliminando sætu.

28. v. Indicatio rationalis est cognitio utilitatis, vel opportunitatis cuiusdam auxilii in dato morbo adhibendi, ex qua determinatur voluntas ad illud agendum, vel præscribendum, quod profuturum esse cognoscimus.

29. Indicatio empirica est memoria utilitatis, quæ quoddam auxilium in simili casu fuit adhibuit, etiam si modus agendi, & meriti conditio, seu causa ignoretur. Hæc valet in usu remedium specificorum, & arcanorum, quorum utilitas, sola experientia, vel historia comperita est.

30. Indicanter in omni dolore sensitivo, t. laxantia, quæ fibræ nervæ distractæ tensionem minuunt; 2. anodyna, quæ animæ sensibilitatem tollunt, vel auferunt. Nam cum laxantia & anodyna necessario destruant sensibilitatem & distractionem, quæ simul junctæ dolorem constituunt, ex illorum usu cognoscimus ægrum melius habeturum; ergo ea auxilia utpote profutura indicantur.

31. Verum cum partium laxitas earum officiis nocuat, animæque somnus, & stupor ejus actiones liberas impediatur, ille status diu sine sanitatis detrimento perflare non potest, nec narcotica possunt continuo deglutiri. Necessum est ut principia doloris, seu causas etiam hujus distractionis tollamus; principia vero sunt vel instrumenta mechanice lædentia, vel infarctus, vel acrimonia, vel cretismus, vel demum naturæ conatus, hisque subtilis tollitur distractio, quæ doloris causa est materialis, ergo ea auxilia indicantur, quibus ea tolluntur principia.

32. Irritantia mechanica sunt vel externa,

ut chlamydes pectus confringentes, calcei pedem prementes, collaria, vincula arctiora, quæ removenda sunt; vel interna, ut calculus vellez qui lithotomia educendus, sætus mortuus cujus partus provocandus, scybala dura clysmatis educenda, saburra emetico catharticove ejicienda, fragmentum cranii trepano attollendum, pus in abscessu, cui via paranda; quibus omnibus chirurgica auxilia sæpius comperunt.

33. Infarctus sit vel per fluxionem, ut plegmo, erysipelas, cujus remedia in classi inflammationum querantur; vel per congestionem ab humorum spissitudine & crassitie, vel siccitate, quæ indicant medicamenta resolventia, seu ea quæ physice agendo fluidis inspissatis fluiditatem conciliant: Illa vero agunt immittendo mutuos contactus humoris concreti & sive interponendo moleculas aqueas sphericas, ut diluentia, emollientia; sive interficiendo particulas igneas, quæ moleculas coherentes separent, ut calida; sive intermiscendo particulas fluidi specificæ levioris, ut resinosa, oleosa, unguenta; sive impediendo perpirationem, eamque colligendo, unde veluti in balneo vaporis retinetur pars infarctæ, quod præstant emplastica, unguinosa.

34. Sed quoniam infarctus dolorificus simul stipatur tensione nervorum, eaque tensio laxantibus simul & anodynus minuitur; ea præ cæteris eligenda resolventia, quæ simul emollientia sunt & anodyna, quæque cutim fatis alte penetrant, ut ad partem affectam devenire possint.

35. Talia sunt flores chamæmeli & melliloti; folia cicutæ & hyoscyami, ex quibus in aqua, vel lacte coctis parantur cataplasmata, vel infusis linteis somenta partibus calide admoveunda; farinæ etiam quatuor resolventes distæ, orobi, lupini, sœnigræci, in passam redactæ, addito croco, oleo lini, & similibus, ovorum vitelli, sperma ceti & catelli, columbæ, pulli juniores vivi sceli & lateri, capitivæ dolenti, vel contuso, vel bubonoceli applicati optime resolvunt, & sedant; Idem præstant axunginæ, adipis, olea, butyrum lactis, cacao, quæ etiam a causa frigida dolentibus calide illinantur, superposita charta emporetica; huic scopo etiam conducit vinum rubrum, quo cum mica panis paratur cataplasma resolvens; aut ex spiritu vini & camphora, cujus uncia libram spiritus vini ingreditur, sit resolvens penetrans & antiphlogisticum; etiam saponem in aqua vitæ soluti, & partibus dolentibus applicati, necnon irrigationes, fomicidia ex aquis theriacibus sulphureis, quæ dolores rheumaticos resolvendos fugant.

36. Interna resolventia doloribus accommodata sunt chinæ radix, falsa parilla, dulcamara; & potissimum electrificatio. Chinæ radix confecta bulliatur in aqua, vel jussulo a drachma semisse ad drachmam pro quovis jussulo; falsæ parillæ semi uncia pro quavis aquæ libra potum.

tem præstare optimum; dulcamare stipites in lacte cocti vim resolventem & anodynani lacti conciliant, modo magna copia lac singulis diebus bibatur. Sed in doloribus rheumaticis a lymphæ spissa factis, in ischiade, nihil est utilis iterata quotidie electrificatione, scintillis & collo extricari, & addita sub finem levi fulminatione, quo solo auxilio innumeros fanatos vidimus; conducunt & laconica, stuphæ, seu fomenta calida ex foliis ebulli, vel hederæ in aqua, vel sub cineribus coctis, & parti dolenti, ac ædematosa admoti.

37. Ubi acrimonia datur, conducunt edulcorantia, in calidis doloribus a sanguine extulco, lymphæ arida productis; in hunc finem parantur ex pullo juniore, ranis, vitulina carne decocta, quæ forma pitænz, jusculive parantur ubertim, præmissis generalibus; præmissis jusculis, interposito leni cathartico, lacticia felicius adhibentur, ut lac asinum, vaccinum, caprillum, ea pro omni cibo arthriticis, rheumaticis scilicet usurpantur. Flores malvæ, violæ, radices althææ, semina lini infusa in sufficienti aquæ copia suppeditant potum calculosis, dysentericis optimum. Exus edulcorant cataplasma de mica panis cum lacte & croco, de oryza cocta, pulpa radices althææ, & axungie recentes, butyrum insulsum, unguentum de althæa modo recens fit; oleum olivarum, amygdalarum.

38. Ad erethismum & naturæ conatus compescendos conducunt laxantia demulcentia, ut balneum in oleo, in decocto foliorum malvæ, violæ, clysmata ex iisdem; litus; potus diluens & demulcens, maxime oleum amygdalarum dulcium intus & extus usurpatum; præstant in doloribus acutis, vel scribilibus phlebotomia, hi-rudines; sed demum ubi dolor non est gravativus, nec æget interno capite laborat, hos erethismos & quovis naturæ serocios conatus moderantur, & sedant anodyna & narcotica, maxime in doloribus spasmodicis sine fororis metu, in hystericiis motibus, in atrocibus quibusvis membranarum divulsionibus, in colica, ileo, nephritide.

39. Mitissima sunt syrupus de papavere albo, qui puerulis ad drachmam, adultis a semuncia ad unciam datur, diacodium, quod opii partem recipit, minori copia præscribitur; caput unum aut alterum papaveris albi, quod in pauca aquæ copia coquitur, & decoctum hauritur; laudanum adhibetur, ubi dosis syrupi papaverini non sufficit, atque laudanum liquidum intus guttatim usurpatur, ut a gutta una ad sex pueris, ad viginti & multo plures adultis minorem dosim expertis: Solidum laudanum a semi-grano præscribitur, sensum augendo, vel quarta quavis hora repetendo, vel majori dosi initium ducitur, si dolor urgeat. Theriaca tecne etiam usurpatur, cujus una drachma continet opii granum; vel diascordium, cujus una drachma vix dimidium opii granum continet; vel pilulæ de cynoglossio,

cujus grana octo continent opii, & seminum hyoscyami ex singulis granum unum, vel sapor Starhæi hic vix ulatus.

40. Ex laudano solido, ad grana tria cuique uncie unguenti de althæa mixto, sunt litus anodynini; ex granis aliquot laudani & catamahaca, vel galbano sunt emplastre temporibus applicanda.

41. Verum & narcotica, quandoque intus non adhibenda, possunt extus admoventi, ut folia hyoscyami, cynoglossi, stramonii, lacti vel aquæ incotta, & in cataplasma seu pulpam redacta; sic succus solani hortensis, phytolacæ cum oleo lenissimo tritus in mortario abito in unguentum quod ulceribus cancris applicatur; sic balsamum tranquillum calidum partibus admoventur.

42. Ubi vires sunt resocilandæ, stomachus roborandus, humores torpidi dissolvendi, anima exhilaranda, doloresque spasmodici compescendi, guttæ minerales anodynæ (rustulo sacchar affusæ intus fumentur; niterum in doloribus nephriticis, & calore, siti stipatis, usurpatur; hujus grana decem vel viginti in singulis pitænz libris sufficiunt; id fervorem temperat, & sanguinem dissolvit.

43. Sal sedativum Hombergii in doloribus hystericiis ad grana duo, vel forma pitænz ad grana decem usurpat in animi anxietatibus, agrypnia. Nullus sopor ab æthereo liquore Hoffmanni, nitro, nec a sedativo sale Hombergii pertimescendum est.

44. Si primæ viæ ante opiatorum usum internum non sint expurgatæ, metuendæ sunt cardialgiæ, nausæ; si sanguis non sit edulcoratus, & solida laxata, metuendum est ab horum usu delirium; aut sopor turbulentus, anxius, agrypnia pejor, expectandus.

45. Narcotica evacuationes supprimunt, naturæ conatus suspendunt; ab his itaque abstinendum, cum evacuationes, & naturæ conatus necessarii sunt, ut in asthmaticis vires fractas ab evacuationibus immodicis, ut dysenteria, cholera, reficiunt; suppressa ob dolorem, & spasmodicam catamenia non retinent. Ast facile eorum usus in consuetudinem difficile deponendam abito, nisi edulcorantia in narcoticorum locum sensim subreperant.

46. Nunquam felicius naturæ conatus sedantur, quam sublati eorum principio, seu i. subblata materie morbifica, ut avulso dente carioso in odontalgia; evaeratis sinibus frontalibus in hemicrania inde oriunda; rejectis vomitu sabburris, quæ cardialgiam excitant; misso sanguine in rheumatismo calido, & inflammatoris morbis; extracto calculo in dysuria culculosa; 2. vel correctæ materie morbificæ, ut viru (syphilitico per hydrargyrosim & scorbutico per lacticiam; scabioso per sulphur, &c. hæc sunt omnium mitissima, quæ dolores sedant, auxilia; 3. vel revellendo seu conatus naturæ aliorum determinando per stimulantia, quæ tamen methodus Empyricis ut plarium relinquenda; Sic colicam aqua-

tatio.

terio actuali pedibus admoto curant Javanenses: Sic Sineses mox accensa arunt dorsum ut sopiant dolorem lateris, pollicis aductorem ad curandum odontalgiam, quam nobilitates infuso in aurem alii fucum sanant. Cephalæam accensis capillis sanant vidit *Homergras*; ischiadem comulto femore sanabat *Hippocrates*; & quod ferrum non sanat, igne sanari promittebat; vide *Herzlii differt. de stimulantium effectu sedativo*. Hinc liquet quare emetica cephalalgia speciem sæpe tollant duplici titulo.

47. Ad sedantia referri debet nervorum parti dolenti prospectientium mechanica pressio, ut maxillaris inferioris juxta auriculam decurrentis vel arteriæ temporalis in cephalæa, nec non vincitura capitis in eodem morbo, quibus frænatur nature impetus dolorem efficiens.

Theoria Doloris Psychologica.

48. Psychologia est scientia eorum quæ per animam possibilia sunt: *VWolf Psychologia rationalis, practica*.

49. Animam in morbis dolorificis non mere passive se habere, sed pro doloris avertatione, & agendi potentia, qua pollet, ad eius principia tum avertenda, tum auferenda, diversos conatus edere, tum rationi, tum experientia consentaneum est.

50. Motiva itaque animam in his morbis ad agendum sollicitantia, fines quos ejus conatus intendunt, media quibus utitur, ad theoriæ doloris psychologicam attinent.

51. Nulla propositio certior est in Geometria quam hac psychologica, hominem scilicet felicitatis, seu non interruptæ voluptatis esse adeo cupidum, ut quidquid mediatur aut exsequatur, illud hujus finis gratia directe vel indirecte faciat; ita ut philautia, seu amor proprius, sit omnium hominis actionum auctor, & suavor.

52. Non vero solas actiones liberas philautia familiarium certum est, sed etiam naturales in eum finem dirigi docent qui pathematum theoriæ certiorum scribere, ut *Architæta la Chambre*; & qui conatus ira, metu, libidine percitorem inconcinnis, & fortuitis machinæ, & fluidi nervi motibus habent, non minus errant quam qui motus oculorum, palpebrarum, pupillæ, ex eo quod eorum non finis confici, pro inanibus, & fortuitis habent, licet in eximios fines, ut visus perfectionem dirigantur.

53. Philautia exigit ut quantum de machinæ suæ integritate, robore, pulchredine, & sanitate læratur anima, tantum de ejus destructione, debilitate, deformitate, agitudine morreat. Moror enim est intuitiva imperfectiois suæ cognitio; cum autem perfecta non sit machina nisi integra, robusta, pulchra, sana tendat ad hominis longævam felicitatem, omnesque ejus partes ad eundem finem conspirent, si quavis de causa fauciantur, vulneretur, corruptatur ejus machinæ structura, ea imperfectior evadit, & ejus imperfec-

tionis intuitu moeret, quæ ipsi unitur, & ejus conservationi invigilat, anima.

54. Nervorum dissectionem, ruptionem, lacerationem inferunt quæcumque vulnera corpori extus inflicta; nervi enim custodiam fidelem referunt, quæ sensum moneat de periculo imminente; horum itaque læsio, distractio, non potest esse non molesta, atque molesta percepta tactu ob imminens partium ruptionem Dolor dicitur.

55. Omnis perceptio dividitur in sensitivam, & imaginariam: illa sensitiva est, quæ refertur ad objectum respectu cerebri externum, & ejus actioni tribuendum; sic visio sensitiva est scintillæ, si eaple scintilla exterior agit in organa visus.

56. Perceptio vero imaginaria vel phantastica dicitur, quæ etiamsi refertur ad objectum externum, sit tamen a sola mutatione intra cerebrum; nulloque objecto simili præsentem fere agente in organa; sic etiamsi nulla reapse scintilla sit præ oculis in diversis morbis cerebri, aut etiam percussio in tenebris oculo, scintillæ nobis repræsentantur, & visio illa imaginaria est.

57. Ita & errores in tactu admittuntur, quippe alia tactus operationes sunt sensitivæ, & respondent objecto tactus præsentis, ut dolor ab acicula manum actum pungente; alia vero sunt imaginariæ, ut dolor quasi ab aciculis pungentibus manum, quæ tamen ab aliquot annis fuit amputata; hujus vero doloris imaginarii exemplum vidimus aliquot abhinc annis in mendico, cujus humerus in nocensio Sancti Elzei fuerat amputatus.

58. Cum anima non possit contristari, quin huic atenta cetera objecta, & negotia negligat, ut homo curæ intentus ceteris muniis minus aptus est, a gravi dolore languent ceteræ functiones, quæ ab animæ actione tanquam principio moveente dependent: hunc actiones liberæ, ut loquela, deambulatio, labores minus ad vitam necessarii, actiones omnes artium voluntati subditorum languent, intermittuntur, differuntur, segnius fiunt.

59. Actiones naturales ab anima pendent, licet intellectus eas minime determinet, nec voluntas præcipiat, ut motus cordis respiratio, excretiones, quæ appetitu quodam jucundo sollicitantur, ut salivæ, ad iusculi suavis aspectum, languent admodum, intermittuntque quantum necessitas permittit; sic in dolore diffiniso pulsus exilior, debilior, rarior; respiratio similes pulsus pariter mutationes; ista quandoque suspiciosa, interrupta, querula, turbata; pulsus etiam quandoque intermittens, turbatus.

60. Actiones vero quæ vitæ actuali non sunt necessariæ, ut excretiones memoratæ, ut manducatio horis alietis, ambulatio, omnino per horas, desique etiam aliquot dimittuntur. Nulla voluptas odoratum, visum recreat, omnia displicent, & fastidiuntur, appetitus ciborum, potulentiorum, veneris, tabaci, caffè, &c. etiamsi in deliciis prius habeantur, jam evanescit, ut appud eos qui magno moreore a principio morali sciunt.

sciuntur; deglutitio etiam difficilis quandoque evadit, & si cibi confecti solita dosi ingerantur, tor, indigesti diu gravant stomachum.

61. Omnes partes consentiunt, vix se mutuo adjuvant, sic pedibus insistere stando non possumus quin ad hanc stationem concurrant musculi pedum, tibiæ, crurum, lumborum, pectoris, colli, &c. nec in hoc fusi pedem loco movere, quin omnes prædicti musculi simul agant, nobis inscisi, etiam invitati; aut si alter musculus, v.g. in collo, doloſifico morbo labore, is dum contrahitur dolet acrius, atque cum pedem stauſo loco movemus, is contrahitur nobis. invitati, & inscisi, ergo in hoc casu dolet acrius a motu pedis. Idem dictum est de aliis partibus remotissimis, dum pes luxatus est, dum mariscæ podicis dolent, vel levissimis brachiorum, vel trunci motus dolorem redintegrat, tussis, ex creatus eum exacerbare.

62. Hinc sedula arthriticorum, rheumaticorum, fractorum, luxatorum attentio, viriumque intentio, eo fine, ut motus conspirantes, etiam remotorum partium, caveantur vel lenissimè fiant; hinc posturæ delectus scrupulosus, hinc etiam partium virium impensa, & debilitas in his morbis.

63. Ex summa doloris aversatione, summa huius principii tollendi enascitur cupiditas, tanta ut qui patientissimo alias animo sunt, in hisce tormentis impatientissime moram tolerant, remedia expectent, & contra obvios dolori sedando inutiles facile irascantur; ut in atroci dolore novam posturam, a qua levatum iri se sperant, continuum quantant, seu irrequieti sint, si ceteri ex posturæ mutatione sæpe magis doleant, vires exhauriant, perspirationem inhibeant, hinc majora mala sibi accersant. Ea enim est hominibus insoles, ut præſente dolore nihil ipsi videatur acerbius; inde omnia experiri mavult licet dubia, quam certo pati statum præſentem.

64. Pathematum nexu Deus optimus omnes homines invicem uniti voluit: quod tibi fieri vis, alteri facias, est principium divinæ sapientiæ, humanæ philantropiæ consentaneum; si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi: etenim pathemata, velut si contagiōsa forent, sive grata sint sive ingrata, cum adstantibus, licet peregrinis & idiota non intelligentibus, communicantur. Si quem videamus vel merito, vel immerito poenis multatum, inviti vel volentes condolemus, & ad ipsi auxiliandum proni sumus; inquirunt sagaciores quo mechanismo homo dolori ferendo impar, ut insantulus diro cruciatu excarnificatur, lachrymetur voce querula, singultibus interpolata, vicinam excitet, alias ridiculis, seu humana ratione vix explicandis, faciei distortionibus dolorem suum invitatus exprimat. Rideat quantum vis stolicus hos inconcinnos, & ut putat, inutiles, vel dolori exacerbando aptos naturæ motus. Non in his miramur statim divinam bonitatem, quæ sancivit, his signis adstantes

manæ aut non ferinæ indolis condolare, & inde ad auxilium miseris ferendum excitari. Inde intelligimus quam sapienter hi motus, hæ distortionis faciei quæ aliis ridiculæ videntur, quia harum finem non percipiunt, a natura instituantur, ut auxilium aliunde perat, & imploret, & ope vocis quæ a diversarum gentium hominibus, confuse quidem, sed clare, cognoscitur: quod e loquela distincta vix obtineri posset.

65. Inde intelligitur cur magnus dolor mortuus sit, cum eo affectus nullum auxilium speret: cor dolor ab inimica manu voluntarie nobis excitatur, lachrymas non extorqueat, tunc inutiles, aut si quem videat sibi facilius compassurum, nec ipsi vires suppetant ad vindictam, illico ad gemitus, sletumque confugiat miser.

66. Nec quis obijciat idem in brutis fieri, adeoque hos fines naturam ad agendum non determinare, sed cæco mechanismo ea omnia deberi. Is vero supponit brutæ non sentire, nec doloris remedia physica vel moralia querere, cum contrarium doceat experientia. Intellectus ad hos fines providendos necessarius non est, & instinctus sufficit, nec potest sentiri dolor quin ejus mali fugiendi animus, & brutæ, inæſſæ cupiditas; quin simul & naturales, & liberos, ad eum removendum conatus instituantur.

67. Conatus liberi maxime instituuntur, quoties principium materiale doloris in sensus incurrit. Sic si os in faucibus impactum dolorem procreet, ipsamet quadrupedia musculos omnes vicinos contrahunt, ut os ejiciant, si deglutiri nequeat; simul collum, capite demisso, vicinis corporibus appropinquant animal in eundem scopum; jam digitos pedum, anticorum intra fauces adigit, ut obicem extrahat; aërem tussiendo velociter emittit, ut hac vi etiam si fieri possit, avellat; nec non vomitu nauſcæque iteratis illud foras eliminare tentat, non cessaturus a conatibus, donec vires deficiant, aut sese ab hoc malo liberet. Scintilla ignis in selis palmam advolet, illico ignem fugie velocissimè, & currendo palmam exagitat, ut scintillam excutiat. Spina sit tendini infixæ, subito dentibus extrahere, motu brachii excutere spinam nititur; illi vero conatus qui in brutis mere naturales sunt, in hominibus sæpe sunt liberi.

68. Verum si spinula alte adacta extus non incurrat in sensus, tunc quid superest agendum, quod natura non exsequatur in homine, & in bruto? Spinula illa vel destruenda est, vel foras educenda; tutum non est auxilium, sed parum refert, ait *Celsus*, utrum tutum non sit, modo unicum remedium: factis abscessu spinula. quandoque corruptitur, vel si sit metallica tandem puri innatans infœxia evadit, & cum extrorsum vergant felicitate omnes abscessus, corpus nocuum felicitate demum.

demum eliminatur. Ad hunc finem assequendum necessaria est inflammatio, unde quidem dolor augetur, & rarissime corpus noxium vasorum, & tendinum subulculibus frangitur, vel descuritur; aut cum intumescit non dignoscatur quoniam sit materia morbifica durities, & saepius in simili casu a fluido flagranne, cruore coagulato similes dolores fiant, in quo casu subulsi, & contractiones spasmodicae vasorumque imperus acuti ad malum tollendum sufficiunt, similes conatus edite natura.

69. Ast in his circumstantiis magnum praesidium est Medici intellectus, & scientia medica, quae causas morbi distinguit, & remedia aptiora, ma-

gisque rationi consona partibus dolentibus applicat; inutilia tamen, ut plurimum, nisi natura simul suam in curatione symbolam conferat.

70. Haecenus potissima dolorum symptomata, ut anxietatem, gemitus, lachrymas, debilitatem ex principiis psychologicis deduximus; plura superessent explicanda, ut pervigilium; verum quique ex progressis illa deducere potest licet ex lege sensationis non potest una vividam excitaris, quin aliae ipsi alligari solitae excuscentur; verum si plures simul idem sensus clare excitantur, homo dicitur vigilare: ergo intelligitur quare vigilia dolores notabiles comitetur.

CLASSIS SEPTIMA.

DOLORES,

PONOI & *Algema* Hippocrati, quo etiam nomine morbos in genere indigitavit, cum dixit *quoniam molestiam morbum esse*. *Passiones* Arabum, ut passio colica, iliaca &c. *Odynes Galeni & Capoi* multis, unde dolor ossium *ostropus* dictus est. *Algeia* etiam idem sonat, unde *cardialgia*, *angina*, seu cordis dolor, auris dolor; nec non *agra* seu captura, inde *podagra*, *gonagra* &c.

Si dolor simplicissimus & in abstracto consideretur, tunc certe *Symptoma* est, ut Pathologi veteres volunt; sed cum dolor secum gerat alia simul accidentia, horum concursus morbum constituit, sicque dolores notabiles, qui observantur, morbos constituunt, quos scilicet dolor est agitudinis praecipuum symptoma; si vero molesta sensatio comitetur graviores morbum, ut febrem, phlegmasiam, convulsionem, fluxum, &c. tunc pro horum morborum accidente dolor reputandus est. Dolores classis morborum adstrictorum annoverare Methodici: *Vi. de Profer. Alpinum Medic. Methodi lib. 9. Felix Platerus lib. 3. de doloribus* hanc classem primum instituit, quam ordine anatomico divisit, verum immerito Febres doloribus accensuit.

Congestionum nomine hos indigitant ex *mil. Junckerus* & *Nenserius*, causam loco morbi obducentes.

Dolores dividebantur ab Antiquis in *graves, infixas, mordaces, punctorios, curas, pulsatorias, sensivos, frigidas*, aliosque plures quoad magnam partem ab *Arabibus* excogitatos; sed multo satius est morbos dolorificos a sede quam ab idea doloris distinguere, cum confusissima sit doloris idea, nec ullis definitionibus distincte tradi queat, licet sentienti clara sit; adde quod in eadem agitudine, ut colica, odontalgia, dolor saepe a priori diversus percipitur nec

morbus genere diversus sit, licet gradu variet, ut omnibus est in confesso.

Accidentia dolores saltem notabiles comitantia ex intellecta dolorum theoria facile cognoscuntur, scilicet cur in atroci dolore vigilia, anorexia, anaphrodisia, asthenia, deinde macies, pallor, syncope, &c. superveniant.

Cum enim animae conservationi corporis invigilet, ea debet ad partem dolentem continuo attendere, & nimis urgentes necessitates considerare, sed ex acris arentione, vigilia acris exurgit, omnis somnus arcei & phaenomena ex pervigilio derivanda accidere debent.

Per somnum fit uberior fluidi nervi secretio, adeoque facultas motrix resarcitur, deficiente itaque somno, deficit reparatio virium, unde languor & asthenia omnium organorum & arum.

Fluidum nervum ex nervis extremis debet admisceri succi digestivi, eo vero deficiente succi digestivi sunt vappidi, inertes, adeoque minus apti ad digestionem & famem, inde anorexia. Uber est proventus fluidi nervi in organis generationis, eo itaque deficiente, viribusque languentibus, nulla libido, seu datur anaphrodisia; ut datur neglectus omnium voluptatum assuetarum, tabaci, cafe, indifferencia erga deambulationes, negotia, ludos; cordia viribus imminutis sanguis debilis fertur in vasa, adeoque ultima & angustissima non penetrat per majuscula tantum provolutus, hinc pallor; denique cur macies succedat ex defectu digestionis, ex virium penuria, ex fluidi nervi dissipatione assidua, cuique evidens est.

Doloris nomine non intelligo tantum eam vividam sensationem quae a nervorum fibrarum distractione procedit, ut vulgo in Scholis intelligitur; sed quidquid animam moleste afficit, angit, vexat, ex corporis dispositione orinandum, unde a pathematis moralibus differt; sic pruritum, anxietatem, frigus, ardorem dolori.

loribus accenso; sic pro doloribus hepatis, lienis, habeo molestiam, gravitatis sensationem, quæ ex horum viscerum infarctu sæpe procedit; unde differt a morore, tristitia mere pathetica, vesaniarum comite, quæ a determinata partis virio non pendet, sed ab errore seu hallucinatione animæ, ut in melancholia, produci- tur.

Dura meninx, pleura costalis, peritoneum & aponeuroses acute sentiunt; acute etiam sentiunt lingua, cutis, villosa intesti norum tunica, nec non tracheæ bronchiorum: obscure vero sentiunt pleura pulmonaris, mediastinum, pericardium, pe- ritonæum quod viscera abdominis obvolvitur, mus- culi, exceptis illis qui, ut in collo, nervis sca- teant; nullus sensus in textu cellulari, in perito- næo quod abdomen succingit; ex his quænam sint dolorum acutiorum sedes in morbis intelli- gitur.

ORDO PRIMUS.

DOLORES VAGI.

Sunt ea morborum dolorificorum genera quæ ar- tus diversos affligunt, nec a determinata indi- vidua sede, vel dextra vel sinistra corporis parte characterem suum mutantur.

Astus nomine intelligimus brachia & crura, quæ sunt organa præcipua motus localis, adeo- que ille ordo motus huiusce difficultatem vel im- possibilitatem secum sæpius importat, saltem in parte affecta; atque cum pedum, tibiarum & crurum ope corpus indigeat ut huc illucve trans- feratur, his artubus dolore tentis, ille cor- poris totius motus vel difficilis vel impossibilis evadit, quod de artubus superioribus non va- let.

Morbi illi quatenus vel totius corporis motum localem impediunt, ut Arthritis, Rheumatismus, ischias, vel quatenus plurimas partes afficiunt aut simul aut successive, universalibus annumerantur, dum ceterorum ordinum morbi peculiaribus accen- sentur, ut colica, cephalalgia, vetum tamen par- ticulares, si atroces sint, ita vires labefaciunt ut totum corpus inde debilitetur, & sæpe lecto ad- ducatur.

Dolores vehementes vagi sæpius initio pyrexiam accersunt, sed fugacem, unde differunt a pleu- gmalis membranosis, ut Phrenitide, Pleuritide, Hepatide; illi etiam qui cum pyrexia incipiunt, non a frigore & horrore orduntur, si casarrhum excipias; unde a febribus distingui possunt. Do- lores quæ tales sunt morbi, adeoque sensationis molestia constantia, aut ejus intensitate, vel ex- tensione se demonstrant, nec ad hanc classem ideo referendi sunt morbi aliarum classium, qui suga- ci & symptomatice molestia quadam sunt stipati; sic in diarrhæa, dysenteria, tencismo, est molestia dolorifica, sed ob majorem evidentiam & con- stantiam fluxus alvini, ea genera ad fluxus potius quam ad dolores referuntur; ut pleuritidis, peri-

pneumonia ad phlegmasias potius quam ad dolores actinent. Ne tamen Philatrii in praxi hæreant, dum morbos observant qui ex utraque Classe, v. g. fluxus & doloris aut etiam phlegmasie partici- pes videntur, species ambiguas ad utramque Clas- sem referre malui, adeoque dicta repetere, quam Philatri inquisitioni aut dubitationi opem sæpe utilem reculare.

I. ARTHRITIS; La Goutte.

Cognoscitur ex spontaneo, vago, & periodico articularum dolore.

Spontaneus est quatenus sine principio evidenti ut plurimum accedit; si enim ideo quæ artubus doleat quia verberatus aut vulneratus est, non ar- thriticus dici potest.

Gutta dicitur ex absurda veterum hypothesi qua ab humoris cujusdam stillicidio in articulos facto eum dolorem oriri putabant.

Si genus confundatur cum arthritidis specie vulgari quæ podagra dicitur, ut vulgo fit, peri- culosi inde errores pronascentur, quod tamen fiet quamdiu vigeant innata Medicorum mentibus præjudicia, quamdiu genera ab speciebus non dis- tinguantur.

1. *Arthritis podagra; Podalgia Dioscoridis; Po- dagra Boerhaave Aph. 1244. Goutte ordinaire ou régulière: L. P. Agri Podagriel. Chirac Con- sult. 1.*

Est Arthritis regularis simplex, sine hereditaria live adventitia, quæ adultos & senes sæpius, raro mulieres, easque senescentes tantum, nunquam infantes aggreditur, atque pedis pollicem, mox talum cum robore, tensione dissecrat; sub galli cantum dolor sedatur, sequenti die alterum pedem aggreffurus, alias reversurus, vere & ætumno sæpius recurrens.

Hujus historiam graphice tradidit Sydenham, eam ad fuz vitæ terminum passus, qui no- rar plures sapientes quum fatuos, divites quam pauperes, ea affici, maxime vero eos, qui ma- ture Baccho & Veneri litarunt, qui ex vitæ genere summe exercitato, pathematis vexato, in sedentariis & tranquillum subito transi- vere, qui voraces sunt, nec satis cibos ma- licant.

Notum est Arthritidis podagræ feminium ef- se materiam calcaream, eandem quæ ossium compositionem ingreditur, quæque e lymphæ cui inest fecernitur intra cavum articuli, ibi- que tophos gypsum inducit; eadem etiam cal- culos in renibus podagricorum efformat: verosi- millimum est ex historia Diabetis 61, Astheniæ 104, & Cachialgiæ 82, ab acido quodam dis- solvi calcaream basim ossium, unde filula in u- rinis tantantia Arthritidem juxta *Doverum* desig- nantia, easque exalbida illa materies cretacea, in sanguine dissoluta, quandoque ad alias par- tes deferuntur: D. Baro du Bouchet, Velaunus, hydropota, venator & tamen podager, liberari consuevit a paroxysmis larga exspuptione pulve- ris

ris arenulosis granulati, duri ad inflar tartari sub digitis crepitantes, qui etiam ex naribus multus emungitur, unicus paroxysmus diutius solito cum diuexebat, usquequo D. Fontfrede Medicus ejus siyalogis, & vaporibus ori nasque appositis hanc secatardam arenarum excretionem ro-cavit, unde convulsis: vivit adhuc vero Nobilis ille vir nephralgix calculosae obnoxius.

Communis opilio *Sydenham* & *Boerhaave* est ab stomachi debilitate hunc morbum primitus oriri: indigestionis certe signa per septimanas aliquot paroxysmi antecedunt, licet ipso pridie fames intensior sit; dein per totum tempus quo paroxysmi concatenantur, fames languet cum alvo adstricta, urica pauca, coloratione, alicui rigore corporis juxta vesperam. Ille vero paroxysmus initio, cum nondum est inveterata podagra; est brevior; magis inconflans in pe-riodo, deinde vero fenefcente podagrigo diutior evadit, & typum certiorum afficitur.

Difficilis paroxysmo pedis affectus pruritus, furfuraceaque desquamatio succedit, fames & bonus habitus redeunt; paroxysmi eo remotiores sunt, quo atrociores & e contra, atque in regulari hac specie non ultra duos tresve menses extenduntur, imma incipiente morbo multo bre-viores sunt.

Ex hac specie regulari licet dolores atroces oriantur, quos vel levis pavimentis motus exacerbat, quos ira continua acri conitatur, cum febricula initio, interea nullum vix periculum inferunt & vitalitatis longioris potius praesagium est quam mortis principium, imo inter pa-roxysmos acri sunt floridi, corpulenti, alacres, ad venereum & voluptates omnes proni: sed si demum consenuerit morbus aut impetere tracta-tus fuerit, tum anomalus evadit & periculum involvit.

Cura exigit non phlebotomiam saltem repe-titam, qua non nisi in paroxysmi vigore apud adolescentes, ad sedandum dolorem, potest adhi-beri, non vero impune pluries repeti: nec exigit iteratam catharsim, nisi tantummodo extra paroxysmum lenissimam catharsim ex manna & sero lactis; nec demum sudorificis est utendum, licet in temperamento frigidis saepius profice-re; ea omnia efficiunt ut sequentes paroxysmi sint atrociores aut pertinaciores; imo quod pe-jus est, ut anomala evadat podagra. Scopus ita-que Medici eo potissimum spectat, ut vires sto-machi roborentur, & ut humorum acrimonia & fervor temperetur, de quibus consultat *Syden-ham*: Arthriticus praeter ossam, carnem assam & elixacem, abstinere ab omnibus cibis; pro potu uratur aqua fontana cum quinta, &, si senex sit, quarta circiter parte vini veteris, potissi-mum Hispanici; ab albis Gallicis & potissimum immaturis abstinent. Quotidie se exerceat vel ambulando vel equitando, vel saltem rheda utens; frigus, vigilas, animi contentiones, flu-dia a pastu, venereque fugiat, aut illa mo-derate utatur; stomachum theriacz bolo, cum

opus est, roboret; frigus pedum, manuumque vitet; lectum mutare petat. Qui senes sunt, si potu mere aequo utantur, stomachi debilitatem incurant, & pejus habebunt; & juvenes biliosi aequo additi pluries se ab arthritide liberant.

Qui juvenes sunt & acrimonia humorum multa laborant, diarta lactea constantissime adhibita saepe se ab Arthritide liberant.

Udones tale cerata pedibus gestati Arthritidem in pedes revocare apti sunt; sed si sudor accedat, ab his cum reprimi periculum est.

Pisana sudorifica cum diarta tenuissima per triduum multos ab ingruente paroxysmo liberat; Vide Pisanam apud *Helvetium*.

In paroxysmo juvant victus tenuis, potus di-luens leviter diaphoreticus, cataplasma e mica panis cum lacte & troco; si dolor acrior sit, laudanum horis nocturnis. Podagricum, quent negotia urgentia alio advocant, e paroxysmo liberavit. D. Lazzeroni tula vena pedis affecti.

Arthritidis varietates.

1. Arthritis hiemalis. L. P.

Ea est podagra quae fere per totum annum recurrit, exceptis tribus mensibus aetivis, quam describit *Sydenham* ea forte affectus. Ea pi-tuitosis senibusque frequentius inhaeret, minori calore in paroxysmo & pruritus extra paroxysmum stipatur; in illa conveniunt magis sudorifi-ca, ut pisana ex radice chinæ, salicperilla, ligno guaiaco, fissuras; electuaria stomaehica & antiscorbutica ex calamo aromatico, angeli-ca, kinkina, emula campana, extracto juniperi; nux moscata; theriaca. Hæc est omnium fre-quentissima; dicitur calida cum tumor parvis do-lentis est ruber, calidus, tensus atque febricula stipatus, crassa inflammatoria cruorem in patel-la tegente; frigida, si hæc abint; sed hæ sunt maxz varietates, atque secundum inagis vel mi-nus differunt.

3. Arthritis Rheumatica. Arthritis Rheumatis-ma subarvensiens Mulgrave c. 2: Goutte Rheuma-tismale De Mercey n. 396. P. I.

Ea species arthritidis frigida fere similis est, aut non est primaria, sed secundaria, id est, rheumatismo succedit, qui rheumatismus: tumo-res in musculosis partibus excrete consuevit ovi-formes, necis magnitudine ut plurimum. Hæc species nunquam topus in articulis generat, ut podagra, nec per periodos regulares revertitur, sed tere continuo leves paroxysmos identidem procreans, non solum pedes, sed nunc manus, nunc genua molestat. Epidemica fuit Moguntia anno 1757, *Straack Journ. de Med. Avril. 1766.* pag. 350. tumetibus articulis hirudines admo-vendas fuisse *Pringle*.

Conferatur oriri a lentore & visciditate lym-phæ ex qua similis gelatinæ synovia in articulos amandatur. Paroxysmi frequentiores sunt autum-no, & hieme a levissimo frigore rediivi; cum tu-more partis dolentis fere ædematofo, manus di-giti

giti ab hac specie magis affecti torquentur, manus ipsa retroagitur. Ad vitæ terminum sæpius affligit hic morbus; nullo cardiacorum abusu, ut in calida arthritide, paroxysmus ejus excitatur, & sanguis in paroxysmo extractus molli gelatina tegitur, ut in rheumatismo; tumores in suppurationem non vergunt.

Curatio exigit medicamina sanguinem resolventia; sanguis autem & lymphæ, si fides est *Musgravi* experimentis, ad alkalinum ita vergunt, ut syrupo violaceo virore in hoc morbo conciliant. In hunc finem tamen suadet Auctor non solum antiseorbutica, ut armoracium, capnam, arum, cochleariam, sylimbrum, in quibus est alkalinum volatile, sed etiam spiritum cornu cervi, urinz, fuliginis, salis ammoniaci, qui fortiora sunt ejusdem ordinis alkalina. Advertit etiam reperitis emeticis quosdam robustiores sanatos fuisse, liquata per consensionem vomitionis lymphæ, sed violenta hæc methodus paucis convenit. Oculum terebinthinæ intus ad guttas quatuor hora somni deglutendum, balsamum sulphuris terebinthinatum artubus motu privatis bis in die superillendum præscribit. Camphoram etiam intus, extulve adhibendam censet: quæ juncturis inest gelatina per tenuous fistulam orificio facto immixta exsurgit debet, ut in arthritide podagra vulgarè jam & pervagatum esse putat; articulos dein vino ululato fovere & emplastro magistrali tegere oportet.

Mulier quadragenaria, diu menstruata, boni habitus, initio hiemis per duos menses laborabat arthritide rheumatica, seu dolore omnium articulationum extremarum, cum manuum, pedum, genuum tumore: nullum levamen senserat: a jussulis diluentibus, ac sumpto extracto hyoscyami albi melius habuit intra septimanam, dosi a grano uno sensim ad Augusta ad grana decem; ipsi tunc accidebat per solito more suffusus *dannes* dicta, hoc solo remedio intra mensem convaleuit.

4. *Arthritis affrica, Goutte chaude*. L. P.

Eam quam ipse a decem annis exuperior describam, quæ cum per totam ætatem me defatiget, & hieme omnino me liberum faciat, merito affrica, vel calida dicitur. Differt a regulari, quod nullam periodum constantem servet, quodque ita mitis sit, ut nunquam me domi detineat, & solummodo levem in progrediendo motum mihi iniciat, prima quidem ejus invasio fuit acerbissima, aut autumnum me per mensem lecto afflixit; alii deinde dolorem pedis, manusque sinistri lateris, raro cubiti, fere continuum, inducit cum aliquali extra paroxysmos debilitate & tenebrositate, sine tumore aut coloris mutatione: cum primum verna tempestas calorem revocat, doleo pedibus, manibusque; dolor refrigerato aere mitescit, rursus ex calefacta atmosphæra revertitur, calore æstatis intenditur, hieme vero rigente nullus omnino est. Ille morbus partim hæreditarius est, partim ab acriori studio excitatur. Pruritus acer in dorso paroxysmos fortiores sequitur;

qui prius frigidulus eram potissimum toto latere sinistro, jam a novem annis multo minus a frigore hiberno patior, seu frigus minus experior. Ut ut acris sit materia hujus morbi quem calorem aeris in motum agit, & a balneis domesticis bene habeam, tamen lac & jussula refrigerantia frequenter adhibere non sinit vel stomachi debilitas, vel ætas ingravescentia nec a vino abstinere mihi fas est, ne diarrhæa accedat; imo stomachica calida in usum quandoque vocanda cenfeo; nihil juvit electrificatio.

5. *Arthritis Chlorotica* Musgrave de Arthrit. ex Chlorosi, vel *Arthritis alba* ejusdem. L. P.

Ea est species quæ mulieribus, quarum parentes arthritici fuerunt, quæque catameniorum retentione aut chlorosi laborant, in ipsa juventute supervenit, nec non adultis sterilibus raro aut parum catamenia patientibus, corpulentis, sedentariis, viraginitibus voce gravi sæpe etiam barba præditis, accidit.

Ea species ad frigidam seu hiemalem accedit, & in hoc altero casu ætate provecsta adoriatur; atque licet molestam, tamen longissimam vitam spondet.

Curatio apud juvenes obinetur per medicamina quæ catamenia revocant, scilicet martialia, boracem & similia, multo vero melius operæ trimoniæ & partus: si vero steriles sunt, tunc emmenagogæ tentanda sunt, quæ si non succedant, locum faciant cathartici quandiu catameniorum revocandorum spes est, ea vero cathartica semel in mense tantum adhibenda: hac ætate prætergræga in fonticula & decoctis amaris solamen inquirendum.

Idem dictum esse de Arthritide asietum excipiente, in qua catharsis sæpius iterata convenit.

6. *Arthritis melancholica* Musgravi Cap. 5. L. P.

Ea est quæ longo mœrore, studio, æternis debilitatis, hypochondriaci, hysteria etiam vexatos, demum aggreditur, ita ut cum hac animi defectione alterent, ea recedente accedat dolor, accedente vero recedat: Melancholia: nomen hic ab Austro usurpatur in plebeo significatu pro tristitia, non pro delirio, licet vere melancholici ab hac Arthritide non sint immunes. Ea species est miserrima qualem meam descripsi. In paroxysmo nil diversum ab aliis exigit; sed in prophylaxi operæ pretium est: a. alvum laxam servare; b. coctionem instaurare: in hunc finem aquæ acidulæ ferruginæ ætate cum magna usurpentur; insusum theæ cum præparatis martialibus, ut limatura martis intra offæ cochlear, kinkina etiam parca dosi diu continuatur prodest, & pro potu decoctum ex radice chinæ, salsæparillæ, &c. Cavendum autem est ne nimia dosi limaturæ ferri paroxysmos concitet, adeoque ea ad grana pauca usurpetur.

7. *Arthritis Scorbutica* Musgravi Cap. VI. VVillis de Scorbuto C. 5. *Goutte volante*. L. P.

Est illa quæ scorbuto calido jam affectos aggreditur, podagræ genuinæ & calidæ similis, sed

sed multo mitior, diuturniorque in paroxysmis, ut plurimum eum scabiē, maculis lividis, gingivarum vitiis, pruritu acri, ossium crepitu.

Ejus signum pathognomonicum sunt filamenta viscida, albicantia, urinz innotantia, extus pellicula; Optimum hujus speciei remedium est sapo sumptus a seminiaci ad drachmas seu per plures septimanas: *Clerk*.

In paroxysmo applicentur lenia astrahentia, ut ceratum viride, ex aquo sunt petasothecæ; aut tela cerata, vel folium brassicæ.

Extra paroxysmum acrimonia sanguinis emendetur, cui scopo hydrargyrum, ut calomelas, antiscorbutica, cathartica, martialia, &c. suadet Auctor; cavendo tamen ne fluxus humoris ad pedes interpellatur.

Duo ægri hexagenarii sunt in Nosocomio generali, qui conqueruntur a sex mensibus de dolore assiduo urente in interiori pedum, qui dolor nullo tumore stipatur, & noctu potissimum eos distruciat, ita ut neuter somno indulgere valeat nec levisima stragula præ calore ibi loci tolerare; ambo sunt macilentis, luridi, cute obscura, fere flavescente, oculis tamen minime flavis; alter edentulus est fere, dentibus cæteris cariosis; alter vero gingivæ habet molles, sanguinolentas; uterque a sex mensibus anorexia laborat, & simul diarrhœa. Solo laudano hæcenus sublevantur. Tibiæ alteri livefere cœperunt, & metatarsus rigescere, dein nigrescere, cum summa siccitate; nigredo & siccitas dein totum pedem & partem tibiæ utriusque occupant.

Hic morbus a nemine rite descriptus est, non tamen rarus; ejus symptomata essentialia sunt dolor calidus noctu exacerbans, adducens contracturam scorbuticam, pedumque nigredinem minime gangrenosam & stercoracem. *Vide Casuum scorbuticum.*

Conviniunt post levia cathartica ex rheo, opiæ absorbentes, juscula ex millefolio, enula campana; dein lac; & si diarrhœa abset, plantæ antiscorbuticæ forma jusculi, nec non amare, stomachicæ; in junioribus pediluvia emollientia, resolventiaque quondam profuerunt.

8. *Arthritis syphilitica* Musgrave Cap. VII. *Arthritis parva* succedens eisdem; *venerea* Locherii; L. P.

Bis nuper eam observavi, & quidquid dicat Musgrave, eruptionibus syphiliticis, scilicet rubedine, pustulisque, stipatam eam vidi, nunc in pedibus, nunc in manibus, cum doloribus vere arthriticis, noctu quidem magis exercentibus; Illa species a gonorrhœa suppressa sæpius oritur, & hydrargyri solito more curatur; post longas tamen præparaciones non solum symptomata syphilitica, ut pustulae, rubores evanescent, sed etiam aliquando dolores arthritici omnino recedunt, quod factum vidi tamen nonnisi pluribus post hydrargyri mensibus; si tamen syphilis accesserit arthritidi primariæ, dubito utrum dolorum arthriticorum sanatio succedat. Salivationem, quam laudat Musgrave, nec mercurium

dulcem adhibui. Suffusus in Italia prius adhībēti morbum in altero ægro per aliquod tempus supprelerant. Si hæc arthritis negligatur, ea in apoplexiam ducit sæpius quam alie docente Musgrave. Senes tantum hoc morbo affectos vidi.

Magna dolis mercurii dulcis data vespere pridie eatharctico est remedium a Rivero & Pringle laudatum in hac specie; est tunc mercurialis præstat cæteris remediis. Vidi hanc speciem cum magno genium tumore ac dolore, quem pressio non intendit. Spiritus antivenereus in quibundam sub initio hos dolores intendit, dein vero mitigat.

In doloribus arthriticis Americani radices napi raspatas ad digiti crassitatem parti dolenti applicant; nos utrimque pediluvio ex decocto chamæpityros; aut florum sambuci in lacte sunt qui folia brassicæ tepida admovent. In arthritide rheumatica laudant quidam pulverem ex anacardis partibus radicem aristolochiæ rotundæ, gentianæ, toliorum chamædrys, chamæpityros & centaurei minoris, dosi drachma una in infuso theiformi per tres menses, dein successive minuenda. *Journ. de Med. Juill. 1757.*

9. *Arthritis asthma* Musgrave Cap. VIII. L. P. Ea est quæ adjungitur asthma pituitoso, circa quinquagesimum ætatis annum non prius; ea fit mitis est sine nodis, hieme silet, seu est activa, a catharticis drasticiis exasperatur, aut revertitur.

Illâ arthritide sublevat asthma, & asthma tunc utilis est adeoque si deficiat, recedat, est revocanda per ceratum viride, vel aliud leve epispasticum. Extra paroxysmum leves cathartici præmittantur, dein decocta amara, martialia & bethica usurpentur.

10. *Arthritis febrisque*. *Arthritis febril vel continua, vel erysipelatosa, intermittens quartana* succedens Musgrave Cap. IX. L. P.

De hac utrope rariori consulatur Auctor.

Febrisqueam voco, quia febrem sequitur, ut pedisequa.

11. *Arthritis febrilis* VVerlhof. Obs. de Febr. pag. 55. Cockburn de Morbis Navigantium, Obs. 19. A. P.

Est arthritide vaga seu rheumatismus arthriticus cum febre remittente, tetartophya duplici in casu Auctoris, a viru febrili dependens.

Premissis generalibus, observato per tres hebdomadas typo, D. VVerlhof in remissione præscribit kininam cum pulvere lumbicorum terrestrium, & jubet continuari post profligatam febrem, addita a radice in infuso vinofo. Evanuit inde perpetuo & febris & arthritide; catamenia huic ægræ redierunt cum fame; cessavit vomitus, debilitas, &c.

12. *Arthritis rheumatica*. *Arthritis a colica* Musgravi Cap. X. Journal de Med. Avr. 1765. p. 328. C. L. P.

Est illa species quæ supervenit rheumatiz apud Damnonios familiaris ad usum pomacei immixtis, & acidi, ut Musgrave & nuper Huxhamius oculati testes idem faciunt; ea arthritidi podagrar.

dagre omnino similis est, & eadem in paroxysmo curam expoliatur; in prophylaxi stomachica & cardiaca, aquæ thermales sulphuræ, lenia identidem ecoprotica suadentur.

12. *Arthritis exanthematica; Arthritis morbis cucularibus subiecta.* Muirgrave Cap. XL. L. P.

Ea est quæ cutaneis morbis exanthematicis tum acutis, ut miliaris, erysipelati; tum chronicis, ut crustis herpeticis, ulcerosis, hæmorrhoidibus, mariscis, supervenit, de qua consultatur Auctor.

Arthritidis omnis signum statuit *Doverus* fibrillas quasdam in urina natantes, quas in urina aliquot arthriticorum quævis, videre non potui.

13. *Arthritis rachitica.* Vide *Duvernoy*, *Maladies os.* tom. 2. du Rachitis, *Observ.* pag. 296. ex D. Saviard. C. P.

Est species in qua dolent omnia fere ossa & facillime ex attractu franguntur, sine febre, cum symptomatibus Rachitidis.

Mulier triginta annos nata, a quatuor mensibus dolores in toto corpore atroces patiebatur sine febre; ingressa Nosocomium gradis & aliquot motus suis libere excrecere poterat; ad minimum corporis contactum dolor recrudescere, dein lecto addita post tres menses omnium ossium fracturas experta est, unde dolores intendebantur; postquam decem menses fere undique fracturas passa fuit, demum obiit. Inventa sunt ossa femorum tænerima fracta & ita fragilia, ut digitis pressa satisfaceret, uti cortex arboris putridus, in minima fragmenta, plena erant medulla rubescens; ossa cranii sub digito deprimebantur; carnes erant albide, molles; cartilagine & articuli, visceraque omnia bene se habebant.

14. *Arthritis Americana.* Le Plan. C. P.

Est morbus doloribus arthriticis chronicis primum diuexans quibus deinde superveniunt tumores avellanæ magnitudine, crustulosi, ulcera phagedænica, caries ossium, & tandem pedum, manuumque thagades, ex quibus fungosæ excrecentiæ progerminant, *framvesia* dictæ. Huic morbo frustra opponuntur medicamenta ex hydrargyro desumpta; sola conveniunt sudorifica ex decocto salisparillæ, chinæ, &c. De *Framvesia* vide *Class. X.*

15. *Arthritis Bahamensis*, Philof. Transf. N. 114. Art. V. B.

Pisces sunt in *Insula Bahama* circuitu, quorum ulus excitat atroces articulorum dolores, qui post aliquod tempus terminantur pruritu triduo.

II. OSTOCOPUS, Gortzi Definit.

Dolor ossium. Deleat des os.

Est dolor constans & notabilis ossium a periosæ interno potissimum affecto, pressione non exacerbens.

Differt ab arthritide quod non per periodos recurrat, & quod pressione non augeatur, præterque non solis epiphysebus insideat. Dicitur fuit ab *ostæon* os, & *copos* dolor.

1. *Osteocopus ab arthroce; Terodon* Græcis; *Spina ventosa* Rhalcis, Freind. *hystor. medic.* ann. 900. pag. 112. Petit *malades des os*, de l'exostose, Cap. 16. *Epine ventose*.

Dolor est profundus in ossibus tubulosis, ut tibia, peronæo, femore, a medullæ & periostii interni rosione oriundus, cum ossis ipsius incrementum seu exostosis. Vide diversas species *exostoses* *class. 1. ord. 5.* Inter eas canerosa & syphilitica dolores atrociores excitant, ossis medullam corrumpunt, & carie laminæ internæ acciunt, simulque vel deinceps intumescit periosteum externum, atque dolet quandiu intumescit; cum exostosis externa non amplius crescit; illa quidem extus non dolet & os potest contrahi sine dolore; verum osteocopus remanet cum dolore interno. Indicatio est ut terebretur os, quod primus *Argillanus* executus est circa medium decimi quinti sæculi variis in locis, potissimum in parte ima, peterebatur ope malleoli plumbei & scalpri. Cavitas detegenda, ut caries decepti possit, ope ferri candentis & alinum in carie uligatorum.

Si spina ventosa sit syphilitica, & hydrargyrosis decenter administrata fuerit, superest operatio jam indicata. Vide *Peris de l'exostose*, *Helffer. diss.* fert. de tumoribus ossium.

v. *Osteocopus a pædarthroce.* *Pædarthroce* *Sennæ* de abcondita abscellum natura. C.

Differt pædarthroce ab spina ventosa quod dolor & tumor in spina ventosa a medio ossis initium ducat, in pædarthroce apophyses afficiat, doloreque in isto fere initio minuit vel nullus, dein crescat, vel accedat; adde quod Pædarthroce pueris sit familiaris, adeoque ad rachitidem accedat, aut ad exostosin, tum scrophulosam, tum variolosam. *Peris de l'exostose*.

Quid per osteocopum vel osteocopum sibi velint Græci, non evidens est, nisi tantum lassitudinis gradum intelligant, ut docet *Gortzius*. Qui se laborant ne minimum quidem motum sustinent, sed omnem formidant; sentiunt autem in tendinibus circa ossa manifestum calorem una cum morfu & tensione, vitioso humore in totam corporis molem large effuso.

3. *Osteocopus Canerosus; Clavus.* C.

Mulier quæ in mamma dextra gerebat carcinoma capitis magnitudine, quæque ab hydrargyrosi, sine syphilidis suspitione, adhibita sublevata fuerat, ita ut eascinoma ad pugni magnitudinem rediisset, in decursu morbi horrendo in medio dextri humeri dolore distructa est, a pressione non mutabili, pertinacissimo, in uno fere puncto peterebatur; post aliquot menses utroque morbo consumpta perit: dissecto brachio inventum est in puncto doloris periosteum ab osse humeri paulisper semotum, cum aquæ guttula, nil ultra. Num ichor canerosus hac delatus pariter erexit? Num medulla ossis laborabat? Hoc vero exemplum, licet rarum, non est.

est unicam. Videtur hic affectus analogus paronychiæ periosteæ, & ratione doloris etiam malidi furiali, hemerianæ clavo, & crampo, nisi iste ultimus fugax esset. In hisce casibus scalpellum foret ad os usque adigendus, ut in trismo doloris fieri diximus.

4. *Osteopus a gummatis* Heister. Dissert. de Ossibus tumoribus, 1740. C.

Gummata sunt tumores tuberosi, inæquales, ossibus faciei & capitis potissimum supervenientes in syphilide veteri, qui consistentiam topheam friabilem obtinent: *Tophi* etiam vocantur, aliis etiam *nodis*, qui quidem initio nullum dolorem creant, sed in tertio gradu ossa subjecta afficiunt, & dolores quandoque acerbos excitant.

Cura exigit 1. remedia generalia, ut phlebotomia apud adultos, catharsim ex jalappa & mercurio dulci apud pueros. 2. Sanguis corrigitur decoctis ex bardana, china, fassaparilla, pimpinella alba radicibus, & ex lignis sassafras, guajaco, junipero; ex usu mercurii dulcis, panaceæ, æthiops mineralis exigua dosi sæpe repetitis. 3. Cum hæc gummata suppurata sunt, citissime ea aperienda sunt usque ad os, quod ferre semper invenitur corrosum usque ad meninges. 4. Pure ejecto linimentis carptis tegitur vulnus, & sinitur paries effluxus per aliquot dies. 5. Dein ossa expurgantur ope effusæ succini & myrrhæ, quæ cum tinctura euphorbiæ, pauxillo argenti digelli admiscantur, scmoza per vossellam parte ossis terebinthina, & sic quotidie semel, imo æstate bis deligando ulcus, intra aliquot menses novus callus, nova caro succrescit, sed cicatrix concava semper remanet. Ager interea lacte, balneis, & vespere narcoticis utitur.

5. *Osteopus syphiliticus* Astrucii, lib. 4. cap. 11. de Morbis venericis; ubi vide historiam & curam. C. P.

Hic dolor juxta illustrissimum Professore pendet a medulla ossis suppurascete, putrescente, unde evidens est nullam expectari posse medellam, nisi ossis perterebrato, ulcus illud expurgetur, quod raro perfici potest. Osteopus autem ille non solum eludit hydrargyrosim, sed etiam sæpius illam sequitur, cum partis dolentis, ut tibia, humeri exostosis.

6. *Osteopus scorbuticus* Leind. de Scorbuto. T. Est dolor ossium ipsorum atrox, cum crepitu, erie, erosine; colix inter respirandum quandoque crepitant & post mortem pars ossis a cartilagine separata est; ut in articulis apophyses ab ossium corpore distinguantur; colix expressæ fundunt erorem atrum; loco synoviae in articulis adeit humor viridescens. Hæc observavit *Leind* in veteri scorbuto. Vide *Arthritidem scorbuticam*.

Leind omnibus Medicis in eo refragaent quod contendat dolores scorbuticos non esse noctu divites quam interdiu.

7. *Osteopus ab osteosarcomi* Trans. Philosph. 470. a Sylvano Bevan.

Dolores sunt atroces, qui cum diabete. incli-
Savages Nosologia Methodica. Tom. II.

piunt & perseverant, in scapulis, dorso, artubus, constantibus hectica & anorexia. Ossia dorsum omnia, potissimum ubi duriora fuerant, remollescunt; medulla rubella, plena, membranacea, spophysis adhuc firma: hic morbus ab acido calcareo ossium materiem dissolvende pendere videtur, & usum aquæ calis, huic acido insin-
gendo apte, suadere videtur, quæ aqua in diabete Anglico plurimum valet.

III. RHEUMATISMUS; Rheumatisme, *jointure, courbature*.

Est distensus musculorum, in artubus potissimum, & dolor, sine coryza, raucedine ac rheumate.

Differt ab *Arthritide* & *osteopoco* ratione genus doloris in partibus carnosis, non in articulis & ossibus ipsis. A *catarrho* & *laxitudine* febrili, ratione diurnitatis quæ ad plures menses & annos extenditur, (solo acuto excepto) nec non quia *catarrhus* incipit a coryza, raucedine, &c. A *cephalalgia*, *pleuridymie*, *ischia*, *lumbagine*, &c. quod rheumatismus brachia, crura, nunc illa nunc ista vage afficiat, non vero determinatis locis inhaereat, aut simul huc illucve excurret, unde etiam differt a phlegmasi dolorificis, ut pleuritide, phrenitide, &c. A *rachialgia*, *hepatalgia*, *neuralgia* discriminatur signis horum generum propriis.

Hoc genus militat quandoque inter phlegmasias, ratione febris acutæ, crux inflammationis sanguinis, & forte in duo genera rectius divideretur, unum acutum, alterum chronicum.

Genus rheumatismi est moderatum; hoc nomine *Calvus Aurelianus* diarrhoeam, *Riverius* arthritidem vagam intellexere; ægri vocatur *rheumatismi*, aut rectius *rheumatismalis*, metu confusionis rheumatismi cum rheumate.

Friderici Hoffmannus rheumatismi nomine complectitur plura genera, ut odontalgiam & ophthalmiam; quidni colicam & omnes dolores, quod ab usu & recta logica recedere est.

1. *Rheumatismus acutus* & *Rheumatismus Sydenhami* cap. 5. lect. 6. *Arthritis vaga* quorundam; *Rheumatisme chaud*. A.

Est illa species quæ febre continua acuta, scilicet synocha, ripatur, deinde apyrea evadit.

Differt a febriculo, qui intermittenti febrili, ejusque veneno debetur, ac ope kinkine curatur.

Incipit a frigore & horrore, dein calor & pyrexia succedunt cum doloribus noctu, diuque discruciantibus, in diversis musculis artuum & trunci, motum impediuntibus; accedit sudor, qui quandoque uberius & costans est, a levi artuum denudatione dolor recrudescit. Febris tamen est immunis a putredine, lingua est nitida, nullus ructus, nulla cardalgia, sanguis in piatella est rectus gelatina alba, subpellucida, crassa, molli unde a pleuritica differt, quæ densa, firmoque est. Post duas circiter hebdomades, iteratis pluries phle-

phlebotomis & poru diluente, febris evanescit, tunc lenia adhibentur cathartica, iuscula refrigerantia, cremores usurpantur, & residui dolores ope lactis tandem evanescunt.

Hic morbus sub finem autumni adolescentes laute viventes exercitatos, biliosos, plethoricos adoritur.

Prognosis facis tuta est, nisi quod male tractatus hic morbus in rheumatismum apyretum chronicum degenerat.

Hæc species est vere inflammatoria; sudores, si parci sint, pitana calida de cichorio, capillis veneris promovendi sunt; uberiores, pitana refrigerante ut aqua, & cremoribus oryza temperandi; quotidie, si sudor cesset, e lecto surgendum, aut in eo sedendum, ut ardor ventiletur; parce utendum narcoticis, quæ materiam morbificam figunt seu sanationem retardant, phlebotomia sæpius quinque aut plures in nostra regione desiderantur, intra septem primos dies instituendæ. Hæc sunt præcipua hujus speciei remedia.

Ante Sydenham hujus speciei historia distincta nulla erat.

2. *Rheumatismus vulgaris; Dolores rheumatismales vulgo; Rheumatisme simple chronique.* L.

Illæ species quæ per intervalla recurrit sine febre, sine sudore, & valde affinis est doloribus catarrhalibus, nisi quod signa catarrhi cetera desint. Illa species a sanguinis & lymphæ viscositate aut spissitudine pendere creditur, & quoniam hieme magis vexat, atque diaphoreticis curatur, ideo dicitur vulgo rheumatismus frigidus, seu a causa frigida. In hac specie quandoque tumores molles cuti concoloris, vel parum rubri in diversis partibus sobolescent, exstantes hæmisperici, nuci magnitudine, potissimum apud phlethoricos, & mulieres non menstruatas nulla febris adest, aut levis & fugax, cruor tamen gelatina pellucida albescens in patella tegitur.

Curatur in paroxysmis repetita phlebotomia, parcius tamen quam in acuto, nisi methodum ab illustr. Medico Sarsensi D. Vissay adhibere placeat. Potus diaphoreticus, ex decocto scabiosæ, infuso capillorum veneris, usurpandum ad sudores movendos; frigus omnino vitandum, narcotica vespere adhibenda.

In prophylaxi seu dolorum intervallis, indusium læneum (stanelle) cuti immediate applicandum gestetur, aqua calida sit potus ordinarius saltem hieme, iuscula viperina & ex cancris fluviatilibus; dein instituta catharsi, lac vaccinum aut caprillum, decocto lignorum sudoriferum, ut buxi, guajaci, chinæ alteratum, per mensem usurpetur: in temperamentis frigidis ammoschasia mensibus calidissimis, thermæ Balerucanæ mense Maio aut Octobri sub forma potus, balnei, stuphæ, luti in usum advocentur; & quod sæpe miros effectus præstat, electrisatio quotidie per horæ quadrantem repetatur per dies quindecim, & tempestas frigida, & sicca fuerit, additis scintillarum extractionibus ex collo & partibus affe-

ctis, nec non aliquot fulminationibus. Vide *Academ. Suecica.*

3. *Rheumatismus arthriticus; Rheumatismus Rivierii; Rheumatisme goutteux; Goutte vague.* L.

Ille est qui & articulos & passim partes carneas afficit ita constantes ut ad rheumatismum simul & arthritidem sere æqualiter inclinet, qui proinde utriusque morbi ruram exigit. Is morbus accedit quandoque post arthritidem vagam, & hoc præludium more morbi ætati ægrum lecto per mensem affigit cum pyrexia, dolore articulos & pedes, genua, nec non caput, thoracem, lumbos & artus simul vel seorsim infestante; alias ille morbus est chronicus, vagus, apyretus, nunc has, nunc illas partes aggrediens, perspiratione potissimum suppressa; maciem inducit, digitos immobilis facit, & subrigidos; sublevarur pitanis leviter diaphoreticis ex guajaco, china, necnon lacticiis & thermis sulphureis, ut Bæregianis, Lamalou, de Rennes juxta Aleth, de Bagnaul juxta Mimatem, de St. Laurent apud Helvios, &c.

4. *Rheumatismus scorbuticus* Frider. Hoffmanni de Rheum. Lind de scorbuto 1. vol. pag. 375. *Rheumatismus cruralis.* Ettmulleri pag. 446. *VVilii de scorbut. cap. 5. L.*

Est vel comes vel *pedisequus* scorbuti.

In omniis doloribus non magis noctu quam interdiu sæviunt; sæpe mutant locum, in lumbis, articulis, tibiis, potissimum cum intumescere tibiæ pectus lancinant, cum dyspnœa a levi exercitio crescente; adest lassitudo universalis, abdominis tensio & tumor, facies pallida & œdematosa, pigrities, torpor, odontalgia, maxillarum dolor.

Pedisequus est, qui sanato scorbuto accedit; est etiam arthriticus, chronicus, cum dolore & stupore articulorum, crescit uterque a motu locali, ab utroque in contracturam, uterque maculis tibiærum est insignitus, præter oris vitia.

In utraque specie præter generalia remedia, ut iuscula antiscorbutica, lacticia, convenienti equitatio & epichemata ex spiritu vini, aceto, & camphoræ panxillo, quæ partibus dolentibus & maculosis applicanda; item decoctum ex sedo arri extus admovetur, & si supulo cerevisiæ miscetur, intus sumi debet ad uncias tres quovis mane. Hoc remedium quandoque emeticum evadit & tunc citius juvat.

In hoc morbo phlebotomia est perniciofa.

Si dolor unam vel alteram partem afficiat, juvant foci ex lixivio cinerum vulgarium, incoctis simul chamæmeli, sambuci floribus, absinthii, rutæ foliis & corticibus l'omonum.

Vesicatoria perniciofa sunt & gangrænam accerunt. Cochlear seminum sinapis semel in die deglutendum. Sudores promovendi, & juxta Lind hydrargyrosis subeunda, quod ego nunquam suaserim.

Vide *lumbaginem & pleurodynem scorbuticam.*

5. *Rheumatismus calidus; L. A lymphæ stissa & acri* Jac. Lazzeri curat. de morbis curandis inter

inter quos rheumatismum male collocat viraliunde meritisimus.

Hæc species a scorbutica differt defectu vitiorum oris & macularum cutis, cum ea convenit ratione acrimoniæ sanguinis, differt ab acuto ex eo quod chronicus sit & sine febre; siccitate, caliditate, macie, temperamento bilioso, calido & sicco ægrotum cognoscitur; invariatur lacticiis, iussulis diureticis ex cihorio, sylmbrio, veronica, becabunga, aquis acidulis calide assumptis, balneis demeticis, necnon sulphureis ut *Lamalea*, *Bagnaul*; irritatur salinis, ut *Balerucanis*; in contracturam facile vergit & ad arthriticum accedit. In hoc stupor domesticæ ex aqua vulgari hieme profunde. Itali in simili morbo partes affectas æstate glacie ipsa conficiant sæpe cum succellu.

Cyrillus, in *consultatione medica* 21. *Cenur*. 3. hanc speciem a scabie repressa ortam cum iussulis *Spiralis* cum lignis sudorificis, viperis, plantis diureticis, addito mare intra nodulum solpenso, faudet etiam catharteres promittendas & aeris mutationem. Vide etiam ejusd. *cenur*. obs. 31. In utroque morbo dyspnœa comes erat.

6. *Rheumatismus equinus* Bourgelat Encycloped. la *Pomere*. Equi affecti dicuntur *Fourbus*;

Signa & curam. vide. loco citato & apud *Soleysel*.

7. *Rheumatismus hystericus*. *Dolores hysterici* Sydenhami differt de passione hysterica.

Est dolor diversarum partium ut capitis, scrobiculi cordis, dorsi, coxendicum, extremorum, cui obnoxia hysterica, dolor ille, ait Sydenham, internas, & nonnunquam etiam exteriores partes occupat, carnesque musculosas, ut maxillas, homeros, manus, erura, tibias, nunc cum tumore, nunc sine tumore, in quo genere is qui tibias distendit tumor præ reliquis conspicuus est. Intet: omnia hujus morbi tormenta nullum se tam crebro ingerit quam dolor in dorso, quod certo certius persentiscunt quotquot levissime hoc affectu tanguntur; quin imo id habent commune dolores prædicti, quod illa cui inhxerant regio, etiam post eorum discessum, tenera sit, & quasi subtilibus probe dedolata tactum refugiat, quæ quidem teneritudo sensum evanesce: Curatur lacticiis..

Morbus, apud Succos raro obviu, quem *Dlewaren*, necnon *Laufendwaren* *Schenckius* nominasse videtur, quem *Bartholinus* *Act. Haffn. T. II. n. 118*: *Illustris* etiam *Linneus* *volaticum* appellat. Dolor ille atrox diversas idemdem partes, vespere potissimum diffunditur, semi hora ad summum in eodem loco permanens, e. tibis ad ulnas, ad femur, ad brachium, relicta priori sede, momento citius se transferens, si ne ullo signo extendo, si ascaridum exitum e parte affecta, a *Schenckio* memoratum, expias: æger præ dolore clamat, mortem aut Dei opem implorat, ac intra aliquot horas sanus est, nisi tamen dolor ad abdomen deveniat, tunc enim perniciosa est, abdomen tenditur, palpitatio, anxietas, aphonia accedunt,

observante *Ill. Linneo*. Affinem morbum vide apud *Freind* *Hist. Med. in vita Albucalis*.

8. *Rheumatismus salatorius* Cardani lib. 3. de Venenis; *Flatusus* qui nakti Albucalis; *Spasmus flatusus* Plateri pag. 277. *Rheumatismus verminosus*. Vide D. Tissot. *Avis au Peuple*, du Rheumatisme Chap. XI.

Apud Helvetios infantes obnoxii sunt doloribus adeo violentis & universalibus, ut, ubi vis tangantur, clamores edant vehementes; cave ne decipiaris hunc morbum pro vulgari rheumatismo curans; pender aliquando a vermibus seu lumbricis, quibus rejectis, ægri convalescunt. Hæc *Illustr. Tissot*.

9. *Rheumatismus verminosus*, D. Marecau de Grandvilliers *Journ. de Med. Juil. 1764. pag. 37*. Obs. 5. Tissot *Avis au Peuple*: Du rhumatisme Chap. XI. n. 167. A.

Puella, vermibus obnoxia, laborabat febricula, cephalalgia, stupore dolorifico omnium artuum; alternans rubedo alterutrius genæ vermes arguebat; indicabantur cathartica, sed dolor abdominis ejusque tenso, sine tumore tamen, tanta erat, ut ne summis digitis tangi pateretur; frustra phlebotomia, oleosa, clysmata, emollientia abhibeantur, sensibilitas abdominis evasit universalis, maxime vero affectu totum abdomen, pedes, verticem; nulla pars sine dolore tangi poterat, omnes dolores ad tumorem cuti concolorem in regione iliaca dextra tanquam ad centrum, vergebant: a notu vel tactu corporis tantum dolebat ægrotans; adhibitis in calum remediis, etiam anthelminticis, post decem dies carotica evasit, pupilla immobilis ut & palpebris; artus flexibiles; respiratio pacata, color, pulsus, facies ut in statu sano, sed somnus profundissimus; hic carus fugax, fumo tabaci in nases immisso discussus, iterum per aliquot dies revertebatur, denum clysmata e lacte & vermifuga succedisse quadraginta quatuor lumbricos, quorum tres rubri erant, foras eiecerunt: eorum forte glomus in regione iliaca tumorem memoratum excitaverat: & sic ægra convalescit.

9. *Rheumatismus febrilis* Mortoni, cap. 9. histor. 22. *Febris Intermitteus rheumatismus summus*, seu *Febris rheumatica* ejusdem histor. 12. pag. 84. histor. 10. ad 14. Ill. Sc. de recondita febrium natura. A. P.

Cognoscitur hæc species 1. quod urinx sine lateritix: 2. quod per intervalla cum frigore accedant dolores singulis alternisve diebus, & remittantur; 3. ex pulsa etiam, nisi doloris intensitas eum deprimat; 4. ex prægressis accessibus..

Curæ Mortoni in vehementi paroxysmo.. ubi deliquum animi imminerebat, fuit 1. phlebotomia larga 2. post sex horas vomitorium: 3. kinkina cum laudano. Ab hæmegero dolores rheumatici sedari pluries expertus est *Mortanus*..

Quartanæ chronicæ non raro succedit rheu-

matinus, ut observavit *Ballontus de Rheumatismo*, & dein *Frid. Hoffmannus*. Sed ea species ad rheumatismum scorbuticum accedit.

10. *Rheumatismus merallius* D. Doazan, Doct. Med. Monspel. L.

Est illa species quæ pictoribus, ægulis, deauratoribus, colorum trituratoribus, calceorum femineorum fabris, talos scilicet colorantibus, plumbi laminatoribus, fuforibus, vini lithargyrio edulcorati potatoribus, &c. accidit, sine prævia abdominis rachialgia. Incipit illa species a manuum & brachiorum sudore, formatione, digitorum contractione, lingua albidâ, mucosa, sine pulsus frequentia: Exacerbatur phlebotomiis iteratis, emollientibus, intus vel extus usurpatis; mitescit ab emeticis drasticis, aut sequenti die abit in dolores lancinantes, rodentes, contuentes, crurum, genuum, tibiarum, pedum, quibus misere torquentur & ejulant ægrotautes; sed alternis diebus purgati, interpositis clysmatis ex vino & oleo, nec non vespere narcoticis & laudano & bolo theriacæ, intra decem aut duodecim dies convalescunt omnes fere. Hæc species rarior est rachialgia intestinali.

Hæc observavit in Nosocomio Charitatis Parisiensi egregius Burdigalensis Medicus supra laudatur, atque affert dolores lancinantes, atroces artuum inferiorum, nisi adhibeantur mochiaca, certius adventuros, cum superiorum paralyti, & difficiliter expugnatum iri, si methodus edulcorans adhibita fuerit.

Curatio Lobbianæ rheumatismi acuti, seu *Febris rheumatica* *Theop. Lobb Traß. c. 9. T. 2.*

D. VVixham 55. annos nata 1. Junii querebatur de magnis doloribus in toto corpore, oculi velut inflammati, identidem delirium, respiratio prompta & brevis, sitis urgens; tussis importuna, pulsus velox, fetis fortis, cutis fœvîda: Die 2. accersitus *Lobbius* nullam phlebotomiam præscripsit, hujus vero loco bolum attenuantem, sexta quavis hora repetendum, superbibendo infusum mellisæ in bolo erant nitri, florum sulphuris, lapidis contrayervæ, ana, gr. septem; salis succini, salis volatilis coccinillæ, croci, myrrha, ana, gr. duo. Tertia quavis hora fumenda erant tria cochlearia jupli attenuantis; ex salis absinthii, scrupul. duob. aquæ lactis alexiterie unc. sex, aquæ cinnamonomi, unc. una & semisse, spiritus nitti dulcis, gutt. quadraginta, syrupi limoni & balsam. ana, drach. duabus. Ægra subinde capiebat mixturæ sequentis guttas viginti quinque, spiritus vitrioli dulcis & tincturæ croci ana drachmas duas superbibendo haustum decocti cornu cervi & vini albi. In languoribus vero capiebat julepium ex aqua lactis alexiteria, aqua trioniz composita, spiritu lavendulæ & tinctura mirrhæ. Febris remissæ quinta die, evanuit septima; dolor vero octava. Ad accelerandum curationem quarta die præscripsit *Lobbius* julepium ex antimonio diaphoretico, lapide con-

trayervæ, diascordio, coccinilla, sale absinthii, aqua lactis alexiteria, aqua trioniz composita, syrupo de althea, & tinctura castorei, & sic deinceps.

Monspelli phlebotomia prima diebus ter in die circiter fuisset repetita; potus fuisset largus calidus ex decocto cicchori, vel infuso capillorum veneris; noctu narcoticum, sedata febre, cathartica mita, &c. eodem modo quo *Sydenham* hunc morbum curabat Londini.

Lobbius vero pleuritidem veram in adu'to viginti duos annos nato similiter absque phlebotomia curabat sudorificis, cardiacis, emplastris, vesicatoriis ulnæ applicitis. Videatur ejus observatio 49. & 50. Tom. 2. & maxime in aphorismis quibus terminatur opus, quibus affert morbos omnes febriles, inflammatorios, ardentis, putridos, malignosve acutissimos, sine cathartici, sine emetico & phlebotomia curari posse, & pluries a se ipso curatos esse.

Hinc concludo naturam esse optimam morborum medicatricem, cum invitis quæ a Medico obijciuntur impedimentis, ægrum tamen a morbo liberat.

11. *Rheumatismus dorsalis* *Lonanii* de tabe dorsali. C.

Est ille qui nimium Veneris usum sequitur. *Vide Lumbaginem a saryriaci; Tabern. dorfalem.*

12. *Rheumatismus militaris* Cl. Bonté Journ. de Med. Janv. 1757.

Puerperis familiaris est cum eruptio miliaris abbit in squamas; dolores enim vagi, qui prius viscera affecerant, ad artus excurrunt; in articulis fit intumescencia, qualis in arthritide rheumatica; cutis colorem lucidum ibi adipiscitur, sine ædemate; hæc intumescencia lucens, pallida, ab uno articulo seu geniculo ad alterum migrat, & peritæx est; dolores acuti sunt, ægræ ex his immobiles sunt; doloris enim acerbitas a levissimo tactu adaugetur: crisis in hoc morbo utilis est urina turbida copiosa proventus; juvant ideo diuretica levis diaphoreticis juncta, ut serum lactis cum incocta radice chinæ.

13. *Rheumatismus fugax*; vulgo dolores rheumatici; *comburatur*. B.

Ille est qui febribus acutis & phlegmatis initio supervenit, dolor scilicet in omnibus artibus & muscularum aponeurosis, cum sensatione lassitudinis, qui phlebotomiis, aliisque horum morborum remediis evanescit; ægri dicunt se sentire quasi fractos & ubique contusos aut sustibus dedolatos.

14. *Rheumatismus necrosos*. Vide Necrosim uli-lagineam.

Dolores incipiunt a stupore pedum, qui sensum tibias, crura, manus, brachia invadunt; illi dolores atroces sunt, urentes sæpius, aere frigido sublevantur, partes contabescunt & nigrescunt, unde necrosis.

15. *Rheumatismus convulsivus*. C.

Est dolor artuum, dorii, lumborum, vehementer cum artuum retractione spasmodica, vel in supo-

fluporem & extremorum necrosim cōtinens, ut in necrosi uftilaginea & epidemica Flandriz, vel sine necrosi perfeverans, ut in convulsione raphania.

IV. CATARRHUS; aliis *fluxo, defluxo, defillatio*; Italia *Infreddatura*; Hispania *Romadizo*; Caterre, *Catarrho*.

Charact. Est partium, præsertim collo vicinarum, dolor frigidus cum tussis, aut coryza & levi partis inuolumentum ab aeris vicissitudine ortum ducens: Pyrexia vespere datur exigua, si ulla; symptomata plura, ut tussis, coryza, pyralismus, otalgia, odontalgia, tumor colli, frigus vagum præcedunt.

Difficilis est hujus morbi character, sed certe qui deducitur a causa latente, eo peior est, quod falsus sit; absque scilicet eum definitum Veteres per *humorum decubitus*; alii per fluxum materiarum serosæ a capite ad partes; nec enim ille decubitus, nec ille fluxus in sensus incurrat.

1. *Catarrhus benignus*. D.

Dolor catarrhalis est sæpius sensu frigoris stipatus, & a suscepto sæpius frigore ortum ducit, unde frigidus dicitur; artamen rubedine & phlogosi lymphatica non raro stipatur, sic rubet cutis capillata in cephalalgia catarrhali; utcumque eum morbum a perspirationis repressione oriri sæpius patem, non minus notum est omnibus eum non solum ab aeris subito refrigerio, vento frigido suscepto, sed etiam a subita post frigus aeris inalescentia ortum ducere, ut & ab insolatione; ita plures catarrho affliguntur vere quam hyeme ob tempestatam vicissitudines. Certum est a minori gradu frigoris homines affici magis, si majori assueti sint calori, quam afficiuntur a frigore intensiori, sed continuo & uniformi; si calentem hominem leve frigus occupet, cutis magis constringitur quam si idem frigus antea non calentem afficiat. Perspiratio totius corporis est æqualis dimidio assumptorum, seu quantitati urinae, circiter quadraginta sex uncis; ea vero materies urinosa est & acris, qua proinde retenta irritantur partes, turgescit textus cellularis; hinc tumor, dolor, non raro febricula accedit; quæ vespertinis horis augefcit cum horrore & frigore. *Vide Amphimerinam catarrhalem*. Ille status est valde affinis ratione frigoris & febris cum amphimerina hysterica, eo discrimine quod catarrhalem sere semper præcedat coryza, tussis, saucedo, odontalgia, otalgia, &c. dolores catarrhales sæpe ad humeros, brachia, pectus se diffundunt & pleurodynem ac pleuritidem catarrhalem efficiunt, usque in ventera genas inflant, maxillas impediunt, obstititatem inducunt. Is itaque affectuum concursus dicitur a rheumate diversissimus, licet ab eodem principio ortus, sed nec non dyspnæa & tussis discrepans.

Dolores catarrhales perspiratione restituta, victu tenui, potu calido, aeris temperatura cadidior, exercitio sensim assoluntur; si actiones

sine, phlebotomia, & quod minime negligendum, cathartici identidem repetita, demum theriaca recentis ad scrupulum vespere sumpta, sanantur: si diuturniores evaserint, signum est rheumatismum calidum his accrevisse, lacticiis ac theriacum sulphurearum balneis impugnandum. Sunt multi qui confundunt catarrhum cum rheumate, & calidum dicunt catarrhum illud rheuma quod phthisi viam sternit.

De catarrho maligno qui agunt intelligunt febrem catarrhalem malignam Germanorum, quæ est Hemitritæ species nihil cum catarrho commune habens, ut notat *Illustr. Brendelius*, vel saltem catarrhus serinus aut epidemicus volunt.

2. *Catarrhus serinus*. *Quintus. Coqueluche*.

De hoc videatur tussis serina; tussis enim est tunc præcipuum symptoma, licet vividis doloribus dorsi, pectoris quoque stipetur.

3. *Catarrhus epidemicus, catarrhalis epidemica* Huxham Febr. 1733. & Nov. 1737. Grippæ; *Fallette. A.*

Maxime distinguendus est a febre catarrhali maligna *Junckeri, Nenter*, aliorumque Germanorum, quæ cum catarrho nil habet commune præter nomen.

Catarrhus epidemicus a serino non discrepat nisi ex eo quod popularis sit & grassetur e loco in locum. Catarrhus iste pendet a generali aeris vicio, & cum zephyrus tepidus in media bruma vento aquilonari frigido succedit, sæpius suboritur quam si frigus perseveret: sæpius est cum febre vespertina. *Vide Amphimerinam catarrhalem*: Secus non minus molestus est ob horridas lationes sere continuas per biduum triduumve quas æger potest aliquatenus siflere per aliquod tempus, constrictione quadam cutis & intenso conatu corporis, adest frigoris sensus in diversis partibus, tussis, coryza, capitis gravitas; succedit defillatio ex naribus, ore; dein maturescente catarrho, exspuitio viscosa, muci narium copiosi rejectio, antea vero noctes inquietæ, anorexia, asthenia, tussis defatigans. Curationem repute ex *Riverio, Hoffmanno*, aliisque.

Catarrhum suffocativum etiam memorant Auctores, quem non satis intelligo, nisi tussim suffocantem velint: æst plurimi hoc nomine insigniunt asphyxias seu mortes subitanæ, quarum multæ a rupto aneurysmate interno, aliæ a vomica rupta dependent, aliæ sunt apoplecticae &c.

De catarrho, *vide Amphimerinam, Tussim, Rheumam, Coryzam, Cephalalgiam*, aliaque genera.

3. *Catarrhus Bellinsulanni*, Journ. de Med. Novembre 1757. D. Rochard. Chirurgi. *Maladie particulière des glandes, endémique a Belle-Isle om mer. B.*

OEdematosæ inuolumentum glandulae colli, maxillares, parotides cutaneæ; ad angulum maxillæ primo viget hic tumor, ac tantus ut deformis evadat æger; tumor quidem mollis est, & tamen dolorificus. Incipit morbus absque febre, cum inappetentia, & lassitudine, & post paucos dies, si a phlebotomia

B j inco-

inceperit curatio, testis ejusdem lateris, ambo etiam, si utrumque colli-latus affectum sit, dolent leviter ac tument. Hic affectus milites eu-stodiam sub dio agentes aggreditur.

Curatur potu leviter emetico, deinde diluentibus calidis, quibus præmissis ad phlebotomiam tuto confugere possunt; viratur, si ab aere nebuloso & frigido caveant. Hæc ergo species teliculorum tumore adventitio distinguitur ab aliis.

5. *Catarrhus rubeolæ.*

Est præludium *rubeolæ*, ut crampus, *Græc* dictus, *miliaris*; scilicet ante eruptionem rubeolæ æger sæpe tussit, sternutur, lacrymatur, coryza laborat, verbo catarrhofum cum diceret, licet erumpentibus rubeolæ pustulis hæc symptomata evanescent, excepta tamen tussis sicca, quæ nullum quandoque negotium ægris & Medicis facessit; si hæc addam anginem catarrhalem, dolores capitis, alique catarrhi accidentia. Ille vero catarrhus ab epidemico vulgari diversissimus est.

6. *Catarrhus pectoris.* L.

Puella, quæ hiemali tempore sericeo velotantum pectus tegerat, clamidi densiori assueta, per plures menses in parte pectoris antica dolorem sensit, qui tactu paululum exasperabatur; mox æ longitudine morbi metuebat phthysicos accessit ob tussiculam accedentem; interea dolor erat mere catarrhalis ab adipsneustia ortus; frustra adhibitis jusculis edulcorantibus, & lacticanis, crassum & calidum mucinum, & pectori impostum, & aliquandiu expectatum, calorem & suppressam hujus parvis perspirationem revocavit ac morbum sustulit.

Dolores etiam a collo & facie diffusi pro catarrhis habendi sunt, licet tussis, coryza, nec sternutatio præcesserint, quoties evidens est eos ab adipsneustia ortum duxisse, unde a rheumatismo discrepant, quod ulterius confirmatur, si pannorum villosorum aut densiorum calidorumque tegumentorum applicatione & diluentium diaphoreticorum usu tollantur; aut ea diagnosi non raro difficilis & obscura est.

7. *Catarrhus caninus.* Journ. de Med. Fev. 1765.

Est illa epidemica species, quæ nuper genus caninum Montpelii, Lugduni, per totam fere Galliam, impetivit, plurimosque abstulit. Incipit a frigore & horrore, sequitur tussis, coryza, pyralismus, inappetentia, tanta asthenia ut paraplegici videantur, & cruribus posticis quasi resolutis insistere nequeant. Vide P. Fournier D. M. Dissertationis de hoc morbo Schedulam ann. 1764. Epidemia rediit hæc hyeme 1765. nec non D. Desmays qui eundem morbum anno 1763. observaverat symptomatis supra recensitis addit tussim, dyspnœam, oculorum lippitudinem viscosam; alii intra mensem, & tunc omnes consumebantur. In cadaveribus cerebrum depressum, pulmo vitiatum, stomachus sabutra putri fortissima factus.

V. ANXIETAS; *Dysphoria*, *Affo*, *Aporia*, *Riprasmos*, *Adaimonia*, *Blephismos* & *Alysmos* Hippocrati & aliorum; *Inquietudo* Sennertii; *Restlessis* Anglorum; *Desaffesiego* Hispan. *Inquietude*, *Angoisse*, *Anxiété*.

Est molestia sensatio quæ adjectionem cogit, sed quomodo ab affinis morbis discrepet, dicant qui experti sunt.

1. *Anxietas febrilis.* Boerhaave Aphor. 631. A.

Tres hujus varietates merito distinguit sagax & peritissimus ejus commentator, scilicet 1. anxietatem quæ in morbis acutis febrilibus oritur ab immobilitate sanguinis per cor sinistram & majores arteriæ aortæ ramos; ea pulsus inæqualitate, debilitate potissimum stipatur, cum angore cordis & præcordiorum intolerabili, eaque est sævissima, periculosissima; 2. anxietatem quæ oritur ob immobilitatem sanguinis per cor dextrum & arteriæ pulmonaris ramos, ab infarctis sanguinibus tum arteriis tum venosis, in morbo acuto pulmonum, ut peripneumonia, cynanche, orphopneæ, & illa stipatur fuscis frequentioribus, profundioribus, præcordiorum gravamine, molestia intolerabili, dyspnœa suffocativa, quæ quidem symptomate nullum est pejus præter primam speciem quæ sæpe huic adjungitur; 3. anxietatem quæ oritur ab impedito transfluxu in morbo acuto febrili per venam portarum, quæ stipatur incredibili cardialgia, æritudine vehementi circa orificulum superioris stomachi, cum sensu ponderis molestissimi, quod etiam quidam ægri præ intolerantia pugnis contundunt; huic succedit quandoque salubris acrio, ex qua mortis periculum remouetur.

Hæc varietates, scilicet præcordialem, pulmonarem, epigastricam, doctè enarratas, earumque signa & indicationes vide apud illustrissimum archiatrum Van-Swieten Boerhaavianæ doctrinæ & sanæ hæreticæ.

2. *Anxietas spasmodica* Boerhaave aphor. 633.

Est illa præcordiorum & stomachi vehemens anxietas quæ hysterica potissimum, hypochondriacas, simileque genus hominum delicatioris & molliori genere nervoso prædictorum, maxime si per cathartica acuta exagitantur, sæpius diffusiatur; hæc stipatur angore animi, fuscis, oppressione, nausea, doloribus, & irrequieta miserandaque corporis agitatione, quibus mortis imago præsens animis & in facie depicta terrorem unumquemque exiungit.

Hæc vero species utcumque majorem cæteris terrorem ægris incutiat, cæteris multo minus periculosa est, cum urinx limpide & uberissime missione, flatibus ano vel cæco erumpentibus, spirituosorum odoratu, aliisque similibus auxiliis cito discutitur; & sine febre, pulsu interea depressio, contracto, sed non frequentiori exiungit.

3. *Anxietas agnostica.* *Angoisses de la mors* A.

Est illa quæ mortem imminentem concemari

ari & præfagire consuevit, in quovis morbo acuto vel chronico, a præcedentibus ideo diversa, quæ visus obtenebratione, pulsus inæqualitate, parvitate, inconstantia, faciei pallore, delirio, oppreffione pectoris, palpitatione cordis, virium muscularium prostratione signatur.

Pendet a sensu confuso periculi propter resistens circulationi oppositas & debilitatem naturæ quæ his superandis jam impar evasit.

4. *Anxietas cordis.* D.

Ea est quæ citra morbum inflammatorium aut febrem pendet ab obice circulationi opposito, intra aut prope cor collocato, ut a polyo, a neurymate, coagulo sanguinis, veneno v.g. viperæ & similibus.

5. *Anxietas ribiarum.* Astruc de Morb. venereis. L.

Hoc affectu nihil est in praxi frequentius & non alius de quovis morbo quam de illo apud Auctores est silentium. Quotidie videmus mulieres & viros, potissimum arthriticis, rheumaticis, qui accedente vespere tibias ne per minutum in eodem situ & loco retinere queunt ob importunam quandam sensationem, quæ motu illo paulisper sedatur, quæque vulgo decubitu in lecto evanescit.

6. *Anxietas a morsu;* a morsu felis irate Morgagni Epist. LXL. 14. L.

Felis irata tibiam heri sui dentibus unguibusque sauciaverat, quæta a morsu die magna præcordiorum anxietas accessit; nullus erat hydrophobiz metus. Adhibitis in casum cucurbitulis & scarificationibus loci affecti, nec non phlebotomis, æger solo balneo pluries, repetito sublebat; demum oborta ephœmera & sudore ubertim fluente, sanus evasit. Verum quolibet plenilunio in demorio loco, eoque adhuc livido, irritationes per duos annos perseverabat, indeque a præcordia ascendebant, ubi anxietas magna, non nisi per phlebotomiam superanda, redibat, & per alios duos annos hic affectus quarto tantam quovis plenilunio revertebatur.

Cæteræ anxietates partium distinctarum videantur in singulari morbis a quos attingunt. De cætero multi morbi ab anxietate declarantur apud infantes lactentes maxime intra cunas vindos.

VI. LASSITUDO; Græcis *Copos*; I Anglis *Weakness*; Italis *Stracchezza*; Hispanis *Cansancio*; Lassi-tudo, Courbature.

Est ingrata sensatio cum debilitate juncta, quæ ad quietendum cogit virium reparandum gratia. Procedere videtur ab infarctu muscularum, ob sanguinem in eorum vas minimis impactum eaque vasa distendentem, interea dum ob defatigationem prægressam fluidum nervæum penuria laborat, aut ob aliam causam in artubus deficit, ut in initio morborum accidit.

Hujus septem species accenset Galemus divi-

sione potius logica quam medico-practica. Huc attinet *Copos tonodes*, lassitudo tensiva, *Copos elcades*, seu ulcerosa, in qua infixarum spinarum horrorefque sensus adest; *Copos phlegmonodes* seu æstuosa, quæ sensum caloris secum insert; *Copos ischnotes*, quæ cum aridura corporis est, &c.

1. *Lassitudo a lebre Hippocri de dicta lib. 2. Horellii diik. de lassitudine, Altdorhæ, 1706. B.*

Ea est quæ a motu producitur sive in toto sive in parte, quæque, observante Hippocrate, sequitur rationem compositam motus & debilitatis præviæ, ita ut quo motus vehementior, & robur minus, eo major lassitudo, & e contra. Verum non solum a vehementia motus illa lassitudo mensuranda est, sed etiam ex eo quod motus sit minus aluctus, magisque constans; sic qui laborem inassuetum, utcumque levem, ineunt, citius defatigantur, quam qui certos musculos constanter contractos retinent, ut de stantibus ostendit Alphonfus Borellus, qui, reapse citius defatigantur quam ambulantes. Cur lassitudo vehementes convulsiones, ut paroxysmum epilepticum, sequatur quisque intelligit.

2. *Lassitudo a parhamate.* B.

Ea procedit vel ab ira quæ fluidum nervæum subito in omnes artus diffundit & dissipat, vel a terrore & gaudio effixi, quæ alio modo non sat cognito vires insignunt; verum infractis subiro viribus corpus gravius solito perferuntur, unde lassitudo. Huc pertinet quæ magnos dolores, quæ vigilias immodicas sequitur.

3. *Lassitudo a fluxu.* L.

Ea est quam *alvi fluxus*, maxime torminibus juncti, ut diarrhæa torminosa, tenesmus, dysenteria, cholera, vel *sanguis fluxus*, necnon phlebotomia, menorrhagia, vel demum *sri fluxus* copiosis, necnon gonorrhæa feminalis & similes fluxus excitant; huc pertinet puris effluxus subiti & magnis apostematibus.

4. *Lassitudo a salute.* B.

Ea est quam atmosphæra incallescens tempore verno, necnon calor hypocausti, sicut & calor a balneo similiaque excitant, dum fibras omnes motrices subito relaxant, inde enim debiliores sunt, & cum pondus corporis non pari passu decrescat ac debilitas, corpus ponderosius sentitur.

5. *Lassitudo a plethora.* B.

Talis est ea quam crapula seu excessus in pota & cibo excitant, quam catameniorum, effluxuumque alveorum suppressio inducit; huc pertinet lassitudo a somno nimio.

6. *Lassitudo febrilis* Pr. Alpini de præfag. vit. lib. 2. cap. 21. B.

Duplex est, vel enim initium morborum præsertim acutum est, de qua dixit Hippocrates *lassitudinis automatica* seu spontaneæ morbus prænunciatur, & ea pendet tum a plethora, tum maxime a debilitate universali in quam inducit infarctus valorum, resistentia cordi a sanguine opposita; tum quam metus obscurus mali imminentis causatur plethoram fere semper antecede-te suadens perspirationis retentio, quæ mul-

multis morbis anam præbet, necessitas phlebotomiae in omnibus fere morbis acutis.

Vel lassitudo febrem jam ortam comitatur cum dolore diversarum partium, & est major in typho, peste, aliisque morbis malignis. *Vide atheniam febriem.* De hujus speciei prognosi vide *Prosp. Apianum* L. c. Lassitudo localis in febribus declinantibus apostemata seu abscessus prænuñciat ex *Hippocr. Aphor.* 31. 32. *sect.* 4.

7. Lassitudo scorbutica Lind. de scorbuto; *Lassitudo scorbutica* Græcorum *ulcerosa* Veterum L.

In prima periodo scorbuti adeest pigritia infolita, quæ abit in lassitudinem, cum genuum stupore & debilitate a levi exercitio, atque dyspnœa, quæ duo ultima symptomata, lassitudo scilicet & dyspnœa, ad finem usque perseverant, eo discrimine quod in secunda & tertia periodo accedit athenia seu debilitas crescit admodum.

8. Lassitudo cachectica Helvetii de lassitudine. L.

Est illa quæ morbos chronicos cachecticos comitatur, inter quos potissimum sunt aurigo, œdemata, aliæque genera; quæ a tenia in primis viis latente inducitur lassitudo, singularem sententione meretur, cum ejus principium in sensus non incurrat, ut principium lassitudinis quæ ascitos, œdematosos, corpulentos & convalescentes omnes afficit.

VII. STUPOR; Græcis *Narkê*; Latinis etiam *Obdormitio*, *Engourdissement*, *Stupor*.

Est molesta sensatio cum obscuritate tactus. Differt maxime a torpore in eo quod torpor meam tactus & motus immutationem designet; stupor vero illud singulare, quod quisque experitur cum olecrani aut nervi fortis pressio facta est, aut cum dultius horis pomeridianis brachio incubuimus. Differt a crampo, quocum tamen quandoque jungitur ex eo quod non sit in Rudidis musculis rigiditas ut in multis crampis.

1. Stupor a pressione. L.

Est ille quem experiuntur artus diu compressi vel proprio vel alieno pondere & sita non mutata. *Vide Gangranam a contusione.*

Ille etiam quem excitat contusio olecrani, aliarumve partium per quas nervi majusculi sub cute transeunt; sit universalis sit & constans, hemiplegiam, apoplexiamve denunciat; si fugax & partialis, vix medela indiget.

2. Stupor formicans; *Formicatio*. Latinis; *Fourmillement*.

Hæc species id habet singulare quod dolor sit qualis a millenis formicis seu spiculis partem stupidam pungentibus, quodque simul motus artus affecti sit torpidus, hinc tamen rigiditate, qualis est in crampis.

Curatur sponte stupor frictione, calidis admotis, maxime spiritu vini calido, ut aqua lavendulæ, ethyni, rosis marini si perseveret, curatio paralytice adhibenda est.

Hujus morbi theoria adhuc est obscuris-

simâ. Videtur fluidum nervæum in partibus affectis hæzere, congeri, unde pars appensa obscurare sentit, difficulter movetur, & pars ipsa affecta dolo.

Stupor est sæpius accidens morborum soporolorum imminentium, necnon dysœmæiarum, ut paralytice; differt ab anæsthesia aliisque morbis dysæsthesiis dictis, ratione doloris seu molestie singularis.

Formicationem in fronte & facie centies expertus sum quoties caput deorsum inclinare, in quo certe casu ex rubore faciei & legibus hydraulices patet sanguinem solito fortius subire ultimæ suæ vasæ, eaque vellicare, forte lymphaticorum oscula diducere; non ergo leviter in omni formicatione acrimonia horum est incusanda.

3. Stupor a gelu, vernacule *Gripi*, Gallice; *ongle*. B.

Ille est species quæ extrema tantum, ut digitorum manuum pedumve, intensissimo frigori exposita, sensum non subito corripit, rigiditate & alicui parti stupore fixata, cum dolore acuto & sensu frigoris congelantis; Differt a crampo.

4. Stupor a torbedine. *Coup de la Torpille*. B.

Est ille quem Torpedo tangentibus incutit, maxime si immediate contingat, debilis vero, si baculi interventu duo musculi dorsum illius raje tegentes, summa vi excussi, hunc effectum inducunt, quem docente *Kampfero* & experientia prævertunt qui summo nisu, dum torpedinem tangunt, anhelum cohibent. Stipatur ille dolor alicui stupore, & a manu ad humerum & altera extenditur. Duplex autem est Torpedo, altera Europæa quæ *Raja tota* *linna*, vulgo *Mirallier*, in Mediterraneo vulgaris; altera Americana, quæ est *Gymnotus tremulus*. *Ab. Helveste*. *Tom.* 4. utraq; tangentibus vel mediate vel immediate artubus crampam vehementem imprimat. Illud tamen attentionem meretur, quod si inventu cuiusdam metalli corporis tangatur *Gymnotus*, succussio multo intensior est, aut si intervenit cæra Hispanica, succussio fere nulla sit; quæ si vera sint, ut testantur autopes, verosimile est vim electricam horum piscium esse hujus commotionis principium.

5. Stupor miliaris. *Grans* Taurinensem Allione de militari. A.

Est symptoma miliaris, seu stupor pungitivus in. in digitis manuum vel pedum, aliisve partibus, ante dem sextum seu eruptionem frequens, cum pulsu exili, frequenti, contracto tremore, anxietate.

6. Stupor rachialgicus. C.

Vide *Rachialgiam* cujus est symptoma, *pareseos* prodromus.

7. Stupor a necrosi, Ctar. Stierne de morbo Soloniensi; Mem. de l'Acad. R. des Sc. des Académiciens è transgers 1755. Vid. *Necrosim* usilaginem. A.

Stupor est pedis, vel manus cum mentis hebetudine, qui semper præcedit dolores atroces sine rubore necrosim usilaginem antecedentes; pars eito,

nihrescit, indurescit, & siccata sponte a sana separatur sine hæmorrhagia; præcedere pallor, phlebotonia, macies, dein rheumatismus accedit. Confer *Tissot Avis au Peuple* a 670. 673. Vide Class. X. Ord. VII.

2. *Scrop saburralis.*

Monialis quinquagenaria a mense conquerebatur de dolore fornicante manuum & pedum, cum stupore harum partium, tandem supervenit atrox cephalalgia cum nausea sine febre; præscripto post phlebotomiam emetico copiosam bilem vomuit & omnia symptomata evanescere: sequenti die revertebatur morbus, levior tamen: purgata iterum uberrimam bilem deiecit & omnino sanata est. Moniales sunt sæpius aerabilaris ob mororem, zelotypiam, similiaque pathemata, quibus vita genus ansam præbet, cum deest sineera vocatio.

VIII. PRURITUS, *Pruris; Demangeaison.*

Est molestia cutis sensatio quæ ad scalpendum cogit. Ille dolor singularis, qui quadam voluptate temperatur cum pruriginosa pars strenue scapiatur, est ita quandoque serenus ut via crucientia cutis deratione sublevetur.

Pendere censetur ab acrimonia humoris mucosi, quæ in glandulis sebaceis fecerunt, verum & excitatur a causis etiam externis.

1. *Pruritus exanthematicus. L.*

Est ille qui accidit in multis morbis exanthematicis tum acutis, ut variola, rubiola, dum pustulæ exsiccantur sunt, in scarlatina, dum sevit, vel etiam in scabie, tinea, aliisque impetiginosis ultimæ classis morbis; demum & in vitis primæ elasticæ, efflorescentis dictis, ut herpese, phydrae, &c. Horum generum curam videlicet.

2. *Pruritus pedicularis.*

Est ille qui a phthiriasi, seu a pediculis vulgaribus, necnon a pediculis inguinalibus aliisque dependet, quique facile curatur asperso pulvere vel seminum staphysigree, vel hordei caustici *Gladille* dicti, nisi malint ægri ad litum vel cingulum mercurialem confugere.

3. *Pruritus iactans. L.*

Est ille qui auriginosus infestat, cum aliis auriginis symptomatibus, & bilis sanguini mixtæ præsentiam arguere videtur: curatur usurigo. An Melasictero etiam superveniant ignoro, licet Melasicteros viderim.

4. *Pruritus arthriticus.*

Est ille qui post paroxysmos arthriticos, pedes, manus, dorsum, aliasque partes pertinaciter molestat, at accedente paroxysmo doloris, imo sæpius antea, evanescit.

5. *Pruritus infantum Bismulleri.*

Est illa species quæ recens natos mire anxios reddit & insomnes; quique non nisi ovis observatoribus innoteat; pendet squidenim a orinibus capillo vulgari longe tenuioribus, qui per eorum dorsum potissimum erumpunt, quique trichione iterata cum panno laneo. excutiantur; vide *Malichum in 10 Class.*

6. *Pruritus fugax. B.*

Est ille quem excitant causæ externæ facile amovibiles, quæ tamen varietas attentionem meretur ne cum aliis confundatur.

Si quis manibus tangat phaeoll pruriginosi (pois pouilleux) legumen, cum pruritus per semihoram, & amplius defatigabit: Vide *Dolichum Ill. Linnæi.*

In luxationibus post diuturnas partis vinculas non raro pruritus est molestus, sed qui aqua calida dissipatur.

Pruritus non raro infestat tibias & dorsum eorum qui vestibus tibialibusve laneis immediate cuti applicatis utuntur, quod non accidit in usu lintheorum.

Pruritus specialius aggreditur præputium ob sebaceæ materiei albe inibi collectæ acrimoniam, verum & facile urinæ ope eluitur, si scilicet præputium digitis inter mingendum obturetur.

Scrotum etiam pruritus est obnoxium ob limen quoddam quo regitur, quodque exsiccatur in lamellulis albas abito, quo calida eloso, pruritus cessat.

Si pruritus oculis, maxime carneulam lacrymalem invadat, hoc vitium pertinet ad ophthalmiam pustulosam. Si podicem afficiat, videndum num alcarides ad sint in excrementis. Vide *Tennessum*. Si vulvam molestat, inquirendum an exordit pendeat, an a pustulis syphiliticis, an a nymphomania, &c.

7. *Pruritus gravidarum Puzos Traite des Accouchemens pag. 8v. C.*

Circa graviditatis tempus medium serius ocium a perspiratione retenta & acriori non raro supervenit pruritus serenus, tum ubique passim, tum in genitalibus; sive phlyctæ accedant in cute, sive immerse lateant in cute pustulæ, mulieres unguibus nocte & interdum scalpendum cruantur, aut scopula affricta pruritum acri dolore commutant, pervigiles evadunt, febrique excitata, fere abortiunt.

Curatio obtinetur phlebotomiis repetitis, postea ex emulsionibus, lacte, sero lactis, aqua pulli, apozematis lenientibus, clysmatibus, cremoribus ex oryza, avena, phaeollis, imo balneis, si pruritus acris sit, vapore aque tepide, fomentis emollientibus, levibus cathartibus, demum & narcoticis; si vero his invitis perseveret morbus, is perperio demum cedere solet.

8. *Pruritus ex opio.*

Est ille qui ab usu opii vel faciem vel totum corpus infestat, quod in bene malis subiectis constanter vel ex minimo opio, laudani, theriacæ dosi accidere videtur. Insa lactis suppletur opii sumendi necessitas in chronicis; & sanatur ille pruritus, qui aliunde non viget nisi quædam opium agit vi sua narcotica.

9. *Pruritus a medusa. B.*

Medusa est zoophytem gelatinosum aque marinæ innatans, rubellum, quod intensam oculis & manibus tangentibus uredinem & pruriginem excitat: non secus ac urtica: unde vulgo *urtica marina* vocatur, vernacule *pete*.

Omnia pruritus senilis Hip. quem sapienter, et potius, et late sonari.

10. *Pruritus syphiliticus*, Amati Luf. Cent. VI. cur. 99.

Inguina ut plurimum afficit. Curatur venæ sectione, hirudinibus & unguento camphoræ & saccharum saturni recipiente, dein antisymphilitici.

XI. ALGOR; Græcis *Kryos*, *Psycho*; Latinis *Frigus morbosum*, *refrigeratio*; Anglis *Coldness*, *Froldur*; *frigid excessif*.

Hæc molesta sensatio cuique cognita est, fere semper symptoma aliorum morborum, potissimum rigoris seu pbricantis qui intermittunt. cum accellum comitatur, unde inter morbos non accensetur vulgo, & tanquam merum symptoma prætermittitur. Interea tamen hoc symptoma quandoque gravissimum est & primarium, seu alterius morbi non est pedisequum, & pro diversis gradibus nunc fiius, nunc algor vocatur, nec semper cutis tremula agitatione seu horrore, nec musculorum contractione seu rigore exagitat.

1. *Algor externus*; *Froid de cause extérieure*. B.

Est ille quem patiuntur, qui frigido aeri, aquæ frigida, nivi diutius expositi sunt, & ea sensatio eo molestior est, 1. quo magis inassuetus est homo, seu quo prius calidior, mutatio promptior, constitutio sensibilibus, educatio mollior; 2. quo frigus intensius, ut quod a decimo gradu Thermometri Reaumuriani versus punctum congelationis accedit, & quo infra illud congelationis punctum ulterius descendit; 3. quo diutius frigori exponitur homo eo intensior dolor evadit, usquequo vel typhomania singularis, vel sphacelus partis sensum auferant.

Calore vitali fluiditas sanguinis, & musculorum, fibrarumque nervearum flexibilitas, permeabilitas conservantur: frigore vero, id est, particularum ignearum recessu fluida nostra coagulantur, fibræ omnes densatæ rigescunt, unde nervorum immobilitas, musculorum inflexibilitas: hinc stasis circulationis in extremis partibus, quæ ut pote a corde remotiores citius frigore congetantur; hæc fibrarum condensatio, vasorumque angustatio fit a proprio elatere quem non amplius sustinent aut cohibent fluida, in minus spatium redacta, hinc vero fibrillarum nervearum rugæ, distractionesque inassuetæ, dolorificæ, puncturæ, sensatioque intolerabilis. Si frigus illud intensum etiam ad interiora serpat sanguineque in majusculis vasis figat, mors accedit: secus vero, febribus accenditur; calor interiorum partium augebitur, vicina partis congelatæ inflammatur, pars congelata livescit, regelasit, putreficit, sphacelo corripitur, a sana separatur. Si eouique non processerit frigus & auxilia debita adhibita fuerint, saltem pars œdematosa remanet, tendines flexilitatem aut mobilitatem suam vix recuperant, & nervi sensu fere orbantur.

Notum est a regulatione promotionis maximum sphaceli periculum imminere, quod ut avertatur, per gradus illa debet excitari fritione partis cum

ipsa nive vel aqua frigidula, deinde cum tepida, immersione intra sinum equinum, & sic successively. Vide *Sphacellum a gelu*.

Millena incommoda patiuntur milites a frigore, ut catarrhos, rheumata, rheumatismos, perfronones, sphacelum, surditatem, febres varias, de quorum prophylaxi legi meretur *medicina militaris D. de Meysers*, tom. 1. art. 14. ad 20.

2. *Algor internus*; *froid interneur*.

Est ille qui a principio interno procedit, ut ab accessu febrili, potissimum quartanae, & paroxysmo tritophyæ algida, catarrhalis; a catarrho ipsomet, ab auriginis, præludio, ab ischuria, cum urina sanguinis remiscetur, quod facile fit per refluxum ejus a pelvi in venulas emulgentes ut vidi lac & atramentum in eas transcutia, &c. a paroxysmo amphigierinæ hædicæ, phthiseos, aliorumque morborum quos suppuratio fuvet.

In illis vero summis frigoribus non deest periculum, quippe qui intermittenti succumbunt v. g. durante frigore moriuntur, pulsus evadit contractus, intermittens, facies albet, pallet, labia livescunt, tremor occupat artus, ita ut quandoque præ dyspnœa & maxillarem trismo vix quidquam ægri deglutire valeant; hinc summa angustia, urgens periculum, nisi cito succurrant adstantes, quæ auxilia ut omnibus notissima, ita & certissima, scilicet æger in lectulo apprimè calesfacto reponatur, sufficienter tegatur, tinctis fœcis calidissimis, vasa excalescentia pedibus apponantur, intus vinum calidum, theriacæ, confectio de hyacintho, aqua cinnamomi similique usutentur; similibus auxiliis qui ex aqua frigida extracti pro mortuis habebantur, excitati sunt. Vide *Asphyxiam immerforum*. His etiam plerumque homines frigore interno pene extincti reviviscunt.

3. *Algor febricofus*, Journ. de Medec. Janu. 1761. p. 36.

Est frigus graciale totius corporis a viru, febris intermittens dependens; differt rigor ab algore motu tremulo cum frigore conjuncto. Algor etiam comitatur Asphyxiam immerforum, hysteriam &c.

X. ARDOR; Græcis *Diacaustis*, & *Cauma*, Angli *Heat*; *Chaleur excessiva*, *Enhauffement*.

Est molesta illa sensatio omnibus cognita quæ a partium ignearum majori actione in nobis excitatur.

Calor hominis sani est hieme 27° grad. in thermometro Reaumurii, æstate ad 30° grad. dum ascendit; ardor itaque eo major est, quo calor altius progreditur, ut ad 35° grad., 38° grad.; ultra vero partes comburantur, desistant organa, fit eschara seu sphacelus, siccus, fluida, exsiccantur, vasa coarctantur, fibræ corrugantur, sensus, motusque partis amittitur: infra vero 35° gradum fluida reseruntur una circiter ducentesima nativi voluminis parte, vasa par-

passu.

passa diducuntur, pars rubet, dolet, intolerabili roboris, punctionis, ulsionis sensatione divellantur.

1. *Ardor externus, calor externus.* B.

Ea est species quæ a corpore calido extus admodum dependet, ut ab aere fervido, insolatione, hypocaulo, igne aperto, aqua, lixivio, olto, ardentibus. Ille vero ardor vel toti corpori vel parti tantum applicatur; ex aere calidiori rubet cutis, turgidulæ evadunt venter, cephalalgia, asthenia, anorexia, lassitudo, agrypnia, sitis, hæmorrhagia narium, urinx rubræ, paucæ; sudor copiosus, dyspnœa, orthopnœa, cardialgiæ, syncopes, alique morbi oriuntur. Ex calore nimio parti applicato erythema, phlyctenæ, ambullio; ex vero phænomena ut pro gradu caloris diversa sunt, ita diversam medicam exigunt.

In genere quandiu bulla labes organica parti fuit inusta, & ardor tantum est curandus, remotis, si fieri possit, causis externis, frigida actualia sunt usurpanda, potu lotu, fusu aqueo, item potentialia intus adhibenda, ut acida, nitrosa, dilucentia. Huc pertinent pruritus de succo limonum, aurantiorum, syrupi granatorum, berberidis, ribesii, nymphæ; consensiones ex hordeo, feculinibus peponis, cucurbitæ, pruritus, aquæ acidulæ cum acido sulphuris, salis marini & similibus, adde balnea, acidulas &c.

Si pars laboret erythemate, ambullione, videatur horum victuorum curæ.

2. *Ardor internus; ardor de cause interne, effluens.* A.

Ea est species quæ tertianas biliosas, triacophiam, causam, phlegmasisque bene multas comitatur, ut erysipelas, pleuritidem, phrenitidem; cujus thesaurum & praxim hisce in classibus inquiras. Hinc pendunt agrypnia, anxietas, dyspnœa, lassitudo, polydipsia, catorema tundra, seu urinx rubræ, paucæ.

Gradus autem calor maximus thermometro teste in corpore etiam febrentie vix ad 34^{um} asurgit; aquæ Baleritanæ cum calente ad 42^{um} cito erysipelas partibus immeritis conciliant, nec ultra paucæ minuta tolerari queunt. Maximus calor atmosphæræ apud nos anno 1746 & 1773 absurdæ mensis Julio pomeridianis horis ad gradum 30^{um}; hic est gradus calor sanguinis in vulgari ætate; quidam asserunt ad 38^{um} gradum cum ascendisse apud Guineenses; verum merito id in dubium revocat *Du. Croix* in thermometris versatissimus; calor autem sanguinis hiescit ad 40^{um} circiter gradum ascendit.

3. *Ardor volaticus, vulgo affluens volaticus; Koringbad Suecic; flammens du visage, passagers Occitanis flamboyant.*

Est subitaneus faciei, colli &c. calor & rubor; per quadrantem horæ ad summum perseverans, quandoque in sudorem prorumpens, qui mulieribus, dum menses decedunt, imo hysteriis, cum anxietate & dyspnœa sæpius accidit, & pluries recurrit; similis est huic ælius volaticus a pudore faciem suffundens: hoc symptoma vide-

tur pendere ab imperu sanguinis adaucto cum fructura carotidis internæ, unde uberius ad exteriorem amandatur.

ORDO SECUNDUS.

DOLORES CAPITIS.

SUNT illi qui potissimum capitis hanc vel illam partem afficiunt, ut calvariam, oculos, aures, dentes, seu maxillas, circa febrem, convulsionemve, nisi dolores pro horum morborum accidentibus, non vero morbis, ut ajunt, essentialibus habeantur.

Hi morbi apud nos generico nomine mala vocantur, ut *mal à la tête, mal aux yeux, mal aux dents*, &c. *Rheumatismi* vocantur a *Frider. Hoffmanno*.

Raro illi morbi ægrum in lecto decinent, quia pars tantum, non vero totum corpus, afficitur, nisi dolor sit vehemens, & astheniam inducat; in paroxysmis est adipia, anorexia, anaphrodisia, aliaque symptomata ejusdem ordinis, quod de omnibus doloribus dictum puta; accedit etiam agrypnia, moror, anxietas, morositas, si perniciosius faviant hi dolores; si vero leviores sint, non raro superveniente gravi negotio vel pathemate animi insolito, dolor evanescit vel feriat. Omnes dolores partium internarum sæpius ad partes externas referuntur, & horum idea, ut uti videri, est satis confusa quoad locum, ut sæpe hæreant ægri in determinanda præfite sede doloris.

Principium horumve morborum frequentissimum est infarctum vasorum aut congestio sanguinis, vel lymphæ in parte affecta; ille infarctus est vel simplex vel philogisticus; hæc a sanguine puro, vel a sanguine vitioso, ut lymphæ acri, rheumatismalis, arthritica, syphilitica, vel fovetur a carie, ulcere, exollis, luxatione, fractura.

Dolores sunt vel idiopathici vel sympathici. *Idiopathici* sunt illi quorum principium materiale, seu materies morbifica tenetur in eadem parte ac ea quæ dolet, ut cephalalgia a plethora vasorum cerebri, meningum, &c. Dolores *sympathici* sunt illi quorum materies morbifica vel principium evidens est in uno loco, dum dolor est in altero, ut cephalalgia quæ tribuitur saburra ventriculi, sanguini in utero hærenti.

Falsum autem est dolores sympathicos tribuendos esse ulli causæ, quæ sit remota a parte dolente; seu falsum est ullam causam agere ubi non est; ergo errant qui causam cephalalgia v. g. stomachicæ in stomacho reponunt; verum quidem est sæpe fieri ut emetico præscripto illa cephalalgia evanescat; verum inde non sequitur ejus causam fuisse in stomacho; dubium est num sanguis inspissatus & vasa meningum vel cerebri intarciens sit incutandus; num vero inspissatus fuerit ob plethoram, ob saburram, inquirendum restat. Efto fuerit inspissatus a saburra & stomachicæ in sanguinis massam transfusa; illa cephal-

largia optime discutietur & præcavebitur usu emetici, licet principium proximum hujus referatur ad caput, quo dolor etiam refertur. Commotio enim ab emetico facta potest sanguinem in ipso capite discutere, & saburra eliminata futuri dolores simul præcavi possunt. Qui itaque morbi juxta quosdam sunt sympathici, juxta alios diversa theoria imbutos idiopathici sunt; arbitraria est itaque illa morborum divisio, & a theoria dependens sæpius erronea.

Dolores interni gravitati capitis, aurium, oculorum, non raro pendunt ab infarctu quem narcotica adaugent, nedum minuunt: licet enim narcotica sanguinem resolvant & fluxiliorem faciant, interea cum morbi hujus solutio pendeat potissimum a vi systaltica vasorum & contractione meningum, quæ humores congestos exprimat, cumque narcotica utrumque naturæ conatum supprimant, ex usu narcoticorum infarctus non raro crescit & cephalalgiam sequitur sopor, delirium aliudve malum ipso dolore periculosius; ergo caute illis utendum in simili casu, nec apud epilepticos, vetulos, paralyticos, similesque ægros in soporem facile delapsuros.

Docet etiam experientia narcotica, topica, quæ in aliis partibus a capite diffusi tuto usurpantur, non sine quodam periculo oculis, auribus internis, seu origini nervorum propius admoventi; sic folia daturæ oculis admoda mydriasis, & amaro-sim excitare valent, adeoque non nisi cum cautela illis simili casu utendum est.

XI. CEPHALALGIA; Eplexis Hippocratis; Carckaria, Gravado capitis Gorrzi Definit. Med.; Dolor capitis Sennerti; Capitisium Baglivi; Dolor cephalicus Frid. Hoffmanni; Mal à la tête; Etordissement.

Est capitis gravitas vel sensatio molesta, quæ refert caput interius distensum, turgidum, & quasi gravatum.

Verosimile est hujus causam esse infarctum ipsius corticis cerebri, qui licet recessus dolorum acutum non inferat, sensum tamen obscuro obtinuit, maxime cum ejus vasa quocumque modo distendantur & turgent.

Si sedes morbi foret accuratis signis cognita, ex illa posset distingui cephalæa & hemierania a cephalgia; cephalæa etenim utpote dolore sensu vivo stipata membranas afficeret, tum extra tum intra cranium posita; hemierania vero sinibus frontalibus magis insisteret vel locis a sympathico parvo nervos accipientibus.

1. *Cephalalgia plethorica; Eplexis Hippocratis; Capitisium Baglivi, Morgagni Epist. I. 17 ex Covperio, Commenc. Litter. Baiero; a vasis meningum sanguine turgidis, varicosis; etordissement; pesanteur de tête*, Diction. de Santé, B.

Dolor capitis a plethora oriundus cognoscitur ex signis generalibus plethoræ, stipatur pulsus raro; semper enim observari in gravibus capitis

doloribus pulsus rarefcere, nec semper facies est rubicunda, ut dum plethora alias partes afficit, sæpius in gravi cephalalgia pallescit, gravitas ad frontem est notabilis, cum difficultate cogitandi, distincte ratiocinandi, reminiscendi. Videtur esse conamen nature ad hæmorrhagiam narium excitandam, in quem finem, meningibus & vasis sanguiferis contractis, ea urget sanguinem versus vasa excretoria narium, & reapse superveniente sufficienti hæmorrhagia, hic dolor evanescit; evidente infarctu vertiginosus aut somnolentus evadit æger; præterea non raro dapes uberiores, vini potus copiosior, somnus pomeridianus, similiaque erant, vel molem directe augentia, vel excrementum consuetarum suppressiones eam indirecte augentes. Hujus varietates sunt.

2. *Cephalalgia catamenialis*. L. P.

Ea est quæ ob catameniorum suppressionem vel emanationem mulieribus periodice & circiter quolibet mense supervenit; atque catameniorum fluxu sedatur vel evanescit. In curatione habenda est hujus principii ratio, seu extra paroxysmum medicamina auxiliaque dietetica & gymnastica, quæ hunc fluxum restituant, sunt adhibenda; in paroxysmo phlebotomia est extremum remedium.

3. *Cephalalgia hæmorrhoidalis* Hippocr. V. Epidemico Valles. 491: a constipatione; Echauffement. L. P.

Altera est plethorica varietas quæ a conatu hæmorrhoidali dependet, cum scilicet plethorici evadunt hæmorrhoidarii, illi ante mariscum surgententiam cephalalgie gravitate sunt sæpius obnoxii. Hoc aliquot dies perseverat cum vertiginosis motibus, idearum confusione, frontis gravitate, corporis torpore, alvi constipatione: præmissa phlebotomia, clysmata & deinde juscula sanguini diluendo & leviter incidendo apta conveniunt; extra paroxysmum balnea, semicupia, tempestate conveniente victus parcius, exercitium moderatum indicantur; sanguis enim crassius, seu spissitudine peccat simul & quantitate.

Hujus varietas est cephalalgia a constipatione alvi, a calore viscerum, quam comitantur æstus fugaces faciei, cum torpore & stupore capitis, capitisium, oculorum rubore, visus obnubilatio, quæ omnia clysmatis & victu refrigerante debellantur.

4. *Cephalalgia stomachica* Riverii Pr. de Dolor capitis; Bonet. Sepulchret. Tom. I. pag. 12. obs. 11. B.

Ea est quæ a saburra in primis visceribus fovetur, aut, ut ait Riverius, quæ fit per consensum capitis cum stomacho; a saburra primarum viarum fovet dolorem capitis cognoscitur ex prægressis & concomitantibus, ex prægressa crapula seu ciborum & potulentorum amia ingestione, potissimum ex liquorum inebriantium abusu, nec non ex habituali stomachi debilitate, ratione cujus male digeruntur alimenta; ex concomitantium numero sunt ructus, nausea, vomitus.

vomitio, ventriculi gravitas, cardiacia, praevis oris sapor; circa quod observandum vomitionem gravi cephalalgia & hemicranie supervenire absque eo quod origo morbi sit in stomacho, ut patet ex vomitione quae supervenit fracto cranio. In hac specie cephalalgiae exterius est *aphorismus Hippocratis* 17. *sect. 4. si sit cibi fastidium, cardiacia, oris amarus & vertiginosa capitis gravitas, emetico opus est.* Quoties enim haec symptomata cephalalgiam comitantur, vomitio praestantissimum est remedium: si tamen aliunde veteris usus emetici, cathartica possunt, licet minus tuto, usurpari; utrumque genus remedii; praestitissimas praemittendas, ut phlebotomia, abstinencia, potu diluente, adhibeatur. Ea symptomata designant saburram inhærentem & latentem in ventriculo; saburra enim cruda a recenti crapula orta non sinitur ori amarore, & vomitione spontanea saepe tollitur, secus emetici aut cathartici abigunt; illa species saepe cephalalgia febrili est adnexa, seu stomachicus cum febrili saepe conjungitur, est diversis sunt quoad principium.

5. Cephalalgia febrilis. B.

Est illa species quae a sanguinis impetu febrili dependet, in quocumque febrim & phlegmasium ordine morbus certe frequentissimus, nisi symptoma placeat nuncupari; quoties impetus sanguinis est solito major, toties pressio lateralis in vasa sanguifera crescit; sed cum ratione aethenae febrilis æger horizontaliter jacet, impetus cruoris in vasa capitis major est quam cum stans; ergo haec duplici de causa pressio lateralis ratorum capitis major evadit; hinc cephalalgia gravativa quæ vulgo ad frontem refertur.

Est cephalalgia in febre acuta cum urina tenui, pellucida, phrenitidem, id est delirium portendit, maxime si eruginosa vomunt argi, & si cum surditate est pervigilium, ut docent *Procrustes*; si dolor capitis vehemens in hoc casu subito desitescat, signum est delirium aut soporem accedere, quod si fiat sine causa evidenti, ut a crisi, phlebotomia, &c. pessimum est.

6. Cephalalgia pulsantis. *Sphygmocephalus* angustus diversum?

Est sensatio moleste pulsationis in capite juxta tempora, quæ licet sit symptoma cephalalgia febrilis, quandoque sine dolore propetio dicto capitis observatur cum molesto pervigilio; ita ut ægi de hac pulsatione tantum conquerantur & de agrypnia; ea etenim pulsatio tunc maxime molesta est cum æger jacet, & ad somnum se componit; accidit autem ea pulsatio post magnas animi contentiones, studia nocturna, curas graves, nec non ob pergratationes, maxime spiritusosorum liquorum potationem, & quocumque sanguini impetum majorem concitat; ægi distinctas & arteriarum pulsui synchronas pulsationes in temporibus percipiunt, quæ perceptio an ad tinnitum bombum, an ad cephalalgiam magis referenda sit, ambiguum est;

pendet autem ex pulsatione arteriarum temporalis adversus canalem ossem, quem in crani subingressu prætergredirur; cum enim canalis ille sit incurvus, & fluida velociter mota fortius agant in curvaturas oppositas, ibi cruor arteriam suam fortius impetie, cum velocius solito moveretur; fluida enim quæ velociter moventur sepe sequuntur solidorum leges, juxta quas vis percussoris in plana opposita est, ut quadratum velocitatis; cum e contra fluida pacate fluencia quorum verum aequaliter premant & libere per canales fluencia in parietes eorum minimum agant; hoc symptoma fugax esse solet, si nulla febre stipetur.

Bandem pulsationem observo cum agrypnia inde aducta in muliere menorrhagiam uberissimam quovis mense patiente, quæ inde chlorotica, id est pallida, picaque evadit, cujus sanguis calidus & æter hyperalgiam in medio catameniorum suorum excitat. Idem symptoma in melancholia Anglica, seu tedio vitæ, constanter adesse ab ipso ægro percipio.

8. Cephalalgia intermittens. L.

Quotidie, vel tertiae quaque die etiam sine pulsus frequentia horis præfixis ea species supervenit, & a veneno febris intermittens fovetur, quod apprimè evincit curatio, quippe paucæ doses kinkinæ, irritis cæteris omnibus remediis, hanc brevi tollunt, ut aliquoties expectus sum.

8. Cephalalgia gravidarum. *Maux de tête des femmes enceintes.* L.

Quandoque gravidæ vehementer divexat cephalalgia circa frontem & oculos; palpebrae difficultat attolluntur, imo quod pejus sopor accedit minime levans; huic gravi malo, ex quo pejora metuenda sunt, illico phlebotomia etiam repetita succurrendum est. Hic morbus sub graviditatis finem magis metuendus est, aorta scilicet ab utero compressa sanguis in supernis partibus retinetur, inde metuenda apoplexia, eclampsia, &c.

9. Cephalalgia inflammatoria Manger. Biblioth. pract. tom. 1. pag. 1041, 1042; *Dolor capitis a meningum inflammatione* ab Heers. *Dolor capitis a phlegmate cerebri*, Brasavoli comment. in Aphor. 51. lib. 7. River. obs. comm. 21. A.

Huc referantur etiam dolores capitis ab ictu, vulnere, contusione, fractura, simulibusque principis procatartidis, quæ cephalitidem, phrenitidem, eclampsiam, aliosque gravissimos morbos deinde inducere solent, adeoque cura in morbis inflammatoriis & tractatibus chirurgicis est inquirenda.

10. Cephalalgia catarrhalis. L.

Ha duplex est; vel enim est externa, id est, cutem ipsam tantum afficit, quæ duplici phænomeno patet, scilicet cutis capillata rubedine & dolore tatione resurgente; quippe etiam capillorum pedunculorum exasperatur. Altera est altior & capsulam sponenoticam, quæ involvitur cranium, afficit; atque ut prior cory.

coryza, tussis, sternutatione se prodit; & maxime ex eo quod dolor tactu, frictione sedatur; hic dolor quandoque est saevus & pertinax cum tinnitu, strabismo, visu duplicato, prout in vicina organa serpit fluxio, ac catarrhorum more ad quadraginta dies extenditur. Curatur phlebotomia una vel altera, deinde catharsi bina, dum interea potus theiformes, diarta mediocriter, suffitus ex karabe, fumus salviae, sacchari ulsi, similiaque in usum vocantur; cum autem ab aeris frigidityte & humiditate procedat morbus, evidens est perspirationem tegumentis calidis, siccis, aere calido, exercitio, potu calido esse revocandam; quod ratio capillitii densioris etiam praestat.

11. *Cephalalgia anemarrapa* Georg. Hannzi, Miscell. Cur. *Cephalalgia. rara* Mangeti Bibliothec. Praet.

Ea est quae quoties fiat ventus meridianus, calidus & humidus, certos homines constanter afficit, & accedente vento boreali aut alio quovis evanescit; ad cum disponunt quaecumque cerebri vigorem imminuunt, ut studia immodica, curae diuturnae, quoties fiat: auster apud nos, electrica vi sere evanescit in aere, ut docent observationes electricae; inde forte fit ut tonus cerebri laxetur, sanguis in eo congeratur, & haec species perbelle sanatur illiis per electrificationem, quae diversis artificibus excitatur. Datur altera quae a vento boreali inducitur, qualem refert *Hannanus*.

An cephalalgia, quae ab insolatione accidit, habeat symptomata specialia, aut cutam specialem, ac proinde inter species sit recensenda, nondum mihi notum est; scio quidem in hoc casu soporem, imo asphyxiam quandoque accedere; scio etiam mulieres huic malo mederi solitas esse singulari artificio quod vocant: solis a capite extractionem, appositio scilicet fronti cyatho inverso frigida pleno; verum an haec sufficiant dubito.

12. *Cephalalgia hysterica*. B.

Illa est diversissima ab hemigrania clavo, quippe partem magnam capitis, saepe occupat totum, afficit cum sensu frigoris vehementis, quod quidem pro hystericae criterio haberi voluit *Baglivus*; sed haec species ex signis genericis hystericae magis innoscitur; fugax est, tremorem incutit, spasmodicae contractiones diversorum organorum, catameniorum emanationem; antihysterica tollitur.

13. *Cephalalgia metallica*. D. Doazan Doct. Med. Monspel. L.

Est species quae potissimum sigulis familiaris est, ex eo quod ad encaustum, quod vitreandis vasculis suis adhibent, plumbum & diversa metalla terere, fundere, eorumque tum pulverem, tum vapores haurire consueverunt. Vide apud *Lemery Diction. des drogues* quae nam sint metalla diversis encustis componendis adhibenda. Illos autem incellunt 1. dolori colli & occipitis pertinax, pressione non exacerbens; 2. dolor gravativus totius capitis, frontis potissimum; 3. stupor mentis quasi soporosus.

Ille autem morbus curatur, ut rachialgia me-

tallica, scilicet 1. die clystima cum decocto colocythidis, sennae & similibus injicitur; 2. trihorio post noctu bolus ex theriaca praescribitur; 3. mane sequenti sex grana tartari stibiaci in duas doses divisa intra semihoram hauriuntur; vespere clystima ex vini & olei ana uncis quatuor injicitur, dein alternis diebus catharticum validum ad tres vices iteratur, & sic acri intra duodecim circiter dies sanatur.

XI. CEPHALAEA; *Crotaphus* Cael. Aureliani cap. 22. *Doulens* de setis, *Cephalae*.

Differt juxta *Calium Aurelianum* a cephalalgia, quod illa chronica sit, ista vero acuta seu brevi terminetur: Cephalaea scilicet morbus est diuturnus dolor totius capitis, sed etiam vehementis, qui a parva occasione vehementes habet exacerbationes, inde sequitur cephalaeam gradu tantum, non genere, a cephalalgia discrepare, & forte satis esset eas ambas unico generi inferere; utinam saltem si genus consulum sit, species dentur distinctae. Cephalaeam Neoterici, Stahliaque distinguunt in eo quod dolore, non gravativo sed tensivo spastico illepetur, verum an hoc verum sit de omni specie non constat.

1. *Cephalaea syphilitica*, *Cephalae verolique*, Mangeti Bibliotheca Praet. de dolore capitis C.

Ea praeterquam quod signa syphilitidis latentis, male curatae orinetur, & quod noctu, dum aeger lectulo incalescit, ferociae, nulla criteria propria obtinet: etenim vix hanc speciem ita catarrhali affinem ut nisi hydrargyrosi cessisset, & noctu exacerbasset, pro catarrhali eam habuisset. Vidi alias hanc speciem a biennio saevientem, noctu exacerbantem, quam pro rheumatica Medicus ordinarius habuerat, proindeque phlebotomis repetitis praescriperat, jusculaque edulcorantia, sed incassum; aeger scilicet viru venereum celaverat, sanguis extractus erat ut in rheumatismo gelatina alba crassa obductus; cum demum accersitus confessionem virus venerici extorsisset, adhibita hydrargyrosi usque convaluit, haec species neglecta exostoses carieque cranii inducit.

2. *Cephalaea acrimonia*. *Cephalalgia scorbutica* Boneti in Sepulchr. Dolor cephalicus a materia salina Frid. Hoffmanni; a scabie, gustu rosacea, pulsus ejusdem.

Ea est quae ab acrimonia humorum dependet. Cognoscitur ex victu praegresso, ex temperamento calido & siccio, a juvenilibus scilicet lacticiis, aquis acidulis, balneis, & a laedentibus, ut calidis, acribus. Si acrimonia tanta sit ut ossa erodat, diploen corrumpat, ad terebrationem aliaque auxilia chirurgica deveniendum est.

3. *Cephalaea arthritica*, Musgrave cap. 14. hist. 7. Frid. Hoffmann. de dolore cephalico; *Pedragua capitis*, Aët. Acad. N. C. Observat. 155. 214. &c. L. P.

Vidit hanc speciem quotidie eadem hora meridie:

recrudescentem adeo intolerabilem ut nihil magis capite fortissime vincto levabatur paululum, ea dolore ad pedes redeunte illico evanescit; ut autem in pedes divertatur nihil est utilius epispastica, inter quæ lapidum ex aqua calidissima aliquoties mirros effectus præstitit; novi aliquot ægros ea methodo sanatos.

4. *Cephalæa febriosa*. Vide Morton. Pyretolog. pag. 32. *Hemicrania a febre intermittenti latente*. A. P.

Dolorem capitis intolerabilem, certis stetitque periodicis utplurimum recrudescentem, observavit Auctor, verum absque aliquo solemnī algore, rigore, calore & sudore, qui sese alternatim excipiunt in legitimis intermittentibus; urina vero multum tincta & contentis saturata speciem aquæ cum pulvere lateritio mixtæ semper præ se ferebat.

Morbum sæpe incassum frequenter phlebotomia, etiam e jugulari, epispasticis, cephalicis omnigenis, errhinis, masticatoris, ægrestus est Mortonus, cum vero auxilium adhibitis emeticis, catharticis levioribus; chalybeatibus, antiscorbuticis; donec tandem experientia didicisset usum copiosum kinkinæ doloris hujus fomitem penitus posse subigi.

5. *Cephalæa melancholica*. Ramazzini *hypochocholica* dicta. L. P.

Est ea species quæ sanguinis viscositati, lentiorique tribuitur, quæ ut plurimum mitis, sed diuturna fere continua est, cum animi morore, solitudinis amore, & non raro puellis ob latens matrimonii desiderium, vel aliud pathema, viris ab ærumna, curis, studiis immodicis supervenit; valde affinis est cum specie quam suppreffio eatameniorum & hæmorrhoidum fovet. At peculiariter exigit diluentia, rusticationem, venationem, quæcumque diversitatem & hilaritatem idearum valent excitare, ætate vero balnea, aquas acidulas, &c.

6. *Cephalæa Polonica*, Stabel. histor. 5. & 6. plicæ Polonicæ. C.

Est ea quæ a plicæ Polonicæ retentione, vel capillitii plicosi refectione ortum ducit; quæque atrox est ac cariem cranio infert.

7. *Cephalæa serena*, Mangeti Biblioth. prædic. de dolore capitis Tom. 1. Boneti Sepulchret. Tom. 1. Fabricii Hildani Centur. 3. observat. 30. C.

Numerosæ præstant observationes hujus speciei quam tribuunt sero in diversis cerebri partibus collectæ; ut vero illud principium ineunt quia cadaverum dissectio hoc serum adesse docuit; eerte non valet consequentia; an quia hydrotica, diuretica, vesicatoria, setacea profuerunt? inde non certo deduci potest morbum a sero profuisse, enim aliunde serum stupori, gravitati, sopori potius inducendis par videatur, quam vividi doloribus excitandis, nisi aliquis sit infarsus phlogodes, ut in catarrhali cephalæa. Consultæ Mergagni de Sede Morborum Epist. 1. ubi hujus cephalæa acutæ præstant casus a Valsalva observati.

Cephalalgia speciem intolerabilem amentia terminari solitam putabat J. Salzmännus oriri a pineali glandula calculosa vel scirrhusa; talem invenire in hoc morbo Schen, Drallmüller, &c. sed hujus speciei signa desunt.

Ab hydrocephalo sinus cerebri ortam vidit cephalæam dirissimam P. Boerllus Obs. 38. Crut. 1. repulsa fuerat scabies; aqua purissima ad libras duas effluxit cum impetu ex sinibus cerebri post mortem incisus.

XIII. HEMICRANIA; Migraine, Clau.

Est morbus cujus præcipuum symptoma dolor est in alterutro capitis latere, potissimum ad tempora, frontem, juxta oculos, sique vehemens, sæpe periodicus.

Differt a cephalæa eo quod ejus sedes non est in encephalo, nec in calvarie parte quæ immediate cerebrum tegit, sed in sinibus frontalibus, orbita oculorum, ita ut vel oculi globus vehementer afficiatur tractione, lachrymatione, vel æger naria obstructione, coryza, similis sinuum frontium latione laboret ut plurimum, aut in loco, quem clavus aur pollex tegeret, terminetur affectus, quod in cephalæa non accidit.

1. Hemicrania ocularis. C.

Ea est quæ pendet ab oculi suppuratione, synchysi, inflammatione interna. In illa dolor est constans, sensus in parte superiori orbitæ alterutrius oculi cum visus latione notabilis.

Sunt autem plurimi oculorum morbi quos ea comitatur, sequiturque, & in quibus ille dolor sæpe est præcipuum symptoma, & 1. quidem cataractæ purulente, & cataractæ a synchysi; 2. amblyopia hydrophthalmica; 3. amauroseos a synchysi; 4. ophthalmiæ choroidæ, uvæ; ab eleomate, & sæpe sequitur extractionem cataractæ, oculi ipsius evacuationem, atque non raro ad mortem usque ægrum direxat; si vero ægrum orbem uno oculo dimittat, anno sequenti alterum oculum aggreditur. Si sit diaphysis seu puris collectio in camera postica, puris emissio potest dolorem sanare; si sit synchysis, suadet Salus Ruyi ipsius oculi extractionem; servet nos Deus immunes a morbo & a remedio.

Sola observatio potest evincere hemicranias immunes pendere a vicio partium remotarum, & quoniam Medici specierum morborum doctrinam parvi faciunt, inde incident in errores ægris perniciosos; sic pro rheumatismo plures Medici curabant hemicranias odontalgicas, quæ demum illico dentibus cariis avulsis a Fauchartio evanescere, nec amplius rediere.

2. Hemicrania odontalgica Fauchart 2, 3, & 4 obs. pag. 473. B.

Ea est quæ principium suum habet in dente carioso, ac nervi pedem anserinum constituentibus, cujus eurationem ex dentis avulsione, vel ex nervi affecti amputatione expectat, qualem tradidimus inter trisimi species; mira quidem sympathiz species, quippe utut principium in ner-

nervi dentium existat, non raro solum caput juxta oculos dolet, quo dolore ineunte, vel remittente odontalgia apparet. Succus porri in aurem infusus dolorem sublevare dicitur; nisi omnes cariosi dentes evellantur, hemicrania permanet, & ad plures menses ac annos quandoque perseverat.

3. *Hemicrania sinus.* Journ. de Med. Avril 1761, & pag. 371 a calculis. D.

Est ea quæ ab alterutra sinu frontali obstructo dependet; dolor est perseverans, diuturnus, in ima parte frontis supra orbitam; naris ejusdem lateris est sicca, oculus vel ruber vel lacrymosus cum dolore exacerbatur: hujus verro varietates sunt 1. a vermibus vel larvis muscularum intra sinum latitantibus. Vide Fernel. 5. *Parthol. cap. 7.* Resuscitum de capitis dolore, Boneti *Sepulchrorum tom. 1. pag. 67*; cognoscitur ex pruritu & vertiginoso affectu conjunctis; huic speciei frequenter obnoxia sunt capræ & oves, unde vertiginosa evadunt. A sanguinis impetu critico & errore hæmorrhagie narum. Monialis bis hunc morbum cum febre acuta passa est, prima vice hæmorrhagia narum quam Medicus ex pulsu nasali prædixerat eam liberavit; altera vice eadem symptomata, idem pulsus, sed naris sicca fuit, & nihil sanguinis ex ea effluxit: Febre sanata dolor immans in orbita permansit. Consultus cum Ill. D. *Caput* non dubitavimus quin sanguis in sinu clauso collectus huic ansam præberet, & trepanum sinui applicandum suavisimus. 30. Dantur similes dolores a muco ibi collecto, imo indurato & in calcore converso; calculi alii per nares anticas res ejus fidem faciunt. Bonet. *Sepulchres. appendic. pag. 62. tom. 3*; alii per nares posticas; idem ibidem, pag. 61; Acidule poratæ in hoc casu profuere; Fabric. *Hildan. Centur. 5. obs. 1.*

4. *Hemicrania coryza.*

Sic dicta quia a coryza incipit; & coryza ac alterius naris siccitate constanter stipatur; est dolor atrox periodice, sed raro, ut semel vel bis in anno, revertens cum oculorum intra orbitam violenta retractione, lachrymatione, quandoque visus hebetudine, aliisque diris symptomatibus, quique pendet ab infarctu sinuum frontaliū: infarctus vero ille est a muco viscido & acri, saltem in senē; hunc morbum vidi sanatum ductis ex æqua Bellulicæ, & inde seroto fluxu viscoso e naribus.

Verum quænam sunt hemicranie quæ curantur vesicatoriis, setaceis, similibusque remediis pone caput applicatis? nonne sunt cephalææ serosæ?

5. *Hemicrania hæmorrhoidalis* Heisteri; *Clavus hæmorrhoidalis*, dissertat. ann. 1743. Heurnstadii. A. P.

Character. Dolor capitis fixus quasi a clavo premente vel terebrante, hæmorrhoidibus & catamenii, hæmorrhagis narum, suppressis superveniens, his restitutus sanandus.

Adfect partis intumescens, calor, rubor, ardoris sensus, agrypnia, pulsatio temporum, cor-

poris lassitudo, urina rubra, spumans, pulsus durus, plenus.

Cura exigit sanguinis detractionem & dilutionem, fluxum supplefflorum restitutionem ad principium tollendum: hoc præstat phlebotomia pedis, dein hirudines parti ipsi aut ano etiam applicatæ, dicta diluens & refrigerans, medicamenta resolventia & temperantia, ut pulvis temperans Stahlii vel Heisteri ex matre perlarum cum nitri granis tribus, quatuorve, potiones ex lapide cancerum, matre perlarum, aqua rosarum florum tilie, sambuci, cinnamomi cum syrupo violaceo; fomenta ex floribus chamæmeli, sambuci, millefolii & mica panis, spiritus vini camphorato, &c. Cucurbitulam partæ applicatam laudant *Natura curiosa*, hirudines P. Bonellus; arteriotomiam Pareus, aquam frigidam nonnulli.

6. *Hemicrania clavus*; *Clavus hystericus* Sydenhami de colica hysterica, procell. integr. p. 669: *Le clou hysterique* Raulin des maladies vaporesales pag. 158. A.

Est dolor atrox, percrebrans, capitis, in parte quam pollex vel ovum tegeret, clavi infixi sensationem referens cum animi desperatione, prostratione, sæpe delirio, hystericas, chloroticasque discrucias. Arabibus etiam *ovum testa* dicitur, si paulo majus spatium occupet. Hic morbus atrox phlebotomiam incassum oppugnat. Valet hic tantum furatio eadem ac in *gastrodynia hysterica*, scilicet serum lactis & laudanum.

7. *Hemicrania purulenta* Nicolai Decas obs. pag. 14 Argentorati, 1725. C.

Miles accepto ante triennium vulnere capitis cum fractura, sed dudum consolidato, ab hoc tempore laborabat cephalæa immani, quæ omnes Medicorum & ipsius carnificis conatus eluserat, præscripto denique pulvere cinnabaris & nitri, emulsione & emplastro, facta est cum aliquali fragore sternutatio cum excretionē purulenta materie tenacis sanguine interpersa per nares, integrum diem perdurante, & ad quadrantum mensuræ accedente, quam subita doloris mitigatio & tandem plenaria sublatio subsequuta est; unde insert auditor sæpe medicamentis tribus effectus quos minime præstant & fortunam esse Medicorum fabrum.

Est itaque ea species quæ a pure sinus frontales, maxillaresque replente deducenda est.

8. *Hemicrania ab insectis*. Morgagni de sedib. Morb. Epist. 1.

Est ea quæ oritur a quodam insecto intra sinus frontales nidulante, v. g. ab scolopendra, orio nasali, vel larvis muscæ carniaræ, ab erucis, &c.

1. Catharina Pfæferin quinquagenaria per annum fuit vexata dolore exquisito frontis versus latus dextrum, cujus locum pollex tegere poterat: is dolor a somno tranquillè evigilantem, vel radiis solaribus expositam aeris discruciat; aderat pruritus narum earumque siccitas & obstructio ad partem dextram cum frequen-

xi Remanimento, capitis obnubilatione, vertigine & palpebræ dextræ spasmo; exasperata tetrum odorem ex ore exhalentem, reliquo tempore ructus acidus experiebatur: Inspiravit tabaci pulverem, aquam Regiæ Hungariæ; ex his repetitis secuta est mucii copiosa emunctio, & denique viva scolopendra bicornis expedita currens, se in circulum convolvens, quindecim ex utraque parte aut plures pedes habens: Videtur scolopendra plana pedibus utrinque quindecim Faunæ Suevicæ 1263. Vide *Hist. de l'Acad. R. des Sc. Ann. 1733. p. 33. & 1708. pag. 24.* oleo in aurem immisso scolopendra post triennium ejecta fuit & syrigimus eam comitans sanatus. 2. Ab Eruca pilosa intra sinum frontalem latente Fabricius Hildanus centur. 1. observ. 8. observavit puerum hemierania discruciatum: Vide iconem apud auctorem. Similem erucam pilosam medium digitum longam vidit & naribus ejectam Tulpius lib. 4. observ. 12. Illa hemierania ovibus est familiaris, hominibus non raro tamen accidit, ut constat sex observationibus quæ prostant in *Ephemer. Nas. Cur.* Licet autem plures Auctores eam tribuant vermicibus intra cerebrum latitantibus, hoc nullius Authoris fide digni observatione constat, ut monet *illus. Morgagni Epist. 1. p. 6. & 7.*

In simili morbo D. Lindern Argentinenfis observat dolorem ad occiput exporrigi; mucum & naribus extillare, a lacte calido in nares attracto levari; ab erithinis exacerbari, vomitoris excusam esse erucam inferne slavam superne fuscam, punctis nigris notatam.

9. Hemierania nephralgia Baglivi p. 335. cap. 9. de fibra motrice. A.

Observavit Baglivi hemieraniam in nephralgia ex eodem latere quo calculus dolorem creat cum pulsu ejusdem lateris parvo & depresso, quod deducit a dolorosa oscillatione & contractione fibrarum communicata a renibus ad pericranium.

10. Hemierania lunatica P. Sallii cap. 10. ad Altomari praxim. L.

Ea est quæ determinate qualibet octava die circiter, seu juxta quamlibet lunæ phasim ægros dixerat. Tres vidit Auctor ægros, inter quos Dominicanus per tres annos & septem menses continuos qualibet octava die lunæ, ferme eadem hora, hemieraniam patiebatur cum ingenti & acuto dolore circa temporalem musculum, triginta circiter horas perseverante, quo tempore nec lumen aspicere, nec strepitum audire, nec etiam cibum gustare poterat sine manifestâ læsione; in intervallis insidius erat.

Merito exiimat Auctor a veneno intermittens febris octava pendere hanc hemieraniam.

XIV. OPHTHALMIA; Piruza Horatii; Lippitudo Celsi; Oculorum inflammatio, Dolor oculorum Sennerti; Ophthalmoponia Heisteri; Gallice Ophthalmie, mal aux yeux.

Ophthalmia Græci ab *ophthalmos* oculus, quasi morbus ocularis.

Sawages Nosologia Methodica. Tom. II.

Cognoscitur ex oculi dolore, rubore, intolerantia lucis & lachrymatione.

Dolor & lucis intolerantia sunt præcipua ophthalmiæ symptomata; rubedo in ophthalmiis externis tantum adest. Dolor in oculis est proportionalis hujus organi sensibilitati, quæ maxima; quippe nulla pars sub pari volumine tot fila nervea recipit, quot oculus. Ille ex sex paribus nervorum fila mutatur, & sensibilitas est nervorum quantitati intra datum spatium proportionalis, si par sit filorum nervorum distractio.

Cum ophthalmia est inflammatio stipata, quod in plurimis speciebus accidit; dolorem comitatur rubedo, calor, tensio, tumor, quorum omnium causa est impetus cruoris in vasa sanguifera oculi: Vide theoriâ Inflammationis: Inde etiam nervorum distractio: verum dantur ophthalmiæ internæ quæ etiam in suppuratum abeunt, v. g. in crystallino, sine prægresso rubore ac tumore conspiciuntur, ut cum crystallinus suppuratur; ibique datur inflammatio lymphatica Boerhaave.

Intolerantia lucis retine sensibilitatem adactam esse probat, siue detur ejus infarctus phlogisticus, siue tensa sit nimium choroidæa, ejusque expansio uveæ, siue simul consentiat sclerotica; in his omnibus casibus datur *myosis* seu pupillæ angustia huic lucis intolerantiæ proportionalis.

Illichrymatio uberior accidit propter dolorem oculi, ejusque siccitatem & fervorem; natura siquidem eo hinc secretionem illam intendit ut lachrymarum fluento, si quid est peregrinum, everatur, succum humectetur, fervidum & aere temperetur; nec alio modo intelligitur quare ab irritatione magis augeatur lacrymarum excretio quam illarum per puncta lachrymalia resorptio, quod tamen ad epiphoram statuendam omnino necessarium est.

Differt a caligine, quia obscuratio visus in ophthalmicis est libera; si enim palpebras aperiant, elare vident; verum in caliginosis est obscuratio coacta quæ a voluntate superari non potest.

1. Ophthalmia Taxis. Taxis Aetii, Pauli lib. 1. cap. 22. Ophthalmia notha Sennerti: *ophthalmia catarrhalis* Saint Yves spec. 3. De Meyserey art. 383. 384. B.

Ea species omnium levissima est, a nullo interno vitio præexistente fovetur, & tantum accidentaliter a principio procatarctico pendet, ut a frigore, tore vespertino, fumo, vento, lectione immodica, oculorum labore in minutis aspicendis, ex vapore caparum, allii, pulvere &c.

Sanatur naturæ vel artis auxilio; natura scilicet pulverem aut miasma acre everrit, eluit, obortis lachrymis; dolorem sedat a luce ortum clausis interdiu palpebris; & naturæ imitatrix ars medica umbellam ex sericea tela viridi prætendit, tenebras suadet, aqua tepida oculum eluendum jubet, nec non abstinenciam a principis noctvis, ut lectione potissimum nocturna, a vento, sole. Si quid in oculis seu inter palpebras & oculum hæserit, diducta palpebra intervenitu plumule vel frusti papyri illud extrahitur.

C

2. Oph-

1. *Ophthalmia trichiastis*, *Trichiastis* de St. Yves p. 98. L.

Trichiastis est directio ciliorum versus oculi globum. *Districhiastis* est series duplicata pilorum in palpebræ interna superficie.

Si pili ciliorum prælongi sub palpebris recondantur, nascitur ophthalmia, quæeductis ciliis evanescit; verum cum cilia ob ulcuscula marginis palpebrarum intus enascuntur, ea acriter pungunt oculum, eumque inflammant, exulcerant, usquequo exstirpata sint. Frustra refecantur hi pili, qui rigidiores deinde furescentes; eradicari debent sigillatim interpositis pluribus diebus, & dein, ne novi succedant, sub debitis cautelis, lapide infernali locus unde exstirpati sunt est comburendus, imo suadent quidam, ubi nullum aliud est remedium, palpebræ marginem pilis onusculum omnino refecare: de quibus vide *Heisterum Chirurg. cap. 47.* & *Saint-Yves cap. 8. pag. 98.*

3. *Ophthalmia tuberculosa*. L.

Posthila Galeni, a *posthæ* præputium vel peras desiderium; Tubercula palpebris accreta sunt *hordeolum*, *Gallis argætes*, *envie*, quia creditur accidere illia, qui gravidæ desideranti quidpiam recusant, *Grando*, *Græcis Crite*, *Gallis grain de grele* ob duritiem & pelluciditatem tuberculi, unde etiam *scleorophthalmia* Actio dicitur, nec non aliis *Chalazæ*: *Præputiolum* Cornarii.

Nascuntur scilicet in palpebrarum marginibus tumores rubri, duri, indolentes, aut parum dolentes, qui veluti præputiolum phimosis affectum referunt.

Illa tubercula sunt emollienda ut resolvantur; si non resolvantur, sunt inflammanda aut adurenda ut suppurentur; vel sunt enucleanda, & demum cicatrix est inducenda; si sint verrucæ, atheromata excrecentiæ, filo vinciri debent ut eadant, vel comburi, vel forficibus refecari.

Emolliuntur emplastro de mucilagine, de vigo, cum pauxillo saponis &c. comburuntur gutta spiritus salis ammoniaci, vel quod promptius agit, acumine lapidis infernalis: enucleantur, refecantur forcipibus; vinciuntur filo serico si verrucæ, excrecentiæ, petiolatæ sint. Curatur, ulcusculum unguento diapompholygos.

Vide *Boerhaave de Heredo Hæst. Chirurg. c. 43-44.*

4. *Ophthalmia Trachoma* P. Æginetz.

Trachoma est asperitudo palpebræ in parte interna. *Dacryma* vocatur, si sit herpetica; *Tylosis*, si callosa; *Sycosis* demum, si pustulæ crassiores fuerint.

Differt a phorophthalmia ex eo quod pustulæ duræ militares seu exiguae palpebrarum intus, non vero globum oculi afficiunt.

Epidemica fuit Romæ post terræ motum & quadragesimale jejuniū, *Bagliv & Teloni de terra moen.*

Cognoscitur ex sensu gravitatis in palpebris; accedunt dolores vividi, pruritus assiduus; calor & rubor in canthis & conjunctiva, ulcerosis videntur tarsi ex quibus lippitudo glutinosa fluit cum lachrymis rodentibus; noctu palpebræ agglutinantur.

Si inveterascit morbus, palpebra potissimum inferior invertitur, & cartilago tarsus dicta prominere instar arcus tumidi; excoriantur tarsi, & morbus vocatur a Boerhaave *Inflammatio excoriatoria palpebrarum*, hinc earum sequitur exulceratio, necnon pustulæ exigue militares quandoque instar areolarum callosæ interiora palpebrarum obfident. Affectus hic contumax est & valde incommodus: acri de areola in oculis-pungente conquerruntur, nictando excoriationem recentant, &c.

Curatio mali recentis alia est quam inveterati. In recenti inflammatione sedanda maxime remediis internis, phlebotomia, catharsis, jusculis diureticis, balneis, necnon topicis.

Recipe bulbi liliorum unc. semisse; serum meliloti vel sambuci, unc. i. croci, scrupul. i. coque in aqua; adde farina siliginæ q. f. & salis ammoniaci gr. vj.

Hoc cataplasmate linteis involuto, bis in die renovato, foveatur oculus donec palpebræ prius tenæ jam laxæ & rugosæ evadant. Si ultra pergas, succedet epiphora sebacea, nisi adstringentibus, ut rosis, malicorio, agrimonizæ foliis decoctis cum pauco mellis rosacei utaris.

In inveterato morbo unguentum sequens palpebris est illiniendum.

Recipe sacchari saturni, drachm. i.; cerusa alba, scrupul. iv.; camphora, gr. vj; cum pauxillo olei rosarum tere, dein adde unguentum de tertia vel rosacei unc. i.; imunge manus & vespertim palpebras claudas: si non possit tolerari, ex butyro recenti, oleo cera & cera alba fiat unguentum solum lenius.

Ulceratis & scabiosis palpebris *Saint-Yves* admoveat collarium ex hepatis antimonij, drachm. ii; rutizæ semiuncia, camphoræ semi-drachma, caryophyllorum gr. xx. quæ insundantur per ostiiduum in aquarum euphrasæ, fœniculi, chelidonij magni & rutæ, ana uncis iv. ter in die instilletur aqua illa in oculum; vespere unguentum de tutia applicetur. Si hoc non succedat, lapide infernali urantur ulcuscula marginis palpebrarum cum cautelis debitis.

Si herpes tantum sit in palpebris, nec ulcus ullum evidens, sufficit quater in die collarium ex salis saturni & salis ammoniaci ana gr. iv. in aquæ rosarum & plantaginis ana unc. iv.

5. *Ophthalmia sicca Xerophthalmia* P. Æginetz. *Ophthalmia angulus oculi afficiens Saint-Yves spec. 5. ab acrimonia sanguinis*, De Meyserey n. 386.

Nullus tumor in palpebris, rubedo & pruritus tantum in tarsi, lachrymæ vix ullæ, palpebræ noctu agglutinantur, lux ab aquis reflexa vix toleratur; curatur facilius quam humida; inerea est contumax & habitualis, quippe fovetur a lymphæ aerimoniam, atque superveniente levi dysuria tanquam crisi sanatur, metastasi facta ex conjunctiva in præputium.

Cura exigit phlebotomiam quæ sæpe sufficit; maxime vero premissa catharsis balnea per aliquot dies repetita succedunt. Jusculum refrigerans, vel serum lactis & balneo exeunti propinatur; noctu anodyna prosunt, maxime pueris.

lis observante Sydenham. Aquæ acidulæ per æstatem novem diebus potantur.

Topica quæ indicantur sunt collyria ex aquis rosarum, plantaginis, mucilaginis psyllii; aqua spermatis ranarum; folia cydoniæ, petala rosarum; juvant etiam aqua vel solutio saturni, aut sal saturni magna aquæ copia dilutum, saccharum canthum &c. *Saint-Yves* vero præscribit collyrium ex aquarum rosarum & plantaginis ana uncii ii, tutiæ gr. xii. & spiritus vini cochleari; foveatur oculus per diem hoc collyrio; vespere autem huic applicetur plumaceolum in decocto foliorum veronice, thymi & florum rosarum ex vino rubro intinctum; talcolæ pyri aut pomi sedant apprimere.

9. *Ophthalmia pustulosa Saint-Yves* Mal. des yeux pag. 183. *Ophthalmie bourgeoise* L.

In hac specie fasciculi vasorum rubrorum ab interiori palpebræ tunica ad corneam usque excurrunt, & ad corneæ peripheriam pustula excitatur lentis magnitudine; si vero in cornea ipsa residant pustulæ, ibi pure confecto, abscessus albedine se prodit.

Cura exigit solutionem aquæ divinæ in aqua, modo pustulæ corneam non attingant: si vero eam attingerint abscessusque efformaverint, ut abscessus aperiantur guttatur affundenda est aqua destillata camphoræ, & apertis pustulis ad solutionem lapidis divini recurrendum.

7. *Ophthalmia erysipelatos Saint-Yves* spec. octava pag. 184.

Rectius *herpetica* nominanda est, in ea scilicet præter conjunctivæ ruborem, palpebrarum tumorem, cum doloribus oculi & capitis intolerabilibus summoque calore exoriantur crustæ, & squamæ furfuraceæ in fronte, temporibus & naso, quibus sanitis cicatricosæ remanent partes. Morbus est pernix & curatu difficilis.

Cura exigit 1. fomentum ex aqua florum sambuci cum decima parte spiritus vini; 2. feraceam nuchæ applicabitur, præmissis phlebotomia repetita & cathartici, nec non ad vesicatoria scapulis aut pone aures admovenda confugiendum erit: propter dolores iteranda phlebotomia, & narcotica in usum sunt.

3. *Ophthalmia umida. Saint-Yves* spec. a. *Epiphora* Galen. introduct. *Ophthalmia vera* Senetti.

Habitualis est ut sicca, seu fomitem habet in sanguinis massa, unde est pernix. Cognoscitur ex lachrymarum abundantia, & palpebrarum tumore circa carnos, ac copiosa lippitudine: dolores oculi lancinantes, lucis intolerantia, rubedo interioris oculi, cum impossibilitate palpebras ducendi; inde maculæ succedunt in cornea; sæpe apud pueros genæ a lachrymis excoriantur, nasus & labia ob situm declivem & inclinarum capitis intumescunt.

Cura exigit phlebotomiam e brachio, pede, jugulo, necnon hirudine oculi vicinæ admotas tres vel quatuor; secunda vel tertia die catharticum vulgare ex fenna, manna, tamarindis; quibus præmissis juscula ex lactuca, acetosa, en-

divia usurpanda sunt; noctu narcotica assumenda; vesicatorium amplum inter scapulas applicandum, vel in pueris aurium fluxus excitandus, fovendus ut serum acre ab oculis revellatur; cathartici etiam iteranda, & balnea domestica tunc in usum vocanda, nisi lingux & stomachi status dissuadeant. Interea oculis collyria initio mitissima admovenda, nec conveniunt aquæ fomiculi, multo minus aqua euphrasæ quæ acrior est, sed pulpa pomi in lacte cocti, lac ipsum recens mulctum, mucilago seminum psylli, cydoniæ, albumen ovi cum aqua rosarum, aut quod melius est, quia oculis non agglutinatur, albumen ovi cum pauxillo alumnis interito inspissatum & linteo obvolutum: necnon albumen ovi ad duritiem cocti & transversim secti, quod aqua rosarum, vel plantaginis irroratur; sedato fectore aqua rosarum cum pauxillo aquæ Saturni, vel sacchari Saturni, potest admoventi aquæ fomiculi & rosarum ana uncie duæ cum sacchari Saturni gr. ii. fiat collyrium, vel cum trochiscis albis Rhasis semi-drachma. Sedato dolore pulvis tutiæ oculis noctu inspergi debet, ut palpebræ mane possint aperiri, secus lippitudo eas agglutinat.

Denique inveterata hac ophthalmia vitriolum vel album, vel romanum debet ea dosi aqua fontana dissolvi, quæ si gutta instilletur, vividum dolorem, sed momentaneum oculis inferat; sic scrupulus vitrioli in aquæ uncia sex cum sacchari drachma humi effectum præstat; illud collyrium hora somni debet instillari, nec oculus fasciis aut spleniolis aggravari; nunquam vero mane acia instillanda sunt, sed solummodo oculi aqua tepida, aut aqua rosarum fovendi, balneandi.

Sunt qui vitriolo addunt æruginis grana tria, ut qui vinum in quo moneta cuprea per noctem infusa sit, adhæbent, aut qui lapidem divinum in aqua infundunt, & hujus guttulas oculis vespere instillant, quæ etiam collyria feliciter succedunt, modo balneis, phlebotomiis, jusculis sanguis edulcoratus fuerit.

9. *Ophthalmia serophulosa, Diction. de Med. L.*

Illà infansibus serophulosis familiaris est, eaque humida, cum palpebrarum marginibus tumidis, maxime lippitudine viscosa obstructis, conjunctiva rubra, subtumida, lachrymis acutis; illi caput deorsum inclinant, nasum, labra, collum habent turgidula, subtumida, & leucomate sæpius cornea opacatur.

Principium morbi est lymphæ serophulosa, viscida & acris, quæ debet dividi, attenuari, depurari. Hoc præstant cathartica iterata, præmissa pilula ex aquilæ albæ granis duodecim: dein juscula aperientia quæ pauxillum limaturæ ferri, chinæ minurum sectæ & millepedum recipiant; præscribenda sunt, addito calendulæ sylvestris pugillo, aut apariens foliorum mantipulo dimidio. Peisana etiam convenit ex chinæ & radicum lapathi ana uncia una, quæ bulliant in aquæ libris decem ad dimidii con-

sumptionem: sub finem coctionis adde summitatum cupressi pugillos tres, glycyrrhizæ drachmas duas, utatur pro potu ordinario. Dein utatur per triduum bolo qui recipiat æthiopsis mineralis gr. xx. aut xxx. purgetur quarta die; qui bolus cum sequenti cathartico post septimanam iteretur: si tempestas permittat, balnea etiam in hac specie faulite succedunt, atque, quod cæteris præstat, est setaceum collo infusum per menses potissimum temperatos sustinendum.

Remedium Doctoris Han Sloane hic apprime quadrat, collyrium scilicet ex axungia viperina & tutia paratam appposito simul amplo ad nucham velsicatorio: lactis autem visus minime negligendus, intereadum topica collyria ophthalmiæ humidæ in usum vocantur, mixta cum resolventibus ex thymo, verdena & cuphrasia depromptis, quæ initio morbi motu inflammationis minime conveniunt.

10. *Ophthalmia tenebrosa*; *Hydrophthalmia* Græcis; Maître-jan de l'extention du corps vitré, 2. pag. chap. 1. idem *Exophthalmia* chiap. vipart. 3. *Gutta serena* quibuldam, L.

1. Dolet frons & oculus unus vel uterque. 2. Dolor sedato vel recedente, bulbus oculi paulo major videtur & eminentior. 3. Pupilla multo magis dilatata est, minusque ad solem coarctatur quam in statu sano. 4. Visus ita obscuratur, ut objecta vix distinguant, vix soli progredi queant ægri.

Oculi prominentia minus sensibilis est, si oculi sint nigris iridibus præditi, præsertim si ambo sint affecti, magis sensibilis vero cum irides sunt ceruleæ vel albescentes, oculi maxime fixi, adhibitis auxiliis maxima horum pars visum recuperat, ita tamen ut non pristinam visus distinctionem & claritatem attingant.

Hic morbus frequentius accidit viris atrabilariis, mulieribus ab uno alterove mense gravidis, & ad partum perseverat, virginibus oppilatis quas per quatuor vel quinque menses affligit.

Sennertus hunc morbum descripsit cap. 37. *secl. 2. libr. 1.* dicens tunc cognosci, quod oculi plane clari appareant, nihilque vitii in eis advertatur, nisi quod pupilla nigrior & amplior appareat.

Hic morbus initio difficile distinguitur a cataracta vulgari incipiente, necnon a cataracta glaucomate, sed cum nulla accedat crystallini opacitas, atque dein visus aliquatenus restituitur, id ab aliis morbi distinguitur.

Principium vero synecticum huius est moles vitæ intercrepans per fluxionem vel congestionem, unde pupillæ dilatatio, dolor, oculi intumescencia, retinæ pressio & visus obscuratio.

Curatio exigit phlebotomias initio repetitas ex brachio, collo, pede, imo arteriotomiam pro vehementia doloris & plethoræ gradu; deinceps serum evacuantia, ut velsicatoria nuchæ, pone aures apposita, imo cathartica sexta quavis die repetenda, præterea ex salisæparillæ uncia & chi-

næ radicis sem uncia intera aquæ libras quatuor coctis ad quartæ partis consumptionem, cuius duæ cyathi mane, duo vespere per quindecim dies propinantur. Topica vero vix ulla conveniunt nisi risolventia; quæ etiam parum præstant.

Si fluxio hanc ophthalmiam excitans validior fuerit, & fluida actiora, oculus magis extorsorum protuberat, vere inflammatur, lacinat inrus, dolores intolerabiles accedunt, rubor extus cum calore, imo febris acuta, agrypnia, palpebrarum oculum tegere non valent & invertuntur, epiphora seruida, visus obscuratio, ac demum perfecta & insanabilis amaurosis accedit, atque suppuratis internis partibus, fit lynchylis, seu dissolutio vitrei, dein fistulæ oculum perforantes, quæ omnia ad ophthalmiam internam referri debet.

11. *Ophthalmia syphilitica* Baglivi pag. 262. *Ophthalmia Gallica* Zacuti præx.; *Ophthalmia venerea* Camerar. Diss. Tubingæ: 1734. Aloysi, Luisini p. 665. L. cher de Luc Venerea; *Ophthalmia vénérienne* Saint Yves spec. 10^a. L.

Hanc dividit Auctor in duas varietates, scilicet in metastaticam & symptomaticam; utraque a vitæ syphilitidis venereæ dependet, & versus noctem ingravescit.

Symptomatica versus auroram remittit, nunquam in chemosim abit, materies morbifica in illa non locum mutat, dolores sunt mitiores, & ea auferatur syphilide sanata, minusque periculi importat; in secundo syphilidis stadio observatur.

Metastatica ophthalmia non remittit circa auroram, abit semper in chemosim, materies morbifica in ista sedem mutat, dolores actiores inferunt, non auferuntur syphilide sanata, periculosior est.

Calorem, dolorem, ruborem in lecto crescere, hoc viru syphilitidis venereæ tribuendum, necnon quod morbus vulgaribus remediis resistat. Ophthalmia metastatica ex tumore scelerotice ejusque livore ac dolore acri & lancinante, depressa quasi intia soveolcam. cornea cognoscitur; necnon ex eo quod a repressa gonorrhœa per metastasim virus in oculum factam accedat; atque utplurimum gonorrhœa prius insanabilis oborta hac ophthalmia evanescat, & reciproce gonorrhœa oborta recedat. Ophthalmia venerea in genere curatur per pydragrypsim, sed mercurius nunquam oculis est applicandus: laudent alii decocta sudorifica, pilulas mercuriales intus sumendas: Monspelli vero solus litus adhibetur. In metastatica præter hydrargyrosim expedit materiem virulentam in textu celluloso sclerotice & palpearum collectam levibus incisionibus utriusque membranz evacuari; exit. autem ichor gonorrhœico perhimalis, observante Ill. Nicolai & Camerar. Illam scarificationem incunte hydrargyrosi instituire satius puto, quam ipsi premittere, ut docet Camerar. 10.

Humidæ & chemosæ valde simili est, excepto quod in syphilitica conjunctiva est velut carno-

fa & duriuscula; incipit a ligitudine seu epiphora sebacea ex alio flavescere, uberrima; omnibus remediis resistit præter antisyphilitica, sæpius a supprella intemptive gonorrhœa post biduum supervenit. Chirurgus Monspelientis decumbendo supra pulvinar pyralismo syphilitici confuscatum illam contraxit.

Curatio exigit virus syphilitici extinctionem, quam optime præstant litus mercuriales ex pomata scilicet neapolitana, præmissis post phlebotomiam & cathartum viginti quinque, pluribusve balneis: fualet *Saint-Yves* panaceam mercurialem: Sume panaceæ mercurialis, drachmam unam; thei pulverati, drachmas tres; balsami copayve unciam semissis; misce, fiat opiatæ; cuius dosis drachma una quotidie mane sumenda purgetur æger quatto quoque die.

Recipe aquila alba & gummi ammoniaci, ana grana XV. trochisæorum albandal, gr. v. syrupi florum persicorum, q. s. fiat bolus

Sed sæpius prælat cathartica: vulgarissima in ufum vocatæ.

12. *Ophthalmia chemosis* St. Yves *Spec. 9. & 13. Chemosis* Actii: *traumatica*, De Meyferey 2. 382. 383. A.

Oritur a principio externo, ut gravi oculi contusione, unde hypophagma; vel ab operatione chirurgica in oculo instituta, ut ab extractione cataractæ, operatione unguis, empyesis, &c. aut a principio interno, metallis, cataractæ gravi in subjectis cacochymicis.

Character est intumescencia atro-rubra conjunctivæ cum depressione & obscuritate corneæ; quæ in fovea latere videtur: Gravis est inflammatio cum doloribus diris oculi & capitis, sensu gravitatis supra orbitam, pervigilio, febre, pulsatione, palpebrarum intumescencia, occlusiones. Terminatur quandoque suppuratione oculi, unde immedicabilis cecitas, saltem leucomata post se trahit, sanguis in patella crusta coriacea obducitur.

Curatio. Nihil est præstantius initio repetitis ex brachio, pede, jugulo phlebotomiis; ipsis palpebris deinceps hirudines aliquot admovendas quandoque suavi; alii opthalmoxylum seu scarificatione oculi suadent; post duas tresve phlebotomias catharticum ex infusione foliorum senegæ ad drachmas duas, thei drachma una, seminis lini, florum violarum, ana pugillo uno, mamonæ uncias duabus vel tribus; alii fortius catharticum ex scammonio præscribunt; iterum ad phlebotomiam deveniendum est; noctu syrupus papaveris, aut laudanum somni conciliandi gratia debent præscribi, cum dixta tenui refrigerante & humectante.

Intrerea oculis iniurio lacte tepido, sanguine pulsi, pulpa pomi in lacte cocti tepida foveri debent; exulent cataplasmata, quæ gravitate sua moceant; infusum ex croco, semine lini, floribus malvæ sufficiat; est post paucos dies resolutio in usum advocentur, ut vinum aut aqua vitæ cum aqua fontana; imo si lividitas, dolorisque immutatio suadeant, aqua vitæ camphorata

ta indicatur; *Saint-Yves* suadet spleniosa madida vino intra quod folia rosis marini, salviæ, hyssopi ad pug. 1. infusa fuerint pro vini semilibra, nec non, si detumescant palpebre & conjunctivæ, fiat collyrium ex aquæ fonticuli uncias duabus, & spiritus vini camphorati uncia semisse, maxime si leucomata adfuerint. Interea potus fir resolvens, qui prius erat leniens; porus resolvens fiat ex pitænzæ libris quatuor cum diaphoretici mineralis drachma una. Emplastrum velticatorium scapulis applicetur, clystimas alvus laxa fervetur; juscula ex pullo, seminibus frigidis, foliisque endiviæ, lactucæ, acetosæ, finito pitænzæ prioris usu, per decem dies usurpentur.

Si suppurationis signa adsint, Chirurgi opera est necessaria ad pus educendum, vulnusque sanandum; si vero strachylis vitrei supervenerint, oculus artificialis in nativi locum est aptandus, ut saltem vitetur deformitas.

Ophthalmia choridea, Ophthalmie interne de La retine ou de la choroïde. A.

Cognoscitur ex lucis intolerantia, pupillæ constitutione, epiphora, cum vel sine conjunctivæ rubore, his adduntur dolores hemigranæ peritænes.

Ea species fere semper accidit nona die post operationem, qua *David* & *Jamin* cataractam extrahunt circumscissa cornea, & quindecim circiter dies perseverat, atque ultimis diebus cum æger demum palpebras deducit; is omnia objecta tanquam nive conspersa videt. Si æger post aliquot ab hac operatione dies moriatur, invenitur vasa choroidæ rubra, anastata, & quandoque vitreum in gelatinam puriformem mutatum.

Cum producitur a principiis internis, eodem modo curanda est quo chemosis; aut versus finem maxime conducit guttulas aquæ distillatæ camphoræ oculis instillare; facta vero operatione vel cataractæ vel empyesis vel unguis, sedatur inflammatio vel mucilagine educta per aquam rosarum ex feminibus psylli, sænægræci, cydoniæ, vel collyrio albuminoso, id est, albumine ovi, cum aqua rosacea ad spumescientiam conquantato, & supra manipulum lintei carpi expanso, quo fovetur oculus frigide stizit ab operatione, ter in die repetendo; addita fascia per biduum, quæ scilicet arceat vitrei ejectionem ex oculo, si tussis, nausea aut sternutatio supervenerint.

14. *Ophthalmia angularis; Ophthalmie angulaire ou de l'angle nasal. Inflammatio lacrymalis carunculae* St. Yves pag. 50. 182. 203. L.

Est dolor aut pruritus cum tumore, quandoque rubore in cantho nasali; accedit epiphora puriformis, plura autem eaque distincta vitia hanc ophthalmiam excitant, 1. Anthylops, de quo vide *Epiphoram*; 2. Rhys, vide etiam *Epiphoram*. Phlogosis caruncule lachrymalis, ubi vasa sanguinea turgent ad corneam usque protensa, unde non raro pannus sacrescit, & in hoc casu vitrioli albi & iridis Florentinæ pulveratæ ana scrupulus unus infundatur in aquæ libra una, fiat collyrium.

15. *Ophthalmia canerosa*, *Cancer des yeux*, *Cancer palpebrarum* S. Yves Cap. VI. C.

Est illa species quæ palpebrarum tumore sæpius exulcerato, duro, lancinantique insignitur, hujus quinque varietates observavit *Aubert citatus*, nec ullum aliud in oculis carcinoma vidit.

In prima varietate tumor durus palpebræ superiori adnascitur cum sanguineis vasis ad basin turgidis & colore plumbeo præditis, doloribusque per intervalla lancinantibus. In secunda porrum oculi cantho nasali adhæret infra palpebrarum commissuram, illius porri radices altæ sunt, tegiturque vasis sanguineis in fasciculos granulatos distinctis, ex quibus vel levissimo tactu sanguis effluit; ille tumor ita pruriginosus est, ut a scalpulo vix abstinere queat æger; unde cito ulcus canerosum progeminat; hæc sola varietas sanabilis est liquore arcano quem sibi reservavit *Saint Yves*. In tertia varicosa sunt vasa sanguinea, & colore plumbeo, sine porro aut tumore antecedenti, sed in his tribus varietatibus successu temporis accedit exulceratio cum carnis fungosis, quæ deinceps sponte assumptæ ulcus majus ac majus in cæteris faciei partes diffundendum reliquit. In quarta malum incipit ab epiphora seu lachrymis acerbis, carunculam lachrymalem exulcerantibus, & deinde palpebram inferiorem exedentibus, cujus oræ deinceps callosæ evadunt; hunc morbum quandoque præcessit lachrymalis fistula. *Quintam* determinant non raro ictus oculo inflicti, quo vasa contunduntur; sanguisque prius acrimonia propria cancris viciatus alteratur, atque sic ulcus canerosum & callosum subsequitur.

Hæc omnes varietates, excepta secunda, insaniabiles sunt; cura vero palliativa exigite dicitur hæstem, jusculam refrigerantia, balnea, aquas acidulas; inter topica laudantur aqua spermatis ranarum, aqua solani hortensis cum aliquot granis salis saturni & plumbi usi.

16. *Ophthalmia a synecchia* *Mauchartii* Dissert. Vide D. Demours *Observat.* in *Essais d'Edimbourg*. T. I. pag. 90. L.

Synecchia morbus est oculorum in quo uveæ limbus corneæ adhæret, cum pupillæ distorsione, lucis intolerantia & nyctalopia.

Adhæret uvea corneæ, tum quia prægressis vulneribus, ulceribus, aut fistulis corneæ, evacuatoque humore aqueo, vitreum pressiori scelerotice cedens uveam extorsum trudit, & sic uvea collapsæ corneæ, quam contingit, adhæret; tum quia ob decubitus pronom pondere suo uvea corneæ incumbit, maxime si tectis oculis, ut in ophthalmia & ulcere, illius uveæ motus cessaverit, qui hanc adhesionem impedit.

Symptomata partim ophthalmiatrici visui patent, ut adhærentia uveæ cum corneæ, unde hujus, in parte saltem adhesionis, immobilitas, nec non pupillæ figura mutata ex circulari in ovalem vel pyriformem, hinc impossibilitas pupillæ ad lucem meridianam coardandæ; sed lux meridiana, & pupilla non angustetur, visum offuscat, inde

nyctalopia; dolet etiam retina a visu lucis fortioris, inde intolerantia lucis, imo dolor, objecta valde lucida hinc expansa vel appendiculata videntur, atque retinæ vasis sanguiferis ob phlogosm turgidis, ægri muscas, vel araneorum telas præ oculis versantes vident, ut in fusione myode.

Curatio. Alia est radicalis, alia palliativa. Radically obtinetur operatione chirurgica, quæ acu intra cameram anticam intrusa perficitur; vide *Mauchartium* Dissert. de *Synecchia in Dissertationibus Chirurgicis* Ill. Halleris.

Palliativa est vel opus naturæ, quæ macula opaca corneæ ulcus subsequente vim lucis nimiam retundit; Vide D. Demours, *observat.* 3. pag. 111. vel opus est artis, quæ, ubi aliud auxilium non suppetit, similem maculam corneæ inurit ope lapidis infernalis; sed præstat conservis vitri colorati, virescentis, vel subcærulei jubar locis moderari, vel cupulis metallicis in centro exiguum foramen habentibus & manu gestandis uti in meridiana luce; Vide Ill. Demours *ibidem*. Post operationem synecchia æger supinus decumbat per aliquot dies, & oculum sæpius luci exponat, ut nova adhesio vitetur.

17. *Ophthalmia a lagophthalmo*.

Lagophthalmus est hiatus palpebrarum ex alterutris retractione aut nativa brevitate, gallice, *œil de lièvre*. Sæpius vitium est in palpebra superiore & procedit a diversis principiis, ut ab ortu, ab strictione cutis.

Curatio exigit ut palpebræ elongatio omni ope procuretur frequenti tractione post emolliationem per iteratam unctionem ope olei, butyri, unguenti de althæa; noctu emplastro glutinose deorsum trahatur palpebra superior, sursum prematur splenio & fasciis aptis infertur.

Si hæc alia usurpata non valeant, operatio indiget scalpello, juxta directionem rugarum incisiones duæ vel tres parallelæ cuticulam dividant, dein tractæ palpebræ curatio adinetur.

18. *Ophthalmia ab elcomate* *Mauchart.* de ulcere corneæ dissert. 1741. L.

Elcomatis varietates sunt *Argema*, ulcus occupans aliquam partem circuli corneæ externi, dimidia circiter lineæ latitudine, cum rubore tunice conjunctivæ, corneæ vero albedine. *Bertrium*, latine *fistula*, aut *annulus*, gallice *la fessette*, est ulcus corneæ, exile, cavum, angustum, purum, sine sordibus purulentis ut crustosis, æquale capitulo aciculæ; si fit in laminis internis, datur *Gerontoxum*, succedit *Straphyloma*. *Epicoma*: ulcers *brillante*, ulcus externum corneæ ut plurimum mediæ, impurum, sordidum, ardens, urcnive, coloris cinericii, aliquando instar flocci lanæ, minus profundum quam encama. *Encama*, ulcus corneæ admodum ardens, crustosum, sordidum & dyspleurum. *Caloma*, gallice *encaveure*, ulcus cavum, rotundum, latius sed minus profundum, borrio, ædens

dens in illa corneæ regione quæ iridi proxima est. *Eleidrien*, ulceratio corneæ superficialis facta a quadam fluxione clara, subtili.

Principia sunt vulnera, contusiones, phlyctenæ, epiphora, ophthalmia, staphyloma, collyria acra, pustula variolosa in cachecticis, scrophulosis, syphiliticis; post cibum acrem, usum telescopiorum, lubricationes, trichiasm, accedunt ophthalmia, lucis intolerantia, visus nebulosus, sensus arenulæ in oculo.

Indicationes sunt 1. affluxum humorum arce-re, ablatis ex oculo peregrinis; huc phlebotomia, catharsis, sanguinis depuratio. 2. Ulcus mundificare, quod præstat lapis divinus *Saint-yves* qui paratur ex alumine, nitro, vitriolo cyprio in olla sigillata fufus, dein addito pauillo camphoræ huius lapidis grana sex in aquæ cochlearibus aliquot volvantur; addæ sacchari drachmas duas, aquæ vitæ cochlear unum. Acres, salinæ materies corriguntur tutia, creta, gummi arabico, mucilagine, radice alchææ, lacte, albumine ovi; absterio fit ablutione frequenti ex decocto abintin, hyperici, aqua calcis, unguento de tutia vel pulvere ex saccharo, radice iridis, aloë, se osepæ. 3. Ulceris consolidatio exigite victum edulcorantem, lenem, decoctum ex agrimonia, veronica, symphito, hyperico, collyria ex creta, pompholyge, bolo armena, myrrha, mastiche, olcum ovorum, albumen ovi.

Insufunde in vino Hispanico caryophyllos, aloem, crocum metallorum, camphoram & tutiam; dosis, guttula ter in die ulcusculo affusa. *St. Yves*.

19. Ophthalmia ab unge Maucartii. A.

Unguis, Græcis *onyx*, est abscessus inter lamellas corneæ; dicitur *Saint-Yves abscessus corneæ*, cap. 9.

Incipit ab ophthalmia chemosi, quæ magna cephalalgia pervigilio, pondere supra orbitam, febre, pulsatione, caligine slipatur; ratione cephalalgia, febris, &c. discrepat a leucomate *Saint-Yves*: Macula apparet subrotunda, alba, eminens, si sub epidermide corneæ pus lateat, in quo casu leve est malum; verum si inter profundas corneæ lamellas hæreat malum, gravior est; si in albagine, ex solo tumore indicatur adesse.

Convenit paracentesis, seu educio puris ope lanceolæ; sed sæpius pus effunditur in cameram, unde Hypopyum *Mauchartii*. Vide *Caliginem*.

20. Ophthalmia a cornea fistula D. Mauchart. Diff. de fistula corneæ. L.

Cognoscitur visu, foramine scilicet corneam vel recte, vel sinuose perforante, oris callosis, oculi subsidientia propter effluxum continuum aquei humoris; visus obscuritas, rubedo oculorum a puris illapso accedunt.

Curatur operatione chirurgica. Sumatur aqua rosarum in qua tutiæ frustum ignitum extinguat, imbuetur hac aqua sphenium quo foveatur oculus. Vesicatorium nuchæ applicetur, vinciat per aliquot dies oculus sanus; iusculis per hos dies utatur æger, & supinus jaceat. Sic im-

plebitur oculus humore aqueo; acus utrinque secans intra fistulam gyretur ad callos destruendos vel vulnus recentandum, affundantur guttula balsami, deligetur oculus.

21. Ophthalmia phlyctanodes, Phlyctæna Auctorum; Ppilyæne communis Sennertii; Phlyctides etiam a phlyxin, fervere. Pustula Arabibus *Bother*. L.

Sunt vesiculæ vel bullæ grane nulli æquales in cornea vel conjunctiva vulgo exoritur; quæ in conjunctiva, rubro vel atro circulo cinguntur; quæ in corneæ lamina extrema sunt, nigricant, quæ profundius latent, albescunt. Dantur quandoque majores & solitariae avellanæ magnitudine observante *genneto*. Desinunt vel resolutione, quod optimum, vel ruptione ad interiora, vel ulcere externo, quod quandoque corneam late rodit.

Curatio. Ut resolutio obtineatur, auxilia ophthalmiæ generica sunt advocanda, ut phlebotomiz, victus tenuis, fomenta emollientia; cathartica non sunt omitenda; fiat fons ex mucilagine seminum psylli, cydoniæ, fornugræci, ana drachmis duabus, aquæ rosarum uncis duabus, florum sambuci uncia semelle, croci scrupulo semisse. Subsidente pustula, aut remissa phlogosi, resolutio tenetur uoque rosarum uncis duabus, aquæ euphrasiz, uncia sem tutiæ, opii ana scrupulo uno, vitrioli albi granis duobus, misce.

Convenit albumen, imo luteum ovi cum saccharo & croco; fomenta ex decocto meliloti, verbenæ, rutæ, rosarum rubrarum.

Si postula remaneat, ea acu argentea pertundatur, & curetur ulcus, ut diximus dum de caligine ab unge vel ab elcomate.

22. Ophthalmia nvea. B.

Illa ut plurimum accidit a crystallino sua sede dimoto in cataracta mobili & in cameram anteam difficulter ingresso; unde cognoscitur ex signis cataractæ mobilis, ex distortionibus pupillæ, dolore inde subseque, sine ulla oculi rubedine. Accedit sæpe synecchia; curatur vero extractione crystallini per incisionem corneæ, sedatur decubitu constanter supino, ut synecchia excitetur locusque amplior crystallino concedatur in camera secunda.

23. Ophthalmia febrilis, Mortonii Pyretol. exerc. 1. cap. 9. De S. Martin Journ. de Med. Sept. 1760. p. 228. B.

Dolor atrox oculi, periodicus, cum lachrymatione, siti urgente, pulsu celeri ac forti & oris intense rubris ac turbidis, sine rubore, ope kinkinz sanatus.

24. Ophthalmia metastica, De Meysercy art. 384. B.

Ea est quæ a materie mortifica arthritidis, scabiei, herpetis, crysipelatis, fontanelle, ulceris, setacæ, repressa supervenit. Præter generalia auxilia hic morbus exiget horum humorum vel fluxuum revocationem.

Veteres Medici tot fere distincta instituerunt morborum oculi genera quod sunt ophthalmiæ caliginisque species, quem errorem ipsi in Hæ-

floræ naturalis, quam plures ex illis colebant, admittere confueverant, ut patet ex *Rondeletii lenthologia*; inde vero summa oritur confusio & omnis methodi tollitur fructus. Si artis antistites cognovissent ophthalmias internas, illi in definitione illius generis ruborem & tumorem conjunctivæ non reposuissent, vel hos morbos ad distincta genera retulissent.

XV. OTALGIA; a Græco *ous* auris & *algæ* dolor; *Dolor & spasmus otalgicus* Frid. Hoffmanni; *Douleur d'oreille*.

Morbus cuius præcipuum symptoma est dolor notabilis in aure.

Omnis dolor est proportionalis periculo ruptionis partium nervosarum & harum sensibilitati; omnis ruptio supponit vim applicatam vehementem respectu ad tenacitatem partis, quæ vis eo efficacius agit, quo pars dividenda magis est tensa, magisque tenuis: tensio linthei, chartæ est necessaria ad hoc ut forcibus scindantur; sic rigiditas, siccitasque virgultu ad hoc ut frangatur; funiculi flexiles non possunt secari nisi prius tendantur vel indurentur in loco secando. Cum itaque periosseum auris in ternæ, maxime vero labyrinthi, sit siccissimum, ab ære contiguo maxime tensum supra ossa, atque sinu tenuissimum, eademque conditiones in myringa, membranisque fenestellarum locum habeant, horum organorum dolorem fore vividissimum cuique patet, si vis insolita applicata fuerit, quæ est vel peregrina, ut insecta, corpora illapsa; vel indigena, ut vaporum spasmus, inflammatio, ossiculorum luxatio, suppuratio, &c. ea excitabit dolorem atrociorum quam in alia quavis parte, quippe nulla est quæ exquisitiori sensu, excepta forte retina, & in aiori nervorum filorum copia sit instructa: ex dolore atroci delirium, pervigilium, convulsio, febris acuta, artuum torpor, aliaque gravia accidentia suboriuntur.

1. *Otalgia inflammatoria* Ettmulleri. *Inflammatio aurium* Sennerti, A.

Cognoscitur ex calore, rubore ad auriculam & genas diffusis, dolore pulsatili, & pyrexia; sæpius acuta, oxycoia, bombo; unde pervigilium, delirium, convulsio, syncope, frigus extremorum, & non raro mors; secus terminatur vel resolutione, vel suppuracione.

Differt a catarrhali per pulsationem & fervorem necnon pyrexiam acutiorem, atque ex prægressis principis juvenes graviora symptomata intrantur quam senes; conatus enim nature apud juvenes sunt fortiores; unde inflammatio intensior, intolerantia major. Post septimam diem suppuratio accedens dolorem tollit & febrem, inde otiterhæa purulenta.

Curatur antiphlogisticis mature adhibitis, inter quæ potissima sunt phlebotomia repetita, potus diluens, nitroforus, emulsionatus, cum decocto capiti papaveris, clysmata laxantia, fomenta emollientia ex decocto malyæ, radicis althææ,

violarum; cataplasma de mica panis cum lacte, & croco; lac tepidum, oleum amygdalarum recens in meatum intillitur, renoventur; omnia acris ab Auctoribus Germanicis prædicata fugiantur; narcotica extus & intus adhibeantur, cathartica mitissima, sedato dolore, usurpantur.

Huius morbo ansem præbent hæmorrhagæ nazium; catameniorum, hæmorrhoidum suppressio, plethora apud juvenes, metastasis in febrilibus, ictus, vulneraque temporum: ante septimum diem mortis est periculum. Si tumor retro aures, expectanda suppuratio, quæ intus fit melior quam quæ extus, facta supuratione dissecare vel copiosis expectanda.

In otalgia ex ictu, vel lapsu, qui sanem ex auribus fundant, omnes pereunt. *Riverii obs.* 18. pag. 291.

2. *Otalgia verminosa* Journ. de Med. Vandermonde 1758. pag. 145. *Acta Acad. N. Cur.* Obs. 5. 166. 50. 57. &c. Morgagni Epist. XIV. 6. *Verduc Pathologie* T. 2. pag. 143. Ch. 4. D.

Catelin dolebat aure ad fæorem usque; Chirurgus Leatod Arelensis ex aure solente extraxit vermes quinque pollicem longos, & quod incredibile prorsus, semipollicem latos; sine pure, vel cruore, in ductus auditorii externi fundo latentes, unde illico sanatus est. Hæc insecta erant nymphæ ex ovis a quodam insecto depositis oriundæ: insectum est ut puto musca carnaria. Huc pertinet sumus tabaci in ore retentus & per tubam Eustachianam in aurem transire coactus. Caveant ab insectis circum volitantibus qui otalgia ulcerofo laborant.

Exemplum paraphrosyncs phreneticæ a dolore atroci, ætæ enim infaniebat currens, clamans, & in Rhodanum mox sese projecturus: in simili casu nuper ex aure extractæ fuerunt larvæ plurimæ, oblongæ, albidæ, quæ in vaso vitreo servatæ dederunt intra paucos dies muscas carnarias.

3. *Otalgia catarrhalis* Ettmulleri, Zacuti præxis; *Otalgia nerha* Nenterii, B.

Distinguitur ex procatartidicis, ut frigore, vento humido, frigidoque suscepto, auribus vel capite nudis, antea calentibus. Symptomata mutumitiora sunt, dolent vicinæ auris, leviterque tumunt; coryza, tussis, angina sæpius comitantur; musculi salpingo-raphyllini sæpe dolet, unde Eustachianæ tubæ dolor, sæpe syngismus, tubæ Eustachianæ distractio; sonorum intolerantia, paracusis, oxycoia.

Curatio ab una phlebotomia ordiatur, potus diaphoreticus, aer calidus, fomenta exsiccantia, perspirationem juvenantia, usurpantur; caput detradatur, vel pestuntur, & suture exsiccant; suffitus aromatici ex succino, olibano, saccharo adhibeantur; narcotica intus non continentur, panis calidi mica auri applicetur; hirudines auribus, admove re suadet *Aretæus*.

Vesicam duodeto Aurum malvæ, sambuci, meliceti, lacte plezaro auribus applicandam suadet *Hoffm.*

Q347

Oralgiam cum emicrania, dolore menti, palati & faucium a pluribus mensibus perseverantem & a carioso dente dependentem videlicet sanatum illico extractione dentis, apud *Fauchart observ. 4. pag. 408.* in libro cui titulus: *Chirurgia Dentistæ.*

4. *Oralgia ab Intrusis* Jonstoni idea medic; ab infectis Jonstoni; a forficulis dantis Ephem. Natur. Curios. VVolkameri observ. 266. a teredinebur Dec. III. Observ. 46. a gryllis Dec. 1. Observ. 5. L.

Dolorem viginti annos per intervalia perseverantem a forficulis aurem ingressi narrat *Volkamerus*. Alium a vermiculis ex aure in frontem sub cute repentibus reeferet; qui morbus oleo juniperi in aurem instillato, & sursu gummi ammoniaci sanatus est. Eundem morbum avermiculis capite nigro donatis multipedibus observavit *Carolus Raygerus Collett. Academ. tom. 3. pag. 206.* vermes illi in aure geniei consuebantur ob ulcus præexistens. Decodis vermifugis cessit dolor.

A globulo vitreo in aurem immisso dolores atroces cum diris accidentibus ortos narrat *Fabric. Hildanus*; illi post octo annos extracto globulo sanati sunt.

Exolothum in aure quam pro corpore peregrino habebant Chiuurgi, per violentiam extrahere conantes, ægrum e medio sustulerunt.

A ceruine auriaci acri factam otalgiam censefet *Duverney* & *Estmullerus*, verum vix credibile est; a larvis insectorum meatui innatis otalgias recensitas vide apud *Vandermonde, Journ. de Med. Fevr. 1757. pag. 145.*

De tetrahendis in aurem illapsis consulatur *Heisteri Chirurg. Cap. 66.* Enecantur vero insecta oleis & decocis amaris.

Turunda terebinthinæ intincta ad extrahenda corpuscula, aut insecta quædam a *Tralliano* suadet. *Rivierus* pilos caninos in aurem immitti vult ad educendos pulices.

XVI. ODONTALGIA; Dolor dentium Sennerii Praxia; Rheumaticus odontalgicus Frid. Hoffmanni, Tom 2. *Odontagra* Heisteri Praxia; *Mal aux dents*.

Cognoscitur ex dolore distensivo, pulsatili, redente, lancinante, aut alio quovis ad dentes relato cum pervigilio, quandoque uaxillæ tumore, pyralismo, &c. Sede ejus est in nervo periosico dentis internus perrepante, quandoque in periosico dentis externo.

1. *Odontalgia curiosa*. Vide P. Fauchart. *Chirurgien Dentiste*, Tom. 1. Chap. 7. B. P.

Ea est quæ a carie humida dentis procedit; sicca enim caries indolens est, caries vero humida est simplex, scorbutica, scrophulosa, syphilitica, & vel interna quæ vel radices vel dentis interiora corrodit, a principis internis procedens; vel externa, quæ vel vitrum dentis, vel ejus collum occupat, a tartaro; idu sæpius æstum ducens, quæque nū ad cavum dentis pe-

netraverit minus est sanatu difficilis quam interna.

Hæc species ex signis cariei distinguitur, quæ in sensus sæpius incurrit; aut quandoque late caries in dentium interstitiis, & tunc color dentis ipsam peritis denunciatur, dentificalpium, fætor, lancinatio ab aqua frigida, ære frigido intra os illapso, erosio sensus, pertinacia morbi, sine magno gingivarum tumore, fistula in gingivis oræ cum rumore circulari ad ejus orificium, puris exitus. Morbus ille a vigesimo quinto anno ad quinquagesimum æst frequentior; caries dentibus potissimum sæpius multo quam anticis insidet, potissimum vero ferotinis, seu ultimis molaribus; color cariem internam declarans est quali pellucidus, margaritæ instar, levis percussio ope dentificalpi metallici dolorem renovat.

Inveteratæ huic speciei superveniunt epulides, abscessus, alveoli caries, in paroxysmo febris, furor, delirium quandoque observantur.

Quatuor remedium genera huic speciei conveniunt; omnium promptissimum & certissimum est dentis avulsio, in qua operatione peritiores sunt non raro circumforaneis balatriones, qui in hac exercitissimi sunt. Alterum auxilium est cauterium actuale, seu ferri filiformis, prius dentis foraminibus apertis, deinde candentis; repetita applicatio, quæ nervum illico comburit & cariei pregressum sistit. Tertium auxilium est olei cinnamomi & caryophyllorum guttula ope gossyli intra cariem immissa prius decolor cavo carioso; horum defectu oleum cadinum ultrapariore est; ad præventionem vero juvat lamellis plumbeis tenuissimis, absente omnino odontalgia, cavum replere, modo sursum spectet foramen; necnon ex suau *Fauchartii* os quovis mane urina calida colluere, putidum quidem, æst expertum remedium in morbo, qui levi de causa, si plures dentes carioli sint, reviviscit. Guttula spiritus salis in dente carioso odontalgiam sedat; collatio oris ex aqua lavendulæ vel spiritu ejus aqua diluto, ipsum avertit, si quotidie adhibeatur.

1. *Odontalgia gravidarum*, Mairiceau, des Maladies des Femmes, Fauchart c. 13. p. 292. B.

Pregnantes nec non nutrices huic maxime sunt obnoxie, sive dentes carioli sint, sive integri, & tanta est doloris vehementia, ut metus sit ne fetus, alumnusque, ratione febris quam mater patitur, morbum gravem contrahat; aliunde vero sunt mulieres quæ adeo exhorrescunt instrumenta chirurgica, ut illius horroris sequela possint esse ipsi foetui funesta; summa itaque requiritur in Chirurgo prudentia & sapientia, quæ vel dolentem ad subeundam operationem inducat, nec eam nisi præ atrocitate & contumacia doloris indicetur, suscipiat.

In nutricibus quidem si dolor acerbissimus sit dentem ut in ceteris hominibus avellere necessarium est, licet nulla sine cariei indicia, dolorem enim intolcrabilem, phlebotomia & laudano resistentem, illico ablatus vidi, vel avulso, vel etiam fracto vi instrumenti deute sanissimo & phlebo-

phlebotomia autem apud prægnante odontalgias est primum auxilium.

3. *Odontalgia catarrhalis* Junker. *Fluxus supra dent. B.*

Est ea species quæ a frigore suscepto calente corpore, a perspiratione retenta, sine earie, aut cum earie dentis, accedit; qui dolor intumescente gena ut plurimum miscescit; distinguitur ex prægressu, & ex eo quod non unus vel alter dens doleat, sed tota maxilla ejusdem lateris dolore, gingiva etiam tumore afficiatur, accedit & copiosus pyralisus; præcessit, quandoque frigus, adjunxit se tussis, sternutatio, angina; aliaque accedere symptomata catarrhi; dolor non ita est vehemens & perterrebrans, ac in cariola, & tollitur phlebotomia una aut altera, collutione ex lacte & aqua calida, diæta sudorifica, narcoticis, & Galagoris, ut fumo tabaci, masticatione radicis hellebori fortidi, emplastro ex resina tacamacha, caranna, oleo masticis, & opio supra alutam temporis adhibendum extenso; pastilli etiam masticantur factis ex pyrethro, pipere, zingibare, semine staphisagris, caryophyllis, cinnamomo, vel simili quodam medicamine, quod pulveratum ope cere in globum piliformem effingitur, vel purum in ore delinetur; nec negligendi panni lanei suffusi carabes, sacchari, thuris, &c. imbuti; & calide genis admoti; confert etiam dentis ablutio ex spiritu vini camphorato. Cum dens cariem admittit, alterius dentis e latere opposito ipsi respondentis & paralleli caries anno sequenti venire expectanda.

Caries sicca nullo fere sæore, nullo omnino dolore est stipata, nec progreditur multum, eam proinde seiro, nec igne attingendam esse putant periti.

4. *Odontalgia scorbutica* Eùgaleni de Scorbuto; Lind. signa primæ periodi, Fauchart Tom. I. pag. 166. L.

Est pruritus gingivarum, cui succedit earum tumor, a levi tactu eruentatio, sæor anhelius; mox gingivæ atrorubæ, molles, spongiosæ, dein fungosæ, putridæ evadunt; præcessere faciei palor & levis tumor, lassitudo laborum, caruncula lachrymalis virescentis, genuum stupor & debilitas, aliaque scorbuti signa.

Dentes autem nigrescunt, gingivis denudantur, mobiles evadunt, & facile ac sine dolore ut plurimum labuntur, accedit etiam non raro densium & ossis maxillaris caries cum fistulis, hæmorrhagiis, & præter pruritus quandoque intolerabilem, a quo mali labes incipit, dolores etiam vividum non raro accedunt.

Præter remedia generalia interna hic maxime necessaria, sunt & alia adhibenda topica, ac 1. quidem ad prophylaxim post quemlibet pastum colludendum, est os aqua cinnamomi hordeati, alii vinum rubrum in quo balustia decocta sint, fusaent; 2. In odontalgia forficibus, rectis vel incurvis detondendæ sunt sigillatim inter singulos dentes gingivæ tumentes, & sanguis exprimendus, quod nedum do-

lorem excitet pristinum compescit, dein melle rosaceo, vino calido, detergendæ gingivæ; si cultum tenuat æger, saltem denticulatio acuto tundendæ fune gingivæ atro rubræ, tumentes, ut cruorem fundant. Si caries vel exulcerationes accedant, collatur os sæpius in die cum decocto foliorum hylopi, salviæ, eochleariæ, rosmarini, symbrii aquatici in vino albo aquato, additis aliquot drachmis spiritus ardentis eochleariæ.

Sunt qui spiritum salis marini, vel etiam vitrioli cum trigecuplo aquæ rosarum & plantagininis ad collutorium adhibent; alii guttas spiritus salis paucas melli rosaceo admiscunt, quo labia ulceraque gingivarum illinunt, vitatis dentibus. Ego vero succum limonum vel aurantium his omnibus antepono, ejusque loco folia eochleariæ, symbrii aquatici, acetosæ, &c. masticanda sæpius in die suadeo. *Vide Stomatocacem inter sanguifluxus, Class. IX.*

5. *Odontalgia dentitantis. La dentition. A.*

A sexto ætatis mense ad annum & ultra infantes odontalgia identidem ita laborant, ut ex hoc morbo plurimi moriantur. Errant autem illi qui scribunt dolorem illum atrocem procedere ex eo quod epithelis gingivæ ambiens resistat eruptioni dentibus, ita ut si illis fides sit, in illo dolore gingivam tumement ungibus vel culero scindere utile sit. Ego vero semper vidis per intervalla unius mensis duplicem observandum esse eventum, scilicet uno circiter mense antequam dens unus ac alter erumpat, omnes gingivæ tumunt, dolent, veluti quadratæ evadunt, & ut nutrices ajunt, reduplicantur, tunc dolores sunt pruriginosi, intolerabiles, ita ut quæcumque oblata corpora dentibus apprimant & affricent illi miselli. Hoc novit nutrix cujus papillæ ardere stringuntur, & ardore oris incalcunc, infans sine, vigilat, ejulat, irrequietus est, non tamen lachrymatur; genia tumunt aliquandiu notante *Errmullero*; accedit febris, faciei rubor, vomitus, diarrhœa, eclampsia, &c. cum hæc procella omnino desit, & minime dolent gingivæ, nec nutrices de ejus morbo cogitant, dentes primiores intervallo quandoque unius mensis ab odontalgia protuberant, sensim crescunt; initium vero ducunt duo incisivi maxillæ superiores, post mensem aut circiter incisivi inferiores pullulant, & sic deinceps morales omnium ultimi sobolescunt, sed ut plurimum sine dolore.

Dentes primores decem in utraque maxilla, cum infans septimum circiter annum attingit, delabuntur, successive aliis in eorum locum succrescentibus. Illi vero qui delabuntur radicibus carere videntur, idest, pars tantum externa seu corona dentibus a radice separata delabitur; illa vero secunda dentitio ut plurimum dolore caret, ut & primorum lapsus, molares vero vix unquam delabuntur; interea apud Parisinos infantibus sexennis, ut narant, molarium eruptio odontalgiam tam immanem creat, ut plurimi hoc ætatis anno inde moriantur, quod apud nostrates.

stanes non accidunt; dentes caduci apud infantes sunt in utraque maxilla inferiori quatuor, duo canini, & quatuor primi molares, quorum duo tantum quandoque delabuntur. *Vide curam dentitionis apud omnes Auctores.*

6. *Odontalgia arthritica* Musgrave de Arthritide, Cap. IV. B. P.

Est ea quæ arthriticos invadit, cum venenum arthriticum pedes deserit, & per corpus divagatur; illud futuras cranii rite delineat, quandoque dentes disrumpit, accedente vero dolore articulorum evanescit odontalgia.

De odontalgia verminosa ferme fileo, quippe licet D. Andry vermiculos in dentibus cariis se vidisse asserat, licet plures esse vermiculos in guttula salivæ quam incolæ in Provinciis Unitis scripserit *Lecurvenboeckius*, sunt gravia rationum momenta quæ me movent ad credendum hæc fidem esse denegandam; vidit quidem *Loesckius*, ut refert *obsevat.* pag. 66. vermiculum cauda bifida in dente cariis; ipse etiam vidi quid simile, quod pro vermiculo alii habebant; quod tamen frustulum nervi vel vasis resecti mihi visum est.

7. *Odontalgia hæmodia*; *Stuper dentium vulgæ* *l'agacement des dents.* B.

Est molestia singularis dentium quæ a fructibus acerbis, stridulis sonis auditis, affricu dentium, &c. procedit, quam soli experti norunt.

Huic obnoxii sunt potissimum rachitici, quorum dentes exquisitiori sensibilitate gaudent. Hæmodiam sæpius excitant non solum fructus acidi, ut ribes, cerasa; sed etiam ipsum saccharum, præsertim candum; dolent etiam eo modo dentes a sonis acutissimis & rauris, ut limæ, ut suberis secti; hic vero dolor exacerbatur ab ingressu aeris in os, impedit masticationem, sed ut plurimum fugax est, & vix ullius momenti.

Sublevatur linteo calido dentibus admoto, masticatione portulacæ, imo acetosæ; acidum debilius aërii mixtum illud enervat.

Dentes sunt ossa minima & durissima corporis, adeoque quorum tonus est omnium acutissimus, ex principis acoustices; debent itaque vibrari & excitari eorum fibræ ossæ a sonis externis acutissimis, & si discordes sint, vibrationes similes pati; unde distractio dolorifica calore sublevanda.

8. *Odontalgia hysterica* Ill. Raulin des Maladies vaporeuses pag. 25. B.

9. *Odontalgia stomachica*, Memoire des Académiciens Étrangers, Tom. III. pag. 463.

Est dolor dentium & gingivarum vividus qui a saburra stomachi pendere videtur, quique vomitione sanatur. *Vide Aën Phys. Med. Tom. III. pag. 163. App.*

Nota. Ad hunc ordinem referri debet *Stomatgia, Glossalgia*; sed dolores hujus partis sunt symptomata alios morbos comitantia, scilicet catarrhum, rheumatismum, cynanchem, anginam, aphtham, carcinoma; de quibus suis locis egimus.

ORDO TERTIUS.

DOLORES PECTORIS.

Sunt potissimum peripneumonia & pleuritis inter phlegmasias; pleuredyne & pneumonia inter anhelationes; palpitatio inter convulsionem. Huc itaque referendi dolores œsophagi & cordis.

XVII. DYSPHAGIA; *Difficultas & avalor.*

Difficultas & dolor est deglutitionem masticationemve concomitans, & non raro impediens sine notabili respirationis læsione, unde ab angina discrepat.

1. *Dysphagia spasmodica* Frid. Hoffmanni To. I. pag. 130. *Spasmus gula.* B.

Est illa quæ ab œsophagi spasmodica constrictione dependet; constrictio vero illa nunc in summa, nunc in ima œsophagi parte potissimum adest.

Signa spasmi omnibus communia sunt pedum refrigeratio, extremorum artuum tremor, ac rigor, alvi constipatio, flatulencia, borborygmi, ventris dolores, murmura, nausea, cardialgie, urinx pallidæ, pulsus duri, &c.

Signa propria spasmi pharyngis sunt deglutitionis difficultas, dolore aliquando stipata, nec fluida, nec solida transmittens, rigida vicinorum constrictio, dolor, impeditus motus, molestia suffocativa, sensus palii faucibus infixi, ac si quidquam inde proferretur; vox perit, & hæc omnia per intervalla recurrunt, ac quandoque convulsionem vel eclampsiam accersunt; signa spasmi gulæ inferioris sunt percepta deglutitionum hærentia in ipso œsophagi tubo, maxime circa cardiam, potissimum a poru frigido; levamen a calido, dolor in spina dorso inter scapulas; accedit nausea, ructuatio, muci limpidi ex œsophago rejectio.

Hæc species opisthotonum sæpe comitatur, *F. rest. lib. 10. observ. 112. Cr. 113. & Boneti de Opisthotono in Sepulchreto.* Vidit Mead tantam dysphagiam in palpitacione cordis paroxysmo ut a dysphagia hydrophobia similiter differret, vidi ego non in paroxysmo epialæ cum convulsivo tremore & frigore horrendo ut ob præcipitem anhelationem ne cochlear potus cardiaci per horam integram posset degluti.

Cura exigit antispasmodica pro re nata diversa.

2. *Dysphagia hysterica*, Mead of the Mad-dog p. 147. L.

Novi mulierem hysterica quæ diversis terroribus vexatur, & quæ quoties cibum sumit, metuit suffocationem, nec sine labore quiddam deglutit, ita ut per annum & ultra sola pasillum sumat, quod indecorum putat culibet bolus vehiculum præbere hausso aque potu. Itineratio, balnea & lacticia hanc dysphagiam demum auferunt; hystericeis œsophagum a par-

roxyfmo affari, ut ne quidquam deglutire valeant; norum est omnibus, spasmo hysterico gulam & tracheam urgente; sed hic aff. tussis fugax est, nec cum spasmo gulæ superiori comparandus quoad periculum.

3. *Dysphagia paralytica* Forelli lib. 15. observ. 30. Fridrici Hoffmanni ibidem, pag. 130. numer. 6. Van Swieten Tom. I. pag. 702. An dysphagia tussiculosa? L.

Est species quæ a musculorum laryngis dilatatorum atonia & resolutione pendere putatur; ea difficultas deglutendi non est interpolata ut priores, sed continua; in hac alimenta per os ac nares regurgitant, aut quandoque laryngem subeunt. Tulpus lib. 1. cap. 44. allegat casum in quo omnino impedita erat deglutitio cum faciei pallore, partium vicinarum mollitie, ac flacciditate, samentu explendi impossibilitate, unde summum periculum.

Vide historias in *Acad. Nat. Cur.* ubi dysphagia ab apoplexia, paralyti relietæ, quæ paralytico curantur exigunt. In hac specie boli solidi per vim linguæ adacti resistentiam superant & deglutiuntur; fluida vero minime: Vide *Mangeri Biblioth. Med. de Paralyti*, pag. 770.

4. *Dysphagia pharyngea* Deidier Consult. tom. 3. pag. 308. ab *excrecentiis, fungis, verrucis æsophago innatis*, vide Synopsim *Acad. Natur. Curios.* verbo Deglutitio: a *rhyimo incussato* Boneti Scpulchret. observ. 16. pag. 35. ab *Obiculo retro laryngem nato*, *Acad. Nat. Curios.* Decur. 2. observat. 116. Tulpus lib. 1. cap. 44. a *calcule palatum obducite*, *Kruger Journ. de Medic.* Juill. 1765. p. 69. L.

Ea est species quæ superiorem æsophagi partem obturat, in qua proinde alimenta vix deglutiri possunt, sed per nares & os regurgitant; si nullus sit hiatus, inedia percundum est; si exiguus, tunc liquida sibi viam parant, non solida. Huc spectat observatio D. Coulas, *Memo. de la Soc. R. de Montpellier* de ovo seu hygromate ad radicem linguæ posito, quod nuper mulier ore rejecit galinaceo ovo non minus.

5. *Dysphagia æsophagea* Coiteri Observ. anat. Decidit Consultat. Tom. III. pag. 327. ab *obstructione imo æsophago intervenit* scribit, Fernel. *Pathol.* cap. 1. lib. 6. a *callo nerto adnato* Dodonæi in cap. 30. Benivenii de abditis; a *scirrho cardiacum obducite*, Vide Coiterum; a *tuberculo cancroso in æsophago*, Bonet. Scpulchret. pag. 32. observat. 8. & 9. a *glandula æsophagea* Verheyeni & Heister Anat. de æsophago. D.

Ea est species quæ a tumoribus infra medium æsophagum, vel intus vel exus adnatis, pendet, vel etiam quæ ab ipso tubo angustato producit, ut *Hernii Observat.* 30. patet. In illa specie alimenta quidem deglutiuntur, sed ad locum obturatum perventa ulterius progredi nequeunt, unde vomitione rejiciuntur.

6. *Dysenteria lætensium* Bonet. Scpulchret. Observat. 5.

Eam intelligo quæ non a vitio pharyngis aut

laryngis obstruæ, indurata vel angustata dependet, sed quæ vel a palato perforato, vel a columellæ erosæ, absumptæ, velive palatini defectu oritur.

Ad deglutendum necesse est bolus in faucibus undequaque magis comprimatur, quam versus æsophagum, & sic quæ data parte propelli; si itaque velum palatinum, veluvæ deficient, nares posticæ minime obturantur possunt, nec proinde resistere pressioni quam bolus experitur: ergo bolus per nares regurgitabit, utcumque liberius sit æsophagus. Novi tres homines quorum palatum ab ortu erat perforatum, unde paraphonia singulari laborant; illi vero fac a papilla oblatum deglutire in infantia non poterant usquequo inventæ fuissent nutritæ, quarum papillæ adeo extensæ erant, ut ultra palati foramen protruderentur. Inde vero filius ipsius Boneti cito perisile mihi videtur, ut narrat loci citato, & *Atti Natur. Cur. Decad. 2. observat.* 5. Vide *veterem Sal-muthi observationem*.

Ea species infantibus tantum fere accidit, nec est confundenda cum ea difficultate sugendi lactis, quæ pendet ab aliis principiis; v. g. si frænum linguæ solutum non sit, lac difficillime sugunt infantes, & cito indignabundi pupillam respiciunt, sed nulla est deglutendi difficultas saltem mihi cognita, quod tamen ulterius inquirent Medici.

7. *Dysphagia suffoculosa*. Vide Fabric. Hildanum, observ. 34. centur. 5. Majault. *Journ. de Med. Ann. 1756. L.*

Ea est quæ metum suffocationis incutit quoties liquida deglutiuntur ob illapsum illorum in tracheam. Hanc vidi in fene. qui quoties jusculum aut potum quemvis deglutire conabatur, toties superveniente vehementi tussi defatigabatur cum suffocationis metu ob similem causam. Hujus morbi theoriam tradit Fabric. Hildanus existimans epiglottidem catarrhali fluxione incrassatam non potuisse more solito glottidi applicari dum fluida bibebantur. Quid simile refert P. Barbette ab epiglottide duriori ortum, & insanabile hoc malum merito reputat, observatque majores bolos solidorum ciborum deglutiri, non vero liquida. *Forellus lib. 15. observat.* 30. & post eum *Frid. Hoffmannus* hanc speciem a paralyti æsophagi pendere putant.

Adolescentes a decem mensibus post cynamchem nil poterat deglutire, quin fluído glottidem subeunte, illico tussi violenta & convulsiva fere suffocaretur; præcristi *Alust. Majault* aut æger bibens caput in alterutrum latius inclinaret; & facto tentamine æger quoties in sinistram latius inclinabat capite, toties liquida sine tussi & difficultate deglutiebatur; quippe aderat ulcus in margine pharyngis & laryngis rimam glottidis in laryngem continuans; & inclinato vero capite, musculi deglutitionis famulantes hanc rimam mutua laborum adunatione debebant, ut demonstravit cadaveris sectio.

8. *Dysphagia hydrophobica* Mem. de la Soc. R. De Montpell. observ. III. Haugenot: *Dyscatapsis Mead* of the Mad Dog.

Paret ex ejus & aliorum observatione Hydrophobos, antequam in rabiem incidant, conqueri potissimum de quadam deglutendi difficultate, sine ulla dyspnœa: D. Lamarier, citatum in hac historia rusticum examinans digitum in ejus fauces intravit inquirens causam difficultis deglutitionis, & nihil vidit: quippe intra œsophagum latent illæ lacunæ quæ virus hydrophobicum foudunt; sequenti vero die non sine terrore auditiv hunc rusticum afferentem se tanta rabie affici ut exercitum integrum devorare cuperet; si monitus fuisset is insignis ebururgizæ demonstratur dari talem dysphagiæ speciem, is non ita facile suum digitum in os hujus lupi immisitset, quod tamen impdne factum est.

Presbyter, a se febratida demorsus dudum, sola densium impressione relicta, sine laceratione, per multos annos, eodem anni tempore quo fuerat impetitus a fele; magna faucium angustia, a qua primum cito evaserat, corripit solitus erat, *Scaramucci* Epistol. 8. historias quindecim hydrophobizæ a morsu fellum excitatæ recenset *Illustr. Morgagni* Epistol. XI., 14. his ego tres addere possum.

9. *Dysphagia nauusola* Bonet. Sepulchret. pag. 31 & 32, Tom. 1. B.

Est ea species quam nausea & inde nata restrictio spasmodica cardiz excitat, quæ vel ab exulcerato œsophago, vel a succis acerbis in ventriculo contentis, vel ab antipathia dæmoni cibi oritur. *Vide Aët. Natur. Curios. Centur. 1. Observat. 6.* ægri licet deglutire conentur, paulo post nausea, singultu, vomitione defatigantur, nec deglutire possunt. De hac specie quam ulcus excitat, *vide vanter Linden & Turzi de Febris. pag. 132.*

10. *Dysphagia a de luvitis* Vaters dissertat, ab officulo *Impo pone consillas subsistente*, Diemerbroeck anatom. lib. 1. cap. 16. a devorato officulo & ex resellio inflammatione œsophagi persistente, Fabric. Hildani, Centur. 5. observ. 35. ab esu *suminis fagopyri*, Aët. Natur. Curios. Dec. 3. anno 3. observ. 5. a frustis cibi solidi *Friderici Hoffmann* conspexit. casu 63. & Foresti lib. 15. observ. 28.

Quibus artificis hæc semi-deglutita foras educantur, *vide Heisterum & Fabricium Gildanum.*

12. *Dysphagia a datura* Grugeri Ephem. Germic. Decem. 3. pag. 84. P.

Sumpto semine daturæ seu stramonii supervenit dysphagia strangulans cum periculo suffocationis, virgine, paraphrolyne & ecclasi, in qua æger chimæras & visiones phantasias sibi representat. Usus gargarismatis ex sicubus, uris passis, & plicyrrhiza juvat; theriacæ ad sudorem excitandum, pulveres absorbentes ad reliquias veneni auferendas profunt; melle, præmissio vomitorio, æterum propi-

Vide plures observationes circa noxam daturæ dum de paraphrolyne.

12. *Dysphagia a sarcamate* Hannemani Collect. Acad. Tom. 3. pag. 604. L.

Post abscellum œsophagi mulier dysphagiæ experta est oriundam ab excrementis seu caruncula huic abscellui succedente, unde omnis in ventriculum aditus alimentis præcludebatur; bis sero via cusa fuerat, æt tertiam operationem experiri noluit, adeoque fame perit ægra. De hac specie *vide observ. 14. appendice ad cent. 4. Rivieris* vide etiam *Tulpium lib. 1. Observ. 44.*

A sarcamate syphilitico ortam dysphagiæ memorat *f. Rhodius centur. 2. observ. 46.*

13. *Dysphagia ab scirrbo*, Joan. Rhodii Cent. 1. observ. 47. Otto Heurnius.

Ab hygromate ovum gallinaceum colore & magnitudine referente ortam vidit nuper dysphagiæ *Docteur Coulas*, ovumque illud inter basim linguæ & laryngem latuisse & latere situm comperit; mulier illa dysphagia liberata fuit, hoc ovo per os expulso integro: illud hygroma continebat a quam subflavam minime in igne concrecibilem. *Vide hystr. in Memair de la Societ. Royale de Montpellier* propediem edendis.

14. *Dysphagia canina*, *Essais d'Edimbourg* Tom. 2. art. 15. difficultas deglutendi ab scirrbo œsophagi cingentes, a J. Taylor Medico edimburgensi. D.

Dolor constans sub cartilagine xiphoidea, difficultas deglutendi alimenta solida, eorum frequens rejectio antequam in ventriculum delapsa forent, in ima œsophagi paræ pondus & dolor. Macies & asthenia crescunt in dies; cum tubercula illa suppurantur, accedit febricula, cum sudore nocturno, quæ sublevantur tuberculis rejectis. Post diversos cruciatus mors: Canes habent glandulam Vercellonianam in imo œsophagi, in qua vermiculus ruber nidulatur, si ab ea, vel simili glandula intumefacta nascatur dysphagia, ea canina cognominatur.

Dysphagiæ caninam observante *Illustr. Pringia* initio designat vomitio omnium assumptorum statim a deglutitione, sed lenis & quasi ruminans, successu temporis vires & exexia immanuntur, accedit frigiditas æstæ non evanescens, denum atrophica marasmodes. Aperto cadavere excrementis scirrbozæ œsophagum a medio ad imum obstitabant ut vix stylus trajici posset: *Essais d'Edimbourg. Tom. 2. art. 24.*

15. *Dysphagia Valsaviana*, Valsalva de aure cap. 2. num. 29.

A muscularum hyopharyngeorum violenta distensione, qualis in majoris boli deglutitione accidit, quandoque luxantur appendice ossis hyoidis; quod ego in muliere Bononiensi a deglutitione majoris boli bovilis carnis non bene manz observavi. Putabat mulier multique impofuerat de vexari a bolo in faucibus hærente, quem ut inde obtineret, varia manuum & medicamentorum auxilia tentavit, sed incalsum; jam elapsus triduum erat ab eo quod nullum cibum & potum assumere potuisset, cum

cum denique a me opem quæsit; ego vero omnibus perpensis, cum in aliqua ex appendicibus cartilagineis ossis hyoidis luxationem suspicarer, partem, ut anatomicam indicatam cognito, ita digitis contractavi, & illico per unam alteramve contractionem, omnia in pristinam sanitatem redacta sunt, ut immediate absque ullo deglutienti incommodo jufculum sumere & cibum mulieri modo desperata poruerit. Hæc Valsalva.

16. *Dysphagia nervismatica*, Morgagni Epist. XVII. 18. 25. C.

Plurima sunt exempla Dysphagiæ, quæ ab aneurismate aortæ œsophagum comprimentis dependet; illud itaque symptoma ad hujus aneurismatis diagnosim conferre potest.

16. *Dysphagia a labario*.

Labarium vocat Illust. Linnaeus lapsum dentium aut vacillationem; ex his autem vitiis masticationem impeditur, ladi notum est.

18. *Dysphagia a cicatrice*. B.

Est difficultas vorandi alimenta solida, sicca, quæ observatur ubi fauces sunt sicciores, hoc symptoma observatur in syncho & tritophya ardentibus, *Bramer. Sepulchret. Obser.* 14. in anasarca & ascite, *Bonillus de l'Anasarque*; dicitur etiam a fumo nicotianæ *Ephemer. Nat. Cur. Dec. III. An. 1. Obser.* 79. comitatur etiam hæc siccitas usum internum extracti stramonii, hyosciami albi, nigri &c. *Mem. de la Soc. R. de Montpellier.*

19. *Dysphagia ab hypostaphyle; hæste combie*.

Differt ab angina, & cynanche, quod nulla sit difficultas respirandi, nulla inflammatio; sola est laxitas uvule extensæ & propendens, quæ curatur adstringentibus & tonicis. adnotis, ut catechu, alumine, pipere, gallis rosæ rubris, granatis, spiritu vitrioli.

XVIII. PYROSIS; Cremasor.

Morbus cujus præcipuum symptoma est sensus arderia in ventriculo & œsophago sine febre acta.

Dicitur *ardor ventriculi* Hoffmanno Tom. 2. pag. 120. *Ardor stomachi* Frider. Strokari differt. cum historia accusata 1704. Soda Germanis, ut Neutro tabul. 90. *Den Soder Sennert.* cap. 16. *Orexis* etiam Nenterii ibidem. *Corgosser* Lugdunensibus, Meyssonier; Occitanis *Cremasor*, quia cremari seu uri videtur cardia. *Pyrosis* Græcis a pyr ignis.

1. *Pyrosis vulgaris, aigreur d'estomac; le ferreux*, Histo. de L'Acad. R. des Sc. 108. L.

Est fugax & indigestionibus acidis, empyreumaticis superveniens atque post finitam digestionem evanescens. Sentitur sensus aciditatis & fervoris potissimum in gutture per totum œsophagum se diffundens, cum frequenti salivæ, quæ acida videtur, exspuitione, simili circa epigastrium molestia, quæ vomitionem etiam concitat, animæ quædam molestia, quæ iracundiam aut morositatem, faciei quæ distor-

tionem inducit. Familiaris est illis qui cibos crudos, accecentes male digerunt, maxime eos in quibus extrahitur aleum copiosum, ut castaneæ, quod oleum prava digestionem empyreum contrahit; familiare etiam malum ab usu piscium, carnium, quoties cum oleo, adipe maxime rancidis mixta fuerint in saccagine; item a liquoribus fermentariis.

Pyrosis vulgaris est simplex, fugax & curatu facilis, modo in hypochondriacos non incidit; *Homburgius* eam frequentem observat apud cerevitiæ potatores, & largo usu oculorum cancerum feliciter sanavit; urpurumque selectis alimentis eupeptis evanescit aut cathartica cedit. Salia alkalina huius pyrosis vulgari laudat expertus *Pingle*; mutant enim succos in saponem utilem; *Experim.* 36. Si in phiala cum pane, carne contritæ & saliva affundatur oleum vel substantia oleosa, fermentatio violentior evadit, eamque saliva moderari non potest. Cum stomachus laxior alimenta distius retinet, fermentatio completa evadit, etiam carnibus, pane & aqua tantum usus sit homo, inde vero exurgit aciditas quæ dentes stupefacit; *idem ibidem*. Testacea, aqua calcia, alkalia fixa, ac potissimum saliva aciditatem corrigunt. Alimenta cocta, carnes asæ, bene masticatæ, mora maceratæ, pecunia fermentescunt, & facilius digeruntur.

2. *Pyrosis biliosa* Felice. Plateri de doloribus, Bianchi histor. Hepat. tom. 1. p. 116. L.

Est species febre & cardialgia sæpius stipata; de qua *Hippocrates* ait in aphorismis: In febribus circa ventriculum & foris æstus & cordis morsus malum. Hanc comitatur inappetentia, oris amaror, vomitus biliosa; biliosis est familiaris, maxime si utantur cibis acerbis, creta, allio, caseo veteri; hæc enim in stomacho calido indigestiones empyreumaticas excitant.

Commendatur catharsis ex tamarindis, deinde absorbentia ex creta, oculis cancerorum, ebore ulso, bolo armato; item aqua portulacæ; conserva cynorrhodonis, &c. Aquæ acidulæ scopopurgandi indicantur, & serum lactis cum extincto lateris frustulo.

3. *Pyrosis a phlegosi Solenandri; ab inflammationis visceribus*. Boneti. L.

Ea est species quam phlogosis ventriculi seu gastritis, nec non hepatitis, cystitis, hysteritis excitant.

Curatur ut morbus primarius phlebotomiis; aqua pulli, nativis.

4. *Pyrosis sæcula* Illust. Equit's Linnæi, Achiatri Suecici epistola an. 1752. Cardialgia *Spasmodica* lii dicta. C.

Est apud apud Suecos, qui Alpibus Lapponicis proxime adjacent, morbus endemicus, quo diutius pars hominum laborat tum mas tum femina. Dolor præcursus sub scrobiculo cordis premit versus dorsum & pectus, repetitis vicibus summa cum anxietate, usque dum æger incipit ex ore emittere salivam instar rivuli cum repetita nausea, interdum vomitione & salivâ.

saliva exiens ad libram semidem & libram unam est calidissima, purissima, aquei coloris, quo effluxu mitigatur morbus aut saltem per unum, alterumve diem æger immunis est a morbo.

Paroxysmus excitatur a cibis fumo induratis, carnibus salitis, larido, pulste quavis. Mitigatur carnibus recentibus, piscibus, lacte dulci & morbus durat sæpe per vitam, nulla vera medicina adhucdum cognita; nonnulli utuntur vomica nuce pulverata ad scrupulum unum intro sumpta, alii alia adhibent; hæc scribit *Illust. Carl. Linnæi*.

5. *Pyrosis ulcerosa* Frider. Stokari differe. Aca-dem. Ardor stomachi Batilæ an. 1704. C.

Est species pyrosee pertinacis, diræ, quæ ab ulcere pylori per multos annos soletur.

Quidam multibulbus a triennio de ingenti ardore epigastrii versus pylorum querebatur; a sumpto quocumque salito vel acri, ut vino, jussulo, acerbissimum dolorem velut a pruna aut ferro candente inulto patiebatur; dolore furente, pugno epigastrium valde comprimebat, gemitus, suspiria ac ejulatus edere cogebatur, cætera bene erant.

Obabantur cremores hordei, farinæ avenacæ, bolus armena, cornu cervi ultum, creta, lapides cancrorum, sed incassum; pulvis ex radice althææ, gummi arabici & tragacantha fuit inutilis; pulvis seminum cydoniorum aliæque frustra adhibita sunt.

Sumpsit vomitorium a Medicastrò, unde malum increvit, anorexia, sitis, hætica, debilitas, urina rubicunda, vomitus habitualis, tabes marasmodi, inde in ascitem, & post atroces intestinorum dolores, mors, prius tamen anhelitus olebat graviter.

Abdomine aperto viginti mensuræ feri viridescentis effluxere, stomachi sedes mutata, fundus sinistrorsum, orificia dextrorsum vergebant; stomacho aperto fœtor horrendus exivit, in intro pylori erat ulcus tres pollices latum, sordidum, canosum, fortidum, & cacochæ, caro lacerata & putris, sanies fœtida, intestina valde attenuata, hinc inde inflammata, hepar exsangue, pallidum, durissimum, glandulæ mesenterii durissimæ, eor exiguæ, flaccidæ, pericardium sero distensum, sanguinis vix uncie due in corpore, &c.

Cura a lacte, quod nemini in mentem venit, erat auspicanda.

6. *Pyrosis a conceptione* Paul. Hermanni observ. Von der Lehr, diss. de sterilitate. L.

Hic celebrat Professor Leydenis observavit mulierem quæ imprægnatam se cognoscebat ex pyrosi quam statim a conceptione experiebat, ita ut suam graviditatem inde certo prædicaret; hunc morbum *Hermannus* exhibitione oculorum cancrorum, martialiumque feliciter sedavit, ac ultima vice per novem menses graviori multo pyrosi cum majori ventriculi inflatione & ardore ea vexabatur, ita ut iisdem remediis profigari non potuerit, usquequo de-

mum dato tempore geminum foetum exclusit; in illa itaque soda aura seminalis martei erat principium morbosum; & quo nberius erat hoc principium, eo major erat pyrosis.

XIX. CARDIOGNUS; *Aneurisma præcordiorum; Aneurisme du cœur, &c.*

Est gravis pertinaxque molestia in præcordiis cum sensu ponderis & magnæ molis pulsantis a minimo motu increfcentis; cordis vasorumve vicinorum molè adauget aut aneurismati tribuenda.

Cardiogmi nomine, ait *Galenus*, quidam intelligunt cordis motum quemdam palpitacioni similem; *Gorrhai* definit. Alii vero cordis etiam dolorem hoc nomine significant; nos vero eum indigitamus morbum adhucdum obscurum, qui a cordis & vicinorum majorum vasorum aneurismate, tum ejus visceris mole, cum vel sine polypo, dependet.

De hoc morbo consulendi sunt *Lanciscus cap. vi. de cordis aneurismatibus; Illust. Senacus des Malad. du cœur, tom. 2. liv. chap. 8. Anton. Marani in præcordiorum morbis aneurismatibus, Florentiæ 1756. pag. 34. &c. Meckel Mem. de la Soc. de Berlin, 1755. pag. 58.*

Cardiachus dici potest a *cardia* cor, & *oncha* tumor, sed præstat nominis cæterum vacui significatum definitione determinare.

Portentose dilatari cordis ventriculos, aurículas, sinus, cavam ipsam & aortam frequenter satis observatur, & frequentius observaretur, nisi denegarentur mortuorum extispicia; interea hujusce morbi diagnosi intricatissima remanet, & si a morbo palpitacione dicto distingui queat, id ex sensu magnæ molis in cordis regione pulsantis, quasi præfocantis, repeti posse viderur; in his tenebris non species distinctas, sed individuas observationes referemus.

1. *Cardiogmus polyposus* Hombergii Histoire de l'Acad. R. des Sc. ann. 1704. p. 159. C.

Matrona annorum 35 patiebatur durum asthma, frequens & magnum capitis malum, cum perpetua vigilia & doloribus pectoris; si vel minimum se dimoveret, asthma adaugebatur, accedente violenta cordis palpitacione, quæ per horam interdum perseverabat; aliis etiam symptomatibus successively laborabat, unde mortis proxima sæpe reddebatur; durante paroxismo, magna ac sensibilis aderat venarum colli & brachiorum pulsatio, exacte sequens motum cordis & quasi undulatoria.

Sceto cadavere cor duplo majus inventum est & flaccidum, cava solito ampliora & graciliora, polypi cordi adherentes & per arterias ad pedem & ultra extensi.

2. *Cardiogmus Palagii*, Lancisi de cordis aneurismatibus prop. 53. Aneurisma ventriculi dextri. C.

J. Palaggi, Canonicus Romanus, hypochondriacus, cordis palpitacione reversiva laborabat cum

cum pulsus inaequalitate & intermittentia, maxime vero quoties corpus aut animam vehementer exercuisset; suffocativum etiam asthma identidem ac vertigo illum vexabant.

Vidit *Lancisius* in cadavere valvulas aortae offesas vel cartilagineas, venam cavam, auriculam & ventriculum dextrum ita dilatata, ut pugnum admitterent; interea sinistra cordis cava in statu sano permanebant. An ex epilepsiae paroxymis ortum duxisset hic morbus dubitandum est: Idem *Canonicus* sphacelum dextrae manus passus erat. Similem calus refert *Hildanus Centur. 2. observ. 99.*

Ex offeis valvulis orificii aortae dilatatum fuisse magis cor sinistrum quam dextrum patet ex *historia 49. lib. 2. sect. 7. Boneti*, quam ex *Horslio* mutatur. Multis aliis exemplis constat cardiognum sine polypis extitisse, & plures polyporum concrectiones in agone mortis a lymphae coagulo produciuntur.

Similem morbum a vena pulmonari cartilaginea angustiori refert *Ill. Senacus*; & sarcomate inter aortam & arteriam pulmonarem, *Gartnerius*; ab aorta ossificata & angustissima, *Blancardus*.

Multiplici observatione consistit vera cordis aneurysmata sine ulla concrectione polyposa existente, & cardiogni symptomatica creare, *Illustr. Senac. liv. 4. chap. 8. num. 5.* De hac specie videlicet *P. de Marchettis & Ill. Senac. pag. 400.*

3. *Cardiognum auricula Illustr. Senac. liv. 4. chap. 8. num. 8. C.*

Puella vicenarius difficulter respirabat, deinceps in lecto jacere non poterat, sine periculo suffocationis; & conquebatur de violenta pulsatione infra xiphoidaeum cartilagineum pulsus imminuebatur, ferme evanescebat, sub morbi finem oedematia pedes & tibias affecit; cor bubulo non minus inventum est, aut ventriculus dexter maxime, & auricula dextra portentose intumescant, cava inferior & superior diametrum brachii adepta erant, pars sinistra cordis recte se habebat; numquid in hac specie pulsatio cordis debilis ob laxitatem ventriculi & auriculae affectae? numquid pulsatio a dextris aut ad aeniam debet esse potius quam ad latus sinistrum? nonne in hac specie jugularium undulatio frequentior? His signis addit *Lancisius* pulsuum magnum & aequalem.

4. *Cardiognum cordis sinistri Poterii Centur. 3. cap. 22. C.*

Quidam est respirandi difficultas, quae per intervalla deambulantibus accidit; in hac sit praecipue virium lapsus, æger propinquus tenetur niti adminiculis, alias humi corrueret; hi ægri ut plurimum derepente moriuntur: In hoc morbo vena pulmonaris distensa disrumpitur, & sanguine effuso spiritus illico suffocatur.

5. *Cardiognum aorta Illustr. Senac. pag. 407. num. 6. C.*

Vidi, ait ille, virum violentis palpitationibus obnoxius; pulsationes erant & sinistro latere infra costas, cum doloribus vividissimis; principium morbi erat dilatazio aortae ab origine sua

usque ad diaphragma, tanta ut capitis volumen æquaret, volumine cordis vix adæcto.

6. *Cardiognum a mole cordis Petr. de Marchettis observ. 49. C.*

Venerus quidam, crapulosus, quadragenarius, de respirandi difficultate conquebatur, & de hypochondriorum angustia; subito extinctus est. Secto cadavere, cor adeo amplum observavit *Autor*, ut tria naturalis magnitudinis æquaret, ventriculis itidem amplissimis & carnosissimis, undique pericardio adhærentis, & hypochondrium pressione sua in tumorem elevans.

Cor incrassatum, pinguedinosum pluries observatum est. Cardiognum procreant quæcumque valent sanguinis impetum in cor adaugere, ejusque per vias suas transfluxum reprimere, ac tonum ejus cordis imminuere; hinc patet cur concionatores, iræ exercitiis violentis dediti huic sine obnoxio; cur ad levem motum paroxysmus accedat, tunc enim sanguinis impetus in cor crescit; cur lapsus, casus, ictus pectori inflicti, cur cacocymia serosa, acris, cordis textum laxans, vel erodens, cur strictura orificiorum cordis, concrectiones polyporum, aortae aneurysmata, tumores vasa vicina prementes, huic morbo anam præbeant.

Ad procrastinandam mortem repentinam quæ sæpe terminatur hic morbus, quies corporis & animi necessaria est, nec non phlebotomia identidem repetita, licet hydrothorax & oedematia imminuant in fine morbi; sudantur etiam narcotica ad spasmos & dolores cordis minuendos, demum dieta media constanti servanda.

Morbus hic sæpius confunditur cum palpitatione & cum asthma, verum longe diversus est ratione principii, ferior atque hujus diagnosi forte elucidabit. Maxima mortium repentinorum pars, quæ vulgo apoplexiæ tribuitur, pendet ab hoc morbo, quatenus subito rumpuntur aneurysmata, ut aliquoties ipse comperi; sunt tamen qui diu hoc constituti vivunt, sic S. Philippus de Neri octogesium annum attigit hoc morbo laborans; referent *Casapino*.

De his vide palpitationem, syncopem, orthopnoeam, quibuscumque cardiognus valde affinis est.

7. *Cardiognum Leprosianus, Ant. Leprosi Obf. de aneurysmate arteriæ bronchialis Comment. Acad. Bonon. 1731. C.*

Dolor ad sternum, dorsum, scapulas, intolerabilis, qui minor erat cum æger pronus jacebat demisso capite; aderant vigilie, oris amaror, flatus, qui ab obice ex oesophago in stomachum repellebantur; dyspnœa crescens, facies livida, jugularis sinistra pulsatio in pectore, pulsus in carpo inæqualis: Hæc in cursu juveni.

8. *Cardiognum Mackellii Mem. de l'Acad. de Berlin des maladies du cœur Observ. C.*

Est illa species in qua ob cohesionem cordis cum diaphragmate & pericardio adsunt dolores cordis cum dyspnœa, præcordiorum anxietas, pulsus intermittens, &c. Vide ejus morbi historias in quibus ventriculi cordis flaccidi, sanguine-

quæque turgidi ac distensi fuerunt, Vide Palpitationem Bom.

ORDO QUARTUS.

DOLORES ABDOMINIS.

XX. CARDIALGIA; Morbus ventriculi Latinitis; Mal au cœur; Cardialgie.

EST molesta quædam sensatio ad stomachum aut epigastrium relata, quæ syncopem minuitur.

Distinguitur a cardiogmo defectu gravium symptomatum, ut oppressionis, palpitationis vehementis, quæ solent cardiogmum concomitari. Juxta Scholasticos differt etiam quod principium habeat cardialgia in ipso stomacho, vel ejus orificio sinistro cardia dicto. Verum ægri ita confuse sentiunt locum affectum, ut indigere ipsum determinare nequeant. Differt a Leptothymia, quia in cardialgia sensatio moletur oritur circa epigastrium, in Leptothymia vertigo, obnubilatio oculorum scenam ducunt, & deinde sequitur affectus cordis, vel cardiacæ. Differt a Gastrodynia, in qua est strox stomachi dolor, non simplex molestia, nec ille virum vitalium lapsus, quem exprimunt ægri dicentes *mox se morituros*, vel *cor sibi mori*, aut *desicere*.

Advertendum est nomine generico *doloris vel algia* Veteres non semper intellexisse molestiam tantum eam, quæ partim a vulnere distractioneque oritur, vel dolorem vividum, cum in cardialgia fit sensatio confusa, quæ a dolore illo acris & vulnera-te maxime differt.

Sedem ejus in cardia *Galenus*, in pyloro potissimum *Frid. Hoffmannus* reponit; aut in cavo stomachi sæpius esse verosimile est.

1. *Cardialgia a saburra* Juch. Differt. Erfordia; *Dolor cardialgieus a cruditatibus oriendus* Frid. Hoffmanni tom. 2. pag. 371. n. 6. B.

Ea species cognoscitur ex signis cujuscumque saburrae in stomacho laticantis, scilicet siue saburrae crudæ a crapula recentis, saburrae viscosæ, saburrae acris & biliosæ, putris aut rancidæ, quæ signa sunt, pondus epigastrii, anxietas, nausea, rufus, prævus in ore sapor, lingue sordities, borborygmi.

Curatur vero emeticis quoties adest cum cardialgia oris amaror, capitis vertiginosa gravitas sine tensione epigastrii; verum emesim sæpe citæ aquæ tepidæ potus; si acris fuerit saburra, aquam pulli, oleum cum aqua præscriptibile sufficit; in hoc etiam casu potus levis cardiacus, vires stomachi augendo, vomitionem quandoque adjuvat; demum cathartica recidivam prævertunt.

2. *Cardialgia a veneno* Frid. Hoffmanni cap. 2. n. 6. tom. 2. A.

Veneni nomine hic intelligo quicquid vehementi stimulo ventriculum lacerat ore prius sumptum, ut arsenicalia, antimonialia, immo cathartica resinosa inopportune assumpta. Hujus *G. Sauvages Nosologia Methodica*, Tom. II.

gna sunt, cum intensissimus est morbus, cephalalgia, vertigo, agrypnia, delirium, convulsio pectoris oppressio, cordis tremor & syncope, pulsus exiguus, debilis, interdum durus & inæqualis, vel intermittens, in abdomine ventris tormina, constipatio, urinae suppressio, in artibus refrigeratio, horror, sudor frigidus, facies livida, contracta, &c.

Vidi ab arsenici drachma deglutita ea omnia symptomata & alia plura accessisse, scilicet oris & orophagi epithelidem ablatam, erosam, penis sub finem morbi spasmodum, & post octiduum mortem atrocissimam, licet optimis auxiliis usus esset hic miser, a Pharmacopolæ sinia delusus, scilicet ab aromatario, qui contra leges medicamenta chymica ægris vendebat.

In his casibus aqua pulli, pinguedo fusa, butyrum fufum, lac, aqua tepida, decoctum omiforum affatum debent hauriri, ut vomitio juvetur, & venenum demulceatur; dein clysmata similia injicienda, & narcotica subjungenda.

3. *Cardialgia stansientia* Huberti Marchant Differtat. Argentini. habita anno 1754; *Dolor cardialgieus stansientia* Frid. Hoffmanni tom. 2. cap. 2. pag. 257. A.

Dignoscitur hæc species per tumorem ovi gallinæ magnitudine versus partem dextram epigastrii, ubi situs est pylorus, necnon ex majori respirandi difficultate propter turgescientiam ventriculi a flatibus; adde ructuum frequentiam, quibus dolor nonnihil sublevatur; denique, addit Hoffmannus, post cibum, præsertim qui inflat, assumptum, ordinario dolor ingravescit.

Hæc autem cardialgia ab Hoffmanno descripta videtur vix differre a Gastrodynia stansientia, vulgo colica stomachi ventosa dicta a qua tamen omnes nostrates Medici cardialgia distinguunt etiam genere contentundum.

In hoc morbo, si pulsus valeat, a phlebotomia oriendum; dein aqua pulli liberaliter haurienda, laudani granum unum est præscribendum præmissis, si minus urgeat dolor, clysmate; lintea calida epigastrio & pedibus admoventa, eo fine ut spasmodica orificiorum stomachi contractio solvatur. Si dolor levis sit, temperamentum pituitosum ac frigidum, stomachus debilis, valent in hoc casu stomachica & carminativa; nimium rusticis in quavis specie laudata, ut decoctum baccharum juniperi, piperis grana integra, anisum, fœniculum, quæ in aliis casibus phlogosum, siccitatem, doloremque intendere valent, & præ aliis theriaca recens.

4. *Cardialgia febricosa*, Vide Mortuorum hist. 16. cap. 9; *Febri cardiaca* Torti de Febrib. lib. 3. pag. 125. & 138. A.

Febricosa nuncupat affectus *VVelshofus* illos qui febris cujusdam intermittens, vel remittens sunt accidentia, ut distinguit eos a febrilibus, qui continuas stipant. Cardialgia febricosa est series symptomatum cardialgicorum paroxysmum febrilem concomitantium, cum eo sapius

pius ingruentium, & recedentium, & in febris vigore crescentium, quod de quovis alio accedente febriculis, vel intermittente febre comitante est intelligendum.

In tertiana sæpius, dum adhuc rigor & horror ægrum infestat, vel desinit, accedit accretioni ventriculi morbus cum pauca vel inani vomitione; accedit animi defectio, seu syncope stomachica, pulsus exilis, facies Hippocraetica, luctuosum suspirium, &c. pro expiratione eduntur clangores, aut ululatus in his casibus, quæ vix unquam primum accessum comitantur, sed secundum, aut tertium, raro quintum; quo graviora sunt symptomata, eo majus mortis periculum est sequenti accessu expectandum.

Quomodo differat a syncope febricosa, vide quo loco; syncope scilicet nulli dolores ventriculi præcedunt. Dolores ventriculi periodicos sine febre alternis diebus recurrentes observavit Bartholinus Centur. 3. obs. 50. in propria filia & aliis.

Cardialgia spasmatica Car. Linnæi Archiatri Suecici epistola anni 1751. Vide Pynosim. C.

6. *Cardialgia scirrhus* Boneti Sepulchret. obs. 13.

A *Scirrhus* ipsius ventriculi pluries observata Hippolito Bosco, unde dolores per annos perseverans. A *Mola*, seu excrescentia carnea in ipso stomacho observata a Vitaglinio apud Panarolum.

Ab *Scirrhus* pylorum, pancreasque occupante, Riverius Rentur. 1. obs. 90.

Ab *Hepatitis limbusque duritie*, Bonet. obs. 31.

A *Pancræate scirrhus*, obs. 49. & Pifo de coluvie serosa pag. 594.

Hæc vero species potius ad Gastrodyniam attinet.

A *verruca Stomachi* Acad. Nat. Cur. Dec. 1. ann. 1. obs. 100.

A *Siruma*, Dec. 3. ann. 5 & 6 Obs. 157. &c.

7. *Cardialgia Paralytica*; *Paralysis du ventriculi*.

Rarus ventriculi morbus D. Lieutaud Mem. de l'Acad. R. des Sc. ann. 1757. pag. 243.

Cognoscitur continuo sensu plenitudinis & gravitatis in stomacho, cum nausea & impotentia vomendi.

Sexagenarius de his symptomatibus diu conquestus, cui propinata emetica nullam vomitionem excitabant, post mortem exhibuit stomachum tensum & repletum, licet per plures ante obitum dies perparum alimentis sumpsisset, pylorus etiam liber erat, unde noster Auctor aliquo jure deducit stomachum sensu & motu destitutum fuisse, nec potuisse alimentis se exonerare, quod accidit vesicæ urinariæ, dum ejus corpus paralyti afficitur. Lein vero erat molis exigua; quippe illius hie usus censetur, ut repleat spatium vacuum abdominis, cum cibis abstinet, æger, & detumescat, cum cibis sacris est ventriculus.

8. *Cardialgia arthritica* Sydenham Proceff. pag. 710. de podagra. A.

Maximo familiaris est ventriculi languor cum ventris terminibus apud arthriticos diu podagra confectis; in hoc casu nihil æque votis respondet, ac vini canarini haustus subinde de-

glutitus; exercitio utatur æger, si autem symptoma inducias non ferens mortem minuetur modo caput malum simul non impetaret, ad laudandum statim confugiendum; hæc ipsa methodo se ab imminente morte liberavit Sydenham, ubi ex errore aliquo in ingentem stomachi ægritudinem incideret, cum vomitione, & aliquali ventris dolore; artus intus, ex retrocessione materiarum arthritice, doloris erant expertes, & ad motum plus solito habiles; congruum nempe unum liquoris possent deorabat, & quæprimum totum per vomitum rejecerat, vini canarini haustum cum laudani sui guttis sexdecim fumebat; quod si huic remedio symptoma non cederet, sudor provocetur methodo & medicamentis huic usui dicatis ad biduum, triduumve, mane & vespere per duas, tresve horas continuas.

9. *Cardialgia brasiptepa*. Cardillas Plateri de dolore cordis a ventriculi imbecillitate, pag. 369 & 478. *Faiblesse d'estomach*, L.

Est illa habitualis & consuetudo cardinalgia quæ ab imbecillitate ventriculi procedit: Stipata est inappetentia; dolores comprimendo, distendendo gravissimè etiam rodendo molestant, & levi errore in victu, ac gymnastica, maxime admissa frigore circa epigastrium, qua sumptis cibis difficilior paulo coctionis, excitantur.

Tarda & difficilis coctio eam molestiam inducit, & saburram crudam effluendo diversa inducit symptomata, ut in inappetentiam, nauseam, ructus, cachexiam.

Huic originem præbent intemperies nativa, senectas, debilitas a morbis prægressis, frigidiorum & humidiorum abusus, crapula prægressa, quæ stomachum sæpius distendendo ejus tenuitatem inducunt ex Plateri sententia. Hæc species nominatur ab illo *cordis molestia*, *imbecillitas ventriculi dicta*, pag. 370. & curatio fuscè traditur, a pag. 398. ad 445, ubi sequentia externa commendat, scilicet pannum scarlatinum vel pellem vulpinam, leoninam aut plumæum a vulture desumptam, aut textum ex gossypio factum, pulveribus galangæ, caryophyllotum, calami aromatici, mentha, pullegii, seminibus feniculi, carvi, &c. factum, & scorbiculo cordis constanter appositum; suadet etiam ut manus calida, catellusve stomachi regionem noctu applicetur; potissima vero auxilia sunt vina stomachica & diæta conveniens.

10. *Cardialgia verminosa* Bonet. Sepulchret. vol. 3. p. 538. Frider. Hoffmanni ibid. num. 19. *hirudinosa* Acad. Nat. Curios. Sectio. 1. observat. 578, Herculi Saxo. prælect. pract. part. 2. cap. 7; River. lib. 9. cap. 10. & centur. 1. obs. 91. A.

I. Bezac Universitatis Decanus accitus quondam fuit in oppidum Frontignan, ubi similis cardinalgia plures & medio sustulerat. Secto cadavere invenit vermes ita tunicis ventriculi adherentes, ut cum perforaverint. Tania non raro horis matutinis & vacuo ventriculi hos ventriculi morbus creat, cum aliquali bulimia, pyralismo, quæ assumpto sublevaritur; idem

etiam hujus fragmenta cucurbitini dicta foras amandantur; in hoc casu magna copia olei juglandum, succus aurantii amari bigarreau drēti, præter emetica; aquas Balneucas, &c. non raro profuere.

Quædam medicamenta pro venenatis habita hic laudantur, ut radix *almofa pudica*. Vide *Labus biflor.* Antillarum; *spigelia anthelmia*, nicotiana, sabacum, arcanum D. *Hierrenschwand* forte sunt hujus generis: Vide *VVeffer de cicuta aquatic.* c. 13. *hifp.* 3. *Hildan. censur.* 1. *obferuat.* 17.

11. *Cardialgia laetentium*, *Cardiognus Nenteri* Tabula 209. cap. 9. A.

Est, ait auctor, species *cardialgie* infantibus familiaris cum anxietate præcordiorum & dolore gravatōe conjuncta, a flatulenta abdominis & ventriculi distensione originem habens.

Cardiagia adulescorum strictior, ista laxior est; *cardiognus* cruditates tantum primarum viarum cum flatibus & vermibus pro causa agnoscit: cognoscitur, 1. anxietate & angustia præcordiorum cum dyspnœa; 2. nausea, anorexia, & vomitione concurrentibus; 3. copioso salivæ effluxu, si vermes subint; 4. febricula quando que satis intensa, convulsiones non raro comites habente. Oritur a mercurii reliquiis, saburra viscida, lumbricis, sudore acoribusve retro pulsus: ructus & flatus sublevant; alvus aperta bona; panophobia, convulsiones & febricula periculum portendant.

Purgetur infans ex syrupo florum pericorum cum guttis tribus vel quatuor syrapi emetici Glauberiani, vel granis duobus tribusve ipecacuanhæ ac manarū unciæ, si bimus vel trimus fuerit; unguento oleo anethi, aut petrolei guttulis paucis additis umbilico illinantur, iteretur cathartus, clysterum usus, &c.

12. *Cardialgia a cardiogno* Bonet. Sepulchret. tom. 2. pag. 80. obs. 45. C.

Cardialgia per annum post partum revertens, cum respirandi difficultate, pulsus interceptione aliisque gravibus symptomatibus observata fuit ab *Antonie de Pozzis* apud Chiliarum, cujus cor inventum est bovino majus, pulmones flaccidos comprimens, duobus polypis distensum, quod a sumpto cibo comprimebat ita stomachum ut ea omnia symptomata sequerentur; *cardiognus* vero quid sit juxta nos supra diximus. Raro de principis morborum mechanicis in praxi cogitamus, qui omnia saburra vel fluidorum vitii tribuimus.

13. *Cardialgia Inflammatoria*. Italtes ad Gallicum attinet. A.

XXI. GASTRODYNIA; *Cordis dolor* Fel. Plateri Classi, de doloribus; *Cardiaca* Panaroli; *Colica ventriculi* vulgo aut *Stomachi dolor*; *Dolor ventriculi* Boneti Sepulchret.; *Cardialgia* Fr. Hoffmanni, qui hoc genus cum ventriculi dolore confundit, a quo dudum ipse Bonetus sejunxit; *Colique d'estomac*, *salbasse d'estomac*, *pesanteur d'estomac*. Ægros *Stomachicos* vocat Cælius Aurelianus.

Est quicumque dolor notabilis & constans in regione stomachi, qui continua animi defectione non cessatur ut *cardialgia*, nec pyrexia ut gastritis.

In *cardialgia* imminet syncopes-periculum; ægri animum, viresque sibi deficere sentiunt, & nostrates sibi stomachum mori conquæruunt. Ast in *gastrodynia* licet intensus quandoque dolor in syncopem demum ducat, talis animæ defectio non constanter imminet, aut vix unquam adest.

1. *Gastrodynia saburralis*. *Colique d'indigestion*, De Meyerey n. 410. A.

Est ea quæ a ciborum quantitate, qualitate, passu tempore, peccantium ingurgitatione procedit. Error autem in cibis est eo major quo cibum quantitate, qualitate & respectu stomachi assumentis vitiosior est: idem enim cibis qui sano utilis est stomacho, debili noxius sæpe deprehenditur. Hac sarcina, Medicis saburra, onustus stomachus, licet sæpe vomitu aut diarrhœa post *cardialgiam* fugacem se liberat, quandoque vehementer contractis suis orificiis contenta comprimit, & ab hac compressione dolet intense, sæpius cum sensu ponderis respirationem inhibentis, pulsus duro, febrili, alias vero depresso, tardo. Dolor tolerabilior est multo quam in *gastrodynia* flatulenta & biliosa.

Gastrodynia a lacte coagulato, a lardi frustulo, ab horæ fructibus, a millenis aliis cibis dyspeptis oriundam observare sæpe datum est, utplurimum vero vomitio spontanea vel artificialis, aut diarrhœa oborta eum morbum solvunt, nec consultum est alimentis sarcum stomachum narcoticis consopire, nisi atrocitas doloris suadeat; utplurimum aqua tepida, oleum, clysmata, penna intra œsophagum adacta ægrum liberant; unde hanc speciem vix inter dolores stomachi recentent auctores, quam velut symptoma dyspeptis, vomitur aut alterius morbi per transennam memorant.

2. *Gastrodynia flatulenta*; *Inflatio Attii*; *cardialgia hypochondriaca* ettmulleri; *Cardialgia* Frid. Hoffmanni; *Colique ventreuse d'estomac*. A. Vide quæ de ea diximus, dum de *cardialgia*.

Est vehemens dolor tensus sub cordis scorbiculo, cum respirandi difficultate, stethendi antrosum trunci necessitate, qui flatuum emissione sabbatur: accedit pulsus imminutus, depressio, extremorum frigus, summa anxietas, præcordiorum angustia. Differt a gastritis, a *gastrodynia* aliisque, quod epigastrium pressione

a manu factam toleret, qua alias exacerbatur dolor.

Premissa phlebotomia, si pulsus permittat, præmissæque clystæ emollienti, & copioso potu aquæ pulli calidæ, si dolor non nimis urgeat, ad oleum amygdalarum recentissimum & demum ad laudanum vel theriacum recentem, aut pilulas de cynoglossio deveniendum est: laudanum solidum ad granum & ultra, liquidum ad guttas viginti, vel triginta, pilulas de cynoglossio ad grana sex vel plura: cavendum a cathartici etiam lenibus usquequo dolor per diem evanuerit, in prophylaxi abstinendum a cibis dyspeptis, leguminosis: juscula emollientia, serum lactis, acidula usurpandæ ad prophylaxin.

3. *Gastrodynia biliosa; Cardialgia atrabilialis* Hollerii & Zacuti; *Cardialgia epileptica inducens* Amati Lusitani Centur. 1. Observat. 20. *Cardialgia biliosa* Bianchi; *ab ira effranti* de Moyserey n. 411. *Colicque biliose d'astmac.* A.

Ea est quæ foveci censetur a materie hiliosa, æcerrima, porracea, æruginosa; bilem vero flavam in viridem mutari per acidam vitriolicam probant experimenta Grohii ab *Etemulera* allata; dolor in hac specie vehementis est, ut a veneno assumpto; quandoque convulsiones inducit; observante Amato, non raro morbus veneno assumpto tribuit: Imo post mortem reperiuntur est ventriculus ruber & fere exoriatum observante Bartholinio & Bonero in *Sepulchretis*. observat. 1. de *ventriculi dolore*; de cætero, si æger biliosus, calidus, liquoibus spirituosus, regimini calido allatus sit, ad hanc speciem præ cæteris pronus est: bilem e duodeno in stomachum facile refluxere docent experimenta Ludovici Davilezard *M. Med. Societatis Regia Scientiarum sodalis meritißimi*.

Solvitur hic morbus vomitione & dejectione uberi bilis acris viridescens, aut æruginosæ, præmissa phlebotomia & pitiana emolliente. Emetica levia in ipso paroxysmo adhiberi possunt, ut decoctum seminum raphani, oxymel scilicetum ad drachmas sex, sed si dolor nimis urgeat, aqua pulli assatim bibenda & vomitione rejicienda: in prophylaxi nihil utilius est aquis acidulis.

4. *Gastrodynia a veneno* Boneti Sepulchret. observ. 2, 3, 4, 9, 17: a *viru*, de Meyserey n. 414: a *vasis cupreis*: Colinix Journ. de Med. Oct. 1775. A.

Ea est quæ a venenis corrosivis assumptis producit, ut ab acidis puris, nitri, salis, vitrioli, mercurio sublimato corrosivo, arsenico, quod vel errore assumentis, vel malicia propinantis acidis, unde casus medico-legalis, qui exigit magnam Medici coram Judicibus eum referentis solertiam & prudentiam. Si venenum sit corrosivum, aduale, ut prædicta, evidens est labia, linguam, fauces, prius affici quam ventriculum, adeoque his reapse corrosis de veneni assumpti realitate non dubitandum est. Si vero symptomata illa externa deficient, dubium potest esse num morbus a causa interna, num ab

externo veneno dato, procedat. Mor est in hoc casu exenterato cadavere panis frustum in stomachi succo tingere, & cani vocandum præbere; & ex subsequente canis morte, ex stomachi corruptione, lividine venenum datum esse concludere; verum conclusio ex prædictis non est rigorose deducta, nisi plures circumstantiæ conjecturam verosimillimam faciant. *Vide curationem dum de cholera: a fungis venenatis* ossa gastrodynia est gravata, sentiva, cum suffocatione & strangulatu: vid. *Orthopneum*: præmisso emetico acidæ & potissimum acetum eximium est antidotum: ea vero quæ valis cupreis, plumbeis, ortum debet, stipatur convulsionibus, clamoribus, delirio: vid. *Rachialgiam*, & Journ. de Medec. Octobr. 1775.

5. *Gastrodynia ulcerosa* Boneti Sepulchret. observ. 5, 6, 7, 8, 27, 28, 42, 43, 48, & additamenti obs. 3. a *Ventriculi sphacelo, omenti, pancreatis, vicini hepatis putredine, exulceratione, corruptione*. obs. 2, 18, 19, 23, 38, 48, 50, additam. obs. 12, 22, &c. A.

Est ea species quæ gastritidem, & phlegmasias suppuratas viscerum stomacho vicinorum sequitur, inde enim exegit ipsius stomachi, aut a pure, ichore, vapore putri, ejus continua irritatio, vomitio frequens, hæctica, aliæque lethifera symptomata exsurgunt.

6. *Gastrodynia americana; Prolapsus cartilaginis mucronata* G. Pifo, de morbis Ind. Occid. cap. 8. *Spinela* Lusitanis A.

Corporis totius languorem inducit cum dolore stomachi, aliquando vomitu, summa respirandi difficultate, quæ ex refrigeratione musculorum pectoris, tum imprinxi mucronate cartilaginis compressione oritur; hinc nox ex dejectione appetitus magna virum imbecillitas subsequitur, & atrophiam minatur. Chronicus est morbus & frigidus, non tamen per se lethalis, paulatim invadens, & cognitu in principio difficilis.

Empyrici signum hujus morbi dicunt esse varices in brachiis; differt a cachexia, oppilatione cachectica, quod vultu quidem tristi & dejecto, non tamen decolore & livido tristi, nec pondus aut duritiem in hypocondriis sentiant, tum & fames languat.

Curatio discutientibus, calefacientibus & corroborantibus internis, externisque absolvitur, interea sunt juscula pipere, immo alio & cæpæ condita, pilulæ stomachicæ, syrupus tabaci, vinum generosum, balsamum copaiva, falfeparillæ & falfasæ decoctum cum aniso, cinnamomo. Externa sunt cucurbitulæ sicæ iteratæ mammis applicatæ, mox stomachi & pectoris inunctiones ex oleo corticis aurantiorum, tabaci, artemisæ & menthæ; scutum stomachale ex herbis corroborantibus, demum emplastrum ex resinis & balsamis. Commotus ergo, ait Pifo, felicissimo horum remedium succellu, in colica atrophica, & dysenteria, commendavi nostri Chirurgus & cucurbitulas siccas & topica externa.

7. *Gastrodynia periodica.*

Periodica Græcorum est nī fallor species *Gastrodynia* chronica, qualem observavi in sexagenario Sacerdote qui ante sex menses per totum tempus digestionis in stomacho contortiones, motus, dolores, & distractiones pariebatur, intestinis etiam consentientibus, lingua sicca, sine fici tamen; macies accesserat; vires ateritæ erant, alvus adstricta, pulsus rarus, sano similis, quidam dolor in lumbis.

Præscripti iuscula ex pullo, narcotica, & dein lac asinum, quo per mensem sumpto, sanus evasit.

8. *Gastrodynia calculosa* Schneidei, lib. 3. de Catarrhis, cap. 7. cognita Riverio, Alfario Crucio, Bartholino, aliisque observata. C.

Est ea species quæ a bezoarcicis aut xagapropilis in stomacho aut ejus vicinia enatis ortum ducit.

Faber quidam jamdudum de sensatione molesta lapidem molarem in suo stomacho referente conquirebatur; invitis omnibus auxiliis obiit; inventus est in jejuno intestino lapis albescentis pylorum comprimens, quem nullus Medicus suspicatus fuerat. Vide similes observationes, dum de Alca. Vide etiam Boneti *Sepechret.* Tom. II. pag. 77. observat. 33. de Calculis cystici. observat. 31. de Calculo, ibidem observ. 32. & sex historias calculorum similium in observat. 29. Calculus gastricus vidi ellipsoideus, albus, aqua leviores, ovo columbino multo majores, ad ignem non inflammabiles, adeoque a cysticis diversos, ex quibus ille fuerat.

Vidi etiam diversos circulatorios, quorum alter plures lapides durissimos, glabros, sphaeroides, oesophagi diametro non minores, impune vorabat; alter præterea sanum testaceum, ex quo tota Urbs Montpelienfis constructa est, masticabat & deglutiebat cum lapillis grandiusculis, quos in abdomine colliso crepitantes audiebam; utrum eos dein vomitione rejicerent compertum non habeo. Curavi etiam in Nofocomio militem, qui ludi gratia scyphos vitreos in ore contritos voraverat.

Sæpe hepatalgiam calculosam comitatur gastrodynia. Vide Boneti *Sepechret.* Tom. II. pag. 76, obs. 31, 32, & 33.

9. *Gastrodynia adstringens; Stomachi adstrictio* Actii lib. 3. ferm. 1. cap. 13. L.

Est molestia inter digerendum cum alvo constipata, æstu generali, maxime vero manuum ac pedum, faciei rubore, pulsū frequenti, aut juxta quosdam febricula, accidit temperamentis aridam & densam carnem habentibus; hæc *Actius*. Id morbi autem mihi pendere videtur ab ariditate & erethismo ventriculi, a defectu potus aqualis, & a dispositione spasmodica generis nervosi.

Suadet *Actius* in paroxysmo, id est durante digestionē, frictionem, & vincturam extremorum, sive erectionem, gestationem in lætica, dein humectantia & diuientia adhibenda, ut inunitiones corporis ex oleo cum pauco nigro; *Sauvages Nosologia Methodica.* Tom. II.

extra paroxysmum jurant multus potus aquæ calidæ, lavipedium & maniluvium frequens. Ipse *Actius* dicit se juvasse in intervallis illos ante pastum lavando, morbo recedente vinum exhibetur; cibi autem sint facili coctionis, & in tres vel quatuor partibus dividantur.

10. *Gastrodynia atterens*, Vide Jonstonidea medicinae, pag. 445; *Stomachi atteritio* Boneti Polyalth; *Periodica stomachi* Hippocratis, quæ ejus vehementem & circum totum dolorem significare, scribit Gorræus. *Foiblesse d'estomach*, Diction. de Santé, ubi fuse signa & curatio. L.

Hæc species etiam inter digerendum accidit, sed cum extremorum frigore, anhelitusque difficultate, unde a præcedente discrepat: an diversa species a gastrodynia saburrali, flatulenta, &c. *Jonston* suadet inunctionem epigastri cum oleo nardino, & intus piperis drachmam. *Macquerus* potum copiosum & emollientem in pastu; in dolore vero theriacum recentem.

11. *Gastrodynia a peregrinis; Colicæ afflicta* Celsi lib. 4. cap. 12. D.

Fit a deglutitis corporibus omnino ab hominum usu alienis, ut ferro, obervante *Scholæzio*; monest capreæ, argenteæ, cultello, fibula, clavus, aculeis. Vido Ill. *Tiffet*, *Avic* au peuple, num. 365. A lapillis *Carfano*. *Hæffio*, &c. observantibus. *Pilulas acutatas*, ac retnosas, plures menses in stomacho commoratas huic morbo ansam dedisse observant *Rollonius*, *Mollenbroekius*; *frustum Hildanus*, centur. 3. observat. 33. xingibris libram *Platerus* observat. lib. 3; *vesiculas pediculis plenas Henrinius*; *laceratas ac serpentes*, quibus tres mille homines intersecti sunt, *Gesnerus*, *Hist. animal. de laceris*. *Salamandras* demum emeticorum vi rejectas nuper recensuit D. *Batigne*, *Mém. de la Soc. R. de Montpellier*.

De gastrodynia quam tæniæ, lumbrici, eruceæ, similiaque reptilia in stomacho latitantia sæpius excitant, vide *Cardialgia verminosa*.

Vidi impune deglutitas aciculas, calanum scriptorium, scyphos vitreos; testam mytili, nucleos perlicæ, aliaque multa: sed non ita felices sunt omnes, & pluribus gastrodyniæ enormis ulcerosæ, lethales ab hiis erroribus superveniunt; quæ dissolvendis hiis corporibus apta sunt, ut conchyliis furcis limonum, atque tuto deglutiti queunt hic indicantur, nec non lubricantia quæ viam ad inferiora parant & aperiant.

11. *Gastrodynia a xiphoidæ Ballonii Epidem.* lib. 2. pag. 242; *Barbette Anaz. præct.* l. 1. c. 4. C. Plebs Occitanæ hunc morbum vocat, *la palatte d'estomac torbée*.

Non rarum hunc morbum testantur *Barbette* & *Bonetus*; rarior tamen est quam vulgus putat. Hæc cartilagine xiphoidæ intusorium luxata vel depresso ventriculi dolor condans supervenit cum vomitu, anorexia, & si morbus perseveret, atrophia; assumpta esculentis

ta & potentia illico sursum rejiciuntur, dolor ac mentes & annos discruciat. Suadet *Barbette* ut ampla cucurbitula semel vel bis epigastrio admoveatur, dein emplastrum adstringens applicetur, omnia symptomata siluisse a reducta per manum dextri Chirurgi hac cartilagine, docet *Bonetus*. Similis huic dolori est hepatalgia calculosa, notante *VVespero*.

Mulier quæ lapsa erat in partem pectoris anticam dolebat epigastrio, dolor a levi tactu crescebat, ea per intervalla sudabat, calebat, facies rubebat, erat oris amaror, anorexia, nausea, identem deficit ab pulso, imminabat syncope, a cathartico pejus habuerat. Accitus præscripti phlebotomia unam & alteram, & sic sanata est.

13. *Gastrodynia pulsantis* Boneti Sepulchret. Tom. II, obs. 45, pag. 80. L.

Cognoscitur ex molesta sensatione corporis in epigastrio pulsantis, quæ certe molestia a dolore alias species comitante diversissima est. Hanc observavi bis vel ter, & non rara est in hypochondriacis: hystericique; vulgo tribuitur pulsationi arteriæ colicæ, quam refert *Bonetus* pugni magnitudine dilatam: certum est & arterias gastricas & aortam, etiam non aneurismatice sint, in his constitutionibus sensu exquisito prædictis, hunc molestem pulsam ex cere.

14. *Gastrodynia hysterica. Colica hysterica* Sydenhami cap. 7, pagin. 332, & in proectionibus pag. 669. L.

Est morbus hystericas, ut morbo prægresso potissimum dyslocia debilitas mulieres afficiens, dolore circa ferobiculum cordis atrocissimo, & vitidescendum humorum reiectione stipatus. Colica biliosa intestini insidet, gastrodynia vero stomacho; in gastrodynia maxima fit animi dejectione & prostratio, vel desperatio; per diem unum, alterumve facessit dolor, qui post paucas septimanas revertitur, nihilominus sæpiens quam antequam solveretur paroxysmus. Adde quod sedato morbo superfit in epigastrio sensibilitas minimam pressionem recusans, & quod aurigo non raro huic morbo comitem se adiungat per aliquot dies. Dissert ab ileo & a colica biliosa, ut attendenti patebit.

Cura. Possetum seu serum lactis ope alæ seu cerevisiæ eductum affatim hauriatur; apud Gallos vero aqua pulli vel serum lactis vulgare, quod dein vomitione rejiciatur; quo peracto laudani liquidi guttæ xxv in aqua cinnamomi hauriantur, quod paregoricum repetendum est, donec morbi ferocia superetur; si vires serant, initio phlebotomia præmittenda est.

Extra paroxysmos, si revertantur, sumatur bolus ex zedoariz drachma una, vel semisse, cum syrupo e condura cicri mane & sero per mensam, superbibendo sequentem infusionem; scilicet zedoariz semi-uncia infundatur in vini carinari uncis quatuor per horas duodecim, colatura serverur pro usu, vel sume balsamum Peruvianum, ut in rachialgia Pictonum.

15. *Gastrodynia chlorotica. L.*

Est ea species quæ a catamenii, hæmorrhoidibusve retentis supervenit chloroticis, easque fere semper divexat, dolore quidam tolerabili, sed constanti, ab epigastrio ad dorsum infra scapulas extenso; quandoque cum epigastrii sensibili intumescencia adest dyspnœa a levi motu, lassitudo, crurum gravitas, facies pallor, œdematia pedum, anorexia. Curatur ut chlorosis maxime usu repetito chalybis.

16. *Gastrodynia hypochondriaca; Colica hypochondriaca* Sydenhami Processus integri de colica hysterica, pagin. 670: ab emphraxi ventriculi, de *Meyser* n. 413.

Valde atrox est morbus gastrodyniæ hysteriæ, sed viros hypochondriacos atitit, & susdet *Sydenham*, ut inquirant Medici methodum curativam ipsi convenientem, cui quasi genuine morbus cadat, tametsi chalybis imprimis confert.

17. *Gastrodynia febrilis*, Morton de 'prote' f. febr. pagin. 33. hist. 16. Jour. de Med. Janu. 1761. pag. 25. A.

18. *Gastrodynia a frigore.* De *Meyser* num. 411. E.

19. *Gastrodynia metastatica*, de *Meyser* num. 411. ab arthritide, scabie, herpette, fomiculis, ulceribus, myricis, repressis. A.

20. *Gastrodynia gastrica*, De *Meyser* num. 411. Vide *Gastroem*. A.

Nota. Nomen colicæ dolorem coli tantum olim designabat, sensum idem nomen dolorum ilei, hepatis, uteri, stomachi, & nescio quos aliarum partium significavit, quo abusu nihil in scientia medica periculosum est; cum enim cuique generi nomen proprium conveniat, ni confundi omnia velimus: cum genera morborum, diversa viscera afficiuntur, diversa omnino sint, diversa debent esse nomina generica morborum diversa viscera afficientium, quorum saltem symptomata notabilia & connexa sunt cognita, scilicet nomina cephalalgicæ, cardiacæ, arthritidis, &c. prescribenda.

XXII. COLICA; la Colique; Douleur au ventre, Colique intestinale.

Est morbus cujus præcipuum symptoma est dolor, vel molestia intestini, potissimum crassi, regiones afficiens, & ab illius situ, figura & officio determinata.

Cum intestinum tenue & crassum diversas sedes occupat, & diversis visceribus abdominis contiguum est, difficile est ex sensu ægrotantis partem affectam determinare; & errare in hac assignanda quotidianum est; verum ratiocinio physiologico adjuvante ex cogniti morbi causâ, principiis & symptomatibus, cognitisque intestini structura, situ, usu, possumus symptomatum nexum intelligere, & ex hac possibilitate intelligendi nexum symptomatum eruitur partis affectæ cognitio, in hoc & alio quovis morbo; dolendum quidem est quod morborum plura genera

nera non nisi theoricis inventu ab invicem distinguantur; multo tutius & clarius esset ea a symptomatis solis dehnire; sed ad hoc obtinendum desideratur historia morborum accuratior quam quæ hæcenus datur.

Colicæ nonnisi *Plinii* tempore novum erat; Græci hoc morbi genus ignorabant, seu nomine proprio non insigniverant. Dolorem intestini tenuis cum constipatione & vomitione assidua *ileum* nominabant, vel passionem iliacam, ut Arabes dolorem longanionis, seu intestini crassi *passionem colicam* nuncupabant. Addiderunt quidam colicæ definitioni alvi constipationem, ut terminalem colicam a vulgari discernere; sed hæc distinctio non pertinet ad genus; quippe si detur dolor vehemens, constans, etiam torquosus; id est, ad alvi dejectionem vergens, & sit morbi præcipuum symptoma, is merito colicæ annumerandus est, & a sortiori, si alvus simpliciter sit libera, ut quandoque observatur, secus nullum erit genus ad quod is dolor pertineat, ad genus novum citra necessitatem erit admittendum.

1. *Colica flatulenta*, Sennerti de dolore colico; 1^a species, Bonet Sepulchr. Obs. 1. & 2, a *vesiculis aere turgidis*, Collect. Acad. Tom. 3. p. 499; a *cola obstructo*, Journ. de Méd. May 1755; a *senilis repulsa*, Frid. Hoffmann. II. 287; hæc oblie Episcopus Monspelienis D. de Charancy; invenimus maculas rubras, pustulosas in ventriculo & intestina flatibus dilata. *La Colique vermineuse*. A. *Colique* *vermineuse*.

Cognoscitur ex eo quod 1. clysmatis aut alvi reiectione flatumque per inferiora ejectione sedatur, quod non accidit in gastrodynia flatulenta. 2. quod coli tractum sequatur, seu abdominis peripheriam, unde sit ut imam partem stomachi quæ transit colum, non raro afficiat, sed flatuum, horborysmorumque diffusus, & loci mutatione sedetur. 3. Etiam in gravi paroxysmo urina supprimatur, penisque contractus & imminutus vigescat sine ullo voluptatis sensu, interea nec dolor renum, nec mingendi cupiditas urgeat, nec urinæ ardentes & instabiles coloris sint, ut in nephralgia. 4. Pressione abdominis non exacerbatur dolor, ut in gastrodynia hysterica, & in enteritide. 5. Adest alvi siccitas, sæcum induratus, conspiciat. 6. Desunt symptomata & principia procacitica rachialgiam designantia.

Oritur ab alimentorum viscosa digestionem, quæ aeris elastici generis copiosam infert, cum e contra ubi saliva & succus gastricus, bilisque bene se habent, digestio sine aeris generatione perficitur. Alimenta maxime flatulenta sunt vinum non satis fermentatum, legumina, & fructus molles, cucurbitacæ. Hæc species sed fugax & levis non raro originem accedentem designat, suppreffo scilicet bilis in duodenum effluxu; experientia *Severis* in cane & homine docent, denegato hoc bilis influxu flatum in intestinis generari; alvi etiam constipatio flatulentia: ausam præbet.

Levis colica clysmate emolliente, oleoso, chamæmeli infuso theiformi, fomento abdominis calido, frictioneque tollitur. Si vehemens sit dolor, a phlebotomia auspicietur curatio, aqua puli assatim bibatur calida, clysmata emollientia injiciantur, & his irritis, laudanum liquidum ad guttas viginti vel triginta hauriatur; dein largo usu olei amygdalarum recentissimi quarta quavis hora, aqua puli continuata, clysmatis ad semilibras, sed rarius immixtis lubricetur alvus; quo facto & dolore sedato lenis catharsis instituetur, & convenienti tempestate acidulis bilis fluxilitas, & primarum viarum mundities concilietur.

2. *Colica pituitosa* Sennerti ibid. 3^a species; Fernel. pathol. lib. 6. cap. 9; Salmuth. centur. 1. obs. 78; Bonet. Sepulchr. obs. 23; *Colique glaireuse*. A.

Ea est quæ censetur oriri ab humoribus crassis & viscidis intestino crasso impactis. In hac dolore palii infixi, vel terebræ perforantis speciem exhibet, ob violentam ibi loci, ubi pituita ista hæret, distensionem, & statim ut plurimum simul recenti expansionem. In alijs speciebus licet dolores graves & acuti sint, interea non *fixi* & *perforantes* quasi sunt; adde quod colica ista peritæx est.

3. *Etmullerus* dolorem illum a pituita, seu mucagine copiosa viscida, non aceri, *gravamen* esse contendit, & merito, quasi conjuncta sit cum acrimonia acida; dolorem non solum gravativum, sed & etiam simul *constudentem* infert, non tamen negat esse etiam fixum, continuum, perterebantem, atque existimat esse sæpius in hypochondrio sinistro, cumque frequentissime hypochondriacos divexare, cum e contra colica flatulenta dolorem distendentem, & quasi disrumpentem inferat; Salia neutra in prophylaxi indicantur.

3. *Colica stercorea* Etmulleri de intestinorum doloribus, tom. 1. pag. 139. A.

Est illa quæ a scybalis induratis intestina difficulter præterlabentibus oritur. Hanc aliquoties vidi apud mulieres, quæ per vim in quibusdam Monasteriis *Refugiis* dictis detinentur, ob mororem & vitam sedentariam; fæces induratae denum dolores vividos sine febre excitant, quandoque cum eruentis aliquot dejectionibus, quod malum palpo fere cognosci potest, & a cathartici-levisissimi exacerbatur, sed longo & largo usu olei amygdalini, lomentorum & clysmatum emollientium, post aliquot dies evanesce sine flatuum saltem notabili emissionem, emissis sensum scybalis strobilos cupressi referentibus.

4. *Colica verminosa* Sennert. 2^a species doloris colici; Fabricius Hildanus Dentur. t. obs. 57. An *Straphus* Celli? A.

Est ea quæ a verminibus, potissimum lumbricis, uritur, cujus character est dolor varius, nunc rodens, nunc pungens, & a loco in loco serpens sine alvi attritione; sæpius sunt dolores fugaces, vari, cum subsultu in abdomine,

roine, non raro cum cardialgia, nausea, febricula, excrementis apud infantes griseis, halitu vis singulari, faciei nunc pallore, nunc rubedine. His signis addit D. Brun Med. Lugdunensis dejectiones alvi nocturnas pro signo pathognomonicum: pulsus intermittens quandoque jungitur.

Utopurimum hæc species ob alvi laxitatem permittit usum catharticonum ex fenna, semine contra vermes, aquila alba, &c. nisi dolor constans fuerit; quandoque si gravis febris, delirium, convulsio imminet, in paulo præcætoribus, emeticus syrupus Glauberi feliciter præscribitur; sæpius sufficit succus limonis cum oleo in ipso paroxysmo, clysmata etiam dulcia, non raro lumbros cathartici resistentes, educunt; tregæta petrolei intus sumpta, catus vero in juvenibus illata, profunt.

5. *Colica biliosa* Frid. Hoffmann. pag. 286. non vero Sydenhami, quæ *chordæ* est; *Colicus dolor ab acri & scorbutico humore* Sennerti, Tralles de opio T. p. 239; *Colica atrabilaria* De Meyserey n. 420.

Hæc species adolescentes vividos, calidos, iracundos, liquoribus spirituosius indulgentes, viros hiliosos, ætate fervente exalcescunt, cum febre fugaci adoritur, aut sine pyrexia. Symptomata sunt vox rauca, cardialgia, cacœstia, vomitio biliosa, porracea, singultus, calor, sitis, oris amaror, urina pauca, ruffa, cum alvo non omnibus adstricta; unde differt a chordapod; imo cum dejectionibus biliosis & crebris, dolor vero intestinum tenue sæpius afficit, ut duodenum; abdomen nec tensum est, nec fervidum, ut in enteritide; urinx fluunt, caput vertigine tentatur, pulsus nec durus, nec tensus, licet frequens; morbus acutus est: succedit sæpius auxilio.

Curatio exigit statim phlebotomiam, clysmata emollientia ex malva, semine lini, radice althææ, oleo s. juscula quibus incocta acetosæ folia; potum acidulatum, ut serum lactis, limonatum, oxyceratam, aquam nitratam, aquam pulli, somenta emollientia, cremores hordei, emulsiones cum narcotico; urgente dolore laudandum, decoctum capitis papaveris in aqua oryzæ frigida; præmissa lenissima catharsi & decocto cassiæ, si reverteretur dolor, semicupia profunt.

6. *Colica phlogistica*, Sennert. species 4; *Phlogosis intestinorum* Felic. Plateri; *Colique inflammationes*, Cl. Tissot Avis au peuple.

Differt ab enteritide ratione gradus tantum, ex eo quod scilicet non sit pyrexia acuta cum pulsu frequenti citato, totius corporis ardore, sudore, &c. Distinguitur ab aliis speciebus meteorismo abdominis, intolerantia palpi, vel magna sensibilitate, cum renitencia abdominalium viscerum versus umbilicum, urinx difficultate, siti, &c. Curatur amplius phlebotomia, irrigationibus emollientibus clysmatibus, aqua pulli, ut enteritis; colicæ statulentæ calidis medicamentis tractatur non raro evadunt phlogistica. Cathartica æria, intempestive assumpta, ut in alvi constipatione,

ne, hanc sæpe excitant. De hac vide *enteritidem*.

7. *Colica spasmodica* Frid. Hoffmanni de intestinorum dolore, pag. 287; *Colique convulsiva* Bonet Sepulchret. pag. 266. obs. 2. A.

Alia est quam a seroacri intestinis impactu deducit Hoffmannus; alia vero quæ est endemia apud Hungaros; ista est vera Rachialgia species, de quæ suo loco agemus; illa vero convulsionibus etiam externis est stipata: in arthriticis, ait ille, & scorbuticis observatur; inflammationem minatur, & vix curatur, nisi materies arthritica ad artus, scabiosa & miliaris, vel perachialis ad cutem tevertatur; videtur itaque eadem ac *colica arthritica* Musgravi capite 3. de arthritide. Præmissa phlebotomia, nihil utilius censet Ragli-vi infuso theiformi chamomilla.

8. *Colica plethorica*. *Colica hæmorrhoidalis* Junckeri Tabul. 106. quam podagæ, vel ichiadiis repulsioni tribuit, proindeque cum convulsiva confundit. *Colica sanguinea* Nenterii Tabul. 26. A.

Bo nomine indigitamus eam quæ a catamenii, lochiis, hæmorrhoidibus reventis supervenit apud eos qui his effluxibus assueti sunt, quæque illis effluxibus resistitur; aut recte se habentibus sedatur. Accidit illa viris & foeminis plethoricis, hypochondriacis, sæpe cum tenesmo hæmorrhoidali, & signis sanguinis copiosis.

Ea species exigit phlebotomiam, diluentia, & ea quæ valent fluxus sanguinis consuetos revocare.

Colica catamenialis, seu a catamenii imminutionibus sæpius & intestina & lumbos & viciniam uteri sequitur, quandoque atrox est, solvitur autem phlebotomia, eruptione catameniorum. Vide *Hysteriam*.

9. *Colica Lapponica* Ill. Linnæi Flora Lapponica. pag. 69. de Angelica. C.

Morbo laborant sæpius Lappones silvatici vehementissimo *Uilem* vel *Horne* dicto, qui species colicæ est, & ad colicam spasmodicam Scheuchzeri proxime accedit: corripuntur enim interanea circa regionem umbilicalem spasmus distissimis; qui extenduntur ad pubem usque, paroxysmis parturitium sane vehementioribus, ita ut miser Lappo vernis instat, per terram reptat, & utinam sæpe sanguinolentum reddat; licet calculi nulla omnino sit suspicio apud hanc gentem a calculo & podagra nativo privilegio defensam; post aliquot horarum, quandoque diei, spatium; terminatur morbus pyralismo ingenti per horæ quadrantes duranti; dicunt Lappones quod hic morbus in Alpibus eos non aggreditur, sed tantummodo dum in silvis per ætatem degunt, hausta scilicet ibidem aqua semiputrida, vi radiorum solarium incalcescit, vermiculo *Gordis* dicto scatente. In hoc morbo variis utuntur medicamentis & omnibus quidem fortissimis, ut radice angelicæ, cineribus aut oleo tabaci, calore liquido, &c. Colica convulsiva, quam in *linere Alpino* describit Scheuchzerus, plures monachos abtulerat usus in culina-
vatis.

vasis cupreis, & is morbus ad Rachialgiam pertinere videbatur. Certum fecit *Laurentius Montan.* hunc Lapponum morbum oriri ab assumpto cum aquis *Gordio* seu seta aquatica, quo extracto sanatur.

10. *Colica Japonica* Kämpfer. fasc. 3. amœnit. obf. 11. C.

Senzki Japonibus, id est spasmus abdominis & intestinorum, ita familiaris ut ex decem adultis vix unus sit qui ea non aliquando laboraverit.

Tribuitur usui cerevisiæ ex oryza paratæ, unde advenas ea utentes etiam adoriuntur.

Illa species distinguitur ab aliis, 1. quod non solum intestina lancinet, sed etiam in inguine simul motus convulsionis excitet; 2. quod abdominis ipsos musculos dolore afficiat; 3. Persæpe suffocationem hysterice instat ægro machinetur convellendo totam regionem ab inguine usque ad cartilaginem xiphoideam; 4. Desinit, ubi diu sævit, in tumores hic illic promiscue nascentes; 5. Et quod pejus est quandoque desinit in viris in sarcocolem quæ fistulam contrahit, in sceminis vero abit in foedam catervam flicorum quæ tuberculorum in ani, vulvæque labiis nascentium (quæ *Sarcocole* *fabri* dicta est, ægri *submota*) & hi flicus extra colicam pariter frequentes sunt & endemii in Japonia.

Therapeia in omnibus fere morbis familiaris apud incolas Corææ, Sinæ, & Japoniæ hauritur ex duplici remedio, scilicet ex *mexiburia* & ex *acupunctura*. Moxa est turunda conica ex filamenti artemisiæ officin. carptæ digitum crassa, quæ apice accensa apponitur cumburendæ parti quæ basi contigit; hæc vero ambulo tam lenis est, ut infantes hanc fine stertu tolerant, teste *Alpine* apud *Ægyptios* moxiburium observante, & *Kämpfero* in Japonia. Arabes moxam parant ex pinno gossypino isatide tincto, vulgo *ceton bleu* Indi vero ex medulla scirpi palustris.

Acus sunt argenteæ vel auræ quæ in carnes adiguntur ad semi-pollicem, raro ad pollicem, eo fine ut status & vapores, quibus fere omnes morbos tribuunt, foras erumpant; plures autem & tum numero, tum ordine superstitiosis, instituantur acupuncturæ, quibus illico vel sanari ægros, vel sublevari testatur *Kämpferus*. Alibi vero in India substituuntur plura eodem ordine moribundis. Japonens in epigastrio anticolicam acupuncturam celebrant, & novem punctonibus pollicem distantibus, figuram quadratam repræsentant; in aliis morbis alias partes acupungunt, aliasque figuras delineant.

11. *Colica mesenterica*, Vid. Bonet. Sepulchret. obf. 2. de dolore colico; id. obf. 7. 22. 28. 30. num. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. item, obf. 34. 35. in quibus de mesenterii abscessu. C.

12. *Colica scirrhosa*, Bonet. Sepulchr. obf. 8. La Motte, obf. 10. des Tumeurs.

Est dolor ab scirrho intestinis adnato.

Tumor est durus, per se indolens, integumentis abdominis profundior, intestinum premens, unde dolor a fræcibus, strabusve cohibitis.

Hæc observatio *Manqueri de la Motte* prodierem Chirurgorum, qui huiusmodi tumorem pro phlegmone habentes; aparuerunt lapidis calculi interveni; aperto vero feces cum pure exierunt, & ægra intra triduum ab operatione obiit.

Similes tumores resolutos fuisse continuo usu emplastris de diachylo, mililoto, ex mucilaginis observat *idem obf.* 109. sumptis intus aperientibus, obf. 110.

13. *Colica pancreatica*. Vide Bonet. Sepulchret. pag. 150. obf. 31. 35. 38. &c. *Ventris dolor ab apostema pancreatis* Heurnii in Aphor. 41. S. V. Hippocrat. Highmor. Disquis. anatom. lib. 1. part. 2. D.

Est molestia perseverans in abdomine circa regionem pancreatis ab ejus visceris induratione, ulcere, abscessu, quæ post passum crescit, & vomitionem aut nauseam non raro excitat; in macilentis summo mane, flexis genibus, palpo potest explorari sedes hujus morbi alias obscurissimi.

14. *Colica pulsantis*. Vide Bonet. Sepulchret. Ventris dolor pulsativus, obf. 48. 50. 51. 52. L.

Raro dolor est vividus, sæpius sensatio molesta refertens pulsationem in abdominis axi, arteriæ pulsibus respondentem, quæ ab arteriæ aortæ aneurysmate sæpius dependet. Si circa cartilaginem xiphoideam sit ea pulsatio, vulgo coliciæ aneurysmati tribuitur; alit quandoque mucroni cordis tribuenda venit; aneurysma abdominale pugni magnitudine crusta olea tectum invenit. *Fallopis*. Pulsationes aut ventris saltus & palpitatoris motus fugaces arteriæ pulsibus non respondent; sunt quandoque tribuendi moribus spasmodicis uteri, ut vidi in menorrhagia abortiva; ut narrat *Marcell. Donatus Hister, mirab. lib. 4. cap. 16*, quandoque ab intestinis in globum convolutis, seu a globo hysterico; sed hæc symptomata aliorum pertinent.

15. *Colica calculosa* Bonet. Sepulchr. de Dolo colico, obf. 14. *Chomel Hist. de l'Acad. R. des Sc. A.* Præter sex observationes a Boneto recensitas, vide alias, dum de Chordapso calculoso, Gastrodynia calculosa, &c.

Huc referri possunt colicæ a corporibus duris ingestis, ut a nucleis ceraforum, prunorum: *Vide Bonet. Sepulchr. obf. 17.* a lapidibus, caltris, ferramentis deglutitis, *ibid. obf. 18. & obf. 8.*

16. *Colica gravidarum* Puzos pag. 79. A.

Si dolor supra umbilicum transverit abdomen cingens per intervalla recurrit, præcelleritque constipatio, flatulenta incusanda est.

Juvant in hoc casu clysmata emollientia, oleosa, largus potus aque pulli, theæ, olei amygdalini, ad tres quatuorve uncias pluries in die; rheriaca recens, laudanum; sed si diutæ tenuis, & ea auxilia non juverint, revertente dolore, phlebotomia instituenda; hoc sedato purgandum ex decocto cassiæ cum manna, vel aqua mineralis haurienda ex sale Ruppellenii, seu polychresto, cum uno vel duobus tartari bibuli.

biati granis, ex qua per cyathos hausta calida alvus laxatur, minime vero vomito exciatur.

Si vero temperamentum biliosum, si eury, mæroris, terror, itacundia, prava alimenta, eaque aeria, calida incusentur, dolorque pungitivus, intestina tenuia, stomachumque molester, cum vomitione sabburæ vel crudæ, vel biliofæ viridescens, colica biliofa, hepatica cum febre adest, quæ phlebotomis promptas, largas exigunt, prout urgentia casus suaserit, dein curatio antecedens adhibenda.

17. Colica hysterica. A.

Est vehemens dolor in intestinis, vel levissimum palpum refugiens, per intervalla, & subito sine causa evidenti recurrens, qui in intervallis maximam partem veluti teneritudinem & tactus intolerantiam relinquit; quique alternatim cum visus obnubilatione, syncope, animi dejectione; in hoc morbo, ut in gastrodynia hysterica, materies viridescens, non quidem sursum, sed per anum ejiciuntur; hoc vero singularis speciei signum est, quod dolores atroces abdominis minime ad dejectiones illas tendant, & nunc has, nunc illas abdominis partes subito invadant.

Nuper vidi puellam longo morbo & cathartici debilitatam, cachecticam, cui hæc omnia symptomata acciderant, quæque velut in agone moris constituta grano laudani & potu cardiaco ex rheriaca & aqua naphæ ab illa colica & febre, quam Chirurghi putridam judicabant, fere illico sanata fuit.

Vide colicam hystericam Sydenhami, quæ cum ista congruit, nisi quod illa stomachum, ista intestina afficiat, & vero globo hysterico stipetur.

18. Colica accidentalis; VVillisi. Tom. II. cap. 15. de Colica. D:

a Colique d'indigestion. D. Tissot Avis au peuple, §. 305. &c.

Quæ pendet ab alimentis vel statulentis, vel majori copia sumptis, quæque sponte non accidit, sed post errorem similem, citoque evanesceat. Accidentaliter est ab indigestione, ea torminibus stipata abit in diarrhæam torminosam, qua curatur; si vero nausea, cephalalgia, vertigine stipetur, sæpius post cardiacam vomitionem sanatur.

b Colica a frigore, Colique après le froid. Tissot ibid. §. 312. Baglivi Prax. p. 100. libr. 1.

Dolores ventris a deambulatione nudis pedibus super pavimentum frigidum facta, appositis lateribus calidis plantis pedum statim sanantur, crescente namque calore in pedibus sensum minuitur dolor in ventre.

19. Colica meconialis; Termina recens natorum; Tranchies deus enfans. A.

Cognoscitur ex recens nati ejulationibus intra sex primas ab ortu septimanas, & scæbis virecentibus.

Præcaventur sæpius a lacte materno, quod meconium magis diluit, & benignius expurgat quam læe spissius. Curatur vel sudatus oleo amygdula-

rum, quod cum syrupo capillorum veneris, vel de althea mixtum, omni bishorio ad drachmas duas vel tres offertur, vel decocto ex cassiæ pulv. drachmis duabus in aquæ ejulationibus quatuor, quod pari dosi & intervallo hauritur. Fiat etiam cataplasma umbilico imponendum ex ovis cum croco & oleo semi coctis, nec non injiciantur leniter clysmata emollientia.

20. Colica lactentium; Colique deus enfans qui sciunt.

Illa est quæ ultra sex primas septimanas lactentes discruciat, & a meconio minime pendet; nam intra illud tempus meconium omnino expurgatum est. Cognoscitur ex ejulationibus subito obortis cum tensione abdominis, ejusque sensibilitate a tactu crescente, ex excrementorum virore, ex vomitione superveniente, citra dentitionis signa. Hæc colica lacti crassiori, vel acefcenti, aut pulvis tribuenda est, adeoque vitia lactis, & nutritis sunt exploranda.

Curatur clysmatis emollientibus. ex decocto malvæ, seminum lini, oleo amygdalarum coehleatim hauriendo, fœtu umbilicalis regionis ex intrita ovis, oleo, croco confecta, subcalida, usu solius lactis sine pulvis, aqua pulli, decocto oryzae pro potu; granis tribus vel quatuor theiacæ recentis.

Nam colicam, mentiatur enterocæle imperfecta examinato opus est, num etiam a dentitione illi ejulationes oriantur, est inquirendum.

21. Colica febrilis, Morton Pyretol. pag. 33. Hist. XVII.

22. Colica enterocælica, vide Ileum herniosum.

XXIII. HEPATALGIA; Dolor hypocondrii dextr. Boneti Sepulcret. tom. 2. Douleur de foye.

Morbus est ejus præcipuum symptomata est molestia sensatio, gravativa, tensiva, aut alia quævis in regione hepatis; differt ab hepaticæ dejectione pyrexia acuta.

a Hepatalgia calculea. Colique hépatique. C. P. Vide Mem. de l'Acad. de Chirurgie T. I. p. 177. Haler. in Boerhaave Tom. III. pag. 166. Morton Phthisol. l. III. n. 13. Bonet. Sepulcret. T. II. Sect. 8.

Cognoscitur 1. ex atroci sæpius dolore circa locum ubi canalibus choledochus inferitur duodenos; 2. ex eo quod dolor ille ad costas spurias & epigastrium extendatur, 3. quod tribus sæpius a palatu horis recrudescat; 4. quod autem comitetur aut sequatur.

Pendet a conatibus naturæ ad expellendum in intestina calculum biliarum, unde ductus biliaris incredibiliter dilatat.

Mæiores, vita sedentaria, quæcumque valent bilis concrectioni favere sunt hujus morbi principia.

Curatio exigit longum usum emollientium, diluentium, ecoproticorum, quibus præmissis balnea domestica repetita conveniunt, & deins-

ager in ipso balneo catharticum bibat, ut calculus in ipso balneo foras eliminetur: qua methodo Ill. Raß Lugdunus Medicus Monpel. Doctor plures sanavit. Hoc morbo periit Celebris Pictor le Brun, Duhamel Hist. Acad. Vide historiam apud Bianchi Hist. hep. Transf. Philosoph. n. 148. vomitiones aut fortis expirationis atrocibus doloribus hepatalgias finem imponi monet Haller. Physiol. Tom. III. pag. 462. prospere succedunt clystinata ex urina recenti & insulum sorum salvia: Varnier Journ. de Med. Juill. 1755.

Signa præcipua hujus morbi sunt juxta Tacconium 1. aurigo in decursu morbi, 2. dolor mucronata cartilaginis & sterni, 3. spasmodica tensio dextri lateris, 4. lassitudo spontanea. Vide opus Cajalani Tacconil de raris hepatis morbis Bononia 1740.

2. Hepatalgia scirrhusa; Scirrhus hepatis vulgo; Scirrhe aufse. Haller Comm. in Boerhaave T. 3. p. 165. G. P.

Cognoscitur 1. tumore & duritie in hypochondrio dextro, 2. dolore gravativo, obtuso & tenso constanti, 3. decubitu in latum oppositum difficili, 4. dyspnœa, & tussis sicca, 5. inappetentia cum satietate a modico pasto & pressionis sensu in stomacho ac dyspnœa: 6. color faciei pallidus, cachecticus, auriginosus: 7. urina aurantii coloris, crassa cum sedimento mucoso: 8. successu temporis oedematia pedum, macies partium superiorum, ascites, amphimerina hæctica. Addit Haller se hunc morbum vidisse cum atrocibus doloribus, periodico decursu, vomitione, &c. ac putat esse idem cum colica biliosa Sydenhami anno 1670. Vide Glissonum pag. 265.

Præcellunt sæpius intermittentes febres diuturnæ, hæmorrhagiarum suppressio, topica contusiones, vita deserta, victus ex cibis crassus.

In curatione si temperamentum siccum, biliosum, parcius utendum martialibus, indulgendum iusculis & apozematibus cum herbis & radicibus leviter aperientibus, sero lactis cum assellis, tartaro chalybeato, &c. Si temperamentum sit frigidum, pituitosum, aquæ theriacalis, iuscula martialia, radices aperientes majores, præmissis & interpositis cathartecis conveniunt.

3. Hepatalgia infarctus; Tumor hepatis simplex Sennerti cap. 5. Insuper hepatis Sennerti lib. 3. pag. 6. Infarctus hepatis Junckeri tabul. 39. Riekhuchen Silex; Obstruction du foye. C.

Omnia prioria symptomata, sed remissiora; regio hypochondrii dextri minus firma, nulla oedematia, nec hæctica; de cætero angustia præcordiorum cum dyspnœa, dolor gravans & obtusus; ætus volaticus faciei, cum rubore fugaci & calore in volis manuum; sitis vaga, os siccum & amarum, tussis sicca, saliva viscosa, inappetentia, cardialgia, lassitudo & gravitas artuum, dolor a tactu crescit, alvus sæpe adstricta.

Ille morbus vel est cum hepatis inflammatione seu expansione quod junioribus accidit, ubi tumor hypochondrii visibilis est, vel est cum hepatis

constrictione spasmodica Bianchi Hist. hep. pag. 338. adeoque remittentia ad sclerisina accedente; nulla utrobique tumoris circumscriptio, uterque status minus est periculosus & pervicax quam hepatalgia scirrhusa; phlebotomia initio conducit, iuscula ex cichoraceis, martialibus juvant, necnon apozematia, serum lactis martialibus & millepedibus onustum, quandoque acidula martialia, extus emplastra emollientia, resolutentia: quæ tamen dolorem non augeant, ne suppurationem moveant. Rigor febrilis superveniens tollit dolorem & infarctum: Hippocrates Aphor. 40. sect. VI.

Si hepatis intemperies sit calida, quod cognoscitur ex caliditate ejus, seu ex eo quod morbi calidi, cibi calefacientes præcellerint; ætas sit juvenilis, animus pathematis vividus, potissimum iræ, deditus, quod potissimum a medicamentis calefacientibus lædatur æger, quod addit æternis versatio, dejectione biliosa, vomitus biliosus, urina flava, pyrexia, calor in volis manuum, color citrinus faciei, corporis macies, siccitas, lingue asperitas; in hoc casu adhibenda refrigerantia hepatica, ut cichorium, taraxacum, fragaria, acetosa, fraga, cerasa, cucurbitacea, serum lactis, acidula, emulsiones, cibi refrigerantes, aer frigidulus, abstinencia a pathematis exercitiosis validis conveniunt: Vide Chirac Consult. 26.

Si hepatis intemperies sit frigida, ut aiebant Veteres, seu si solida sint inertia, fluida, mucosa, viscosa, vappida, quod corjæctamus ex ætate proveciori, abusu frigidorum ætus interve usurpatorum, phlebotomiis repetitis, pulsu parvo, raro, frigiditate seu juvamine a calidis & siccis, excretis pituitosis, urina vir colorata, faciei pallore, dispositione ad oedematiam, &c. in hoc casu usurpantur quæ sanguini fluxilitatem conciliant & motum ejus intendunt, attenuando, calefaciendo, roborando, resolvendo. Huc pertinent radices fœniculi, asparagi, apii, pimpinella alba, agrimonia, abnethium, lupulus, chamædrys, fumaria; cortices citri, cinnamomum; martialia, stomachica amara, vinum rubrum, aquæ theriacales, &c.

4. Hepatalgia interens. Vide Bartholinum. L. Ea est quæ ex abscessu inter musculos abdominis hypochondrii dependet; præcellit inflammatio, de qua vide Hepatitis interentem, quæ facile ex vulgari distinguitur ob tumorem & dolorem a cutis tactu exacerbantem. Curatur ut abscessus quicumque arte Chirurgica.

5. Hepatalgia ariginosa. Colica spasmodica Angellimentherum Scheuchzeri Iter Alpinum t. p. 12. an Rachialgia metallica? A.

Dolor coli ac tenuium intestinorum contumax; somnum arcens, delirium quandoque æstrens; vomitione crebra, biliosa, inappetentia, alvus obstructa, flatulencia, ardor præcordiorum infra & supra cartilaginem xiphoideam, urentes & furentes dolores artuum superiorum & deinde inferiorum, paresis brachiorum, respiratio asthmatica, sensus ponderis pectori incum-

cumbentis. Hæc patiebantur Benedictini qui usi fuerant pro lacte, butyro, vino, continendis, vasis æneis, æruginosis. Cadavera ostenderunt hepatis folliculis conerctis sarctum, corpuscula piliformia, subviridia, intestinis inærentia, in pericardio serum viride.

9. *Hepatalgia farcomatosa*; Mangeti Bibliothec. Med. pract. lib. 8. pag. 784. 785. &c. *Excoissance du foye*. L.

Fuldenreichius in viro, cui hypochondrium dextrum dolore gravato & tumore afflicebatur cum inappetentia, vomitione biliosa, polydipsia, invenit post mortem hepatis mollem portentosam, librarum scilicet quatuordecim, præter carnosam excrecentiam caput infantis æquantem, in me fenterio: in altero ægro similia symptomata; sed ex umbilico sæpe materies serosa & alba fluebat: Hepar grande, induratum & riginta ulcuscula habens inventum est. In filia simili morbo affecta hepar insolite molis erat, pallidumque & totam abdominis cavitatem replebat.

7. *Hepatalgia apostematosa*; Bartholin. Centur. Absces an foye, Civadit Journ. de Med. Mars 1757. pag. 216. calculi ex cystide fellea per apostema extracti. D.

Dolor ab affectu hepatis ripatur febre, dolore, tumore, uti hepatalgia Petitiiana, seu a cystide fellea turgida, sed 1. dolor in apostematosa crevit cum pus efformari incipit, sedatur vero cum turgescit cystis. 2. Dolor apostematosa est pulsatilis, non vero dolor a bile collecta. 3. Dolor apostematosa diutius perseverat, vires magis deiciit. 4. In suppuratione hepatis pulsus est minor, phricialis diuturnior & sudore terminatur: in Petitiiana cystidis turgescencia, pulsus fortior, phricialis brevior, sudor nullus. 5. Cystidis felleæ turgescencia extus apparet sub specie tumoris faccati, firmi, æqualis, circumscripti: abscessus vero magis diffusus est. 6. Abscessus in epigastri regione vel hypochondrio dextro ubivis reperitur, non cystidis felleæ tumor. 7. Fluctuatio abscessus in ejus medio tantum, marginibus adhuc resistentibus observatur, locus fluctuationis ampliatur crescente suppuratione.

Curatur incisione qua pus extrahitur, injectione detestiva & balsamica: Vide curationem a D. Choleynau & Soulier Mem. de l'Acad. R. de Sc. feliciter absolutam, necnon consule Mem. de l'Acad. R. de Chirurgia tom. 1. a D. Petit, Amlan, &c. Vide observationem apud Heurnium ad aphorism. 45. sect. 7. & plures, in Mangeti Bibliotheca Med. lib. 8. pag. 783.

Adolescens auriginosus qui plurica sanguinem ex umbilico fuderat, gerebat in hepate abscessum qui putis loco repletus erat materie ovorum tritorum luteorum persimili, ut memini me vidisse Alexia.

Legi de hoc morbo meretur dissertatio Cajani Tacenii de Raris hepatis morbis Bononia 1740.

8. *Hepatalgia Petitiiana*, D. Petit Mem. de l'Acad. R. de Chirurg. tom. 1. C.

Est dolor & tumor in regione vesiculæ felleæ cum horrore, febre, sensu fluctuationis, circumscriptioe a vesicula fellea bile turgida & distensa, qui morbus difficulter distinguitur ab Hepatalgia apostematosa nisi per signa sequentia, cum illius signis collata; scilicet: 1. dolor crescente tumore decrevit; 2. non est pulsatilis sed distensus; 3. vires minus prosteruntur & dolor minus est diuturnus quam cum datur abscessus; 4. Horror citius terminatur, pulsus est major & nullus datur horrores sequitur; 5. tumor est æqualis, firmus initio, circumscriptus; 6. tumor est constanter infra cartilagine costarum dextri lateris e regione, vesiculæ felleæ; 7. ille tumor fluctuationem in toto suo volumine refert, marginibus in apostematosa renituntur.

Curatur incisione, modo tamen peritonæo adhareat vesicula fellea & bilis in cavum abdominis non fluat, unde brevi mors accerferetur; cognoscitur vero ea adhaerentia ex eo quod, 1. tumor loco suo non potest dimoveri; 2. ex molitie & rubedine tegumentorum; 3. frequenti recurfu inflammationis in tegumentis.

9. *Hepatalgia deceptiva*, D. Billebault D. M. Journ. de Med. Sept. 1761. p. 247. C.

Est species quæ apostema hepatis fere imitatur, & quæ pendet ab apostemate calculique renis dextri e sua sede deorsum lapsi.

Mulieris hoc morbo affectæ hepar incidere parati erant VVinslevu, Gaulard & Morand viri expertissimi; tenuit ægra; demum sectio cadaveris veram morbi sedem aperuit. Symptomata hæc fuerant: a levi pressione hypochondrii dextri, a motu citiori, a postura improvisa, suffocabatur mulier pars tensa, renitens acerrime dolebat a tactu, alias dolor obscurus, continuus; stupor & torpor ab eodem hypochondrio ad semur extendebatur, ita ut difficillime moveretur aut antrotrorsum inclinaret, & stare cogeretur nisi somno victa; Tussis secca, sputa interdum parvulenta, aut cruenta cum amphimerina hæctica, paroxysmi pingui pectoris sudore terminatis; interdum vomitio sanguinis nigri ita copiosa, ut syncope subsequeretur, hanc præcedebant nigri færidique sanguinis ante diem rejectio, utinarum fluxus liberissimus & abundans, sine dysuria, sine ardore, sine ærenulis, pure aut mucro: Diarrhoea habitualis, non serosa; nunc purulenta, menstruatui regularis, fames inordinata, picacea, cum anorexia alternans, tabes fumana, mors.

Sectio cadavere hepar & omnia viscera sana, exceptis rene dextro & pulmone; ren ille amplus, absumptus intus, pure & calculis turgidus, ureter obstratus; pulmo sinister absumptus, dexter omnino sardus ærenulis miliaribus, singulas vesiculas repletibus.

XXIV. SPLENALGIA; *Dolor lateris Sennerti lib. 3. cap. 10. part. 4: Dolor de la rate.*

Est morbus cujus præcipuum symptoma est dolor pertinax in regione lienis, sine pyrexia acuta; ægri splenetici vel lieniosi dicuntur.

1. *Splenalgia infarctus; Obstructio lienis Sennerti cap. 3. lib. 3. part. 4: Obstruction de la rate. C.*

In principio solum gravitas in sinistro hypochondrio percipitur, postea dolor aliquis acutus præsertim in cursu & ambulatione concitatorius, dein color nativus faciei in lividum mutatur, corporis gravitas seu lassitudo adest, dyspnœa ab exercitio, interdum tussis sicca, quandoque cordis palpitatio, scabies, hypochondriasis, boulimia &c. superveniunt, & ægritudo pertinacissima est.

Curatio eadem ac obstructionis hepatis. Laudantur in his morbis lamii albi pulvis ad drachmam quovis mane, radicis filicis decoctum, limatura ferri ad grana aliquot diu usurpata, terra foliata tartari ad grana decem bis in die per per mensum & ultra. Pauci sunt quartana recidiva diu afflicti, qui hanc splenalgiam non patiuntur, & vulgo longo kinkine usui morbus hic tribuitur, quod vix credo.

2. *Splenalgia scirrhus; Scirrhus a la rate. C.*

Cognoscitur ex tumore duro lineis figuram & sedem obtinente cum sensu gravitatis; in infarctu vero tumor hypochondrii quidem adest, sed nullatenus figuram lienis refertens, nec durus, nec circumscriptus, cum dolore acutiori qui efformato scirrhus sæpius abit in gravitativum. Hic tumor mire quandoque diffunditur, raro cartilaginea crusta tegitur, quartanam sequitur, & in ascitum non raro ducit. Splenetici colorem plumbeum, maciem etiam patiuntur; accedit dyspnœa, sensus ponderis jugulum deorsum trahentis ad sinistram, pressio stomachi a pastu, demum œdemata pedum, quandoque ulcera tibiarum.

Sanguis maxime retardatur in liene, si enim sectio transversa hujus visceris sit centies major sectione transversa arteriæ splenicæ, toties fere tardius sanguis moveretur in illa arteria. Memini me vidisse & liene cadaveris, cujus aortæ adaptatam tubum aqua plenum, effluxisse per horam tantam humoris nigri copiam, ut ab eo lienem unquam elui posse desperarem. Vidit in hoc morbo *Diamberbeckius* ejici per alvum tres atramentum, & licet vena splenica in venam portam ducat sanguinem, non in intestinale colum, atramentum certum sum retrogredi posse hunc sanguinem & ingurgitare venas mesaraicas, dum ejus circuitus per hepatis arceatur, ut sibi viam cudad in intestinali tuba, aut per vasa brevia intra stomachum. Refluxum sanguinis a venis in Ramos in vivis multæ observationes mihi patefecerunt, & leges circulationis non repugnant, quippe ipsæ eadem sunt ac leges hydrodynamice, quæ similem refluxum sæpius exigunt. Ex hoc regressu fit *hiperirrhœa nigra*, vulgo morbus

niger Hippocratis, seu dysenteria hepatica, quæ lienosos juvat non raro.

De cura & historia hujus morbi consulatur *Mangeri Bibliotheca Med. practica lib. 10.*

3. *Splenalgia suppuratoria* Cornelii Stalpart. obs. rarior. centur. 1. apud Mangeri Bibliothec. Med. pract. C.

Vidit ille Auctor lienem, velut saccum membranaceum, pure ætgidum, quo rupto ægra obiret.

4. *Splenalgia sarcinosa*; Lien ingens Blancardi Anat. pract. *Rate de grosseur enorme.*

Is vidit lienem sex libras ponderantem, humore nigro piceo repletum; duplo majorem refert *Helvighius* apud *Rivierum*. Vide multa exempla apud *Bartholinum*, *Borrichium*, *Blasium*, *Fabricium*, *Schenckium*; &c.

Morbus affines videlicet in ultima classe inter phisconias, quæ tumore abdominis pariter stipantur.

XXV. NEPHRALGIA Zvingeri; *Dolor Nephriticus Sennarti lib. 3. pag. 7. Colique renale.*

Morbus est cujus præcipuum symptoma est dolor fixus in regione renum & uretrum sine pyrexia acuta, unde a Nephritide discrepat.

Colica Nephritica vulgo dicitur; sed colica, a colo intestino dicta, nomen est quod perperam doloribus aliarum partium quam intestinorum trihuitur ob æquivocationem restringendum: unde merito *Zvingerus* in *peculiari dissertatione Nephralgia* genus constituit.

1. *Nephralgia calculosa* Zvingeri dist. 12. Baglivi p. 410. *Calculus renum* Sennerti; *Calcul des reins. A.*

Ea est quæ a majusculo calculo renibus, vel intereribus inapto pendere censetur; quæque cognoscitur, 1. ex dolore & cruciatu acerbissimo in alterutra regione lumbari, raro in utraque, eoque fixo & stabili; 2. qui tamen juxta ductum ureteris in abdomine oblique versus vesicam extenditur; 3. qui in viris testis ejusdem lateris tractionem dolorificam, in feminis cruris stuporem, doloremque comitem habet, si intentus sit; 4. necnon in vigore doloris nauseam & vomitionem frequentem infert; 5. decubitus in laeus dolens mitescit, in oppositum vero exacerbatur; 6. cum urinis variantibus, initio aqueosis, paucis, dein turbidis, copiosis, sæpe ardentibus ac cruentis.

Uterius cognoscitur ex hæreditaria dispositione, ex eo quod a uestione in curru, rheda dolor recurat, cum nephralgia hæmorrhoidalis a quiete & decubitu in lecto potius exasperetur.

In lumbagine dolor maxime perferentur, cum truncus prius flexus erigitur; in colica dolor per abdomen divagantur, & primis clysmatis, aut alvinis defæctionibus sedatur, quod in nephralgia non accidit. Arenularum mictio non pertinet ad hæc speciem, nec mucii copiosi excretio cum urinis hujus signum est, cum potius in calculosis a modo vesica a calculo sit.

fit expers, urinae solcat esse velut lixivium pel-
lucidum.

A Nephritide, calculosa differt nephralgia per
pyrexiam defectum aut gradum tantum. Calculus re-
num saepe nullam sensationem molestantem infert,
nisi commoveatur a victu calidiori, a pathemate
vividio, ab exercitio valido, a vinctura supra pa-
pimentum lapideum.

Dolorem illum sublevant, 1. phlebotomiz; 2.
quies; 3. potus diluens mucilaginosus ex semi-
nibus lini, petalis malvæ, violæ, limonata; 4.
narcotica; 5. olea lenia amygdalarum, lini, &c.
6. balnea; 7. dieta tenuis refrigerans. Cavandum
ab aquis mineralibus affatim haustis, a diureticis
calidis urinam uberius in renes advocantibus; in-
de enim calculus commoveatur, & nephritis exci-
tatur: pisanis nitrata optime conducit.

Nephrotomia impossibilis censetur, adeoque
ad curam radicale tantum facere possunt lithon-
triptica, quorum usitatiores sunt, 1. aqua calcis
ostreorum hausta, iuxta methodum *Roberti VVhitæ*,
cujus satis laudabiles effectus observari; sed hæc
per menses & annos continuanda; 2. Sapo albus
pillularum forma quotidie ad seminiatam, qui
dolorem non raro sedat, & calculum lente dis-
solvit; 3. Leve infusum arbuti uvæ ursi, vulgo
Buxoræ, quod calculos granulatos friabiles in
minora fragmenta, glutine dissoluto, disrumpit;
sed sine cautela dysuriam creat, & licet maxi-
mam lutulentæ urinæ copiam evacuet, ut infu-
sum parietatiz, vix calculi molem minuit, ut
exportus sum.

2. *Nephralgia arenosa* Bonet. Sepulchret. observ.
21. &c. ad 26. vulgo la *Gravelle*. C. P.

Est species senibus tantum familiaris, quæ ra-
re renes, sæpius ureteres & urethram afficit; in
qua sedato dolore, lapilli feminibus lentis, sed
asperis similes, rubri, durissimi minguntur iden-
tibus: nulli vero sunt magni calculi; illi vero
lapilli raro hærent in renibus, uretribusve; vix
ab ullo lithontriptico cognito dissolvuntur, & ad
usque extremum senium vitæ ægri miseram sa-
ciunt. De his vide *Dysuriam*. Laudantur in hoc
morbo granum, grævia Dei, sanguineum, cy-
norhodinis bacæ, spongia bedeguar, herniaria,
thea, solidago, virga aurea, rubia, anserina,
fancula, alchymilla, pyrola, vinacei gigarta:
vide *Hauchert Dissert.*

3. *Nephralgia arthritica* Musgrave de arthriti-
de, cap. o. & cap. 17. pag. 154. Sydenham p.
485. D. P.

Est ea species quæ hæ a materie arthritica,
non renes, sed membranas, periosteumque ver-
tebrarum lumbiarum vellicante, qui dolor men-
titur nephralgiam calculosam; sed distinguitur
ab aliis speciebus ex eo quod podagricos tunc af-
ficiat, cum dolores extremorum silent, & resis-
tuto dolore in articulis, evanescit. Arthritici
præterea sunt obnoxii veræ nephralgiæ calculo-
sæ, & calculus in illis est tephaceus, cretæ si-
milis, friabilis, qui facilius cæteris dissolvi se-
patur. Aquæ de Baniæti hic censetur aptæ: da.

paroxysmo podagræ non raro terminatur hæc
Nephralgia.

4. *Nephralgia rheumatica*; *Lumbago rheumatica*
Sydenham de Rheumatismo, cap. 5. D.

Est immanis dolor idemque fixus circa lombo-
rum regionem, ipsumque aliquando ad os sacrum
se demittens: paroxysmum nephriticum mentitur,
nisi quod æger non vomitur: nam præter do-
lorem atrocissimum, & vix secundum circa ipsos
renes, aliquando & ureteres per omnem eorum
ductum ad vesicam usque, eodem licet miciori
tentatur, qui & ipsi *Sydenham* olim imposuit,
tanquam a materia aliqua fabulosa in iis partibus
hærente penderet, cum revera materix rheuma-
tismi peccanti & inflammatæ ortum suum debeat,
quæ quidem partes illas jam solas urit, intacto
reliquo corpore.

Immanis hic dolor, nisi abigatur eodem modo
quo rheumatismus vulgaris, pariter etiam perdu-
rat, pari sævitia excrucians, adeo ut miser æ-
ger nequeat procumbere; se vel lecto exiliat,
vel super eodem erectus sedet, corpore interim
perpetua agitatione nunc versus anteriora, nunc
posteriora inclinato, redutoque. Hæc *Sy-
denham*.

Evidens est his verbis non lumbaginem, sed
nephralgiam his symptomatis representari: nec
enim morborum genera a sede nobis sæpius igno-
ta determinantur. De cætero repetita phlebotomi-
æ, & dieta tenuis, potusque diluens hic o-
mnino requiruntur, ut in rheumatismo.

5. *Nephralgia hysterica* Sydenham de Colica bi-
liosa cap. 7. p. 132. & dissert. epistol. p. 430. A.

Est ea species quæ hysterica invadit quando-
que, unde vomito immanis cum dolore lombo-
rum per uretris ductum se extendens, & calculi
renum mentiens, uno eodemque tenore diu-
tissime miseras affligens, ita ut quandoque eas ex
medio tollat.

Hic morbus subito invadit, subitoque citius
reccidit more symptomatum hysterico, auge-
tur a repetitis clysmatibus, maxime vero a lithon-
tripticis, & diureticis calidis: tollitur vero nar-
cotici. Vide *Dysuriam hystericam*.

6. *Nephralgia hæmorrhoidalis* Nenter. *Nephri-
tis spuria*, rectius *Nephralgia phlebotica*. A. P.

Est ea species quæ a sanguine copiosius in re-
nes affluente dependet, quod cognoscitur, 1. ex
suppressione fluxus catamentialis, hæmorrhoidalis,
phlebotomiz, aut scanificationis confluxu, 2. quæ
is temporibus accidit quibus maxime illi fluxus
accidit pro more solito, 3. quæ his fluxibus
sponte restitatis sponte cessat; 4. quæ dum si-
gna plethoræ conjuncta habet; 5. nausea & vo-
mitione sæpius caret; 6. dolores sunt magis ex-
terni, & ad lumbaginem accedunt; 7. crescent
a decubitu in lecto, victu calidiori; constipatione
alvi stipantur.

Juvant phlebotomiz, alvum emollientia, fluxus
sanguinis ex utero, ano; nitrosa, diluen-
tia, &c.

7. *Nephralgia putulenta* Bonet Sepulchret. obs-
serv.

Serv. 13, ubi quatuordecim huius speciei historiam preponuntur. C.

Urina deponit materiem albam fluidam, velut lacteam; adest gravitas continua in lumbis altero, cruris stupor, lenta pyrexia, insignis corporis macies, nullus pyrexiae paroxysmus; praesens nephritis, vel nephralgia, haematuria, pituitosa vomitiones. Vide *Mangel's Biblioth. Med. Pract.* tom. 4. pag. 993 & *Ephem. Natur. Cur.* Dec. 1. ann. 1679. obs. 182.

Vide Chiliarthz Tovvnsend celebrem historiam apud *Chrynaum, the English Malady* pag. 305.

8. *Nephralgia a Pancreate* Mangel. Bibliothec. Med. Pract. de Nephritide, pag. 545. Coll. Acad. T. 3. p. 330.

Chirurgus quidam febris lumborum & dorsifloribus excruciatas areolas rubras cum urinis excremens, comitante vomitu gravissimo domum obiit. In cadavere erat pancreas tumidum, cancerosum, quo diaphragma perforatum, & vertebrae duae exese fuerunt. Cancer hic nigricans ambos quoque renes corruptus, nigros & putridos effecit; nec in illis arenulae, aut calculus inventus est. Hæc *Hertodius*.

9. *Nephralgia verminosa* Zodiaci Medico-Gallici, Riverii obs. 4. pag. 103. centur. 4.

Juvenis quidam renem dolore excarnificatus, demum excrevit cum urinis vermes plurimos nigros, magnitudine, & longitudine acus communis, cornutos & friabiles, quorum duos *Pachecus* misit ad *Rivorium*.

10. *Nephralgia mesenterica* Georg. Mercklini. *Ephem. Natur. Curios.* Dec. 1. ann. 1677. observ. 50. C.

Dolor vehemens ad latus dextrum lumborum, & ad femur cum impotentia progrediendi; urina mutata, sæpius turbida & albescens, vomitio quotidiana, nausæ continuæ, somnus nullus; extrema frigida; post mortem renes sine ulla noxa, sed in mesenterio abscessus pure & calculis tribus turgidis, & in pancreate calculus adhuc major nigricans.

11. *Nephralgia menstrosa* Collect. Academic. T. 3, pag. 169, obs. 277; ex *Ephem. Nat. Cur.* Cabrol. obs.

Est Nephralgia atrox cum haematuria, in qua ægra cum urinis excrenebat vermiformia frustra renem, & ren inventus post mortem portentose molis ponderans uncias septemdecim, simulque exulceratus.

12. *Nephralgia a carie* Vandermonde, *Journal de Médec.* Tom. 9; pagin. 516, a D. Hazon. C.

23. *Nephralgia febrilis* Morton. *Pyretol. Hist.* stor. 28, pag. 101.

Est species dissimilis quæ urina rubra, dolore atroci renem, vomitione, algore extremorum, lipothymia, ægros in summum vitæ discrimen inducit, quæque optimis remediis vulgariis ipsique laudano resistit; ea ab intermittente febris laryatæ veneno dependenti non tu-

tius curatur quam ope kinkinz, ut omnes alii morbi febriculi.

14. *Nephralgia miliaris* Hamiltoni de febre miliaris.

Est symptoma præcedens eruptionem miliarem cum crampis, odore.

15. *Nephralgia febrilis* Sachs *Miscell. Curios.* a lienis luxatione, Bonet. Sepulchret. observat. 30. C.

Nephralgia scorbutica Engauli est potius lumbago, nec ullam nephralgiam observavit *Lin* in scorbuto in quo lumbago haud infrequens est.

Sympathicas nephralgias, quæ scilicet pendere putantur a vitis in partibus a rene remotis, quæ solæ post mortem affectæ visæ sunt, missas facio, cum quia rariores, cum quia gratis tribuuntur vitis partium remotarum, ut cordis, pulmonum; forte siquidem pendebant a vitio renem quod post obitum evanescebat, v. g. a phlogosi, spasmo, &c. horum enim in cadavere nulla signa supersunt.

Nephralgias mesentericas, pancreaticas, nemo jure ex hoc genere expunxit, cum nomen genericum morbi non designet necessario partem affectam, sed tantum symptomata quæ ad datam partem referri solent; nihil autem obstat, quominus hæc symptomata pendant a vitio partis alterius proximæ nervos ex eodem plexu mutantis.

16. *Nephralgia gravidarum* Puzos pag. 79.

Si dolor sit in lumbis, ad vesicam protendatur, urinx difficilis fluant; cum dysuria vel mingendi cupiditate frequenti, urinis aquosis & paucis, nephralgia adest.

Huic conducunt phlebotomizæ repetitæ, oleum amygdalarum, clysmata emollientia, potus laxans, leniens. Procedit in gravidis a pressione vesicæ, ureteribusque illata; ab infarctu renem ob urinas crassas, lacteas, ob distractionem nervorum; clysmata, philonii romani drachmas duas vel tres recipientia, dolorem sedant.

17. *Nephralgia haematurica* Tralles de Opio Sect. 2. p. 36.

Cum sanguis ex rene fluit uberiter in uretrem, is non raro coagulatur, & in uretere retentus nephralgiam calculosam mentitur, ac dolores atroces in omnibus viis urinaris excitat, cum ischuria quæ ægrum capitali periculo exponit, nisi, cum emollientibus foris & intus exhibitis, opium in auxilium vocetur; accedit quædam singulis.

XXVI. DYSTOCIA; a *Dys* difficile, & *tokos* partus; *Partus difficilis*; *Accouchement laborieux*.

Est dolorifica, laboriosa ultra modum fœtus exclusio, simulque muci, lymphæ amnii & dein sanguinis effluxus.

Causa est resistencia ex parte fœtus aut viarum majot quam ut conatibus matris intra breve

tempus vinci queat: ergo dyslociæ principia sunt ex parte fœtus major resistentia ob molem maiorem, situm incommodum, mortem, aut summam ejus debilitatem, ex parte matris angustia viarum, earum siccitas, & conatum tum debilitas tum irregularitas.

Partus facili accidit 1. circa finem noni mensis solaris; 2. præcedunt infolitæ lumbagines: 3. tumor abdominis dorsum labitur versus hypogastrium; 4. leucorrhœa mucofa ex glandulis Nabothi per tres, quatuorve dies; 5. orificium uteri incipit hize paululum.

Signa præsentis vel imminents partis sunt 6. dolores lumborum fortiores, periodicis successive brevioribus recurrentes, in quorum dolorum intervallis puerpera ad somnolentiam usque non raro quiescit; 7. pulsus frequentior, fortior solito evadit; 8. facies coloratur, calidior, ob respirationem, dum dolores vigent, cohibitionem; 9. genitalia tument in labiis; 10. sæpe vomitio, minime noxia, accedit; 11. repetitis conatibus supervenit tremor minime frigidus erurum & tibiarum proximis imminente partu; 12. simul cruentum quid ex utero stillat; 13. tunc orificium uteri magis hiat & repletur vesica ovali, quæ quovis termino magis tensa apparet, capite interim magis ac magis intra illam membranam extrorsum accedente; 14. crescentibus & densioribus torminibus crepant illæ membranæ fœtum obvolventes, & aquæ amnio contentæ cum impetu ad libram unam circiter profunduntur; 15. denique simul, vel cito post violentos conatus fœtus capite primo & facie prona, & paulo post vel simul placenta, excluduntur cum residua amnii aqua; 16. tuncque uberior sanguis simul effluit, abdomen deprimitur, puerpera quiescit, & dolorum prægressorum brevi obliviscitur.

Cura. Torminibus partus accedentibus, cum scilicet quovis tormine os uteri dilatur, membranaeque protuberant, puerperæ, nisi alvus libera sit, clystia ex oleo, aqua & catholice infundendum est: si plethorica fuerit, vena secanda: in sedili comodo, in quo resupinari queat, collocanda, genua firmanda; mappa utrinque extensa lumbi sunt sustinendi, de cætero crocotæ, tunice laxandæ, seu abdomen, & pectus ab omni pressione liberentur; ovum sorbile, crustulum cum vino forbendum, sitis syrupo limonium cum aqua temperanda, levis identidem deambulatio suadenda, obstetrix perita os uteri exploret, & si trans membranas caput dignoscit, ne fessinet, sed partum præstoletur, puerperam in veris torminibus adjuvet: si vero trans membranas oblongas caput fœtus non percipiat. Chirurgum aut Medicum in arte obstetricia peritum statim advocet.

Dyslociæ ex parte Matris.

1. *Dyslocia a debilitate* Mauriceau chap. 10. liv. 2. A.

Mater vel habitualiter est infirma, vel actu debiliores edit conatus. Habitualiter infirma est vel a constitutione nativa, vel ob morbos prægressos, vel ob structuram viriosam, ut si sit gibba, clumbis, clauda, maxime si organa respirationis sint debilia, ut in asthma, plethisi, cognoscitur actu debilis ex pulsu parvo, faciei pallore, extremorum frigidity, animi dejectione; tunc autem vino & cardiacis ac consummatis, aromaticis refocillanda est.

Si gibba, clumbis, clauda, asthmatica, auxilio obstetricii viri est adjuvanda; si pusillanimitas est, hilari vultu, promissis, exemplis ad bonum animum adhortanda: si vero idee conatus sufficientes non exerat, quia delirio, vel sopore est delecta, nec proinde stimulus uteri sentit, phlebotomia, clysmatis acerbis aut appositis huic morbo remedium sensus est revocandus; obstetrix vero successiva digitorum in uterum immisione & assidua ejus orificii inductione partum sollicitare debet, usquequo manu immissa fœtum, arreptis pedibus extrahere valeat.

Si menorrhagia, aut si epilepsia, eclampsiave laboret, Chirurgi opera fœtus quantocius educatur. Vide *Menorrhagiam gravidarum*.

2. *Dyslocia a solida* Mauriceau chap. 10. liv. 2. A.

Quantum ad partum necessaria sunt tormina uterina, tantum noxia est colica, quæ nedum respondeat utero, ejusque orificium diducat, ipsum orificium potius arctat, & aliorum dirigitur, ut ad diarthoræ excitandam. Clysmata vero emollientia, laxantia, quæ colicam sæpius compasscunt, tormina partus excitare solent, adeoque duplici titulo indicantur; suadentur etiam in colica linteorum calidorum applicatio, usus olei amygdalarum, & pulsu vigente phlebotomia.

3. *Dyslocia a pathemate* Mauriceau chap. 10. pag. 158. liv. 2. A.

Gravida vehementibus animi pathematibus sunt obnoxia, quibus nihil est perniciosius in parturitione, tum quia vires ad hoc opus utiles exsolvantur, ut a metu, morbre, pudore, pusillanimitate; tum quia divertuntur, ut ab indignatione, ita, similibusque: in his vero sola Medici & obstetricis sacundia præstat, quippe animus prostratus promissis, verbis hilaribus, exemplis consolantibus erigendus est, vel narrationibus, gestis, fabulis appositis ab idea molesta avocandus, spe pulchræ prolis, sexus quem cupit, promptæ liberationis.

4. *Dyslocia ab angustia* Mauriceau chap. liv. 2. A.

Vias angustiant simulque conatibus inutilibus ansam præbent excrementa alvina, quæ proinde clysmata

clasma laxantibus tantum expurganda, antequam foetus intra orificium delabatur; tunc enim clyma nec immitti, nec prodelle potest; urina copiosior in vesica latens debet per cathetrem educi, si clyma, ambulatorio, aliaque auxilia non succurrant. Primiparæ juniores, sicciore debent longe ante partum & instantem partu butyro insulso, pomatis emollientibus, vaginam & os uteri sibi iniungere, maxime vero si longe ante partum, aqua, amnio rupto, elapsæ sint. Si tumores syphilitici vaginam angustent, quantocius & primis etiam graviditatis mensibus, sine præmissis tunc temporis balneis quæ gravidæ non ferunt, litus mercurialis ad hos resolvendos, caute tamen, est usurpandus, ut successit *Burbeyracio*.

Denique si os uteri non sufficienter hiet, utcumque conatus matris vegeti sint & debito tempore duraverint, illius oris margo est non ungue, sed convenienti instrumento secante scindendus, vitando partem superiorem.

Si membrana foetum obvolvens extra vulvam propendat, durior sit, non crepe, atque simul foetus sufficienter extrorsum protrusus, orificiumque uteri ita diductum ut spes sit fore uti foetus exclusioni nihil obliturum sit, sub his conditionibus tantum ungue, vel olio modo illa chorii membrana dirumpenda est.

Seniores & primiparæ difficilior parient ob rigiditatem partium, ossium immobilitatem.

Si angustia sit immedicabilis, ad operationem caesaream deveniendum, aut matri fortissime moriendum est.

5. *Dystocia ab hysterolaxia*. A. Vide Bened. Pellini *Dissert. Argentinae* 1758.

Dystociæ culpa foetus.

6. *Dystocia a mole foetus* Mauriceau *ch.* 29. & 25. *liv.* 2. A.

Moles major est vel in toto, vel in parte, sæpius vero in parte, ut cum hydrocephalo, ascite, aut hydrothorace foetus laborat, nec non cum monstruose adhæret alteri foetui; si explorato utero per manum immissam judicet obstrictans impossibilem fore partum, nisi Chirurgia auxilium intercedat, quoniam a partu pendet vita matris & foetus, nec utraque servari possit, & mors foetus hydropici aliunde expectanda sit, necessum est foetum aliunde minime evasurum matri immolare, ut saltem matris vitæ consulatur; ergo cultro hamato soleriter ope manus sinistra in uterum immissa directo & dextra impulsio incidatur caput hydrocephalicum, abdomen asciticum ad aquarum effusionem, quo facto foetus facile retrahetur. Cum vero molis & figuræ monstruosæ est foetus, eodem cultro ad juncturas incidentur sigillatim artus, & sic per partes extrahantur, cavendo maxime ne cultri apex extrorsum vergens uterum lædat.

Si moles creverit a numero foetuum, difficilior est manum in uterum immittere; interea elegant *Sauvages Nosologia Methodica*. Tom. II.

tur ambo ejusdem foetus pedes, qui collati aut manu ad usque inguina extensa, cognoscuntur, & sic ab illo liberetur mater incipiendo a magis obvio; dein vero caveat ne placentiam educat antequam alter foetus exierit, ne scilicet durante hocce labore sanguis ex placenta soluta radicibus ubertim effluat, quippe sæpe accidit, ut una placenta duobus foetibus sit communis. Frustra autem ad alterius foetus exclusionem naturæ conatus præstare, cum mater novo hocce labore deterreatur, adeoque ni vegeta sit & animosa mater foetus manu Chirurghi extrahendus est modo quo poterit commodissime, & promptissimo.

Si foetus sit recte constitutus, sed respectu viarum uteri crassior, tunc cum enecare nefas iudico, & ad caesaream operationem, quæ foetum, materemque servare potest, confugiendum est.

7. *Dystocia a foetu mortuo* Junckeri *Tabul. Medic.* 112. Chirurgh. 104. Ill. Mauriceau, *liv.* 2. chap. 30. 12. 14. A.

Conjectamus foetum mortuum 1. si gravis vulnata; 2. si gravi menorrhagia laboret; 3. si foetus nondum maturus; 4. si ante quatuor, pluresve dies aquæ amnii elapsæ sint; 5. si mammae flaccidæ; 6. si facies matris plumbea; 7. si oculi introgressi, aspectu languido, si foetui anhelitus, si totus uterus attollatur per intervalla.

Asserimus foetum mortuum 1. si a multis diebus non moveatur; 2. si multi ex utero humores foetidi cadaverosi existant; 3. si dolore magnus & pondus in utero sentiat mater; 4. si foetus, velut mola, a gravitate sola volutetur quoversus mater inclinat; 5. si matri syncopes, vel convulsiones frequentes accidant; 6. si dudum ex utero funiculus umbilicalis aut placenta exierit; 7. si manu in uterum immissa foetus sentiat frigidus, nullus in fontanella, in funiculo, in carpo pulsus; si caput molle, suturis hians, ossibus ejus decussatis. Foetus autem mortuus, si aquæ elapsæ sint, magis puerefcit intra biduum, quam putresceret intra quadriduum, vel extra oecum; vel intra annum integrum.

Cura. Expectandi conatus ad partum; medicamina foetum expellente noxia sunt, aut inutilia, teste *Mauriceau*; embryulcia seu foetus extractio, eaque matura locum habet; & quoniam laboriosa est etiam si foetus optimum situm servet, ad hamulos non deveniendum nisi plura simul signa mortis foetus concurrant; cum certo mortuus est foetus, cavendum, si pedibus trahitur, ne caput ab humeris avulsim in utero relinquit; si caput offerat, sæpius hamulo caput extrahendum est, imo ad instrumentum *strasseri*, dictum, quandoque confugiendum est, artus discissi seorsum eximendi.

8. *Dystocia a foetu senu*; *Accouchement contre nature*, Mauriceau, chap. 13. ad 27. A.

Multiplex est vitiosus infantis situs; 1. si pedibus primum nascatur, uno vel duplici exercit; 2. si situs periculosus, sed minus cæteris, 2. si

2. si *nates* primum prodeant, infantes sub ipso partu non raro moriuntur: 3. si *manus* precedat, situs est periculosissimus. In omnibus illis circumstantiis 1. ambo pedes quærendi sunt, & manu Chirurgi apprehensi foras deducendi: 2. ita invertendus est fœtus, ut ejus facies gravidæ coccygem respiciat, ne nientum ejus ossibus pubis incurrant: 3. cum ad pectus deventum est, obstetricans debet digitis diductum tenere os uteri, & puerpera fortiter connsi, & caput angustiam petranseat, ne confritio circa collum fœtus utero capicis exclusio impossibilis evadat: 4. sed antea manus utraque fœtus deorsum est adducenda.

9. *Dyslocia a secundinis elapsis*. Mauriceau, ch. 16. & 27. lib. 2. A.

Si *funiculus umbilicalis* primum prodeat, eo in ore uteri constricto præpediur circulatio a matre in fœtum, & fœtus intra breve tempus, ut semihoram, ocuis, seriusque moritur.

Si *placenta* primum extra uterum prodeat, non solum fœtus multum periclitatur, sed etiam mater ob hæmorrhagiam uterinam summo in periculo versatur.

In ambobus casibus quantocius Medico-Chirurgus debet sortum utcumque bene collocatum invertere, pedes apprehendere, & anequamfuntem umbilicalem ligare aggrediatur, gravidam liberare, quo facto cessat hæmorrhagia matris, & illico baptizatus fœtus, calide fortis, resocillatur hiliu vini calidi, in quo cinnamomum, aut quid simile, ebullierit.

10. *Dyslocia a mola*, Mauriceau ch. 31. lib. 2. Heister. Chirurg. cap. 156. Juncker. A.

Mola quæ falsum germen dicitur, si bimembris vel trimembris sit, est moles carnosæ lymphaticæ, sæpe hydatidosa, in quam mutata est placenta; cum fœtus, in ipso amnio contentus, non explicatus fuit. Cognoscitur 1. ex signis graviditatis usque ad quartum vel quintum mensem; 2. ex eo quod hoc tempore nullus verus motus aut totalis aut partialis percipiatur in utero, nisi adfit spasmus ipsius uteri; 3. massa gravitans pondere suo delabitur quoversus inclinat abdomen mulieris; 4. multo majora sunt gravida molam quam fœtum gestantis incommoda, ut lassitudines femorum & tibiarum, mimpendi difficultas, gravitas in pelvi; 5. mamma minus turgente, veroque lacte non sentent; 6. Abdomen a mola æqualiter intumescit, a fœtu versus umbilicum magis prominet, mola absque fœto fœtu, & solitaria gignitur, sæpius circa secundum, tertiumve mensem ab utero sponte excluditur prægressis partus doloribus. Sunt quæ utero adherent firmius cæteris; sunt quæ in annos plures utero latent.

Molæ exclusio vel medicamentis excitatur, vel arte chirurgica; primo modo præmissa frequenti unctione vaginæ, imo semicupio & sectione vena pedis, purgabitur ægra, & post paucas horas ab assumpto cathartico clystma acre injicietur, ut tollantur partus excitentur, modo minus menorrhagiæ absit.

His irritis, maxime si mola utero hæreat, simulque ex uteri paululum hiet, obstetrix manum insinuat in uterum, & vel manu, vel hamulo molam extrahet.

XXVII. HYSTERALGIA; *Hysteralgia* Hasselquist iter in Palæstinam; *Dolor uteri* Auctorum; *Mal de mere*, *fortraiture*, *colique uterine*.

Nomen *Hysteralgia* debetur *Monro* in *Synopsis morborum*; oritur ab *hysteros*, uterus, & *algia*, dolor.

1. *Hysteralgia ab hysteropsi*. Class. 1. genus 49. *Descente de matrice*. L.

Est dolor uteri ob ejus prolapsum. Vide *Hysteropsim*, in *Classi 1. gen. 49. Vide Astruc. Tom. III. cap. 10.*

Vide curam apud *Sydenhamum tom. 1. pag. 436.*

3. *Hysteralgia ab hysterocœle*, Hippocrat. de Morbis mulierum, lib. 3. 4. 5. passim; *Ab Hysterolaxia*, Class. 1. gen. 55. D.

Est ea quam inducit uteri & nativæ sedē dimotio, cui morbos plurimos hujus visceris passim tribuit *Hippocrates*; sed hi perverbi uteri situs, ne plurimum graviditatis sunt comites; aut dolore inde exurgentes ad dysociam-attingunt, aut graviditatis symptomata, ut graviditatis rubalis, abdominalis, &c. Vide *Classem ultimam*.

3. *Hysteralgia a menoflasia*. *Colicus dolor in purgatione menstrua* River. cent. 4. observ. 85. *Colique des mois*. D. P.

Est ille dolor in utero, lumbis, femoribus, qui quovis mense a difficili aut retardato cærameniali fluxu dependet, qui dolor virgines potissimum sanguineas adurit, & singulis mensibus per aliquot dies eas divexat, unde etiam convulsiones excitatas vidi. Vulgo vero creditur illos dolores pendere ex distractione vasorum uteri a sanguine viscoso, copioso, aut a vasis angustis, hæcis, rigidis, effluxum illum denegantibus; & reapse raro accidit, ut is affectus mulieres quæ jam peperere, aut pluries cæramenia expertæ sunt, afficiat, nisi ob frigus susceptum balneo, vento, potu, fluxus ille difficilior evaserit.

Auxilia in hoc morbo convenientia sunt phlebotomia in ipso dolore, clysmata oleosa, anodyna, potissimum vero semicupia tepida, insusum croci orientalis, storum calendulæ, cheri, potus teiformis ex foliis chenopodii Mexicani. Vide plura apud Astrucium de Morbis mulier. tom. 1.

4. *Hysteralgia cancerosa*, *Cancer uteri* Astrucii cap. 7. tom. 3. *Cancer de la matrice*. C.

Cancer uteri oculutus hunc dolorem inducit, ulceratus vero Leucorrhæam excitat dolorificam. Vide *Leucorrhæam*.

Cancer uteri oculutus cognoscitur ex dolore circa inguina, abdomen, immum ventrem, ac lumbos, necnon ex tumore duro in regione uteri si contrahatur manibus; qui tumor renitens,

inz-

inæqualis, lancinans doloribus jungitur per intervalla; quem tumorem dolentem præcedit durities scirrhusa, simplex diuturna; hic scirrhus dein expansus est in tubercula inæqualia, dura, quæ etiam tactu explorantur, si uteri colum vel vaginæ afficiantur hoc morbo: tactus autem non fecit ac motus corporis hunc dolorem exaspant.

Sublevatur hic dolor dextra refrigerante ex ossis hordei, oryza cremoribus, lacte bis vel ter in die sumpto, abstinentia a vino, a salis, piperatis, ab usu veneris; sedatur potu ex levi decocto radicum althææ, vel infuso florum malvæ, seminum lini, balneis aquosis, vel semicupis, sero lactis, jusculis ranarum pulli, laudano liquido solidove quovis vespere sumpto. Possunt & injectiones demulcentes in vaginam leniter immitti ex lacte, decocto hordei mundati, infuso florum violarum, malvæ, seminum lini, mucilaginis seminum psyllii, succo solani hortensis, &c. extractum hyocyami albi ac cicutæ non raro profuit.

Vide ulterius *Luchæram cancerosam*.

5. *Hysteralgia ulcerosa, Ulcere de la matrice, Aitrici de Morbis mulier. Tom. 3. cap. 4. C.*

Hæc species sæpe semper stipatur ulcere interno uteri adeoque & effluxa foetidissimo, sanioso, cruento ex vagina, unde morbus pertinet ad menorrhagiam ulcerosam, aut ad leucorrhæam ulcerosam; de cætero cum præcesserit metritis, seu inflammatio uteri, hysteralgia hujus morbi sequela habenda est, & eadem auxilia ferme requirit ac hysteralgia cancerosa; sæpius enim uteri ulcera cancerosa evadunt.

Apostema uteri designant meritis non resoluta, febris exacerbat, tumor & dolor obtusus uteri, sudores, &c.

6. *Hysteralgia scirrhusa; Scirrhe de la matrice, Aitrici tom. 4. §. Puzos du scirrhe de la matrice. C.*

Cognoscitur ex molesta sensatione ponderis in regione uteri, ex ipsius tumore duro, reutente, tactum tolerante; maxime si per vaginam explorari possit, aut si uterus fursum propellitur digito in vaginam immisso, & corpore resupinato, cruribusque flexis, potest tamen confundi scirrhus in totum uterum occupet cum graviditate, nisi signa accuratius inquirentur; aut cum hydrometria, cum scirrhi moles est, notabilis dolor gravativus deorsum trahit, & ægra vix stare potest, ac imminet hysteropsia, tumorumque delabatur quo versus corpus inclinatur, inveteratæ scirrhis. superveniunt leucorrhæa, edematia, febris intermittens, &c. *Vide curam apud Auctores.*

Consequitur mulier de gravativo dolore circa podicem, atque dissentivo circa uterum, inguina & lumbos. Hæc admonitio Medicus palpo explorans hypogastrium, duritiem in ea regione percipit, a pressione levatur dolentem, si forte prematur uterus, cedit & rursus resistitur; si in vaginam digitus immittatur,

cervix uteri crassior, brevior; aspera; in ambitu, durior, & aliquatenus dolens observatur.

Dolores inguinum & lumborum, stante muliere, graviores sunt; accedit metendi difficultas, accessus febres, inappetentia.

Sæpius scirrhus evadit uterus, dum catamenia cessant circa quadragesimam quintum ætatis annum, cum lac suppressum suis puerperis; cum ictus uteris passus est, cum terrore subito fluentia catamenia sistuntur.

Scirrhus incipiens vix ulla sui præbet indicia, tunc hysteralgia accedit, cum mole adacta molestia.

7. *Hysteralgia pruriginosa, Pruritus uteri Roderici a Castro lib. 1. cap. 9. Le Prurit de l'Uterus. L.*

Definitur ab Auctore: ardens scalpendi, coeundique tentigi, cum maximo desiderio & dolore, quod feviorem reddit affectionem; verum hæc libido intensa ad nymphomaniam atinet Hysteralgia vero pruriginosa est dolor potissimum in vagina a materie acri, sæpius herperica, pustulosa, quæ continuo scalpendi necessitatem inducit, cum rubore, ardore & phlogosi partis affectæ; pendet a materie serosa, acri saluginosa, quandoque herpetica, quandoque syphilitica, alias cum pustulis, alias sine pustulis.

Curatur refrigerantibus, ut balneis repetitis, præmissis jusculis ex lactuca, cucurbita, seminibus frigidis, quibus venter pulli infarcitur, additis diureticis sanguinem lixiviantibus, ut sylibrio aquatico, cochlearia, acetosa, necnon mucilaginosi, ut ranis, cochleis, floribus malvæ, radice althææ; hæc præmissa phlebotomia & cathartici conveniunt, noctu vero emulsionis, julapia æstææ aquæ acidulæ Vallesiensis, Alesiensis; inter topica folia plantaginæ, vitæ, rosarum petala, præparata saturant; &c. primas tenent.

8. *Hysteralgia ab osse Edvard Gody Philosoph. transt. vol. 9. pag. 191.*

Mulier quæ dudum laboravit dolore gravativo in regione uteri, necnon tussi, dyspnœa, difficultate mingendi, dolore inter deiciendas fæces, erat asthmatica a scirrho pulmonum; sed præterea in utero inventa est substantia ossæ, cujus iconem vide *tabul. VIII. figur. 113.*

9. *Hysteralgia febrilis Morton Pyretol. pag. 92. Febris intermittens dolores partus simulans histot. 19. 20. &c. A. P.*

Est dolorum, spasmodum, animi deliquiorum concursus, qualis in parturientibus observatur, sed oriundus a veneno febris intermittens, adeoque per periodos singulis vel alternis diebus recurrens; in gravidis absque lumborum uterique dolores, vomitiones, spasmi, vociferationes, sed ex recursum periodico, ex urina lateritia, ex pulsu febrili, linguæ sorditie, abscentia signorum partus instantis, hæc species dignoscitur.

Curatur hæc febris, præmissis phlebotomia, cathartici ac narcoticis pro rerum circumstantia.

10. *Hystericalgia veneralis*. Colique hystrique de l'anus. L. P.

Sunt dolores uterini a passione, ut ajunt, hysterica procedentes, quorum duo sunt potissima principia ex Sydenhamo, scilicet, *menorrhagia* seu fluxus immodicus catameniorum, aut lochiorum, a partu laborioso, necnon qui versus quadragesimum tertium ætatis annum, antequam catamenia recedant, solet accedere, & uteri *precidentia*. Distinguitur hæc species urinae limpide copiosa mictione, extremorum refrigeratione, animi dejectione, lachrymis & cathinnis se excipientibus, aliisque hysteriæ characteribus; potissimum vero hic morbus oritur a pupperas a lochiorum parciore proventu & suppressione, ubi scilicet maturius aeri frigido se exposuerint, de quibus omnino legi meretur *Dissertatio Epistolariæ Sydenhami ad G. Cole sub finem*. In doloribus hystericiis nil est utilius quam laudanum cum duplo castorei, aut cum viginti guttis liquoris mineralis anodynæ, aut cum tinctura succini.

11. *Hystericalgia ex abscessu* La Motte observ. 57. des Tumeurs. C.

Mulier diris doloribus ab osse sacro ad ossa pubis excruciatæ, sedem morbi vaginæ fundum referebat, tactu exploratis omnibus vicinis partibus, invenit Chirurgus infra os sacrum & a coccigis latere locum dolentem fluctuantem pollicis latitudinem, quo pertuso patella puris sæditissimi effluxit, & ægra convalescit.

12. *Hystericalgia imprægnatarum*. L.

In felicibus graviditatibus uteri sensibilibus & quæ ex ejus extensione atque catameniorum retentione oriuntur symptomata, usulurimum tribus vel quatuor primis mensibus terminantur, aut maxime minuuntur, hoc signum est bonæ graviditatis, quoniam distensio uteri cum triplicem acquisivisse diametrum, est ad ejus distensionem cum duplicem obtinuit, ut sunt diametri; interea tamen capacitas acquisita in primo casu est ad capacitatem in secundo, ut ubi diametrorum, seu ut 27. ad 8. capacitas uteri est ad ejus distensionem in hisce duobus casibus. fere ut 5. ad 2. adeoque crescit in duplo, triplove majori ratione quam ejus dolores; sicque successu temporis quam minima fibrarum ejus elongatio sufficit ad magnum volumen utero conciliandum; sensibilibus eo minor etiam evadit: quo majus tempus additur ad distensionem eandem, & quo minor est distensio; affuescit enim his natura & ab assuetis non patitur.

Priora recens imprægnatarum symptomata eo citius post conceptionem accidunt, quo citius recurrit catameniorum periodus, ea vero symptomata quæ ab uteri sensibilitate, a phletora, & a sanguinis spissitudine procedunt, sunt cacœstia, malacia, nausea, vomitus pituitosus, ptyalismus viscosus, pyrosis, acida, lassitudo, hysterica phenomena.

His ultra ter vel quatuor menses persistentibus

aut etiam gravioribus medetur phlebotomia alvi libertas clysmatis concilianda, ciborum delectus.

Hystericalgia gravidarum seu circa ultimos graviditatis menses aliam therapiam exigit.

Distinguitur hystericalgia imprægnatarum a colica ex eo quod t. Hypogastrio insidet potissimus dolor; 2. quod nephralgici dolores accidunt, aut lumbaginosi; 3. quod vomitio se comitem addat; 5. quod clysmata licet reddita nullum levamen afferant, distensio uteri, nervorum vicinorum pressio, inculcanda sunt, ut in hystericalgia catamenialis.

His gravidis succurrunt 1. Phlebotomia; 2. Victus legitimus; 3. Exercitium moderatum 4. Alvi libertas.

Gravidæ versus quartum mensem dolore inguinum direxantur noctu & per intervalia recurrente ac claudicationem inferente, quod ex igitur rotundum distensione fit, & sponte evanescit.

13. *Hystericalgia lactea*, *Infiltrationis lacteæ* Vandermonde Journ. de Medec. Juill. ann. 1759. auctore D. Levret. L.

Puerperæ huic sunt obnoxia a lacte suppressio, suffocato, ab aere frigido suscepto: tunc nutrices hunc morbum incurrunt.

Initio dolor gravitatus in pelvi & in inguinibus, debilitas in femoribus, ligamenta rotunda uteri dolent. In progressu infarctus femoris cuti cencolor, vix dolens, parum promineus; crescit tumor femoris, cum accedit tumor similis in tibia, sed hujus tumore accedente dolor remittitur; dein pedes intumescunt, ast quæ ratione tument minus dolent quam ante tumorem.

Fit status morbi intra octo decemve dies, & cum declinatio accedit, intumescencia crurum prima recedit, dein tibia & successively pedes detumescunt, ut in *oedematia* resolutione.

Differt oedematia lactea ab oedematia lymphatica; 1. Quod lymphatica pellucida sit, lactea vero opaca; 2. Quod lymphatica ab imis partibus ad superiores procedant, e contra lactea a crure ad tibiam, inde ad pedes se extendant. 3. Lactea oedematia originem habet juxta uterum, unde ad infimas partes se diffundit.

Curatio. Incipienti morbo sudorifica & levia cathartica ad resolvendum lac in massa sanguinis retentum & nondum alicubi decubens sunt aptissima remedia; verum factis lactis decubitu seu partium quarundam infarctu, sapo ceteris medicamentis præstat. Cataplasma & plantis emollientibus cum mica panis & sapone oedematia lactea resolvendo convenit, sapo in clysmate solutus etiam prodest, nec non forma semicupii in aqua solutus.

14. *Hystericalgia hœmialis*; *Tranchès naturelles des accouchées*, Puzos traité des dépôts lacteux, pag. 368.

Post partum naturalem accedente tormina aliquot dies perseverantia, periodica, in quorum intervallis perperæ perfecte quiescit; Quilibet tormica.

torminum hystericaliorum accessus definit perstium lochiorum vel cuiusdam grumi sanguinis ex utero; uterus qui in dolore tenditur, cessante dolore remollescit; in intervallis, si paulo longiora sunt, sudationem patitur mulier, viget appetentia & pacate dormit.

Discrepat hæc hystericalia a metritide lactea, 1. Quod tormina hystericalia frequentiora sint: 2. Stipata calore urenti, cephalalgia, febris, doloribus vagis abdominis & lumborum: 3. Lochia magis ichorosa sunt seu fluxiliora, serosa, fluunt magis propter irritationem quam propter uteri constrictionem naturalem: 4. Lochiorum fluxus, nec symptoma minuitur, nec ægrum sublevent. Vide *Metritidem lacteam*.

Pro specifico in hac specie laudat *Baglivus* tincturam succini extractam cum aqua cinnamomi: & exigua dosi syrupi de cinnamomo: *Baglivus* pag. 224.

15. *Hystericalia ab Sparganofo, Dipot laiteux dans l'hypogastre*. Puzos traité des accouchemens p. 55. L.

Congestio lactis in hypogastro cognoscitur, 1. ex eo quod aliquot diebus a partu accidat: 2. quod prædant tormina insolita, vaga, importuna in toto abdomine, sed ad locum fixam terminata: 3. locus ille est in alteratro inguine, scilicet in textu cellulari peritonæi, ligamentis latis vel in ovario: 4. hæc tormina nec uterum indurant, nec lochiorum fluxum exeitant, ut tormina naturalia puerperis communia: 5. anorexia, agrypnia, febris vel synochia, vel intermittens quæ horrores pluries in die repetit: 6. circa decimum aut decimum quartum a partu diem tumor tactu deprehendi potest: 7. si hi tumores negligantur aut male tractentur, abscessus his in locis sanabilissimi superveniunt.

Dicitur hystericalia licet uterus non afficiatur, quia ob torminum cum uterinis similitudinem facile cum hystericalia vera confunditur, nec est genus morbi ad quod initio propius accedat, eum autem ab initio nosse oportet præsum esse.

Curatur repetitis phlebotomiis; dein jusculis ex cichorio, taraxaco, chærophyllo, nasturtio aquatico, & sale Glauberiano, unde urinæ uber provenit; clystera etiam interponantur, dein cathartici tenuiterintus juscula; identidem vero boli ex pulvere viperino, cinnabari, millepedibus, & antimonio diaphoretico præscribantur.

16. *Hystericalia calculeosa*, Puzos traité des accouchemens pag. 139. Mem. de l'Acad. R. de Chir. Tom. II. pag. Louis Journ. de Medec. Juill. 1759.

Calculi uteri sunt sæpius gypsei, leves, asperi, albi; cognoscuntur tactu, specillo, excretionem, ponderis sensu. Accedunt in quibusdam circumstantiis dolores gravativi lumborum, femorum, claudicatio a dolore, maxime si concurrat hysterocoele, pruritus ferinus vulvæ & inguinum juxta seniores, dolores acuti febriles & Marc. Donat. *hæstet. Mirab.* lib. 4. cap. 30. *Schen-Savages Nosologia Methodica*. Tom. II.

16. *observ.* 4. *Hystericalia* cum leucorrhœa putri, purulenta *Act. Erud. Lypsis August.* 1712. calculi triginta duobus in utero; vel tubis; calculi illi diaphoretici sunt ut Bezoarticum. *Leu. corrhœa* cum doloribus lancinantibus ex ulcere a calculo uterino *Latus ibid.* pagin. 134. & leucorrhœa purulenta, marasmus. *Dyslocia* seu dolores similes illis parturientium Pucri *De Generat. lib. 24. cap. 9. Hippocrat. de Epidem. lib. Sect. 2. Sterilitas* semper comitatur hystericaliam calculosam. *Dysuria Blunckard ann. præd. observ. 74. Philos. transact. Hody 1636. Ischuria* a calculo uterino seu ab hysterolitho. *Ephem. Nat. Cur. Dec. 1. ann. 4. observ. 65.*

Mamorrhœis ab hysterolitho. *Duncan. Pathol. lib. 2. utero* petrificato, uteri petrificatio.

Est ea quæ pender a calculo intra vaginam genitio, cum perforata post partum vesica, urina in vaginæ fundo fibris lorice intercluso velum tartarum deponit, inde dolores, tormina vaginæ & incessus difficultas. Operationem in hoc casu necessariam memorat *Puzos*. Carnium vegetationem prævenit turando alius in vaginam adactæ, cum post partum difficilem hominem colli vesicæ supratio.

De hoc morbo etiam videantur *Comment. Academiae Harlemensis part. 3. pag. 603.*

Curatur extractione quam natura vel ars exsequitur, cum hiat orificium uteri aut in vaginam propendet.

ORDO QUINTUS.

DOLORES EXTERNI ET ARTUUM.

HUc refero dolores mammarum, trunci, lumborum, crurum, genitalium, &c. qui ad priores ordines non facile amandari possunt.

XXVIII. MASTODYNIA; Douleur de mammelles.

Notabilis & constans sive periodicus sive continuus mammae alterutrius, vel utriusque dolor; a *mastor* mamma & *odynè* dolor.

1. *Mastodynia phlegmonodes* Rod. a Castro de miliarum inflammatione lib. 1. cap. 16. B.

Dolor est mammarum cum tumore, rubore, dolore pulstili & renitentia, cujus causa est impetus sanguinis per arterias mammaria accedentis solito major, ejusque actio vehementior in vasa sanguifera mammarum; impetus sanguinis est major, quod cognoscitur ex pulsu duro, pleno, veloci aut frequenti simul, unde vasorum mammae distentio, robur, dolor, renitentia. Actio vero major est ob præditum sanguinis transitum per vasa minima, ut cum dolent mammae thoracibus scissis, arthriticis balenis cingulique compressæ, sanguis enim retro urgens fortius agit in latera vasorum quam si more solito in venas facile fluere; hic morbus sæpe pressioibus externis, E 3 icibus

ictibus nec non plethoræ, catameniorum suppressioni supervenit.

Curatur 1. victu tenui ex iusculis, cremoribus, potu, diluente, refrigerante, priscana hordei, orizæ; 2. phlebotomia repetita ex brachio vel e pede, clysmatis emollientibus cathartico antiphlogistico; cum sedata fuit inflammatio: topicis iniurio emollientibus, dein anodynis ac resolventibus; refrigerant lineæ oxycrato frigido madida, vel irrigata decocto foliorum seminum lini; resolvunt levia cataplasmata ex pulpa eorumdem, necnon meliloti, cum farina sebarum, melle, aceto, croco medulla bovis, butyro, oleo olivarum, &c.

2. *Mastodynia puberum* Krameri Commerc. Norimberg. 1755. hebdom. 30. §. 2. B.

Omnes pueri ad ætatem 12 vel 14 annorum pervenientes concurunt de dolore mammarum cum tumore & pruritu; mammae, earumque areolæ inflammantur, & desunt, acque non raro vasa earum lactea excoarctant, & exsudent.

Cura exigit ut exprimat serum albescens ibi lactens; deinceps vero emplastrum apponatur. *Essai d'Edimbourg, tom. 7. pag. 122.*

3. *Mastodynia Piliaris* Roder. a Castro lib. 4. cap. 26. *Lactis concretio, Febris lactea* ejusdem; Græcis *Trembæ*, ac *Trichlasi*, Hispanis, *Pelo*, Gallis *la Peli*; Occitanis *Arcoffol*; *Lait grumelle*. B.

Fabula est *Alpharavii* hunc morbum a pilo a matre deglutito ortum habere. Dolent acerrime papillæ cum rubore, tensione, lactis pauca & dolorifica excretionē, glandularum vietarum mammae turgescunt, necnon exiguarum glandularum areolæ dolore pungenti & nigredine; unde atzactus labiorum alumnii tolerari non possit; hi exigui acini nigri ab Occitani *Cass nigres* vocantur, & puerperas mire discernant; his adde papillarum fissuras cum inflammatione valde dolentes, quibus accedit ephemeræ lactea horrore stipata, cum cephalalgia, sudore cascum acidum redolente, &c.

Hæc omnia caseationi, vel conglutinationi lactis in mammis tribui solent; sed potius videtur inflammatio lactea, seu in lacteis vasibus & glandulis oborta; an ab infarctu, an ab impetu illis humoris & sanguinis affluentis.

Curatur ut *Mastodynia polygala*; sed præterea fissuræ, seu rhagades illinuntur oleo ceræ, ovorum macilagine seminis cydoniorum, inspergitur pulvis gummi Arabici; Adhibetur cura ephemeræ lactea *Class. 2. & mastodynia phlegmonodes*.

4. *Mastodynia cancerosa*; *Cancer mammarum* Roder. a Castro lib. 1. cap. 22. *Cancer aux mamelles*.

Cognoscitur ex dolore lancinante per intervalla ab axillis, aut vicinia ad mammae quoddam punctum desinente, & instar subulæ eam persequentiæ, cum tumore verrucoso, duro protrudendo, initio; dein vero tumor tuberosus, inæqualis, venæ varicosæ, aliæque symptomata accedunt, de quibus vide *Carcinoma in Class. X.*

5. *Mastodynia polygala*; *Sperganofo* Dioscoridis; *Lactis redundantia* Roder. a Castro, lib. 4. cap. 26. *Dûpôt laiteux aux mamelles* Puzos B.

Lactis abundantia in feminis quæ pepererunt interdum tanta est, ut mammae eam sustinere nequeant, ac præ copia distendantur, & incredibiles excrescant cruciatus; tument, tenduntur, vix attræctari pariuntur ab alumnio mamæ sic turgidæ; unde nili fluat sponte lac ex papillis, id magis ac magis congeritur, & supervenit inflammatio, de qua supra cimus.

Curatio est difficilior, si lac suum restinguere velit puerpera; fallor, si papillas alumnio, vel catellis aut suetrici præbere velit aut possit, quod licet difficile sit & dolorificum, vitari vix potest per aliquot dies, usquequo lactis redundantia imminuta fuerit; interea diæta tenui cavendum est, ne uberior lactis materies generetur; potu diluenti, diuretico, ut decocto radicum petroselinii superfluum lac ad vias urinarias est deducendum, lochiorum fluxus est sustinendus, & fovendus cautissime; clysmata sunt repetenda, phlebotomia etiam non negligenda, extus vero lineis lalidis, cataplasmatibus resolventibus lactis caseatio avertenda, fluxilitas & excretio promovenda. Inter hæc præstant mei illucum, cataplasma ex foliis petroselinii, cicutæ, ex quatuor farinis resolventibus; salivæ, fomicinii, apii decoctum, ex quo embrocationes parantur, &c.

6. *Mastodynia butirofa* Tandemmonde Novembr. 1758. pag. 441. D. Funn. Med. Harlemensis.

Quadragesima mulier post terrorem doloribus in utraque mamma vividis diu consistata fuit; unicum levamen erat ab admoto igne, & simul frictione mammae, quæ humorem flavum spissum ex papillis exercebat, quæ operatio multoties in die repetenda erat; sanata est litu ex oleis aromaticis cum spiritu vini, superapposito emplastro basilicone, demum repetito usu æthiopis mineralis cum gummi tragacantha, radice guayaci, in pilulas redacta.

Humor hic flavus spissus butyro similis nomen dedit speciei.

7. *Mastodynia ex terrore* AB. Acad. Harlemensis part. 3. pag. 31.

Mulier ex terrore percollebat; ita ut vehementer in mammis dolores perirent; irritis pluribus remediis, calor carbonum ardentium cum lenta frictione sublevarat dolorem, quæ frictione papillæ quid vicidui stillabant; mammae vix turgidæ & tumidæ erant; dein spirituosus, & emplastro basilico mammae admoto dolor evanuit.

8. *Mastodynia emphysematosa* Roder. a Castro, de fluoso mammarum tumore, lib. 1. cap. 17. L.

Part. cum albedine; elasticitate & tensione dolet sine glandularum tumore; pulsata mamma, si fides sit Auctoribus, sonitum edit. Distinguitur a prima specie per albedinem mammae; a cancerosa mastodynia per uniformem, non tuberosum, tumorem; quodque nulla foris

orum glandula dura sit, sed tota mamma aequaliter renitatur; dolor ille molestia accedente augetur, finita saepius recedit.

Curatur remediis catamenia revocantibus, nec non topicis resolventibus, ut decocto foliorum anethi, melicoto, chamamelis, florum sambuci. Vide curam emphysematis 1. Class. & pneumatosi X. Class.

9. *Mastodynia apostematosa*. Abscessus mammarum. Roder. a Castro, lib. 1. cap. 16. pag. 118. L.

Præcessit inflammatio quæ non resoluta fuit, sed exacerbata sunt pulsatio, dolor, tensio; dein resedit tumor, remollescit, apice albescit, fluctuat, febris remissa, tunc pus in tumore geniturum, quod præmissis cataplasmatis maturantibus, emollientibus foras per incisionem debet emitti; atque disterium vulnus ad cicatricem perducit. Vide *Apostema* in Class. 1.

10. *Mastodynia portentosa*, Aët. Societ. Lond. num. 32. L.

A mole mammarum, quarum altera 40. alia vero 66. libras ponderabat; hæc excrecentia intra noctem fere supervenerat. Femina Tolosata a suppressis catameniiis mammae portentose excreverant; sumptis emmenagogis catamenia e naribus effluerent.

XXIX. RACHIALGIA; Dolor colicus Pictonum Cretæ; Colica Plumbariorum Ramazzini; Colica Saturnina Junkeri, Damnoniensis Huxhami, figura D. Dubois ann. 1751. Dolor colicus Pictonum & Figularum quibusdam; Entripado Hispanis; Colique de Pezeta.

Genus novum ab Illustrissimo Astrucio constitutum est nomine Rachialgiæ, ab *algia* dolor, & *Rachis* spina dorsi, quia dolorum principium nervis medullæ spinalis tribuit.

Licet autem theoria Astruciana nondum satis sit confirmata, non minus retinendum est nomen genti huic ab aliis distinguendo utile, utpote proprium.

Character hujus morbi consistit in atrocibus doloribus abdominis ad lumbos & dorsum serpentinis, pressione non crescentibus, cum umbilici non raro tetractione, alvi constipatione, summa pertinacia, manuum torpore, paralytice, alias artuum contracturis chronica terminantibus.

Convenit cum *hepatalgia* calculosa quod hypogastrium dixerat maxime, & ad thoracem serpat, atque chronice sit & paroxysmans; verum *Hepatalgia* augiemem inducit saepius, & hepatis regionem magis afficit; colicæ spasmodicæ valde affinis est, & a multis pro biliosa & spasmodicæ habetur.

1. *Rachialgia Pictonum*; Malum biliosum ab anno 1572. ad 1606. Colique de *Pontou* vegetale C. Cl. Bonté Journ. de Med. Nov. 1761.

Est ea species quæ a vini, potiusque acido-austri fermentati, acidorumque manaturorum nimio usu pendet.

Morbus Damnoniensis Huxhami Londinens. 1739. *Philosoph. transact.* Tom. 9. pagin. 248. A pomaceo, Gallis *Cidre*, endemiam videre Musgravius & Huxhamius: *Vandermonde*, Journ. de Med. 1758. pag. 133. A pomaceo veteri iterum fermentato, & a vino immaturo; acido apud Pictones frequens fuit olim, observante Clesio. A vino albo non satis fermentato plures Monachos hoc morbo cruciatus Pifo; Senarius, Clesius, Craze, Cardanus, VVepferus memorant. A succo citri, a spiritu vitrioli, a potu acido, Pench dicto, ortam vidit rachialgiam Illustr. Tronchin, qui tertiam Rachialgiæ speciem constituit.

Symptomata sunt angor summus, & dolor atrox epigastrii, pulsus debilis, inæqualis, sudor frigidus, lingua fordida, halitus fetens, vomitio viridescens, atra, pituitosa, acida; dein alvi adstrictio summa, vomitus minor, dolor quasi nephralgicus in umbilico, lumbis, dorso, cum sensu ponderis in perineo, & urina, si fluere, crassa: abdomen spasmodice contractum; dein brachia, manifeste moru carent, femora ac crura dolent, anus & intestina alternatim cruciantur, paralytis, pustulæ rubræ morbum terminant. Differt rachialgia vegetalis, quæ a pomaceo in fermentationem acidam vergente, vetusto, ab aliis speciebus, quod abdomen a pressione vehementer doleat, quod in metallica non acidit, quod gradatim augeat morbus, agri scilicet languent, pallent, facies ex flavo plumbea evadit, stomachus gravis est, dein nausea, ructus accedunt, dolent interaneæ; genus, crura debilitantur; pulsus debilis, inæqualis evadit; interea vomitiones viridescentes, acida, amara, lingua sicca, albescent, singultus; jam gastrodynia intenditur, inde in umbilico serpit dolor atrox, umbilico minime retracto, abdomen levem etiam pressionem refugit, constipatio pertinax, dolores artubus insident, tibiae, genua cum stupore, brachia laceant; lumbago atrox, mitescentibus ventris doloribus, in statu morbi nulla pyrexia, nec sitis, nec delirium, nisi in secunda morbi periodo.

Curatio eadem ac speciei sequentis. Sedato dolore profant acidula Selteranæ, Claubernianæ martialæ, & equalitatio. Si aurigo superveniat, quod salubre est, signum est Rachialgiæ nuptam esse Hepatalgiam, ob bilis coagulum ab acido. Colicæ Pictonum medetur, si credamus Sydenhamio, usus copiosus balsami Peruviani, qui prescribitur ad guttas xx vel xxx sacchari frustulo insillatus, bis terve in die; sed paræsis huic remedio non cedit.

2. *Rachialgia febrilis*; Colica ab intermittent febre, Burlet de Hispanorum morbis 1714. Colica Pictonum a causa remora prima, Tronchin pagin. 45, Riverii Prax. Medic. Lib. X. cap. 1; Dolor de *tripas* & *entripado* Hispanis. Vide Journ. de Medic. Novembr. 1761. pagina 415.

Hæc est species quæ febres intermittentes, remittentesve comitatur, vel pressio pede sequitur, si male curata sint; observata *Fernelio Patholog. lib. 6. cap. 10. Ballonio censuit. 5. Spigelio de Semulteriana. lib. 4. cap. 13. Carol. Pijoni censit. 3. 4. cap. 2. Epidemica vifa ab Illust. Tronchino Amstelodami ann. 1727. Hanc Veteres bili æruginosæ tribuerunt; Neoterici veneno febricifico, potissimum tertianæ & hamitricæ; aurigine sæpius stipatur.*

Sensus est ventriculi, tenuiumque intestinorum asperimus, cum alvi adstrictione; multa inflatio accedit per totum abdomen, potissimum epigastrii, modo cum ructu, modo cum vomitione; dolor hic diuturnus, admodum recidivans, remediis non facile mitescens, in contracturas & paralyces abire solitus. Post epidemicam Rachialgiam Amstelodamensem peste severiorem, sæpius visi sunt miseri superflites veluti larvæ arte quali progredientes, exsangues, pallidi, manibus incurvis, pendiculis, cum voce clangosa, debili, nec decedant aphonæ.

Ad curationem missio sanguinis, fortiaque tum emetica, tum cataplasma vitanda; alvus mollienda est fomentis exotis & balneis, intus blandis alimentis & medicamentis, ut oleis, mucilaginosus, saccharosis; adde laxantia ex manna, pulpa casia cum oleo amygdalarum, ferro lactis tepido, amptritriho parca dosi repetitis. *Citresus* cathartica cholagoga expertus ad lenissimam reversionem est; Narcoticis abstinendum. Morbi reliquæ ferro lactis gramineo, cichoraceis, beccabunga, taraxaco sugandæ; denum tonus partibus aquis est restituendus.

3. *Rachialgia metallica; Colica Plumbariorum* Ramazzini de Morb. Artif. & *Doler rachialgicus; spasmodicus a veneno Frider. Hoffmanni* Tom. II. pag. 257. *Colica Plistonum*, vulgo *Sæturnina Junkeri; Colica Plistonum a veneno Illust. Tronchin Spec. 2. Mil-nech Anglis*, id est, *Vapor melastina Aët. Soc. Reg. Lond. Colique des Peintres, de plomb, des Potiers, des Barbouilleurs. C.*

Est ea species, quæ oritur, 1. a vino acido interventus lethargyrii dulcorato; frigus detegitur ope lixivii alkalinæ, in quo dissolutio auripigmenti bulliit; 2. ab usu interno medicaminum ex plumbo paratorum, ut sacchari saturnini ad extinguendum venerem, ad gonorrhæam sanandam; 3. ab usu alimentorum in vasis stanno-obductis, cupreis, rubiginosis diu servatorum; 4. a fumis arsenicalibus quibus nulla metalla carent, cum igne tractantur; unde Metallurgi, & qui calceorum corium cerusa susa dealbant futores, huic sunt obnoxii; 5. qui varia pigmenta liquefaciunt, pulverant, ore assument, ut Pictores; 6. Figuli qui vasa terrea vitro ex plumbo obducunt; 7. ab antiveniæ crudi repetito usu interno, si fides sit *Illust. Tronchino, pag. 65.* imo ex cinnabari; viridi æris, colore ultramarino, aliisque pigmentis metallicis.

Hujus speciei exempla ubique sunt obvia, *Mompeli, Nemausi, Alisie nobis observata.*

Differt a vegetabili seu Plistonum, quia, non predecens, sed subito dolores accedunt, quod umbilicus retrahatur initio, quod in atroci ventris dolore pressio abdominis dolorem non intendat, quod in statu accedant pyrexia, litis, delirium.

In hac soli artus superiores, inferiores nunquam paralyti & stupore tentantur, sæpius umbilicus retrahitur, fæces in scybalis indurantur, ægri pallidi, tremuli, debiles sunt.

Duplex autem est curandi methodus; 1. ab *Ill. D. Dubois* in Nosocomio Charitatis Parisiensis frequentissime adhibita, & dudum multis successibus firmata, docente *Ill. Bonvare*, qui ex sexaginta ægris, quinquaginta novem sanati allerit; est methodus Drastrictorum.

Æger adveniens sumit clystma ex decocto drachmarum duarum fennæ & pulpæ colocynthidis, cui adduntur diaphenici drachmæ sex, benedictæ laxativæ semuncia, mellis mercurialis uncia duæ, & sæpe vini emetici uncia etiam duæ. Post septem horas injicitur alterum clystma ex olei nucum & vini rubri ana uncis sex; die sequenti tartari stibiaci magna dosis, vulgo ad grana quatuor, præscribitur; statim ab actione emetici datur theriaque recentis semidrachma cum laudanico nitano; die vero tertia repetitur clystetis; dein purgatur æger ex diaphenici semuncia, diatrini drachmis duabus, syrupi dethame uncia, apozematis sequenti uncis sex. Apozema fit ex culcitæ, polypodii & fennæ ana uncia una, seminum anisi, & cremoris tartari ana drachmis duabus, bulliant in aquæ libris duabus: ad uncias viginti; vespere hujus cathartici repetatur narcoticum; sustineantur hæc medicamina ope peisane sudorificæ, ac potus cardiaci cum lilio Paracelsi: maxime si dolores supersint, aut immincant, vel supervenit paralyticus. Hæc methodus intra septimanam omnino sanat, & si epilepsia, paralytice nondum accesserint, eos morbos prævertit, si sanatio imperfecta sit, iteratæ partim vel omnino methodus, ipsique atrocibus abdominis doloribus sævientibus hæc drastica usurpantur. Intra 23 annos *D. Boretti* 1200 ægros hæc methodo curavit & omnes exceptis 20 liberavit.

2. Altera methodus lenitiva est, qua in ipso Nosocomio Charitatis ab *Ill. Borden*, Viennæ ab *Ill. de Haen*, & *Montpeli*, occasione tamen raro data, ab omnibus Medicis usurpatur. In hæc præscribimus, oleum amygdalarum ad uncias plures in die, clystma oleosa, fomenta emollientia, narcotica, levia laxantia, serum lactis & sopito dolore aquas sulphureas tum thermales, tum acidulas; ad a phlebotomia saltem repetita est abstinenda, quam exhorrent qui methodum drastrictam sectantur. In secunda periodo morbi hæc methodus a *Gl. Bonte* sola laudatur, in prima vero drastica.

Mira certe opinio de morbi causa, & methodorum circa therapeiam repugnantia; in aliis morbis saltem acutis quæcumque sit methodus, natura non raro morbis medetur, aut in hoc morbo.

morbo solius naturæ vires non sufficunt, & methedi licet omnino oppositæ morbum tollunt: in hoc certe ovarer magnus Medicinæ adversarius *Micbael de Montagne*, qui in omni morbo methedum Medicis acceptissimæ oppositam æque successuram esse contendebat.

Hujus varietas est.

a *Rachialgia Saturnina*: *Colica Saturnina* *Hsemanni*, 1752. *Zeller*, *Docimasia vini lichargyrio manganisati* *Tubingæ* 1707. *Colique de plomb*. to.

Quotquot hoc vinum biberant constrictionem gulæ & dolorem ventriculi ac præcordiorum patiebatur; quibus accessit colica circa ventriculum & umbilicum, hinc & excrementa in scybala coegebantur: conquerebantur multoties defæctibus molestis, qui tamen nec sursum nec deorsum efflabantur, accessit vehemens mingendi conatus, inanis, & tenesmus; urina pene tincta erat, ac continuo turbatur; pulsus erat durus & tardus, æqualis tamen, flavescbat album oculorum, genæ solæ rubebant, facies cætera virorem Judaicum præ se ferebat; siccescebat os, ac vomituebant; anxii insigniter toto temporis decursu erant, quam anxietatem adauxit horrida & insignis cordis palpitatio.

Potissima cura mali recentis & primotum symptomatum consistit in vomitoriis, purgantibus, oleosis, sæpe diu continuando, terreis ex bolo armena, terra sigillata, oculis cancerum, balsamo peruviano & vulnerariis. Lixivium calcis vivæ cum auripigmento sumatur, ejus guttæ sex in vini manganisati uncia affundantur, vinum turbabitur, & atramentocolum colorem adipiscetur. Vel olei vitrioli guttas decem affunde vini nectis tribus, vinum lichargyrio manganisatum instar seri lactis absceat. Vide *VVillium*, *pharmac.* pag. 473.

4. *Rachialgia arthritica*. *Astruc*, *rhéf. de Rachialgia* pag. 9. *Tronchini Colica Pissinum specis* 4^a, *Zellst* de podagra 1738. C.

Est est quæ cum arthriticis paroxysmis alternat, in quam scilicet arthritidis sæpe terminatur, quæ treviviscere tollitur rachialgia. *Hippocrates lib. 6. epidem.* hanc alternationem dolorum articuli & intestinalium observavit, deinceps memoratur *Andreas du Laurent*, *quest. anat. lib. 4. quest. 8. Roder.* a *Fonseca*. *Mercurialis*. *Masgravius*, &c. De Rheumatismo vero idem dicendum ac de podagra.

Si æger plethoricus vegetusque sit, phlebotomia præmittatur; cavæ ab acerbis cachacticis; maxime ab emeticis; furis apponantur vesicantia, & plantis pedum cucurbitulæ siccæ, dein emplastrum de galbano, fomentaque tepida furis & semptibus ur materies arthritica deorsum vergat; molli culcitria, sicca, tepida, ex floribus chamæmeli & sambuci sacra foveatur abdomen: post lene clystma hydrogala, vel lac purum sæptus sumatur, exinde salus spectetur; sedatis doloribus vino generoso vires resocillantur; equitationes, vestibus hiemalibus corpus firmetur: hæc *Tronchin*.

a In Cœnobio Savigny incipiebat morbus a cardialgia gravativa post cibum crescente, digestionē tarda, molesta; succedebat alvi constipatio, fæces duræ, siccæ, nigrae, tum pyrosi & tristimus cynicus, seu ridendi cupiditas a titillatione cordis accedebat, mox sensario stomachi sursum violenter distracti; inde dolor atrox epigastrii quasi a stomacho intorto; intestina videbantur sursum reversa, abdomen durum, tensum, planum, quasi verberis adherens; omnes musculi dolebant quasi divellerentur; postea atrociores atroxum dolores accedunt: quasi cubiti, genua, crura lacerarentur. His succedit impotentia artuum movendi cum sensu tactus imminuto, dolore ad stomachum redeunte; pectus etiam dolet, sternum contractum videtur, vix plumæ atatus toleratur, ultio est lenior hoc dolore: urinae paucæ, alvus constipata, pulsus sanus est nisi typus superveniat.

An hæc species tribuenda est tartaro pomacei quo utuntur Normanni eoque non satis a doliis deraso? An quod fructus immaturi fervantur in cellis subterraneis nitro murario fœtis.

Curatur feliciter hæc species clysmatis emollientibus, julpapiis antispasmodicis simul & anodynis, demum balneis; sed artus debiles, dolores arthritici periodici, stomachi debilitas raro tolluntur. Hæc *III. Marceau Journ. de Med.* 1763. *Jaill.* 1764. *Janv.* p. 45. *Vide Nov.* 1761 p. 415.

b *Rachialgia arthritica*, *Cl. Strack*. C.

Ab arthritide vaga seu rheumatismo arthritico pendet hic dolor atrox abdomen aliasque trunci partes infestans, qui Rachialgie saturninæ omnino similis est, eo discrimine quod rarius paralem & epileptiam inducat; paralem dico, seu motus abolitionem in artubus sensu eoque dolorifico, superfluit.

Hæc arthritidis vaga cognoscitur ex doloribus & tumoribus quos in diversis corporis partibus excitat, hæc & illuc discurrens: miasma vero arthriticum omnes sere corporis partes, intenas externasque, oblidet, unde superveniunt earus, peripneumonia, pleuritis, asthma; sed si viscera abdominis afficiat, inde succedit Rachialgia arthritica, ejus hæc sunt signa.

Dolor atrox citra febrem & inflammationem, pulsus parvus, lentus, vel exiguus & frequens, color faciei flavus aut olivaceus, oculi depressi; præcesserunt dolores obscuri artuum, vel lassitudines a levi labore; somnus non sublevans, sudor cum sensu unctionis aut vellicationis quasi electricæ, vel præcesserunt pustulæ exiguae, numerosæ, pruriginosæ, in squamas faescente, stranguria sine causa manifesta, urinae limpidae, quandoque albescentes seri lactis instar, cum striis sebaceis; hæc sunt signa certissima Rachialgie arthritice.

Curatio consistit in usu balnearum domesticorum, vel thermalium sulphureorum, usu interno antimoniæ erudi in alcohol redacti ad grama ij vel iij, & decocti ex lignis sudorificis; verum balnea non juvant nisi plurima ut quin-

quingenta vel centum, quæ quotannis sunt repetenda.

5. *Rachialgia ab adipsneusica. Collen Pittonum ab impedita respiratiōe* Ill. Dronchin spec. 5. *Colica Surinamensis* Herbert. apud Tronchin, *Forcellæ observat.* lib. 21. observ. 15. *Colique de Surinam.* C.

Ea est quæ a perspiratione impedita, frigoreve suscepto productur, & in epilepticos infusus, vel in paralyticum degenerat. Familiaris est Surinam, ubi licet summas calor interdiu incolas resolvat, noctu venti frigidi incautos & frigoris avidos carpunt. Lenissimis oleosis ecceproctis insilistendum, moll'a enemata ex infuso florum chamæmeli paranda, opium cum pari camphoræ doli, si urgent dolores, adhibendum, cum largo pœtu ex infuso ligni sassafras; curam absolunt thermæ sulphureæ.

6. *Rachialgia scorbutica* Ill. Tronchin. spec. 6a & Eugalen. de Scorbuto, artic. 17. 24. C.

Sed *Eugalen* fides merito multis suspecta est, adeoque solis observationibus Ill. Tronchini innititur: Hæc species a *Lind.* minime recensita. *Frig. Hoffmannus* colicam scorbuticam memorat; sed rachialgiam in genere hoc nomine tantum describit, non vero speciem distinctam; Veteres huic morbo nomen colicæ biliosæ imponebant.

In hac specie præter dolores abdominis atroces, dolent brachia, cæterique artus per intervalla, ac demum ipsi artus resolvuntur, aut spasmi tenentur, si fides *Eugaleno*; sed verius esse puto quod vidit *Illust. Tronchin*, scilicet extremos artus potissimum pedes & tibias ingrescere, indurescere, instar piscis sole indurati, ut ipse vidi; sudor sponte prorumpens falsus æbit etiam in crystall'os digitis friabiles, ut vidit citatus *Auctor* in quodam qui sale marino abus' fuerat.

Fugienda phlebotomia, alvus blandis oleosis laxanda, antiscorbutica adhibenda, aquæ chalybeate juvant.

7. *Rachialgia traumatica.* Vid. Dissert. *Illust. Astrucii*, & adjunctum historiam; item, *Journal de Medec.* Juin 1760. ubi duæ hujus speciei præstant observationes. D.

Ea est scilicet rachialgia, quæ ex ictu spinæ dorsali insito ortum ducit. Constat autem multiplici observatione homines ex hoc principio rachialgicos evasisse, seu ventre, epigastro deinde, admodum doluisse, ac artuum resolutionem passos fuisse cum alvi constipatione, scybalorum induratione, aliisque rachialgiæ symptomatis apte ab *Illust. Astrucio* explicatis. Contendit scilicet Ill. *Auctor* labem esse in medulla spinali compressa, obstructa, unde paralyticorum fœcedit; dolent quidem interanea, quia origo nervorum in medulla afficitur, & sensatio ad extremos nervos refertur, ut accidit apud eos qui cum artus amputationem dudum passi sunt, in reā ob pulsationem arteriæ vicinæ refectæ, & nervum impetentis, dolores manus aut pedis du-

dum ablati persistent; non mirum aut, etiam si cum acerrime dolent interanea, abdomen manibus premi potest, ac contrectari sine ulla doloris exacerbatione, si intestina atona. & motu peristaltico orbata alvi excretionem remorentur. Hinc & rachialgiæ nomen a Græco, *rachis*, spinæ dors', & *algia*, dolor. Vide *Quæstionem medicam* Ill. *Astrucii*, an morbo colica Pittonum, rectius *Rachialgia dicta*, *Veneficidæ* ann. 1750.

D. *Privas D. Med. Alsiensis morissimus*, curabat puellam, quæ cum horrenda gæstrodynia laborasset, per trithorium subito incidit in paræplegiam, quæ omnes partes collo subjectæ sensu, motuque orbantur; inspecto collo observavit ultimam colli vertebrae prominentem, ita ut infra illam notabilis foret fovea, unde hujus sebluxationem, adesse cognovit; puella ultra duos menses supervixit. Gæstrodyniam magnæ vomendi conatus comitabatur, & hanc luxationem ab hisce validis constibus ortam fuisse, non inanis fuit suspicio; oborta paræplegia statim cessavit dolor, ut id rachialgia solemne est.

8. *Rachialgia osteosarcosis.* Benjamin Gooch, *Cases of Surgery*, pag. 178. ann. 1758. Sylv. *Bevan Transl.* Phil. n. 474. morbus a diabete incipiens, corpore septemdecim pollicibus decurtato. C.

Est morbus cujus præcipua symptomata sunt dolores totius corporis, præpue vertebrarum lumbarium, cum successiva ossium omnium dissolutione, flexilitate, & corporis decurtatione.

Fœmina, sana hætenus, ritque menstruata, trigesimo ætatis anno dolores univerſi corporis cum pyrexia experiebatur; dolebant potissimum extrema corporis, post mox menses crura fracta, flexilia, cum signis scorbuti; per quadriennium subsequens dissolvebantur cætera ossa cum dyspnœa, gibbositate, dolore ad vertebrae, corporisque decurtatione.

In cadavere viscera sana, pulmonibus tantum & corde flaccidis, ossibus omnibus, præter dentes, remolitis; dissolutio in ossibus cylindricis ab interna parte incoeperat, ossa caltro non magis resistebant quam muscoli. Varia medicamina imprimis chalybeata sine fructu adhibita; corpus vixit sex pollicibus decurtatum est. Vide historiam dum de Asthenia ab osteo sarcoſi.

XXX. LUMBAGO. Mal de reins.

Est genus morbi dolorifici cujus præcipuum symptoma est molestia ad lumbos relata, cum trunci erigendi difficultate.

Ægri dicuntur *lumbaginosi*, *lumbes*, Gallice *deinés en tréens*; morbus Græcis *ladosis*, *ephalgia*, &c. *Asphialgia* Riolani, *Isthiar* Archigenis.

Dissert a nephralgia ex eo quod nausea, ureterum dolor, testium, femoris flapsor, urinaeque viria deficiant; a colica quod dolor ad portem posticam corporis referatur, nec ab alviæ eacæ.

exeritione tollatur, aut micrigetur; non raro cum ichiade conjungitur, truncumque sæpe incurvat, unde aliis *curvatura lumborum* vocatur.

1. *Lumbago rheumatica* Sydenhami pag. 470. Juncker. Tabul. 19. *Muscle Helvetorum*. L.

Est vehemens lumborum dolor, in quo æger semel flexum truncum erigere non potest, quin lumbos sibi rumpi videatur; qui dolor nec tactu exacerbat ut traumaticos, nec calore lecti rederescit ut syphiliticos, scorbuticusque, quique crustam albi gelatinosam in sanguine extracto comitem habet: adde quod artus neplurimum simili dolore vago affecti sunt.

Curatur repetitis phlebotomis; dicta tenui initio, dein victu emolliente, refrigerante, leviter diaphoretico. Hic morbus musculos extensores dorsi afficit.

2. *Lumbago arthritica*; *Ospialgia* Hippocratis; *Goutte aux lombes*, *Goutte aux reins* de Meyssey n. 338.

Est ea species quæ arthriticis infestat, quæque procedit ex materia tartarea vertebrarum ligamenta, & periosteum lacerante; ea pressione exacerbat.

Spinam dorsi, & sæpius os sacrum afficit; exigit eadem auxilia quæ arthritidis.

3. *Lumbago plethorica* Frid. Hoffman. Tom. II. pag. 297. *Lumbago hamorrhoidalis* Junckeri; *Caramentalis* Hippocratis: *A fluore albo* Frid; Hoffmanni: *A tubo intra musculos effuso*, Baglivi de fibr. motr. p. 393 304.

Est illa species quæ a suppressa sanguinis solita evacuatione dependere putatur, ut a carentiis recentis, hamorrhoidibus suppressis, a fluore albo represso. Sunt qui contendunt a veneris abstinencia similem morbum induci.

4. *Lumbago febrilis* Moroni Director; *Varicelosa* Mortoni. pag. 48. 190. & 74. Pyretol. Mercarial. pag. 186.

Est neplurimum symptoma morborum febrilium & phlegmasiarum ineuntem, sed fugax, quod tamen morbos quosdam pressus sequitur, & distinctius designat. Sic variolam in adultis initio comitatur lumbago gravis cum nausæ; in infantibus cum somnolentia.

5. *Lumbago scorbutica* Eugeleii, apud Sennerum de Scorbuto; Leind. de Scorbuto.

Est dolor lumborum a quocumque exercitio recrudescens, noctu etiam sæpiens, in secunda & tertia potissimum scorbuti periodo accedens, minus mobilis quam cæterarum partium, cum urinis paucis turbidis, scætidisque, sæpe oedemate tibiarum, lassitudine, facie decolore, &c.

Noctent phlebotomizæ, juvant antiscorbutica, iac, &c. prodest unciam oxymelitis scillitici intra diem assumere, & partem dolentem fovere lixivio cinerum vulgarium incocctis floribus chamæmeli, sambuci, abfinthii, rutæ & cortice limonium.

6. *Lumbago pflandica*, Obs. Lamothe, Chirurg. Normanno Valognienfi. A.

Aliquoties is Auctor observavit lumbaginem illam singularem quæ pendet ab inflammatione &

suppuratione musculi *psoas* dicti. *Psoas* major oritur ex lumborum vertebis, & femori inferitur. *Psoas* minor oritur ex latere supremæ vertebree lumborum & ossi pubis inferitur. *Psoas* major flexor cruris sæpius in hoc morbo afficitur, & inde fit ut ægri nunquam possint in hoc morbo semur extendere, quod est signum hujus speciei pathognomonicum. Lamothe, præter remedia generalia, suadet, ut vulnere abdomini inflicto, culter usque ad hunc musciculum, prægressa inflammatione abscessu tenerum, deducantur; nec ulla alia via turior videtur ad pus educendum, quo ægri vita ferius ocus collectur, si in abdomine pus illud lateat.

7. *Lumbago partus*. *Douleur d'accouchement*. A.

Licet ille dolor lumbos graviter afficiat in gravidis, non minus verum est quod ad hysteralgiam atineat, quippe pendet a distractione ligamentorum latorum, quæ pelvi utrinque annexa peritonæum lumbis applicatur, valde distrahant, cum utero contrahitur ad sætem foras expellendum; illi vero dolores per intervalla successive frequentiores recurrunt, intervallis lucidis etiam somnum quandoque permittentibus, simulque in quolibet dolore & conamine comitante orificium uteri dilatatur. Hic vero dolor id habet singulare, quod parturientis eo tantum sublevetur, si magna vi ejus lumbi comprimantur fascia circumducta lumbis & antrorsum tracta simulque pugnis versus lumbos fortiter appressis; demum superveniente genuum tremore, crepat corium, aqua ubertim ex utero erumpit, fœtus prodit in lucem, & dolores illico tolluntur, nullo alio auxilio cessuri nec impugnandi.

8. *Lumbago a saburra* Baglivi de fibr. motr. L. I. cap. X. pag. 345. *melenterica*, id. p. 94. 95. De Meyfery n. 401.

Est ea quæ a cacochylia in mesenterio, ut ait ille, collecta, eaque cruda oritur; hujus & aliarum specierum innumerarum possibilitas, quæ vulgo Medicis sufficit, non mihi satis esse videtur, requiruntur observationes fidæ, quibus eorum existentia comprobetur.

Cognoscitur ex longa alvi suppressione, sapore lingue mutato, levi inappetentia, gravitate totius corporis, lumborum calore ac dolore; hanc tribuit Baglivi replecioni miferentia a congesta puri cacochylia & erudis humoribus in ejus glandulis. Mesenterium sic affectum mentitur lumbaginem; Romani hanc speciem impugnant refrigerantibus, emulsi vis, unde morbus angetur. Baglivi a clysmatis & fomentis curam orditur, & cathartics dein absolvit.

9. *Lumbago miliaris* Allione de Miliari.

Hic dolor est sæpe symptoma miliaris eruptionem antecedens, quod combinatum cum crampo, odore acido, pyrexiaque potest morbum eruptum patrefacere; unde sublevar lumbago.

10. *Lumbago a nisu*. *Effort de reins*. *Reins enrayés* Rusticorum. B.

Ex venere nimium exercitata, maxime si pedibus insitens vix eam sæpius exerceat, sævissimæ lumbaginis incurritur periculum cum atrophia femi-

semi-paralytica sensorum, unde lecto dein affigitur æger & exfolvitur: *Tissot de manufsupratio- ne pag. 221.*

A ponderum gestatione, elevatione, vehementes quandoque superveniunt lumbagines, verum sæpius ideo dolent lumbi, quia antea rheumatico infarctu sunt affecti, & perperam his nifibus dolores tribuuntur.

Ab Equitatione fuscillante inæstueti lumbaginem incurrunt, quæ sequenti die laxari magis quam prima; pars dolens a tactu vel pressione læditur. Illæ omnes lumbagines raro phlebotomiam exigunt, ut plurimum quiesce & calore læti evanescunt: interca fontenta resolutentia & anodyna ex decocto florum melliloti & chamæmeli opem ferunt. Extensiores lumborum, scilicet sacrolumbaris, longissimus dorsii, & semispinosus sunt distracti & contusi in his conatibus; quod ex horum musculorum situ & origine ac insertionem cognoscitur.

Ballonius & Baglivi quandoque observantur in gravi lumbagine a nifu oriunda cruorem intra musculum effusum, qui fluctuatione sine præviæ suppurationis signis cognoscitur, & lancæola adacta foras educitur.

11. *Lumbago ab aneurysmate* Auberti in Boneti Sepulchreto Tom. 2. pag. 573. obs. 35. C.

Hæc aneurysmata vertebrae erodere consueverunt, & demum rupta mortem subitanam inferunt. Dolor pulsatilis, qui arteriarum pulsationi respondet, sine inflammatione, huius speciei signum est.

12. *Lumbago apostematosa* Rivertii observat. 2. missa à Franc. Chomel.

Est illa quæ ab abscessu lumborum procedit.

13. *Lumbago Sympatica* Boneti observ. 41. 42. &c.

Est illa species quæ a viscere quodam vicino læso oritur nervorum communione; & quæ talis ante mortem ægrotum visa est Medicis. Tales sunt sequentes.

A Mesenterii glandulis induratis VVarthou A-denograph.

A pancreate tumido, purulento, scirrroso, putri.

Ab induratis pyloro, vena cava, pancreate.

A rene scirrroso, putrefato, observ. in Boneti Sepulchreto, 43.

Ab abscessu circa vena cava bifurcationem, obs. 43.

A vermibus intra renes, Additamenti obs. 2.

14. *Lumbago ab hydrothorace* Morgagni Epist. XVI. 38. 41. Boneti Sepulchret. Tom. 2. Obs. 60. §. 3.

Est dolor in lumbis; quem pressioni ab aqua in hydrothorace, potissimum in pericardio, contentis ascribendum censet Morgagni; nulla alia erant signa hydrothoracis, præter rheumata, febrem & pulsuum humilem; dolor autem ad spinam dorsii in lumbis referebatur.

15. *Lumbago a Satyriasi*, D. Hartt Journ. de Med. Fevr. 1755. pag. 110. *Satyriasmæ*.

Vir venere ter quaterve in die urens, in maciem & debilitatem eam devenit, ut auxiliis medicis indigeret; præcipuum symptoma erat

dolor spinæ dorsalis vividissimus a medio dorso ad coccygem cum tumore, quos dolores ut sedaret æger procedebat flexis omnino genibus ut furas suas manibus sustineret; nulla gonorrhæa, nulla dysuria, nec tremor manuum, nec cephalalgia gravativa; hic morbus succellerat satyriasi, seu inextinguibili cocundi desiderio cui indulgeret, & sanata lumbagine satyriasis revertebatur.

Curatur phlebotomia, fomentis emollientibus, emulsionibus; hæc species vocatur *lumbago*, & quarta species tabis dorsalis a Ronsao apud Senarium de tabe.

16. *Lumbago pseudischuria*. Vide Ischuriam neptiticam.

17. *Lumbago ab arthrocate* Cl. Perrault Journ. de Med. 1757. pag. 389.

Dolor arthriticus dorsii, inde trunci inflexio, gibbositatis. Sæcto cadavere aliquo verberet dorsales putride; poriosolum pure inodoro sacrum; cartilagine solute, spina medullaris suppurant.

XXXI. ISCHIAS; Dolor Ischiadicus Sennerti, Ischiagra Schneideri; Dolor coxendicus Boneti; Malum Ischiadicum Nenterii; Morbus coxarius de Haen; Sciapica Barbaris; la Sciatique.

Morbus est cujus præcipuum symptoma est dolor constans, sæpius diurnus, coxendicus; sive ossi sacro & ossibus pelvis, sive articulationi femoris cum illis ossibus, sive musculis cruris & tibiae inhaereat juxta fasciæ latæ extensionem, quod sæpius accidit; inde vero progrediendi, imo standi difficultas, elaudicatio, &c. Ab hysteralgia non raro difficulte distinguitur.

1. *Ischias intermittens* Essais d'Edimbourg, Dom. VI. artic. 49. pag. 143. L.

Est species quæ a febrili fermento intermittenti, ut quotidianæ, tertianæ, produciatur, & quous, tertia vel quarta quaque die hora data accedit, eum febre, deinceps vero recedit cum sudore.

Puerpera loci paludosi incola, cepit laborare dolore circa os ischium qui ad vultum externum extendebatur, quippe singulis diebus determinata hora redibat, cum magna pyrexia sudore terminanda, quo peracto bene se habebat & ab omni morbo videbatur.

Sumpto emetico & adhibitis catharticis ad usum kinkinæ devenit, additis elixirio virrioli & antispasmodicis, nec non emplastro vesicatorio cruri apposto; convaleuit. Hæc *Duncan Balne*.

2. *Ischias sanguinum* Bonet. Sepulchret. obs. 13. A sanguine Moroni director. L.

Ischias non raro accidit mulieribus a suppressis catamenii, lochiisve: & viris a sanguine hæmorrhoidali retento, quod principium in omni ischiade incusant Stoltiani.

Differt ea species a Rheumatica, quia sanguis gelatinæ alba Rheumaticis familiari non est.

Aut in patella, cum plethora peccat tantum; curatur vero phlebotomiis & victu tenuiori, ut notat Bonetus.

3. *Ischias Hystricum* Raulin des Maladies vaporeuses cap. 8. Sydenham. pag. 131. Tom. I. de colica biliosa. L.

Diffinguitur ab aliis 1. ex cognita hysterica dispositione ægotantis; 2. ex eo quod fugax sit, subito accedens & subito sine causa evidenti recedens; 3. ex tencritudine partis quæ recedente dolore tangi vix patitur.

Panni fumo succini imbuti calide applicati conducunt, nec non narcotica tincturæ castorei junctâ intus sumenda; juvat illico electrificatio.

4. *Ischias Gravidarum* Mauriceau lib. 1. cap. 17. *Douleur des cuisses & des jambes*. L.

Est dolor crurum & tibiarum cum harum partium œdematâ, & varicibus, ultimis graviditatis mensibus crescens, stantibus major quam jacentibus, vespere quam mane, ex dengato ob iliacearum venarum pressionem sanguinis reditu.

Varices minime aperiendo citra magnam necessitatem, sed molliter reprimendæ fasciis oblique circumvolutis; ab ambulatione abstinendum, & sæpius decumbendum; vino aromatico favendæ partes tumidæ. Sæpe illa œdematâ ante partum evanescit, & est illis maxime familiaris quæ gemellos gestant. Vide etiam hysteralgiam imprægnatarum, quæ cruris dolorem & stuporem inducit a ligamenti rotundi alterutrius distractione; phlebotomia & brachio & situs convenientes præ his morbis opitulantur.

5. *Ischias ab Sparganosis*. *Depot laiteux à la cuisse*. Puzos Mem. sur les dépôts laiteux, pag. 350. Levret Journ. de Med. Juill. 1758. pagin. 86. L.

Sparganosis ex *Dyscrasie*, est lactis redundantiæ & inde ejus deviatio in alias partes.

Hic morbus circa decimum quartum a partu diem, apud mulieres lacte redundantes quæque lac sugendum non præbent alumnis, indicia sui præbet a dolore inguinis unius lateris juncta tractum vasorum cruralium protensus, cum funiculi horum vasorum intumescencia, accedit progrediendi difficultas, dolor ex femore ad popitem, inde ad suram atque ad pedem serpit: œdematosus vero tumor crescit quandoque ita ut volumen extremitatis inferioris sit duplo majus quam in statu sano.

Quædam ferrosam distinguitur a lacteo quod ferrosam seu vulgare incipiat a pedibus, sensim sursum ascendat sine dolore, amboque pedes invadat; lacteum alterutri cruri insidet, dein descendit & dolore stupatur initio, gravidæque vel puerperæ tantum afficit.

Hic dolor curatur 1. phlebotomia una, alterave; 2. cathartis; 3. calore assiduo partis & corporis; 4. topicis resolventibus diu applicatis, ut decocto herbarum emollientium & resolventium addito vino albo, aqua vitæ, sale ammoniaco; emolacationes ex saponæ & butyro, oleum amygd-

larum amararum cum seirito vini, balsamum Fioraventi, frictiones sæcæ repetitæ &c. adhibentur, & si sanato crure alterum afficiatur, ut sæpius accidit, iterantur eadem auxilia.

6. *Ischias ex abscessu* River. observ. 53. centur. 1. Fabric. Hildani observ. 71. centur. 1. Lamorte Observ. de Chirurg. 110. 115. &c. Chiffroi. Observ. 47. fol. 41. P. Borelli cent. II. Obs. 86. C.

Abscessus supra articulationem femoris cum ischio, seu natem, post cruciatus annum integrum durantes, cum claudicatione, incisus fuit, magna puris copia effluxit & ægra convalescit intra mensem; altera ibidem doluit per plures menses, admotis cataplasmatibus maturantibus, post quinque dies facta fuit incisio, & sanitas subsecuta cū puris effluxum. Hanc speciem etiam mihi observare contigit in tribuno militum D. du Billard.

7. *Ischias a carie* Benivenii de abditis cap. 79. est prioris sequela.

Ischias syphiliticum Baglivi pag. 206. lib. 2. §. 2. *Ischias Gallica* Moroni Director. C.

Virum gravi ischiade laborantem nuperrime curabamus, irritique optimis præsidii desperabamus de salute recuperandâ, cum vero per transfennam nobis subindicasset se, v. g. intus abhinc annis, bubonibus gallicis male affectum fuisse, statim suspicionem dedit ischiadem a fomite gallico pendere; quapropter præscriptis decocto salsæparillæ, macrimonio crudo, cortice nucum, &c. paucis diebus interjectis, a gravi ischiade convalescit non sine adstantium stupore; hæc Baglivi, qui ea occasione instans dietæ Medicos, quimorborum species flocci habere in praxi, qui v. g. quodvis ischias eadem methodo curandum doceat.

8. *Ischias verminosum* Delii Amicitat. pagin. 349. Zacuti Prax. pag. 398. B.

Puer habitus corporis strictioris, pallidus, abdomine duriusculo, de doloribus abdominis sæpe conquestus, & interdum febriens habebatur pro atrophico; is titubabat genibus, pedem dextrum introversum vertebat sæpius, dolebat femore, præcipue circa os ileum dextrum: parentes luxationem femoris incusabant; Chirurgi luxationem conantur curare; his irritis puer claudicare videtur. Illustr. Delii pruritus narium, oculos relaxatos, copiosam salivam, urinam fero lactis similem, dolores abdominis respiciens, lumbricos in intestinis suspicatur, anthelmintica præscribit, lumbricisque vivis aliquot excretis, dolor ischiadicus & omnia symptomata cessant.

Zacutus memorat cuidam ab anno ischiagram gravissimam patienti & secunda vena pedis vermicum vivum profluisse teretem palmaris longitudinis, quo cæceto dolor evanuit, sed est auctor subtilitatis fidei.

9. *Ischias a subluxatione* Petie Mem. de l'Acad. R. des Sc. 1718. a fractura. D.

Distorsio vchemens ligamentorum, capsulæ articulares, tendinuvæ femoris articulationem firmam-

manium a lapsu, nisu, ictu, dolore vividum, & pertinaac inducit, qui phlebotomiis, quiete, victu mediocri, potu diluente sedatur. Luxatio quidem integra cetera fracturam impossibilis ferme est; nisi a laxitate tendinum sensim oriatur, eaque ex crurum longitudine inæquali cognoscitur. Vide *Heisteri Chirurgiam Part. 2. lib. 3. cap. 10.*

10. *Ischias Rheumaticum. Dolor ischiadicus* Sennerti Cap. XI. L.

Differt ab ischiadæ arthritico 1. quod non articulo inhaerere, sed musculos inter os sacrum & genu, imo in tibia positos discruciet, latam scilicet aponeurosim, quæ illos omnes obvolvitur; 2. quod his affecti doloribus non patiantur, ut arthritici, dolores pedum & manuum; 3. nec si dolor sit externus ullo tumore stipetur, ut arthritici. Ille vero dolor est pertinacissimus, demum claudicationem & artus atrophiam inducens.

Immutanda est eralis sanguinis viscosa & acris per fuscula diluentia, præmissis universalibus ut phlebotomia & eucharis, dein si temperamentum ægri sit calidum & siccum, balnea domestica calida, intus. serum lactis conveniunt, thymæ etiam sulphureæ profunt. Si vero æger sit frigidus & pituitosus, discrucientia, vesicatoria, sudorifica profunt. Sic fometa ex foliis sambuci, hedere calidis, aut ex horum decoctis, balneum ex arena marina ad solem vel ad ignem calefacta, immerso in aquas belluianas, litus calidus ex sapone in aqua viæ soluto, &c. sæpius profunt. His invicis vidi sanatum aliquoties ischias ope electrificationis repetitæ paulo fortioris.

11. *Ischias arthriticum* Sennerti cap. 603. *Malum ischiadicum* Nunteri Tab. 32. Cap. 5. *Species 14 doloris ischiadici*, de Haen de dolore coxarum Tom. 4. *Gonæ setasque; Ankylosæ de la cuisse* de Meyerey n. 404. L.

Aggreditur podagricos, potissimum annosos; assis sacro inhaeret, quod mirius, vel ipsi articulo smotis, quod pejus. Dolor est profundus, vehemens, a motu exacerbans, ad pedes usque extensus, & in pedibus tumorem rubellum glabrum excitans; per periodos recurrit, non vero constanter divexat, ut vetus ischias rheumaticum; sanguineos, gulosos, veneri deditos, laute viventes sæpius aggreditur.

Eadem cura generalis est quæ podagræ.

XXXII. PROCTALGIA. *Dolor aut Tulpii; Douleur du fondement.*

Est dolor podicis, seu extremi recti, & vicinarum ejus, cojux diversæ species a totidem principis diversis pendunt.

1. *Proctalgia inflammatoria; Inflammation du fondement* Sennerti, de inflammatione ani, cap. X. B.

Cognoscitur tumore calido, dolore acuto, qui premendo irritatur, alvus difficiliter redditur, & sæpe dies aliquot subsistit, accedit febris.

Oritur hoc malum ex excoriatione, ictu vio-

lento, hæmorrhoidibus restrictis, acris applicatis, &c.

Malum hoc curatum est difficile, & in fistulas sæpe abire; curatur phlebotomia, victu tenui, fomentum initio emollientibus, & anodynis, cataplasmatibus ex mica panis albi cum lacte & croco, foliis solani hortenhs, oleo rosaceo, amygdalino, decocto malvæ, radicis althææ, floribus chamæmeli, melliori; si fiat abscessus, is mature aperendus & detergendus, ne fistulam inducat.

2. *Proctalgia cancerosa.*

Est ea quæ ex ficis, thymis, ulceribus cancerosis, rhagadibus malignis procedit; fici quidem, cristæ, condylomata benigna, imo syphilitica vix ullum dolorem creant, sed non raro pessima indolis sunt, & carcinomatosa indolem acquirunt, unde dolores pungitivi, pruriginosi, lancinantes, cum duritie, asperitate, ichoris acris effluxu, rhagadibus corrosivis, quæ omnia potissimum molesant in alvi dejectione.

Si hæc mala syphilitica sint, præmissis multis balneis ad hydrargyrosim deveniendum est, atque in ejus decursu cristæ, porri, verrucæ, vel cultro auferendæ, vel causticis exedendæ; dein vulnus more confecto deligandum est; sed si carcinoma minime syphiliticum fuerit, tunc periculosius multo est, & fere insanabile: illud vero more aliorum corrodendum est; dolor, buyro, inguentisque ex lithargyrio, cerussa paratis delinendus, non omissis narcoticis.

3. *Proctalgia fistulosa; Fistule à l'anus. &c.*

Fistulam ant præcelsæ phlegmones, mariscæve suppuratæ, & sunt ulcera sinuosa, oris callosi, quæ cum anum obfident, si uniculos agant, in rectum, vesicam, vicinalque partes, sanatu difficillimæ sunt.

Dividuntur in completas & incompletas; sanantur operatione chirurgica, quæ cum in finem instituitur, ut ulcus callosum in vulnus simplex mutetur. De his vide non veteres. Auctores, apud quos curatio harum fistularum impossibilis censetur, teste Sennerto, sed Chirurgus hujus ævi, ut Heisterum, aliofque.

4. *Proctalgia intertriginosa; Intertrigo ani* Sennerti. L.

Est dolor cum excoriatione & rubore partium, quæ excoriatio si fiat a causis mechanicis, ut equitatione diuturniori, curatur apposito sevo inuncto, vulgo candela fibacea, ad pe, oleo rosaceo, aqua rosacea, &c. sed sæpius intertrigo infanses divexat recens natos ob acrimoniam urinx in plicis & rugis harum partium immorantibus & excalescentibus; idcirco frequens lotio ex vino & aqua, mundities sedula requiruntur; item purrices his plicis quotidie sero & hunc imponunt pulverem cerussæ, piuperes vero pulverem salicis cariosæ.

Si intertrigo sit herpetica, vel simplex, vel syphilitica, quod malum adultis accidit, alia methodus est adhibenda, qualis in Hysteralgia puiginosa.

4. *Proctalgia ex rhagadibus* Sennert. loc. citat. *Gefores du fondement. L.*

Rhagades sunt scissuræ marginis ani sine tumore & pure, quales labris, digitisque favientibus, ruficis potissimum, accidunt; hæc ulcerata sicca sunt valde dolentia & inordinata, tenesmus excitant, & ob deieciendi necessitatem exacerbantur quotidie; pendunt aut aeris homia sanguinis, quæ ideo primo est remediis internis, debitoque victu impugnanda; dein chirurgica auxilia sunt adhibenda.

6. *Proctalgia Brasiliensis* Zacuti Lusitani Præp. pag. 396. *Morbis Brasiliensis, vermis dictus; Bicho Lusitanis; Malbundo Brasilianis; VVorm Belgis; Bittor Angolensibus* Histoire des Voyages. A.

Symptoma præcipuum hujus morbi est dolor ardens pudicis initio, cum constipatione, spontanea lassitudine, quibus addunt se comites, saltem apud Angolenses, profundus mæmor, cephalalgia, tibiarum debilitas eum dolore acuto, oculorum prominentia, & quasi exophthalmia. Initio morbi sufficit non rari podicem eluere, & suppositorio ex limone uti, quandoque potest tolerari; inde enim atrocior evadit podicis dolor, sed sanatur.

Si serius adhibeatur hoc suppositorium, ardor & pruritus ani crescit, tumet podex, exulceratur, & multum puridum album mucum, aut pus fundit; tunc vero præter succum limonium, succo nicotianæ tabaci pars abluenda est; folia tabaci aceto irrigata, & sal marinum adpersum feliciter etiam adhibentur, sed cum tanto dolore, ut æger per vim continendus sit; & profunt etiam frequentia clystera ex decocto rosarum cum ovorum vitellis; prodest situs ex oleo rosaceo & cerussa; si vero negligantur hæc auxilia, serpit ulcus, sphacelus accedit, & sine febre ac siti, æger, viribus exhaustis, e vita discedit.

7. *Proctalgia ab exania. Chute du fondement. Vide Exania* class. 1. gen. 47. D.

Ille affectus frequentius agreditur infantes & pueros diarrhœa dudum affectos & constitutionis debilis; utile est intestinum prolapsum post quamvis alvi defectionem blande reponere, priusque vino eluere; in hoc vino folia verbasci prius incocta sint; si vero tensum & dolens sit intestinum, oleo, vel butyro prius inungendum est, quam reponi possit.

8. *Proctalgia ex Mascis River. Centur. 3. ubi serv. 7. Douleur des hémorrhoides. L.*

Præmissa phlebotomia, æger utatur clystematibus ex oleo tenui syringa injiciendis; syringæ canula intestino gallinæ involvatur; æger utatur cremoribus ex fecali, emulsionibus hypnoticis.

Succus perservivi cum ovi vitello mixtus addito opii grano marisæ applicetur; sola folia sedi telephi Linnæi admodum maxime profunt, necnon collyrium ex albumine ovi cum fructu albuminis inspissato, sed linteis obvoluto.

Cataplasma ex mica panis cum lacte & croco, verbasco, malva, radice alexæ; seminibus lini, floribus chamæmeli, foliis hyoscyami, inaccessis

ex horum decocto juvant; prævertuntur marisæ, si sæpe soveatur podex aqua frigida; tepidave, & bibendo mane pintam aquæ cum lactis cyatho.

9. *Proctalgia Diarrhoica. B.*

Qui diarrhœa forti laborant, potissimum billosa, nec non qui aquis mineralibus cathartici per aliquot dies utuntur, non raro dolorem viduum in podica experiuntur quasi urentem & pungentem, qui tamen facile sanatur, sedata diarrhœa aut loto podice ex ipsis aquis acidulis: dolor ille qui a vividis intestinorum distentionibus dependet, non refertur ad intestina quæ obstructo sensu gaudent, sed ad cutim quæ marginem ani constituit, quia cutis acutiori multo sensu pollet; eadem est ratio cur calculosi acutissimum dolorem referant non ad collum vesicæ, ubi est calculus, sed ad extremum balneum, cuius tegumentum valde nervosum est.

10. *Proctalgia Tenesmodi. Vide tenesmi species varias.*

De ani dolore videatur *Tulpus observ. lib. 3.* quem vidit dirissimum quarta post defectionem hora recurrere, quique sublevarius est tantum hirundinum applicatione.

11. *Proctalgia equina.*

Est dolor vehemens podicis equos excrucians; inflammans, quem excitat vesicæ hæmorrhoidalis ingressus, & illic instat marisæ adhaerens. *Vide D. Linnæi Amœnitat. Academ. Tom. VIII. pag. 357.*

XXXII. PUDENDAGRA. Douleur des parties génitales.

Est dolor partium genitalium tum in viris tum in feminis. Nomen a *Gasp. Torrella* inditum, ut mentulagra a *Vendelino Hokie*.

1. *Pudendagra a Parorchidio; Douleur des testicules retirés, déplacés.*

Vide *Class. 1. genus 59.* præsertim 2. & 3. *speciem*, quarum altera est comes nephralgiæ calculosæ.

2. *Pudendagra ex phimosi; Douleur du gland provenant du phimosis; paraphimosis, &c.*

Vide *Classis 1æ genus 22.* ubi diversa phimosos species, quarum altera vaginalis est.

3. *Pudendagra Herniosa, Douleur de Hernie.*

Est dolor oriendus ab ernia, ut ab enterocœle, epiploce, cistocœle, quarum alix ratione loci sunt inguinales, alix crurales, perineales, vaginales, hypogastricæ.

4. *Pudendagra ulcusculosa; Chancres aux genitalités.*

Ulceræ subrotunda lentis magnitudine in ambitu rubra, in medio grisea, vix ulcra epidermidem profunda, serpentina, a viru syphilitico oriunda, vulvæ & vaginæ in feminis, balano & interiori præputio in viris insident; illa quidem non admodum dolent, sed tamen molestiam creant, & quod peius est, virus syphilitici strages edituri lignum præbent funestum; his neglectis phimosi supervenit, gonorrhœa præputii cum

cum dysuria, quandoque balani exeno, sequuntur. Curantur autem radicitus per hydragryosim aut vicaria huius remedia.

5. *Pudendagra pruriens*; *Impetigo scroti* Forseka consil. 68. tom. 2. *Prurit des parties naturelles*.

Vide pruritem supra & Hysteralgiam pruriginosam. Distinguenda est hæc species ab ea quam ascarides vulvæ excitant, & ab herpete harum partium.

6. *Pudendagra a Gonorrhœa*; *Dysuria venerea sicca* Astrucii lib. 3. cap. 3. de gonorrhœa sicca.

Est dolor ardens in tractu urethræ sine puris seminisve stillicido notabili, ortum habens a phlogoli erysipelatosa urethræ, quam virus syphiliticum acris & volatilius in subiecto magis irritabili induxit, qui simul dysuriam aerem, quandoque stranguriosam, constem habet: hic morbus paucis diebus ab impuro coitu se prodit & curatur 1. phlebotomia; 2. immisso sæpius balano nudo intra lac tepidum vel decoctum radicis althææ, seminum lini; 3. vel admoto cerato Galeni, cataplasmate de mica panis cum lacte & croco; 4. potu diluente, demulcente, emulsionato leviter narcotico; dolore sedato, ad virus syphilitici curam progrediendum est.

7. *Pudendagra arsura* Astrucii lib. 1. pag. 49. *Incendium virgæ*.

Est dolor acer cum rubedine erysipelatosa balani, quæ olim a concubitu cum leprosa oriri consueverat, qui dolor est urens & punctorius, præter quem accedunt puncturæ inter carnem & corium, & corporis excalescitiõ. In hoc morbo Joannes Arden suadebat potissimum injectionem ex lacte, saccharo, oleo & decocto hordei, addita si velis opulione ex amygdalis.

8. *Pudendagra cancerosa*; *Carcinomata venerea* Astrucii de morb. venereis lib. 4. cap. XI. §. 7. & lib. 1. cap. 6. de bubone carcinomatoide; *Douleurs des cancers aux parties génitales*.

Est dolor a carcinomate pudendorum in viris ac foeminis, coque occulto, vel ulcerato, sive in bubone sive in balano, pene, vulva, vagina, &c. de quorum affectuum signis, causis, cura vide loca citata.

9. *Pudendagra ab ascaridibus* Ill. Delii Amcenitar. Medic. tom. 1. pag. 341. Collection Academiq. tom. 3. pag. 366. Auctore Beniamino Scharho.

Est dolor pruriginosus vulvæ & vaginæ ab ascaridibus cum ardore incredibili, & eruptione vermiculorum casei hospitum similibus.

10. *Pudendagra testium*.

Ut plurimum testes dolent a tumore phlegmonodeo quem suppressa gonorrhœa excitat, & vocatur vulgo *gonorrhœa in seretum testis*, de qua videbis Chirurgos de morbis scroti.

Dolores ad alias Classes dimissi multorum sunt generum, potissimi vero pertinent in *prima Classe* ad exanthrema, Gallicæ entericæ, *fractures*, ad enterocelen, phlegmonem, paronychiam, puncturam nervi, tendinis fracturam; in *tertia Classe* sunt pleuritis, cephalitis, gastritis, nephritis; in *quarta*, trismus, crampus convulsivus, raphania potissimum; in *quinta* pleurodyne, in *sexta* dypochondriasis, hylleria, hydrophobia; in *nona* hæmorrhoids, dysenteria, ileus, cholera, genesimus, dysuria; in *decima* demum tympanitis, meteorismus, ischuria, malis furialis, syphilis, scorbutus & gangræna dolores intolerabiles excitant.



CLASSIS OCTAVÆ SYNOPSIS.

V E S A N I Æ.

CHARACTER. Est morbus animi, error scilicet in imaginatione, appetitu, vel iudicio, seu hallucinatio, morositas aut delirium.

ORDO I. HALLUCINATIONES seu errores mentis oriundæ ex vitio organi cuiusdam extra cerebrum, unde imaginatio deceptiva.

- I. **VERTIGO**, (*Verrige*) apparens objectorum vacillatio vel nutatio.
- II. **SUFFUSIO**, (*Berlus*) objectorum, quæ non sunt, imaginaria visio.
- III. **DIPLOPIA**, (*Brusus*) hallucinatio qua idem objectum duplicatum vel multiplicatum apparet.
- IV. **SYRIGMUS**, (*Tintoin*) auditus imaginariæ soni, cuius nullum est extra aures principium.
- V. **HYPOCHONDRIASIS**, (*Hipochondrie*) morbus diuturnus quo affectus se in mortis periculo versari ex ructu, palpitatione, aliisque levidentibus malis imaginatur.
- VI. **SOMNAMBULISMUS**, (*Maladies des noctambules*) hallucinatio qua somniantes e lecto surgunt, sequæ diversis periculis exponunt.

ORDO II. MOROSITATES, (*Bizarries*) cupiditates aut aversiones depravatæ.

- VII. **PICA**, (*Gout dépravé*) alimentorum inassuetorum appetitus cum assuetorum aversione.
- VIII. **BULIMIA**, (*Faim canine*) appetitus esculentorum copix majoris quam quæ digerit possit.
- IX. **POLYDIPSIA**, (*Soif immodérée*) appetitus majoris solito copix potulentorum.
- X. **ANTIPATHIA**, (*Antipathie*) quorundam objectorum tanta aversio ut eosum visu, vel olfactu æger gravia symptomata patiat.
- XI. **NOSTALGIA**, (*Maladie du pays*) parentum patriæ tanta cupiditas, ut hac non expleta æger gravi morbo decumbat.
- XII. **PANOPHOBIA**, (*Tremor panique*) summus pavor inter dormiendum sine causa evidenti.
- XIII. **SATYRIASIS**, (*Satyriase*) effrenis, impudensque veneris cupiditas cum libidinosâ penis tentigine.
- XIV. **NYMPHOMANIA**, (*Fureur urétrine*) est effrenis in feminis veneris cupiditas.
- XV. **TARANTISMUS**, (*Tarantisme*) est effrenis choreas agendi, saltandi cupiditas.
- XVI. **HYDROPHOBIA**, (*Rage*) est effrenis potulentorum aversio, sæpius a morsu animalis rabidi.

ORDO III. DELIRIA, (*Délirés*) insomniæ seu errores mentis iudicantis, a cerebri vitio oriundi.

- XVII. **PARAPHROSYNE**, (*Transport, alination*) delirium fugax, a veneno, aut altero morbo dependens.
- XVIII. **AMENTIA**, (*Démence*) delirium universale, mite, sine furore & audacia, cum morbo diuturno.
- XIX. **MELANCHOLIA**, (*Mélancholie*) delirium particulare misæ, cum mœrore, ac morbo diuturno.
- XX. **MANIA**, (*Folie*) delirium universale cum furore, vel audacia & morbo diuturno.
- XXI. **DÆMONOMANIA**, (*Démonomanie*) delirium melancholicum quod vulgo diaboli potentix tribuitur.

ORDO IV. ANOMALÆ VESANIÆ, morbi prioribus affines.

- XXII. **AMNESIA**, (*Oubli*) est omnis memoriæ Fessatio.
- XXIII. **AGRYPNIA**, (*Insomnie*) est pervigilium continuum, immodicumve.

CL ASSIS OCTAVA.

MORBI VESANI,

SEU

VESANIÆ.

1. Sunt illi quorum præcipuum symptoma est animæ error, alienatio, delirium, aut dementia, seu imaginatio, iudicij, aut cupiditatis, vel voluntatis depravatio.

2. Paraphrenici Græcis dicti sunt a *paraphrosyne*, quod delirium est, vel a *pirene*, quæ mens audit, vel a *parafero*, transfero, ut Galli delirium mentis translationem *transport* nuncupant; *apologismi* Helychio dicuntur. *Mentis alienationes* Pel. Plater; *morbi animi vel spirituales* Nov. Class. *Morbi mentales* Ill. Linnæi.

Ægros Græci vocant *paraphronontas*, *paraleptos*, *parapalontas*, *parapaisantas*, *parapossantas*, *maniacos*; Latini *mente captos*, *deliras*, *insanos*, *stultos*, *dementes*, *desipientes*.

3. Symptoma præcipuum si sit imaginatio, *hallucinatio*, Græcis *leros*; si sit delirium, *paraphrosyne*; si sit iudicij depravatio, *paraphrenia* vel *dementia*, *stultitia*, *insania* dicitur; si sit hebetudo, *morosi*, Latini *amentia*, si depravata cupiditas aut aversatio, *furor*, *morositas*, Gallis *tic*, *mania folie*, *caprice*, & in genere *delire transport*, *alienation d'esprit*.

Theoria.

4. Anima tres facultates præcipuas obtinuit a Summo Numine, facultatem cognoscendi, appetendi, & movendi.

5. Utraque inferior est brutis communis, & superior hominibus propria. Facultas cognoscendi inferior *instinctus* est potentia ideas objectorum confusas eliciendi, superior *Intellectus* seu facultas ideas rerum distinctas efformandi, seu genera, & species cognoscendi.

6. Instinctus dividitur in sensum & imaginationem; *sensus* quintuplex, visus, auditus, tactus, olfactus, & gustus, ideas objectorum sensibilium præsentium, seu in organa nostra agentium repræsentant.

7. Imaginatio nobis etiam absentia olim per sensus cognita repræsentat; tum actualia, tum præterita, tum futura, & huc referenda est memoria, & prævisio, seu prognosio.

8. Intellectus has ideas comparat, combinat, & vi attentionis, & abstractionis, ingenij ac rationis, suas actiones sublimiores, ut syllogismum, & ratiocinium exsequitur, sicque verum a falso, bonum & malum apparet a reali distinguit.

9. Quod nos statumque nostrum perfectiores reddit, bonum est: *voluptas* vero est intuitiva perfectionis nostræ perceptio. In constanti voluptate jacet *felicitas*, quam ideæ nobis conciliant bona

omnia, scilicet bona animi, corporis, fortunæ &c. cum autem in eam finem nos creaveris. Deus Optimus, ut nostræ perfectionis promovendæ attentæ felicitatem consequamur, non mirum si bonorum appetitus, & malorum aversio nobis sine congenita.

10. Facultas appetendi bonum, & avertendi malum duplex est; *superior Voluntas* dicitur seu inclinatio animæ versus objecta pro ratione boni intellectualis seu in eis distincte percepti; aversatio vero rationalis *Voluntas* est.

Inferior seu appetitus sensitivus est inclinatio animæ versus objecta pro ratione boni in eis confusa seu sensum ope percepti; aversatio vero sensitiva non reclinat a malo sensibili; appetitus sensitivus propriæ cupiditas vocatur, & opponitur voluntati seu appetitui rationali: cupiditas itaque a sensu, & imaginatione ducitur: voluntas vero a ratione, & intellectu.

11. Quæ nobis bona apparent sensu duce sæpe mala sunt, ut dulcia verminosis; & quæ mala sensibus videntur sæpe bona sunt, ut amputatio artus sphacelosi; solius est itaque intellectus, & rationis bona realia a malis distinguit, & de illis iudicare.

12. Cum itaque nostra intersit maxime bona vera nobis conciliare, & mala realia effugere, ut felicitatem aut voluptatem, veram, & constantem quantum fieri potest attingamus, nostrum est etiam pro viribus intellectum nostrum perficere, & rationi obtemperare, & consequenter quæ optima sunt agere.

13. Facultas ultima agendi seu movendi superior, *Libertas* vocatur, seu potentia agendi quod rationi optimum videtur, & quod voluntas rationis nutui obtemperans indicat; non solum autem imperium libertatis in actiones corporeas extenditur, ut in motum, loquaciam, &c. sed & in actiones animæ proprias, ut sunt attentio, abstractio, reminiscentia, appetitus, &c.

14. Inferior vero facultas *natura* dicitur, & est potentia agendi quæ sensui, & imaginationi bona videntur, quæque proinde a cupiditate aut aversatione sensitivis fuadentur. Illa vero expedite, sine deliberatione, & vi consuetudinis bona obvia absorbit, mala sensibilia removet. Cum quæ visus, aut ad lapsum inclinat, illico natura dum membrum usum, aut lapsum retrahit, cum secus æqueam intercessisset deliberatio, de eo actum esset.

15. Vehementia naturæ conamina ad bonum admovendum, aut malum removendum, consequenter ad cupiditatem aut aversationem sensitivas, vocantur animi *pathemata*, quibus supprimendis & moderandis concessum est libertati imperium eo majus, quo quis attentius rationem suam excoluerit, & perfectioni propriæ acrius allaboraverit, ita ut in homine perfectissimo detur summus consensus inter voluntatem

tem & cupiditatem, inter actiones liberas ac naturales, nihilque appetatur nisi quod bonum, utile, decorum, & iustum. At in statu imperfecto, & quo plus ad brutorum conditionem accedunt homines, ratione, philosophia ac religio non satis excuti, majus ibi diffidum, & actiones quæ sensui videntur jucundæ, intellectui videntur malæ, & quæ bona ratione dūce cognoscuntur, ab instinctu ingrata deprehenduntur; hinc origo malorum tum moralium, tum physicorum; de physicis hic tantum agimus.

16. Vesaniam itaque inde oritur, quod cupiditatibus nostris servientes ab illis duci nos patiamur, quod pathemata refragare, moderati non studeamus: hinc erotomania, antipathia, pica, ac æraminis melancholia, a repulsis furor, & ab erroribus in cibo, potu, gestis, ingeltis, &c. varia incommoda, vitiaque corporis, ex quibus iterum vesaniam producantur, quibus certe morbus nihil est miserabilis, cum ad brutorum conditionem homines accedant, ut videre est ex mania, lycantropia, rabie.

17. Errores dividere possumus in theoreticos & práticos; cum quid opinamur verum quod falsum est, ut solem moveri, terram stare, error theoreticus est, cum inde nulla pathemata subsequantur. Vero judicamus verum quod falsum est, ita ut inde pathemata gravia subsquantur, error est práticos, ut cum maniacus melancholicus amicos suos pro hostibus habet, a quibus insidias, venenam & mortem timet, aut cum quis vertiginosus imaginatur domum inclinare dextrorsum, & se inde pro metu sinistrorsum præcipiat.

18. Prior error hallucinatio, Græcis *leres* dicitur, ut in syrygmo, suffusione; alter error vocatur *delirium*, Græcis *paraphrenia*, quoties scilicet pathemata delirantis ipsi soli nocet, ut in nostalgia, taimeismo, hypochondriaci, panophyia; furor vero dicitur, si animi pathemata ad manus violentas sibi, aliisve inferendas, adeoque ad grave damnum eum inferat, ut mania, melancholia, rabies, nymphomania, demonomania, &c.

19. Inter hallucinationes referendæ sunt vesaniz, quæ a vitioso organorum externorum statu oriuntur, illarum iudicio; ita ut cerebri vitium nullum addat, ut in boulimia, cacochia, polydipsia, & juxta quosdam in vertigine.

20. Ex sola librarum cerebri consonantia, & dissonantia, qui rectam hominis rationem, & vesaniam deducere tentant, nullo habito respectu ad imperium libertatis in proprias animæ actiones, & sua pathemata, illi materialistis, vel inviti veliscuntur: si erroris causa foret mere mechanica, nullus error deberet imputari; adeoque de philosophia morali & jure actum esset, ut impii Spinozistæ existimant, qui moralitatem actionum fabulis accensent.

21. Error non solum procedit a vitio corporeo, ut a retinæ obstructione suffusio, a vitio labyrinthi syrygmus, &c. verum etiam a negle-

ctu suarum facultatum, aut ex eo quod in vero inquirendo, & iudicio excolendo non satis invigilaverimus; unde libertatis nostræ abusu deinceps errores corrigere nescimus. Sic rusticus suffusione laborans revera muscam præ oculis volitare judicat, Philoſophus vero hunc errorem agnoscit, & ab illo se liberat; ebrius duplicem candellam adesse judicat, ubi strabo mentis exculæ errorem suum brevi dimittit, & unicam cernere assuescit. Ipse vidit hydrophobam, quæ pathemata sua religioni & rationi submittere assuetæ, assant aquam bibebat, neminiq; ullo modo nocere parata erat; & recte monet *Illustr. de Sanit. bruta* & rusticos solum in hydrophobis adstantes munitari; homines vero rationem excolere assuetos, minime.

22. Errorem ab organorum externorum vicio ortum corrigere facilius est, quam qui a vitio cerebri oritur; scilicet errorem corrigimus, 1. mucuo diversorum sensuum, & imaginationis auxilio; 2. ope attentionis, abstractionis, & iudicii; auditus errores visus & tactus corrigunt; visus errores auditus, tactusque arguunt, ut patet ex historia illius aulci, cui *Chefaldenus* catarractam congenitam abstulit, visumque dedit, quique solo visu corporum distinctias, figuras, minime distinguebat, deinceps vero tactu & auditu visui conjunctis optime distinguit; ergo si unum tantum sensus organum laesum sit, errorem facilius erit corrigere, quam si in empirio affectu plures diversorum organorum fibræ nervæ laedantur; præterea cum cerebrum ipsum laesum est, gravior percellitur anima, quam cum organum ad vitam minus necessarium laborat, ut oculus; ergo huic attentæ malo minus apta est ad operationes, quæ errori corrigendo necessariæ sunt, dum hallucinationes sunt fugaces. Vertiginosus primo instanti timet, altero errorem suum agnoscit, ut phreniticos maniacusque errorem suum non agnoscit.

23. Quo erroris obiectum ad vitam, aut felicitatem nostram magis conducere nobis videtur, eo pathema subsequens vehementius est: ferre omnes maniaci somniant se hostibus gladio aut veneno armatis stipari; & nunquam, si abesset ille timor, in furorem adigeretur melancholici qui vitam suspensio ad submersione finiant, sortem morte illa multo pejorem se manere somniant, & a statu præsentæ multo magis quam a futuro cruciantur. Hydrophobi, quotquot accedunt homines, tot hostes scyphis ac phialis armatos judicant, quibus ad bibendum cogendi sunt, & ipsi potum cane pejor & angue timere se dicunt; non mirum itaque si eo spatis, minis, ululatibus remove conentur.

24. Licet maxima vesanorum pars vitio organorum, vel cerebri primario deliret, non rari sunt tamen apud quos vitium primarium contraxit anima, notum est puerulos, qui noctu utrumque soli domum obambulabant sunt

metu, statim atque nunquam satis puniendae ancillarum & anicularum garrulitate, fabulas de larvis, vampyris, manibus, hauserunt, misere torqueri incipere nocturnis terroribus, sibi mille somnia in lecto, aut in tenebris fingere, unde melancholiam, alioquin graves morbos incidunt.

15. Observat *Felix Platerus* moriones bene multos, qui quælibet gratia apud Magnates mimos, histriones & stultos se simulant, ut ipsis placeant, denum reapse longa austeritate desipere. Afferit *Ovidius* plures qui tantum se amatores finxerant, reapse amore deperitisse; plures puellæ amicarum suarum & exemplo ad gypsum vorandæ, quod abhorrent, incitatæ, pica deinde revera laborant & pauci sunt qui tabacomaniam simili modo non contraxerint; adde quod deliria febrientium, ut somnia dormientium, versantur circa objecta quæ sanorum & vigilantium animis aures versabantur, horum vero ideam abicere prius poterant; febrientes vero aut dormientes nequeunt, cum sensuum suorum non sint comites; hinc patet principium botumque morborum non semper esse vitium corporeum, ut *Boerhaave* male inquit, & *Spinositz* pronuntiant.

16. Multi in vesaniam incidunt, ne dicam omnes, ex pathemate, seu idea objecti, quod vehementem cupiditatem aut aversionem in ipsis excitavit, adeoque ob ideam *bani animi*, ut saluti, honoris, loci quem adipisci cupiunt, aut amittere metuent; *bani corporis*, scilicet sanitatis, formæ; *bani fortune*, ut opum quas conservare desiderant, vel perdere timent vehementius.

17. Sic plures sunt melancholici qui se dantatos esse metuant, inde vero desipiunt; alii qui a Magistratibus, Judicibus, Militibus se iniqui putant, & sanæ, vel vitæ detrimentum pati metuunt, inde delirant; plures mulieres quæ senescentes ex detrimento formæ, plures mercatores ex fortunæ, litigantes ex litis, adulescentes ex amasæ suæ jactura infaniunt; demoniaca obsessorum, vampyrorum, maleficiarum, sagarum a pathematis vehementibus pendet, ut sigillatim in speciebus videbimus.

18. Docet observatio quod si historiam cuiusdam facti audiamus, in qua omnia sic temporis, loci, aliorumque circumstantiarum determinatio, nobis illico hincius locum, tempus, ut noctem, vel diem, aliasque circumstantias, & sic casum omnimode determinatum imaginatur; hæc est itaque lex sensationum, ut idea unius objecti excitet in nobis ideam omnium circumstantiarum quæ illud concomitare solent.

19. Falsum est fibras cerebri medullares esse tenfas, elasticas, cum resecti ipsi nervi minime se retrahant; falsa est itaque hypothesi; quæ systema librarum illarum chordis clavicymbali confertur, & qua asseritur pulsata una eætera eo vividius resonare, quæ sunt ejus alterutæ harmoniæ, ut unisonus, octava, &c. nec

enim ulla est ratio cur credamus fibras quæ præsentant colorem, figuram, aliasque qualitates utcumque diversas unius hominis; ejusque vestitum, eas inter se, minime vero cum aliis, esse harmonicas, quæ tamen omnes auditio illius hominis nomine juxta hanc hypothesin debent resonare silentibus cæteris; ergo illa idearum accessio conjunctio minime mechanice musicæ legibus tribuenda videtur, sed difficultati res in abstrahito concipiendi, & faciliatè illas in concreto, ut sæpius fit, perspicendi, adeoque consuetudini.

20. Cum itaque ob infarctum, pressionemve quarundam librarum medullarum emporii quædam idea in anima excitantur, quæ eam fortius afficiunt, anima v. g. metu percussa ad hanc tanto fortius attendit, quo minus ipsi momentosa cæteræ videntur, aut quo ob opinionem præconceptam, motivum metuendi illi fortius viderit, statimque huic ideæ simplici alius comes metui fovendo, vel augendo aptas adjungit; sic qui somnando cogitavit se criminis cuiusdam insimulari, cito satellites, judices tortores, patibulum hinc conficiat; unde mire discruciat, febricit, sudat, & tandem evigilat, atque de errore suo visu, auditu, verbo circumstantiarum collatione, monitus respicit.

21. Verum non ita respicit ille, qui ob fibrarum emporii constans & permanens vitium, infarctum inflammatorum, siccitatem, rigiditatem fixam, priorem metu excutere non potest; aut si deservescente sanguinis impetu, in febris remissione, respicit, febrili exandescencia revertente iterum delirat miser: nec obiectum delirii dimittit, nisi altera cerebri parte magis infarcta aut excalescens a novo pathemate fortius quam a priori afficiatur.

22. De cætero quandiu obiectum delirii idem remanet, quod quandoque per integrum ægritudinis decursum perseverat, quidquid agit & loquitur delirans, præconceptæ ideæ consonat, & consequens est; & licet anima sit in continuo statu statum suum mutandi, atque sit nobis impossibile ad unam ideam simplicissimam per duos temporis secundæ attendere, quin ad ideas ipsi conjunctas evagatur, interea ab-objecto primario non semper recedimus; ita licet delirans videatur quandoque multa debilitare, & textui primario intermiscere, non raro accidit, ut per dies integros discursus, ejusque actiones sibi cohercant.

23. Merito itaque dehincur a *Pitcairnis* delirium *vigilantis somnium*; quippe ut in somnio ita in delirio, nullius sensationis sumus conscii, seu res præsentem non appercipimus, & absentibus tantum detinemur, seu sensationes omnes sunt obscuræ; phantasmatæ vero clara nos afficiunt; judicium vero minime lædunt, cum ex præconcepta idea imaginaria recte judicent, & appetant delirantes.

24. Cum delirantes objecta præsentia obscurant

esse aut nullatenus apperceptant, eorum rationia non determinantur ab objectis externis. Iam circumstantiis non respondent ea quæ appetuntur, loquuntur & agunt, sed respondent imaginationi, quæ ab interna cerebri dispositione maxime determinatur. Merito itaque dicit *Bertramus* in delirio esse ideas, quæ non respondent objectis externis, sed internæ cerebri dispositioni, & illarum idearum exortus est causa delirii, quatenus anima ad eas solas attendit, & a circumstantiis non afficitur.

35. Verumtamen in mania paroxysmo, cum magna est agitatio in cerebro, ita velociter excitantur diversæ omnino objectorum ideas, ut nullam invicem cohesionem habent, adeoque cum ea actionum & rationum cohesionem judicemus de iudiciorum consequentia, non mirum si in hoc casu ipsum iudicium maniaci nobis videatur depravatam; atque sunt optimi Auctores, qui in hoc maniam a melancholia distinctam esse volunt, quod melancholici consequenter ratiocinantur ex præconcepta idea, maniaci vero minime sibi coherent; sed reapse limites inter utrumque morbum assignare difficillimum est, sique vix nisi gradu differunt in certis individuis.

Praxis.

36. Cum hallucinationes, ut vertigo, strygmus, diplopia, &c. nullum cerebri vitium agnoscent pro suo principio; nec maxima pars cupiditatum & aversionum, ut boulimia, cacolitix, polydipsia, &c. in illis curandis corrigentem esse organa determinat vitium, ut stomachi in boulimia, auris in strygmio, oculorum in diplopia; quorum proinde morborum nil habet commune therapia, quam quod medicamentis cuique organo convenientibus sit utendum, sique diversis pro diversitate principii eos excitantis; interea tamen quoniam omnem vehementem cupiditatem & aversionem sedant, quæ sensationem obtundunt, in illis narcotica & sedantia videntur generaliter indicata.

37. In maniacis vero, melancholicis, aliisque, cum cerebrum peccare videatur, non solum remedia topica conveniunt, verum etiam ea quæ vitium sanguinis & solidorum hic suspicandum corrigunt, scilicet humectantia, laxantia, diluentia, necnon ea quæ sensationes compescunt, ut narcotica: demum cum remissior est morbus, & æger intellectus suo potest uti, auxilia morbi non negligenda sunt; etenim illa deliria sæpius ex eo procedunt, aut foveantur, quod iudicent ægri sibi magnum malum impendere, ut pauperatatem, infamiam, mortem, aut magni cuiusdam boni iacturam se passos esse; verum si quid apud eos valeat ratio, ut valet initio morbi, facile est magnis rationum momentis hanc præiudicatam opinionem evertere, sunt verba & voces quibus hunc depellere morbum potest Medicus philosophus.

Savages Nosologia Methodica. Tom. II.

38. Sapientis est, ut felicitatem assequatur, eam finem semper sibi proponere, & media certissima ad hunc scopum attingendum adhibere, ad hanc conferunt bona, quæ ideo omnes quæritus avidi; verum non omnes æquali sapientia eligimus; ea certe aliis anteposenda sunt, quæ omnium maxima, quæ fortune non obnoxia, quæ sola mentis aviditatem expellere possunt: talia certe sunt bona animi, quæ ideo bonis corporis anteposenda, & præ quibus bona fortune sunt meræ quisquilie, quibus frui dulce est, ad hæc infipientis est. Infani omnes bonum quoddam fluxum & labile misere ambiunt, diliguntque. Sic sunt adolescentes, quos etiam mentiri sæpe non pudet, qui ita leduntur a contumelia mendacii exprobatione, ut hoc deducit suo, aut adversarii sanguine eluere non dubitent, & si inulti sunt, in morbum, ut melancholiam, delabantur; hoc furore tamen apud Sapientes multo plus eos infamari certum est, quam ab ultione decorari; misera felicitas, quæ ab alterius arbitrio pendet.

39. Itaque infantes, falsis moralis philosophæ principii imbui, possunt ratiocinio ad rationis usum revocari, modo velint nobiscum pendere quid vere bonum sit, quid aliis anteposendum, & cuius possessionem contenti cæteris tunc carere valeamus: voluptas eadem est summa bonorum, sed ea debet esse constans, inconculsa, sincera, & vera, nullisque obnoxia damnis.

- » Nam quid velle potest homo, ni vult esse beatus,
- » Hoc unum variis querunt in motibus omnes;
- » Vos per delicias & lenimenta dolorum,
- » In quibus ut vento fluviique fugacibus undis
- » Nil stabile est, ubi se veri spes conscia fundet;
- » Quos bona nulla movent, nisi quæ infinita putentur,
- » In virtute Deum, atque Deum in mercede requirunt.

40. Præter moralia sunt etiam auxilia physica, quæ morbo radicato sæpius inutilia sunt, nisi a febre fugali sustineatur delirium; notum enim est maniam, melancholiam, similesque morbos chronicos difficillime sanari, & hypochondriasm ipsam, licet multo leniori delirio stiperur; ob id crux & opprobrium Medicorum vulgo dicitur; cum autem in ipsis febrarum tenuis, & sanguinis viscositas ad siccitatem vergens ut plurimum morbum foveat, nihil deluculentius, refrigerantibus, & potissimum balneis scilicet succedit.

41. In melancholia vero & hypochondriasm optimum auxilium est itineratio & equitatio; quippe cum maxime referat ideam morbosicam, quæ ægri torquentur, depellere, nihil est

ad hoc utilius quam animæ attentionem ab hac in alias, easque varias ideas divertere: docet autem observatio homini iter facienti, vel equitanti continuo varia nova & grate afficientia observari objecta, quæ successu temporis ani-

mam a priori idea revocant; interea dum prioris auri respiratio, & moderatus musculorum motus sanguinis lentorem resolvunt, perpirationem adjuvant, famem & digestionem restitunt, somnoque pacato aniam præbent.

CLASSIS OCTAVA.

VESANIÆ.

A Anima, quandiu corpori sociata est, ejus malis comparitur in omni morbo illa frigore & calore alterno, nec non molestia debilitatis afficitur in febribus; iidem miseriis nec non dolore simul in phlegmasi vexantur; ejus facultas moris depravatur in spasmi & anhelationibus, languet in debilitatibus, sensuque seriatim in comasibus & dysphesiis, ut tactus intenditur & molestus evadit in doloribus. Verum præter facultatem movendi & sentiendi, quæ in illis morbis laborant, sunt alix ipsius facultates, quæ specialiter læduntur in vesaniis, quippe facultas objecta absentia sibi repræsentandi, seu phantasia, cujus ope ideas boni & mali retinet; revocative, organorum culpa quandoque vitatur, unde error imaginationi, seu hallucinatio, ut in vertigine & syrygmo, facultas superior quæ ex ideatum comparatione exurgit, seu judicium etiam ab hallucinatione in errorem deducitur, maxime si cerebrum rationis præcipuum organum lædatur, unde delirium; demum inclinatio & aversio ejus circa objecta bona & mala physica, corporis nostra conversationem aut speciei propagationem spectantia, in errorem pariter trahuntur ex organorum & ipsius cerebri vitio; inde voluntates & cupiditates depravate, quæ morositates generice vocantur.

Morbos itaque quorum præcipuum symptoma est hallucinatio, delirium, aut morositas, classico vesanie nomine indigittandos volumus: *vesanos* siquidem a recta ratione alienos aut errore gravi, constantique detentos nuncupamus, atque error constantis animæ in imaginando, judicando, vel appetendo, est hujus classis character, qui quidem directe sub sensus non cadit, aut ita facile a quovis homine sano cognoscitur, ut in ipsa ovibus similes vel his affines morbos agnoscant pastores.

Recte hominum actiones sunt illæ quæ in bonum quandam finem conspirant; in homine recte agente, & mente sana prædico, hunc actionum conspirationem cernimus, si gestuum, locutum motuum cupiditatum, discursuum, iudiciorum inter se nexum respiciamus, nec opus est ad hallucinationem aut delirium agnoscendum, ut syllogismos falsos præferre vesanus sufficit, ut ejus actionibus quibuscunque inter se & cum communi hominum ratione non co-

herentibus, ejus errorem aut alienationem intelligamus.

Facultas cognoscendi superior, quæ intellectus vocatur, homini concessa est, ut verum a falso, bonum & malum reale ab apparenti distinguere valeat; ut autem facultatibus suis recte utatur, is debet libertate sua non abuti, debito scilicet regimine corporis, organorumque suorum valetudinem servare, nec non veri, bonique studio attente incumbere; qui secus faciunt, sibi impudent, quod sanitatem mentis cum sanitate corporis anittant, quod erroribus & præjudiciis irretiti falsum pro vero amplectantur, & errant; quodque cupiditatibus aut aversionibus sensitivis abrepti, rationique minus obtemperantes, morositates admittant, seu pro boni habeant quæ mala sunt, & pro malis averfentur quæ forent sectanda.

Hæc est duplex hallucinationum, deliriorum & morositatum origo. Qui crapulæ indulgent, illi organa sua ita vitiant, ut vertigine, visa duplicata, somnolentia, paraphrosyne afficiantur, hinc vero intellectus depravatio, amnesia, amentia, mania ex corporis vitio; quod sua culpa contraxerunt; verum ipsamet voluptatis ex vino percæptæ assidua contemplatio facit, ut vinofus hoc bonum physicum attendat; bona cætera prætermittat, maxime vero intellectualia, adeoque ut pergræcationi, tanquam bono reali, & omnium maximo, inhiat. Hinc error qui cæteras animæ facultates, ut judicium, voluntatem transversum rapit, & sic abusus libertatis vitia corporis vitiis ipsius animæ cumulat, & in diversas vesanias hominem deducit.

Hinc sequitur eos homines, quæ cupiditatibus suis libentius indulgent, & intellectum minus excolunt, ut Americani præ Europæis, rustici præ litteratis, mulieres præ viris, ganeones præ Philosophis, hisce mentis erroribus & voluntatis depravationibus esse magis obnoxios.

Inter eos vero qui rationi obsecundant, suisque pathematibus frenandis & regendis incumbunt, illi morbis animi sunt magis expoliti qui etiam studio acris incumbunt, qui labores animi suis viribus majores subeunt; non secus enim ac cantores morbis pectoris, ganeones morbis genituum; sed qui itum imaginationem, tum iudicium; tum alias animæ facultates, ultra modum exercent; morbis animi sæpius afficiuntur.

Morbi tamen non impedit quinomin ex recto harum functionum usu, & moderato exercitio omnes

omnes animæ facultates roborentur, non secus ac qui modice choream ducere assuevit, qui modice lyram pulsare aliter est, is facilius & aptius & expeditius eos motus exsequitur, constantiusque quam in his minime exercitatus, & rudis est.

Vesaniæ a duplici conditione, tum animi, tum corporis pendet, scilicet vel nimia sensibilitate, vividitateque, vel a segnitie & tarditate idearum, phantasmatum, iudiciorum, appetituum; utrumque autem vitium pendet a principiiis moralibus, aut a principiiis physicis.

Quoniam vero inter principia moralia libertas abusus primas tenet, ejusque rectus usus ad sanitatem animi ac corporis recuperandam omnino necessarius est in multis casibus, non mirum est si vesania ita rebelles & pertinaces sint, rariore & difficilius sanentur, quippe ægri quod in se ipsis esse nequaquam agere suspiciunt, quia ægritudinem suam ignorant, aut cognitam amant.

Morbus animæ curare non est stupidi & imperiti, sed solertis & ingeniosi Medici, in psychologicis & moralibus æque ac in physicis versati, qui aptissime distinguat quandonam irritabilitas generis nervosi, seu nimia sensibilitas, quandonam vero atonia & corporis in causa est.

Imprimis eligendus Medicus fiduciam ægri jam adeptus, ubi valet illud effatum; *præstat Medicum esse ægri amicum quam ignotum*; secus æger suspiciosus, indomitus, ferox, ipsius consiliis exasperabitur, ejusque auxilia recusabit.

Vesani sæpe ingeniū acumine polleant, ut hystricæ & hypocondriaci, nec crassæ minervæ dictis aures præbent, vulgaremore ac ut plurimum falsam medicamentorum theoriam vix sibi coherentem risu excipient, ad populum phalaras dimittent. Quis enim nisi stolidus probaret eorum Medicorum opinionem quæ omnes morbus saburæ stomachi, vel horum spirititudini & acrimoniæ tribuit?

Philosophus sit qui morbis animi mederi contendit, cum enim origo horum morborum sit præconcepta idea boni cuiusdam circa quod errat ægrotans, illud vehementer apparens quod bonum sibi videtur, periti Medici officium est, ut ipsi ratio cinando probeat illud quod tantopere appetit bonum esse apparens, & malum reale, sicque cum ab errore abstrahat.

Sed summa etiam in Medico requiritur animi lenitas & flexibilitas, qua diversitate animorum sese accomodat, eorumque fiduciam capter; nam nihil est difficilius, morosiusque vesani, & in omni fere morbo plures, alias maxime rationales, jam morosi evadunt; tempus opportunum ad consilia & monita, nec non ad remedia ostendenda esse caute eligendum; ægris morosis, discedentibus, desperatis, Medicus hilarum & serenum vultum præbeat, mirabundum & tristem ne invites ad risum & jocos, indignantur æger molestem, interpellatorem, ut ejus formidinem pellat, errorem corrigat, mororem diluat, amice & familiariter, ut ait *Klueckhoff*,

seus, at lente & distincte, graviterque argumenta sua proponat, pauca, clarissima, quibus communis omnibus ratio statim assentiri queat; si vel quiddam obscuri, salvè detexerit æger, actum esse solet de toto molimine.

Maxima præterea in Medico requiritur patientia, ne suos conatus, utcumque industrios, dum multoties elusos videt, de perficienda cura desperet, & totum opus derelinquat, ne ægri morosi fastidia & repulsas tolerare recuset.

Maximi momenti est principium erroris & tenebris eruere; non raro hoc celat cautissime vesanus, quem pudet fateri se gravem contumeliam passum, aut bonorum, honorisve jacturam experiri; atqui tamen si ignoretur origo vesaniæ, ipsi mederi impossibile est. Mulier quædam quæ conjugem suum misere amabat, & ab ipso se pariter amaram esse hæctenus crediderat, cum spe sua se delusam percepisset, & maritum perfidum esse cognovisset, animum suo mori firmiter decrevit, nec cuiquam suum aperit propositum; interea vtebat religio, horror suicidii, parentum & natorum amor, quominus subito sibi faceret satis, denum. post nulas inducias vitam sibi subito eripuit. Si vero maritus hoc infortunium vitare potuisset, nihil erat aptius quam ipsius ægræ lateri continuo hætere, eam in itinere quodam grato comitem sibi adungere, sicque mororem & zelotypiam idearum diversitate, & huius viri argumentis diluere; accersitus Medicus varia præscripta medicamina, quæ morbi principium non attigere, & infelix ægra horrenda catastrophe vitæ suæ finem imposuit. *Nichols*.

Quanto in errore versabaneur veteres Medici, qui in vesania fere quæcumque aram bilem pro morbi somite incusabant, eamque acribus helleboratisque cathartici evacuare contendebant. Medicamina nunc acia, si atonia fuerit, nunc lenientia, si erethismus adhuc conveniunt; verum exteris longe præstantiora sunt ut plurimum auxilia moralia. Plura de morbis illis curandis vide in eximio, nuperque tractatu *Corn. Kleuckhoffi de morbis animi ab infirmato senore medulla cerebri*, cujus verba mea facere, dato loco, non dubitabo.

ORDO PRIMUS.

HALLUCINATIONES.

Sunt ille morbi, quorum præcipuum symptoma est imaginatio depravata, erronea. Hallucinantur illi qui vigilantes somniant, id est, apud quos sensationes pro imaginationibus, & imaginationes, seu phantasmatæ pro sensationibus habentur, ut recte monet *ill. Delius*. Dum mens recte se habet, idæz aliz sensum ministratio offeruntur, scilicet objecta colorata, sonora,

ra, sapida percipimus præsentia, & in organis nostris impressiones suas actu exercentia, simulque ope reminiscentiæ ideas universales prædicatorum illis objectis convenientiam repræsentare nobis potest phantasia; unde fit ut eelerii subiecti & prædicati combinatione cognoscamus tale prædictum tali subiecto congruere; v. g. saccharum esse dulce, abinthium esse amarum; cum itaque saccharum ore detinemus, oritur perceptio dulcedinis quam sensationem esse cognoscimus; cum e contra nullo saccharo in ore deitento, hujus ideam nobis repræsentamus, ex surgit phantasma, seu perceptio imaginaria sacchari, quod ab ore cognoscimus abesse; tum quia non per cepimus motus prævios ad illud in os ingerendum necessarios, tum quia perceptio imaginaria multo debilior est sensatione; hæcenus error nullus, tum in sentiendo, tum in imaginando; verum si, ut accidit in somno, sensationes obscurissimæ evadant, ita ut objecta præsentia non apperipiamus, simulque anima objectis externis minime distracta, & tota perceptionibus imaginariis attenta sit, illa percipit motus quos in organis fluidi nervi fluxus & refluxus, arteriarum, & sanguinis motus excitant, qui inter vigilandum debilius non efficiunt quam ut percipi possint, utpote qui multo fortioribus impressionibus obscurantur; tunc anima ideas æque vividas percipit, ac si forent sensationes, cum tamen imaginationes sint, adeoque objecta illa præsentia reputat quæ sunt absentia, inde error qui hallucinatio est; nam anima more somniantium præsentium externorum impressiones non sentit, & internorum impressiones refert ad objecta quibus repræsentandis sunt destinata, quæque proinde præsentia esse reputat, licet sint absentia. Sic insens dormiens saccharum se degustare somniabit, si in ejus lingue papillis aliquis motus a saliva, sanguine, fluidoque nervo exsurgat, qui æstus sit cum speciali sacchari impressione; & cum simplex idea menti refricata, omnes cum illa sociari solitas refricet per legem imaginationis (Cl. VIII. §. 18.) ex percepta solummodo idea dulcedinis, vel viscositatis, vel friabilitatis sacchari, cæteras omnes sacchari qualitates, ut albedinem, in aqua solubilitatem, jucunditatem, percepturus est, quod est percipere in concreto, non vero in abstracto, seu percipere objectum undique determinatum; hinc non mirum si illa imaginatio pro sensatione habeatur.

Anima vigilans similem errorem vitat; quippe ope tactus, visus, auditus, memoria, reflectionisque ea distinguit omnes circumstantias, quarum concursu de objecti præsentia, vel absentia, adeoque de sensatione & de imaginatione recte judicat; errores enim gustus corrigit visus, prævertit auditus, emendat altera facultas; sed in somno defuncta illa adminicula; unde errores illi in dormientibus ita familiares sunt, in vigilantibus etiam obrepunt illi erro-

res, siue impressiones in organo factæ ab arteriis, sanguine, succisve aliis; ita sunt actuales, ut sensationibus sepe æquales sint. Hinc in febribus ob pulsationem vehementem vasorum cerebri, aurium & oculorum, nascuntur tinnitus, marmariges, similiaque phantasmata, quæ nos vehementissime commovent.

Error etiam facile admittitur, si menti inhæreat fixa quædam idea, quæ maximam attentionis partem absorbat, unde anima ad alias ideas rutinandas, recipiendas minus fit apta; inde fit ut qui veneri continuo inhæat, voluptuosisque phantasmatis continuo delectantur, non solum in somnis ex levi seminis titillatione imaginationes veneras, & inde sequentes libidinosos motus experiantur; verum etiam inter vigilandum a similibus phantasmatis detentus & turbatus, momentosis negotiis, philosophicisque studiis prosequendis impar fit, & veluti de rebus veneris continuo deliret.

Hallucinatio itaque pendet a duplici principio, scilicet 1. a fortiori, vividiorque fluidi nervi refluxu spontaneo, seu sine objecti externi præsentia, sed ob motum in organi fibris, arteriis, fluidisque excitatum a causa intussecæ. 2. Sie agitata retina marmariges, vellicato nervo acoustico soni imaginarij percipiuntur. Incuranda itaque & fibrarum nervearum sensibilitas major, seu fluidi nervi nimia mobilitas, necnon motuum sanguinis intensitas, aut humorum major activitas. 2. A defectu attentionis ad omnes circumstantias quæ errorem fugaret, illa autem attentio ad omnes circumstantias deficit, siue organa sensuum feriantur, ut in somno, in anæsthesiis, paralytibus quorundam organorum, siue anima pathemate quodam delecta cupiditati, aut aversioni quidam tota inhærens, cæteras ideas attendere, & accurate perpendere nolit, aut nequeat.

Ex hac vero theoria, praxis hallucinationum deducitur; etenim ad eas curandas. 1. Organi affecti vitiosus status corrigendus est, sic ablata macula corneæ, ablato retinæ infarctu, visus errores qui ex his pendebant, corriguntur; immixto sanguinis fervore & imperio somnia terrefica, quæ a plethora quæ calore oriuntur, evanescent; alia vero auxilia sunt moralia, & repetuntur a recto libertatis & aliarum facultatum usu; sic physici ut errorem in suis indagibus vitent, summa attentione, acri studio, meditationeque utuntur, opinia instrumenta ad visum auditumque acuendum adhibent, mensuras accuratas sedulo capiunt, & sic errores sapienter vitant, quam solidi, rustici, aut qui cupiditatibus suis, voluptatibusque sensum mancipati, suis fluctatibus excolere negligunt.

Hallucinationes visus auditusque sunt omnium frequentissimæ; dantur enim tactus, ut in artubus dudum amputatis, gustus in febribus, necnon olfactus; sic in epileptico Morgagni fortis perceptionem imaginariam ob-

servavit *Epist. XIV. 28.* hæ hallucinationem una sunt morbi, sed tantum aliorum bonum coincidentia eaque anonyma.

I. VERTIGO; Græcis, *Dinos, Scotodinos, Scotoma* Græcis *Vertige, tournoyement de tête.*

Est hallucinatio qua objecta licet quiescentia e loco moveri vel gyrum versari nobis videntur. Ipse æger sibi quandoque mutare videtur.

Causa vertiginis est eadem impressio facta in retina quam reapse inducerent objecta sit visa imaginem suam in diversis retinæ punctis successively depingerent. Non autem in omni vertigine repræsentantur menti objecta visus seu quantum colorata & collustrata, quippe oculis clausis vertigo etiam datur, & tunc objecta tactus quorum colorem non percipimus, videntur e loco moveri licet quiescant. Sic in lecto jacens vertiginosus lectulum suum retrorsum, sinistrorsum, vel dextrorsum præceptu ruere vel inclinare imaginatur, & ne cadat ipse metuit. Est ergo vertigo tactus, ut vertigo visus, atque utraque sit per eadem organa, cum nervi visorii simul tactus sensationem referre queant, cum non repræsentant objecta visus.

Principia vertiginis sunt ea quæ valeant successively agere in diversa retinæ loca, non secus ac agent radii ex objecto circumgyrante vel motu procedentes retinam immixti: nam ideo non sumus vertiginosi cum objectum transiens dextris ad sinistras suam imaginem depingit in retina continuo loco motam, aut oculo gyrante huiusmodi objectum quiescens, cuius imago percurrit oculum, quia novimus saltem confuse nostrum oculum, vel illud objectum moveri; sed si ignoremus nostrum oculum moveri, & credamus objectum v. g. murum esse immobilem, tunc motum illius objecti percipientes illud moveri imaginamur, in quo hallucinamur, non deliramus tamen; quia errorem nostrum statim corrigimus ope iudicii & aliorum sensuum; interea in paroxysmo ita hallucinamus, ut castrum illitro seu lapsum & domus & nostri corporis ab altero vix separabilem nectamus, quodque ad tremorem & palpitationem usque.

Inmotus balbo oculi & muro videbitur objectum moveri. Si lens crystallina, cuius motus non appercipimus, dextrorsum vel sinistrorsum inclinetur, quod accidit, si fibræ coronæ ciliaris, quæ in statu sano hinc & inde sunt æquilibres, spasmo quodam contrahantur, ut accidit in vertigine hysterica & hypochondriaca: 2. Si globuli cruriosi, qui percurrunt reticularia vasa retinæ, insolito modo moveantur; motus progressivus cruriosis in illis valis est ita affectus, ut a nobis non percipiatur, ut non percipiunt pulsus arteriarum labyrinthi, nec molitor motus suæ molitorinæ; sed si motu retrogrado sanguis arterias illas percurrat, tunc

influxu illa actio in retinam novam in nobis sensationem excitabit.

Sanguinis motum retrogradum dari in vasculis minimis arteriis a levissima mutatione morbifica, observant omnes qui circulationem sanguinis ope microscopii in ranæ pedibus, melenterio, cauda piscis, &c. observant. Ipse eenties hunc motum sanguinis retrogradum observavi, & alitè videndum præbuit: vidit deinceps æpius *Ill. Hallerus*: Vide eius commentaria de motu sanguinis *sect. 4. exper. 64. ad 82. Lausana. 1756.*

Ita libere promovetur sanguis ex truncis arteriarum in extremos ramulos, ut levi enato in venulis obice sanguis ille in arteriolas & ex illis in truncos regreditur per aliquot temporis secunda, rursus progreditur in venas, rursusque retrogrado motu in arterias influxit. Ille vero obex est vel crassities sanguinis, vel ejus plethora, vel frigus, vel ligatur, vel spasmus viam coarctans in minimis vasculis, hinc totidem vertiginis principia. Cuni autem oculis apertis & sub luce hic retrogradus motus accidit, successively diversa retinæ loca afficiuntur non secus ac si objecta præsentia loco moverentur, & tunc datur vertigo visus, quia refertur ad objecta visibilia: si vero oculis clausis aut in tenebris similis motus retrogradus datur in retina, tunc non videre, sed sentire tantum, seu tactus quodam confuso percipere horum objectorum vicinorum motum existimamus. Sic cæcus in suo sedili quiescens existimat sedile retrorsum inverti, vel ad latum alterutrum inclinare & delabi, quia impressio in retina facta, licet non visibilis, eandem est ac si reapse labasceret sedile, nec ullum objectum visibile, sed tantum tactile perciperetur.

In retina vero ille motus retrogradus est magis sensibilis quam in ullo alio organo, quia retina est tota nervea adeoque valde sensibilis. Secundum quia cum venulis careat, ut patet ex theoria suffusionis reticularis, illa minime est affluata motui retrogrado, cum aliz partes nervosæ quæ habent venulas arteriis contiguas motui retrogrado sanguinis per venulas suas sint affluatæ. Ductæ experientia impressiones ab objecto visibili factæ in retina aliquot secunda perseverare etiam remoto objecto, ut patet ex zona flamea quam cernimus, cum titio attentus præ oculis in circulum versatur; ergo si corpus nostrum in gyrum agatur circa suum axim, cum semel steterit, vertigine corripiemur fugaci, quippe impressio objectorum circumgyrantium aliquandiu post in retina remanebit.

Idem accidit cum ex alta parte flumen prætersuens attente intui sumus, vel rotam velociter circumactam, vel alterum motum, maxime si errorem vel motum incutiat; clausis etenim subito oculis aut alio directis adhuc dum moveri objecta iudicamus, quæ quiescunt; terror autem, extreme vasa membranasque constringens, motum retrogradum sanguinis

guinis excitat in retina ut in aliis organis; unde hallucinatio sustinetur.

Similis motus retrogradus in auribus tinnitum vel sibilum excitat, unde non mirum vertiginosis aures sæpius tinnire; cum ab eodem principio in auribus ac in retina sæpe sanguis retrogrediat.

Qui vero tribuunt vertiginem majoribus arteriolarum retinæ oscillationibus, illi ignorare videntur quod illæ oscillationes, & turgescentiæ excitent tantummodo suffusionem reticularem, qualem experimento singulari excitare valens. Vide *suffusionem*.

Hallucinatur vertiginosus: non vero delirat: delirium enim est error constans. qui a facultatibus animæ superstitibus corrigi non potest, quippe pendet a visio sensorii communis, ut in mania, melancholia. Hallucinatio est error fugax qui pendet a solo vitio organorum externorum, quippe ab ipso iudicio & reflexione salvis facile corrigitur, ut qui globulum digito indice & medio superimpolitis palpando duplicem globulum se tractare statim putat, aut qui flexo ope digiti oculo duplicem faciem accensam putat, cum unica est.

Licet sit vertigo tactus, ut vertigo visus, ultimæ etiologiam tradidisse sufficit, cum quæ de posteriori dixerimus, mutatis organis, de priori facile intelligenda sint.

Vertigo visus, est illa in qua reapse objecta tantum circumgyrancia in oculis depinguntur, licet sint immota, aut motum ab eo diversum obtineant.

Objecta moveri videntur, vel quia reapse, moventur, vel quia illis immotis, oculi nostri aut quædam eorum partes nobis inscitis moventur eo modo qui ad successivum obiectorum in oculi partibus diversis delineationem requiritur.

Cum autem situs imaginis in retina, sit e directo objecti, quæ sunt in latere dextro pinguntur, ad sinistram retinæ, quæ sunt in summa pinguntur in ima oculi parte, & reciproce. Ergo si eadem fiat impressio successiva, in oculo a dextris ad sinistras, quæ ab objecto circumgyrante, seu ad eadem a nostris oculis distantiam modo accidit, obiectum a sinistris ad dexteram circumagi videbitur. Et si imago objecti juxta axim oculi moti successively clarior, distinctior, & major appareat, obiectum ad nos accedere, secus vero a nobis recedere videbitur.

Insultus vero vertiginis fugax est, licet, quandoque repetitus & interpolatus, vix ultra temporis minutum unquam quæ insultus perseverat, sæpius intra minuti tridentem, imo quadrantem definit.

Polus opticus est pars oculi pupillæ e directo opposita, ille polus opticus non multum distat ab insertione nervi optici, qui versus canthum nasalem est, in mediotulio ipso nervi optici est arteria centralis dicta, quæ nullam venam comitem habet, quæque in retinam ramulos suos e centro ad circumferentiam tanquam radios dimittit; venulæ vero ab aliam viam persequi videntur.

Si oculis parietem album proximum respicientibus, lucem retro accedentem, solarem non eam directam, sed reflexam accipiat paries, observator vidit in muro reticulum obscurum, quavis articularum pulsatione apparentem, mox evanescentem.

Cum vero venulæ sint arteriolarum majores, si nullum reticulum superfit, cum arteriæ sunt in syphole, nullas venulas saltem arteriis dilatatis æquales retinæ asidere verosimile est; ergo nullum est in retina, vel magis distitum est reticulum venosum.

Juxta quancumque plagam lumen oculis prætergrediat, hujus imago sequitur lineam curvam quæ a circumferentiâ incipiens versus polum opticum accedit.

Lens crystallina polo antico corporis vitrei affixa limbo suo adhæret membranz vitreæ; circa hunc limbum radiatim dispositæ sunt fibræ nigricantes alternatim breviores & longiores, quæ coronam dictam ciliarem constituunt, quæque videntur a ligamento ciliari procedere & in limbum crystallini terminari; si paulisper contrahantur illæ fibræ, nihil facilius videtur quam quod lentem crystallinam ex eodem latere paululum depriant, & ex opposito attollant.

Si lens vitrea cameræ obscuræ foramini opposita transmittat imaginem objecti immobilis, eamque depingat in pariete opposito, docet experientia quod si immoto objecto lens vitrea sola inflectatur; imago locum suum fecit movere; ergo si lens crystallina per coronam ciliarem tractionem inflectatur, imago obiectorum movebitur, seu obiecta loco moveri videbuntur, licet immota sint.

Si globus ipse oculi circa suum nervum opticum huc vel illuc inelinet, nec hujus motus anima sit conscia; evidens est quod obiectorum licet quiescentium locus apparens mutandus sit, seu obiecta circumgyrari videantur. Si vero anima hujus motus, quæ per musculos rectos aut aliquos perficitur, sit conscia; tunc nulla subsequatur hallucinatio.

Illæ tres hypotheses phænomeno vertiginis explicando sufficere videntur, pro diversis circumstantiis, eo tamen discrimine quod si bulbus oculi loco moveatur, quoniam ille motus milies in die secutus est imperium animæ, milies in die connexus est cum conscientia illius imperii, adeoque vix fieri potest quin hæc connexionem appercipiamus; sed si appercipiamus hunc motum dependere ab animæ imperio, nulla vertigo secutura est; ergo ab hoc principio vertigo dependere non potest.

Motus quidem crystallini minime pendet ab imperio animæ, & omnino inasuetus est, nec eorum speculo in nobis ipsis, nec in aliorum oculis percipi potest; si itaque accidat, anima eius non erit conscia, adeoque inde hallucinatio vertiginem constituens oriri poterit.

Verum eam non esse vertiginis omnis causam ex eo sequitur quod vertiginis tactus explicandæ non sufficiat, cum supponat oculos apertos.

& in.

& in luce constitutos, vertigo vero tactus etiam oculis clausis & in tenebris nocturnis accidat.

Superest itaque prima theoria quæ utrique vertigini explicandæ sufficere videtur, quæque proinde fusius est examinanda.

Si ranz vivæ membranarum quibus ejus digiti connectantur microscopio solari subiciamus, videbimus rivulos sanguinis & lymphæ, quorum alii corde recedunt, & arteriosi sunt, alii ad hoc accedunt & venosi dicuntur, vasa vero ipsa minime appercipimus. At ubi animal vel conatu exagitur, vel pungitur, vel quomodocumque perturbatur, nihil est frequentius quam quod videamus motum sanguinis progressivum in retrogradum mutari, ita ut globuli sanguinis ex venulis in arterias resiliant, & per aliquod temporis spatium, v.g. seminuntium, vel arterias versus cor retrocedant, pristinum iter mox recuperant, aut inter aliquot oscillationes in hoc alterno progressu, & retrogressu hæsitant; hoc phænomenum ante viginti annos Philiastris sapius ostendi.

Illud autem quod in minimis vas cylindricis familiare est, in majoribus difficilius accidit, quippe in Majoribus arteriis vis sanguinem a corde ad extrema protrudens eo major est quo cordis proximiora & majora vasa sunt, & non nisi vi majuscula ipsi æquali adhibita potest sanguis resiliere; in minimis vero vasculis sanguis subsequens non agit in antecedentem, sed communi eaque exigua velocitate ambo procedunt, ita ut illi rivuli velut aquæ gutta in tubo vitreo horizontali posita, ad progrediendum & retrogrediendum æqualiter proni videantur.

In nova sanguinis theoria probavimus pulsationem vasorum pendere ex eo quod sanguis subsequens cum majori velocitate progredi conetur quam antecedens, sique in antecedentem & proinde in parietes eum continentes agit, atque ratione contrariorum, ubi nulla est pulsatio, consequens est sanguinis subsequens in antecedentem nullam esse actionem, in extremis autem arteriis microscopium nullam pulsationem ostendit.

Hinc sequitur quod reticulum, quod in retina formant vasa in experimento superius allato sensibilia, non depinguntur in arteriis ultimis; quippe cum vasa hoc reticulum depingunt pulsant, nisi tamen alia sit circulatio in tunc, plicibus & mesenterio catellorum in quibus eadem observantur, alia vero in oculis hominum, quod vix ullus admittat Physiologus.

Nihil itaque verosimilius est quam quod in eisdem circumstantiis in quibus sanguis per arteriolas minimas animalium prædictorum retrogradatur, sanguis etiam arteriolas retinæ humanæ præteriens resiliat.

1. *Vertigo pathologica* Junkeri; *Idiopathica* Pitarrii. B. P.

Ea est quæ sanguinis nimis copię tribuenda videtur & per plethoram intelligi potest; a plethora scilicet ob molem movendam majorem & afflictus adauscos sanguinem in ultimis vasis re-

tardari prout est; sed ut sanguis in minimis vasis retardatur, vis quæ progreditur tantumdem imminuitur, atque vi triviali ejus imminuta facile sanguis a minimis vi huc vel illuc movetur, atque resiliere potest; ergo a plethora intelligitur possibilis vertiginis.

Cognoscitur vertigo plethorica a prægressis, comitantibus, a juvenilibus & lædentibus. Prægressa, ut in ingurgitata avida, copiosa excrementorum cupeptorum, cum fame, vis digestiva fortior. Comitantia, pulsus plenus, facies turgida, rubra, segnities, lassitudo, catameniorum, hæmorrhoidum, perspirationis suppressio, venarum curansarum tumescencia. Juvenia, vertiginosi illi mane post inediam, vel exercitium melius habent, eruptis catamenis, hæmorrhagiis narium, perspiratione, clysmatis, melius habent, & contra ab epulis, a somnolentia, ignavia, post pastum pejus habent.

Si plethora sit magna, & cerebri debilitas, ex vertigine forti succedere potest apoplexia, epilepsia vel alius gravis affectus, in quo casu medicamentis negligenda non sunt; in fugaci vero vertigine diæta tenuis sufficit.

Curatio 1. Imminuenda est plethora; 2. Sanguis a capite est divertendus. 3. Vasorum oculi robur est denique adaugendum.

Imminuitur plethora 1. victu parciore, &oque fluxiliori, quippe plethoram viscositas sanguinis facile comitatur; 2. auxiliis catamenia, hæmorrhoides revocantibus, phlebotomia ex brachio, clysmatis, imo catharticis, sed phlebotomia directe subitoque idem prestat.

2. Derivatur sanguis ad partes inferiores seu erecto, capite elatiori; non horizontali, collaria solutione, seu plenaria colli & thoracis, cingulorumque abdominis libertate, clysmatis, phlebotomia & talo, lavipedio, frictione extremorum, catharticis.

3. Roborantur vasa oculi medicamentis tonicis, cephalicis specificis; huc spectant potus theiformes ex infuso florum salviæ, lili convallium, tiliæ, ex decocto chinæ, pauco vino & aqua ferata, potus cassiæ tenuioris; medicamina sint sterues pavonis siccum ad scrupulum, *Pitarrii* laudatum, succinum ad grana decem vel ejusinductura, sal &c. & quæ ab omnibus celebrantur, kinina ad ʒss. bis in die; syrupus marialis vel limatura ferri parva dosi diu usurpanda.

Caendum in plethorica vertigine ab aquis acidulis intus sumptis, & suspectis etiam chermæles porandis; vitanda insolatio, luctuatio, magna lux, animi contentio, capitis pertinax inflexio sursum deorsumve, lectio assidua; iteratæ purgationes nocent in plethorica, magis vero in hysterica.

2. *Vertigo stomachica* Aretzi; ab *obstruati*, *influxu* Riveti; *sympatica* Pitarrii. B.

Ea est quam præcedunt apoplex, nausea cardialgiæ, crampæ, vomitus, oris parvus sopor, odor, pondus epigastrii, tubercinatio, quæque

2. cruditatibus primarum viarum sanguinis masculini insipientibus pendere censetur, aut non ideo stomachica censenda est vertigo, quam nausea non præcedit, sed subsequitur; omnis enim gravis capitis affectus, ut fractura cranii, cephalalgia non raro vomitionem excitat, etiam si stomachus prius bene se habeat. Illa species est frequentissima omnium, si *Villiso* credamus, & comes est assidua initio morborum acutorum, ut synochi cum cephalalgia gravativa.

Curatio exigit 1. ut phlebotomia præmittatur, nisi æger frigeat; pulsus exilis sit, temperamentum pituitosum, subiectum senex, debile &c. 2. ut præmissio clysteris, si alvus stricta sit, vomitio cietur ope tartari vel vini emetici magna aquæ tepidæ copia diluti, & pacatis dosibus sumpti; sic pro adulto, uncia vini emetici in tribus aquæ cyathis quovis horæ quadrante ad sumendum sufficit. 3. Sequenti die catharticum est præscribendum faræ effricæ, additis, v. g. tabellarum diacarthami drachmis aliquot in portione communi. 4. Dein stomachus usu castæ, cinnamomi, cortici VVinterani, kinkinæ, vino rubro opata Salomonis, roboratur. 5. In paroxysmo spiritus salis ammoniaci, aqua Lucæ, acutum naribus offerantur, extrema fricentur, penna fauces irriterentur, aqua tepida ad vomitionem pronus excitetur. 6. Denum stomachicis martialia, kinkina, antiepileptica addentur, inter ea laudatur a multis radix doronici pardiachnes *Linnaei*, ad scrupulum, quæ majori dosi suspecta, nisi tantum in loco gestetur, ut funambuli consueverunt.

3. *Vertigo hysterica* Etmuller. pag. 36. vel *hypocondriaca*, *vertigo vaporæus*. B. P.

Est species quam magnæ nervorum sensibilitati aut irritabilitati tribuunt Neoterici; vaporibus Veteres, spasmodicis motibus Bagliviani, sanguinis siccitati, nervorumque tensioni plurimi.

Hæc species studiosos, meditabundos, melancholicos, ingenio acuto præditos pertinaciter di vexat, austro flante petissimum hystericas, hypocondriacos; epilepticos infestat, a metu, curis terrore facile nascitur, remediis evacuantibus repetitis, stimulantibus gravibus exasperatur, anodynis leviter narcoticis, laxantibus, emollientibus cicuratur; summo terrore & angore æa animum percellit.

Novi hysterica quæ si templum vacuum ingrediatur, lapsum metuit & vertigine afficitur; minime vero si in media turba ipsi prætereundum sit: Alteram vidi, cui per vias progredienti pavementum videtur instar gossypii cedere & intro premi, unde continuo lapsum ad anteriora metuebat. Sæpe vertiginosum caput suum quasi vacillans & non satis collo coherens imaginantur: illa capitis instabilitas, necnon idearum confusio quam Gallicæ *étourdissemens* dicimus, sunt quando sola symptomata quæ ad hoc vertiginis genus referuntur, ubi tamen nulla est objectorum nutatio; supponit torporis quæ nomen huic ultimo symptomati experientia impar est;

quam multa sunt quæ adhucdum ita parum sume cognita, utcumque familiaria, ut nonine proprio creant: talis est status eorum quos *astonites* vocamus.

Curatio. Strictior dicta non imperanda est, somnus, quies concilianda est, studia, contentiones animi, curæ viandæ sunt, inedia in picrocholis fugienda; ubi principium morbi non satis est cognitum, ad specificæ & hysteriæ convenientia remedia confugiendum est, temperamentum occulte consulendum, sic in mulieribus hysteriis frigidis, p. tuitosis, adiposis, pulvis casearillæ, cortex VVinteranus, castoreum, guttæ minerales anodynæ conveniunt cum kinkina & martialibus, floribus calendulæ, pulvis temperans *Stabilit*, in fœcis, macilentis, calidis portiones & pulveres cum nitro, julpia acidulata, serum lactis: paucæ guttæ laudani momentis *Piscario*; ab emeticis purgantibus, repetitis catharticis eodem docente abstinendum; sæpe morbus est contemendus & eo gravior evadit quæ plura medicamina adhibentur: externa non nocent, ut spiritus vini camphoratus; aqua Reginæ Hungariæ, Carmelitarum, cum spiritu cornu cervi cervici vel temporibus admoveantur, haustus vini post passum usurpentur.

Acidulas ferrugineas potandas suadet *Heisterus*; balnea & juscula leviter aperientia tutoria videntur.

4. *Vertigo fugax* Sennert. *Vertigo accidentalis*. B.

Est quæ motu verticose corporis nostri vel aspectu corporis in motum acti ex alto potissimum visi, maxime si motus sit, excitamus; illa vertigo paucis secundis temporis cessat; an vero præter durationem impressionis factæ in retina motus centrifugus impressus sanguini retinæ ex eo latere versus quod gyramus excitat sanguinis regressum ex arteriis in suos truncos? hoc suadere videtur observatio eorum qui oculis clausis gyrantes vertiginem incurrunt? quorum vero, ex hoc verticose motu sequatur vomitio? an ex illa succussione alimenta in ventriculo versata ventriculum irritant? an inde vomitus marinus in procellis crescit?

5. *Vertigo ab ictu* J. Sculteri Armamentar.

Ictus capite exceptus, concussio a lapsu vertiginem excitant, ob contrictam a dolore & spasmo subsequente coronam ciliarem, unde refluxit sanguis in arteriolas centrales nervi optici.

Duratur phlebotomia repetita, & si fractura adfuerit, eadem auxilia quæ in apoplexia traumatica conveniunt.

6. *Vertigo a venenis*.

A *lapis* & ab *opio*, ut docent Ephemerides Natur. Curioforum: Vide tabulam illustr. Buchneri.

A fumo *Uthontactis* & *calcis*, necnon vapore minerarum: Vide Ramazzini de morbis inauratorum, calciarum, &c.

A vino, seu vertigo ebriorum. A *cerevisia*. Vide Sennert. de vertigine.

Ex tabacco. Vide Ephemerides Natur. Curioforum.

Ex *foliis scilicet* manducatis capellæ vertiginosæ evadunt.

Mulier, sumpto jusculo in quo folium hyoscyami albi fuerat incoctum, patiebatur vertiginem in qua caput collo minime adhaerens videbatur, corpus vero in aere suspensum existimabatur sine delirio, quippe ratio seu intellectus hanc hallucinationem apprime corriperebat.

7. *Vertigo ovula*, Boneti sepulchr. Obs. 8. Morgagni Index 2. de vertigine.

In ove quae se per intervalla quotidie saepe circumvolvebat, nec sibi caput tangi ferebat, *Vassalva* invenit folliculum aqua turgidum in bōve cerebri, cujus pars corrupta os ethmoideum carie affecerat, inde in nares exstillabat serum. In decem vertiginosorum capitibus *Morgagni* serum effusum invenit: inde fonticulorum & pulveris de guttota usus indicatus videtur.

8. *Vertigo syphilitica*, Frambesarii Lib. II. Conf. 3. Etmulleri cap. 8. p. 365.

II. SUFFUSIO; *Scotoma* Heurnii Med. Pract.

Suffusio Latinis; *Hypochyma* Graecis; *La Berlus*.

Genus est morbi imaginarii, cujus praecipuum symptoma est hallucinatio visus circa objecta, ita ut suffusi ea videre sibi videantur quae non sunt, ut muscas, colores, scintillas, quatum imaginum prototypus extra oculos non exiit. *Vide Ophthalmiam 18^{am} & 19^{am}*

Differt a vertigine, quod *suffusio* repraesentet substantias aut corpora quae non sunt: *vertigo* vero modificationem corporum, scilicet motum, ita ut in suffusione corpora quae non sunt, & in vertigine corporum praesentium motum qui non exiit, imaginemur.

Imaginatio est facultas percipiendi absentia; error est imaginationis, si ea quae non agunt in sensu, actu praesentia existimemus: hoc accidit in suffusione, qua sit ut videre nobis videamus scintillas, telas, muscas, fulgura, ut actu praesentia, licet absentia.

Error vero qui circa visibilia versatur, *opitius* vulgo cognominatur, isque vel originem ducit a iudicio temerario & praecipiti, sine vitio cerebri, vel oculi, talis error ad Logicos attinet. Multiplices vero sunt huiusmodi errores; sic fere omnes existimant, dum navis a terra recedit, terram ipsam recedere: in rheda agros vicinos retrogradi, qui error vertiginosus etiam circa motum Solis omnes, exceptis Astronomis, occupat. Sunt etiam errores suffusioni affines millei, sic baculum aqua semimerulum fractum putamus, turrim eminus aspectam non cylindricam, sed planam, solem luna non majorem & utrinque superficem planam; plebs in ipsi faciei humanae varias partes videre se putat; sed haec a vitio corporeo non pendunt, unde ad forum medicum minus attinent.

Erroris vero optici morbofi, vel a vitio cerebri, vel a vitio oculorum potissimum oriri censetur; qui a vitio cerebri circa visibilia

versantur, sunt suffusiones, vel vertigines graviores multis symptomatis stipatae, ut sopore, convulsione, delirio, & ad alia genera referendae sunt, ut phrenitidem, maniam, paraphrosynem, melancholiam. Verum error opticus a vitio oculorum oriundus sit praecipuum symptoma, tunc genus proprium constituit, ut vertiginem, vel suffusionem.

Error ab organi externi, non vero cerebri, vitio oriundus vocatur apud *Placrum* *hallucinatio*, ut a delirio distinguatur, cujus principium est in ipso cerebro; adde quod hallucinationem cito & facile corrigimus aliorum sensuum auxilio, ut ope tactus, auditus; delirium vero eo modo non facile tollitur, quia functiones mentis ad eam correctionem necessariz impediuntur a vitio ipsius cerebri, harumque functionum praecipui instrumenti: sic vulgo consentiunt Medici vertiginosos & suffusos minime delirare, qui tantum hallucinantur; aut delirant melancholici, maniaci, phrenetici, &c. Errare est acquiescere iudicio falso, quale est iudicium suffusi, qui percipiendo imaginem muscae, inde praecipitanter insert adesse muscam; iudicium vero salum est quoties praedicatum non determinabile est per notionem subiecti; cum vero perceptio est confusa, ut in suffusione, non datur vera notio quae distinctam ideam involvit; ergo ex umbra fusca, vel nigra per errorem muscae praesentia inferant. Hunc vero errorem facile corrigit suffusus, cum manum praetendens in loco ubi musca percipitur, nec quidquam tangens, sic ratiocinatur intuitive: *Contradictorium est esse muscam ubi ejus imaginem percipimus, & tangi non posse, sed contradictorium alterutrum est impossibile; possibile vero est imaginem muscae in oculo impressam huc ab anima referri, qua tangi non potest, & sic ab errore suo liberatur suffusus.*

Mirum certe est, cum objecta tantum percipimus interventu imaginis in retina depictae, eam imaginem minime a nobis percipi, sed ad objecta quae videmus hanc sensationem referri; hinc consuetudine ducti, ubi datur in retina imago objecti, licet confusissima, inferimus dari extra oculum objectum huic imagini respondens, & si quid in ea deficiat, imaginatio cetera supplet. Sic ex imagine meram umbram determinatam circularem referente imaginamur adesse muscam, vespam, vel crabronem, adeoque huic maculae obscurae imaginatio alas, pedes, proboscidem, aliasque insecti partes addit. Haec enim est lex imaginationis, ut quoties idea simplex menti obversatur, toties accedant idem, quae priorem concomitari consueverunt, ut idea loci, temporis ab imaginatione additur omni narrationi indeterminatae; verbo imaginatio objecta universalis non amplectitur, sed tantum individua, seu undequaque determinata.

Obiectum quod imaginatione percipimus tantquam praesens, vocatur *phantasma*, a phantasia, seu imaginatione; diversa sunt phantasmata

in diversis suffusionis speciebus; præcipuas hic delineabimus.

1. *Suffusio myodes*: *Scotoma* Heurnit de vertigine. L.

Orchides quarum flori insidere videntur muscæ, vespe, crabrones, similiaque insecta volitantia, a Botanicis *myodes*, seu muscis similes cognominantur; ære suffusionis speciem simile quoddam insectum in ære præ oculis volitans representat; at si oculus fixus chartam inspicit, cito percipimus hanc muscam fixam esse, nec moveri, nisi moveatur oculus. Calculus dioptricus suadere videtur maximam distantiam ad quam hoc phantasma seferetur, decem vel duodecim pollices circiter non excedere; notum est autem apud opticos objectum non videri in loco ubi est, sed tantum in foco virtuali, unde radii in oculum perveniunt, aut pervenire censentur.

Optimi quoad visus aciem, organique pelluciditatem, & figuram oculi, huic morbo sunt obnoxii; verum presbytri & myopes ab hoc non sunt immunes. Error fuit opticus veterum Medicorum asserere in oculo suffuso se percipere quid opaci tanquam cataractæ rudimentum, quod huic phantasmati principium præberet: error vero ille ex præconcepta theoria obtebatur; hinc factum est quod suffusionem tanquam symptomam, vel focum, vel prodromum cataractæ plures etiam hodie habeant, licet experientiæ sapienter repugnet.

„ Interui aliquando (ait P. Doehales Optic. lib. 1. cap. de suffusione, pag. 402.) Medicorum satis peritorum consultationi circa morbum quem aliquis ex nostris patiebatur: cum autem ex suis tantum principiis loquerentur, nec opticas rationes advocarent, mirum quantum in re alioquin facili hallucinabantur; conquerebatur ægrotans quod fere continuo sibi obversari videretur aliquam notam obscuram instar muscæ alicujus volitantis, & omni objecto insidentis; vero aliquid molesti sibi contingere asserbat. Re diu inter eos agitata, talis fuit sententia: hujusmodi notam esse rudimentum aliquod cataractæ, quæ pupillæ insideret; imo aliquis eorum perspicacior inspectis diligentius ad lucem oculis, se in medio pupillæ eam notam videre asserbat; ridebam ego tacitus, nec multum eos hallucinari dolebam, cum ex hoc illorum errore nihil mali ægroto contingere præviderem.

„ Hypothesis horum Medicorum, quales etiam nunc hodie non desunt, admittebat concretione, quandam opacam in humore aqueo, (Nuperi vero potius in crystallino,) quod tamen pupilla minus sit, secus occultaret omnia objecta. Verum illa molecula opaca primo intuitu Medicorum facile cognosceretur, cum tamen oculi suffusorum sint maxime pellucidi, secundo hujusmodi concretio inter crystallinum & corneam latens minime repræsentaret unquam quandam determinatam limitibus circumscriptam & opacam; quippe cum nulla sit pars

corneæ & pupillæ, quæ ex omnibus circumstantibus objectis non recipiat radios, similis concretio, quæ totam pupillam non obturat, minime potest impedire quā omnia objecta circumstantia videantur, seu nullam objecti cuiusvis partem potest occultare, nec proinde notam opacam determinatam referre; atque id tantum efficere potest, ut paulo minus clara, seu illuminata sint omnia objecta, cum ex singulis aliquam partem radiorum interceptat.

„ Illi certe Medici magis errant quam plebs quæ hujus morbi causam esse putat, quod æger felix cuiusdam mortis adfuerit, cum error eorum facilius demonstrari possit, quam plebis opinio refutari; sed quoniam inutilis est demonstratio adversus eos qui vim syllogismi demonstrativi non sentiunt, quive & Logicam & Mathesim contemnunt, satis est ad experimenta provocare; itaque illi vel in oculo artificiali, vel in telescopio vitrum objectivum æramento partim obscurum, vel corpusculis opacis tegant; dein per tubum oculum aspiciant, ac ætoniti percipient se non minus cælum in tota suo ambitu videre, quam si nihil fore interpositum, nec ulla maculas, aut umbras videre.

„ Alterum facilius experimentum instituunt: caput scilicet aciculæ corneæ admoveant; quo proprius est oculo, eo melius; illud aciculæ caput nullum objectum occultabit, nil umbræ aut opaci ante oculum cernet qui id experitur. Si tamen caput aciculæ ad plures lines removeat, tunc illud & pellucidum ut nebulam videbit, & illud mole maxime autum apparebit. Iterum illud caput aciculæ removeat ultra pollicem, & tunc radiis ab eo reflexis & coloratis videbitur, cujus tantum umbra prius conspiciebatur: consula tamen erit visio ulquequo quatuor circiter pollicibus a corna distitum fuerit, quia in minori distantia radii in oculum procedentes, & ter refracti minime possunt, ut par est, in retina adunari, sed a crystallino divergentes, aut ad summum paralleli ad retinam tendunt, cum ad visionem distinctam necessum sit, ut pæne crystallinum radii convergant, & focus suum in retina habeant.

„ Si calculus dioptricus insisteret circa concretum quoddam opacissimum in ipsius corneæ substantia hærens, ut leucoma, queraturque num oculus illud sit percipitur, vel umbram distinguere possit, inveniunt radios in retina denique pertingentes fere dispergi tanquam a centro convexitatis pollicæ crystallini, adeoque nullam hujus concretionis delineari pene imaginem, nec umbram; ultimus focus est scilicet in centro ipsius crystallini, vel e. 8. lin. ab ejus superficie postica distat.

„ Necessum est itaque ut pone medietatem crystallini postum sit illud quod radios interceptat, & quo proprius erit retina, ut in vitro & retina ipsa, eo fortius expressa erit illa musca imaginaria; radii scilicet qui incident in corneam

neam ex omni hemisphaerii puncto, quod stupendum est, in singula cornae & pupillae puncta perveniunt; sed cum coni lucis inde procedentes inveniuntur, quilibet conus a puncto dato hemisphaerii procedens lenum separatur ab aliis magis ac magis, ita ut ad retinam pervenit. apex ab aliis omnibus conis distinctus sit omnino; adeoque sit quoddam sit in retina punctum, guttula v. g. cruoris, rectum, adeoque radii lucis extrinsecus adventuris impervium, illud retinae punctum non poterit recipere conum lucis, cuius apex ibi est, & basis in tota cornae superficie, nec proinde partem objecti cuius radii conum prioris inversum constituunt.

Sit guttula cruoris effusa in textu retinae, illa cum opaca sit, recipiet radios ab extra venientes & loca determinato, & ille locus obscurior, vel nigriens videbitur; et tunc diameter illius umbrae 8. 7. viciibus maior: docet autem dioptrica quod maxima distantia ab oculo ad quam referretur illa imago, futura sit 122. linei, seu 10. pollicibus aequalis.

Cum autem magnitudo apparens ejusdem objecti crescat prout longius ab oculo protenditur imago, sequitur suffusus eo minorem muscam visuros esse, quo propiori objecto insidebit; ita ut si librum legamus, quo magis ad oculos eum admovebunt, eo minor ipsis apparitura sit musca libro insidens, cum & contra objecta extra oculum posita eo majora videantur, quo propius oculis admoveantur.

Verum illa musca nec noctu, nec in mediocri luce apparebit; cum enim ideo videatur, quia vicina retinae loca afficiuntur, quae hujus umbram limitat, si illius guttae sanguinis umbra non limitetur, seu si omnia vicina loca aequaliter obscurerentur, nulla musca videbitur; ergo tunc musca debet acri potissimum observari, cum caelum, vel objecta magis illuminata respiciunt.

Ut in levi ecephymosi intra paucos dies cruor effusus calore loci resolvitur, & a vasis vicinis denum resorbetur, atque qua ratione attenuantur globuli, eadem colorem mutant, ita ut ex nigredine sequatur lividitas; dein flavedo, adeoque opacitas in dies minor ac minor evadat; ita & illa musca de die in diem saepe evadunt minus opaca, dein in medio pellucidae ac denique evanescent.

Si tamen concretum magis fuerit, ut apud Barbaevae, qui illico vidit umbram nigram pugni magnitudine, non omnino resolvi poterit eam concretum, unde umbra imminuetur quidem, sed nuchus induratus perseverabit.

Verum post aliquot annos anima hujus visioni alluctata vix afficietur, nisi principium renovatum fuerit, & denique licet primum mali principium perisset, musca omnino evanesceret, quod sequenti experimento elucidabitur.

Notum est ex anastomia nervum opticum a latere interno sine nasali globo oculi inferi, maxime vero in polo optico; notum est ibi co-

actari nervi medullam ita ut ejus diameter circiter semi-lineae, quod spatium subrotundum vocatur *foramen choroidea*, juxta eos qui choroideam esse immediatum visus organum existimant; ut *Mariotte, Le Cat, D. Bernoulli*; in hoc puncto debet desicere visus; notum est pariter arterio-lam centralem dictam ex axi nervi optici intra oculum serpere; ibique pone retinam ramos innumeros, minimos dispergere: cum autem truncus illius arteriae centralis non sit visus organum, radii in illum incidentes nullum objectum debent representare, adeoque idem effectus eventurus sit, ac ex foramine choroideae provenire putat *Mariotte*. Talis autem est effectus.

Applicetur parieti albo ad oculi altitudinem frustulum chartae nigrae pollicis magnitudine, & in eadem altitudine, sed ad octodecim pollicum distantiam altera charta circularis decem pollicum in diametro caerulea; hoc facto claudatur oculus sinisterr: si charta caerulea sit a dextris & recedet oculos ad tres pedes a charta nigra, dum dexter oculus fixo eam intuetur; tunc oculus qui recedendo utramque chartam nigram scilicet & caeruleam videbat, jam caeruleam minime visurus est, sed hujus loco parietem album videbit. Hoc experimentum *D. Gautheron, dein D. Bernoulli & Le Cat* diversis modis tractarunt, & extendunt, sed ad idem omnia recidunt.

Cum eo devenit oculus, ut conus lucis a charta caerulea procedens & inversus in oculo incidat in foramen choroideae, vel in arteriam centralem nervi optici, evanescit charta caerulea: verumtamen hujus loco nulla videtur umbra, nec alterutro oculo aperto & fixo ullam umbram in muro albo percipimus; quia huic umbrae assueti sumus ab ortu, & quae assueta sunt non percipimus, si non percipimus pulsationes arteriarum in auribus nisi multum crescant, nec pondus utatur corporis nisi debiliores evadamus, & hujus umbrae loco videmus album parietem, cuius ratio a sequenti experimento innotesceat.

Sint duo corpora conjuncta, unum album, alterum nigrum, si e longinquo uno oculo errantur, licet aequalia sint, album majus videbitur, & si corpus opacum ad nigrum accedat, tunc album recedere videbitur. *Vide De Chales Optic. pp. 37. 1. 1.*

Ager suffusus utatur perspicillo maxime convexo (*Lunette a camera*) vel microscopio (*lunette, loupe*) & tunc temporis evanescet musca, quia radii fortiores facti, utpote uniti, trans gutturalem sanguinis in retinam agunt, adeoque nulla umbra percipietur.

Curatio a Veteribus tradita inanis est; innoxia; suadebant scilicet Veteres diversa colyria vel innocua, ut sanguinem columbinum, vinum calidum, vaporem aquae vitae, oculis excipiendum, vel acra ut infusum feniculi; ruta, succum chelidonii, euphrasiae, sel diversorum animalium, ut resolveretur concretio.

sio quam ex errore theorico in cornea aqueove humore supponebant; in primo casu inanis, in altero noxia erat curatio, nec medicamina ad principium morbi poterant peringere.

Si sanguis in retina effundatur, illud accidit ut plurimum ex eo quod maximo solis ardore, per iter æstivum sub sole, retina lædatur, ut accidit *Borhaave*; vel ex eo quod sanguis fortius per febre ad extrema vasa impellatur, ut accidit phreneticis, dum natura narum hæmorrhagiam frustra molitur; vel ex eo quod plethoricus sit æger ob suppressas hæmorrhoides, catamenia; maxime si lubricationibus, microscopiorum aut telescopiorum usu, retina fuerit debilitata & veluti inflammata, ut accidit sæpius Astronomis, qui vitro diaphano non obscurato aut colorato eclipses observant. In hisce casibus 1. Vena brachii, pedis, aut juguli est aperienda, & phlebotomia repetenda: 2. Si a solis fervore oritur malum, oculus sero & mane pluries aqua frigida est irrigandus, balneandus, ut successit *Borhaave*; balneis etiam sæpius utendum; si a lectione nocturna ortum ducat malum, ut sensibiles retine quæ in hoc affectu maxima esse solet, compellatur. 3. Si plethora concurrat, useatur victu moderato, auxiliis catamenia, hæmorrhoides revocantibus. In phrenitide per hæmorrhagiam narum maxime liberatur æger ab hisce phantasmatis.

2. *Suffusio articularis.* L.

In ea specie ægri præ oculis umbras tenues & ramosas, invicem reticuli instar connexas, videre sibi videntur, easque arenearum telæ, lanæ earum & similibus objectis comparant.

Hujus vero theoria non magis inclarescere potest quam experimento sequenti, quod quisque capere potest. Sit cubiculum angustum, magnam quidem lucem reflexam, non vero solis lucem directam, accipiens; sedeat quis in hoc ante murum album luce maxime collustratum, atque hunc murum siæ a distantia unius pedis circiter aspiciat simulque anhelitum per vices colibeat; is, na fallor, percipiet in muro fenestræ opposito, quem cominus respiciet, reticulum umbrarum; quod per intervalla accedit & recedit; obscuratur scilicet eo ipso tempore qua arteriæ pulsant, claritatem vero recuperat dum arteriæ contrahuntur; verum, observabit ulterius filamenta hujus retis esse duarum linearum circiter diametro, eorumque margines minus obscuros axi.

Ex hoc experimento rite pensitato, sequitur, filamenta hujus reticuli esse in retina arteriis, nullas vero venulas apparere, licet venulæ sint arteriis multo crassiores, adeoque verosimile est nullas esse venulas in retina, cum nulla sit filamenta quæ non pulsant; sequitur etiam obscurari reticulum dum arteriæ pulsant; claritatem recuperare dum non pulsant, licet plene adhuc dum sint sanguine, & modo non turgidæ; denique arteriolas dum non pulsant minime percipi, seu

umbram earum supra retinam esse inconspicuum nec realem.

Ex hoc experimento & ex theoria suffusionis myodis facile eruitur causa hujus phantasmatis; sanguine turgent arteriæ capitis dum respirationem cohibemus, & arteriolæ retinæ febrilibus nervis intertextæ lumen in illas casurum intercipiunt, hinc umbra veluti reticulata; arteriæ enim illæ reticulum in retina efformant, imo in ovina retina annulos corone ciliari veluti concentricos sequuntur; illarum imago est 77. vicibus amplior ipso objecto; ergo si duas lineas in diametro obtineant filamenta imaginis, arteriolarum diameter est circiter nona pars lineæ.

Experimentum mihi succedit, quia retinam valde sensibilem habeo, ut omnes fera, quibus hæc suffusio atque myodes solent accidere, atque ideo videntur in hisce circumstantiis illa phantasmata, quia magna luce collustratus est paries, unde clarius affecta retina clarius percipit differentiam inter loca umbrosa & collustrata, unde non mirum si extra hæc circumstantiis ætopiæ hæc suffusio careat. Inde etiam fit ut suffusi ea filamenta non percipiant nisi in meridiana luce, & dum cælum, vel objecta alba intuentur.

A vero longe aberrant illi qui filamenta in crystallino aut in cornea & aqueo humore supponunt, quique consequenter scribunt in hujus morbi historia hæc filamenta locum mutare etiam si oculus sit immobilis, ut ipse existimavit *La Hire*; hoc enim accidit in altera varietate quæ sedem habet omnino diversam, scilicet in suffusione scintillante.

Suffusio reticulata vel est fugax vel permanens: fugax aut arteriolarum retinæ insarctu procedit; permanens aut errore loci seu deviatione sanguinis in vasa retinæ lymphatica seu serosa procedere videtur; nec existimandum est insarctum mere lymphaticum huic phantasmati producendo sufficere, cum ipsæmet arteriæ, apud sanos in systole nullam umbram depingant.

Curatio vero videtur eadem esse ac suffusionis myodis; revellendus scilicet cruor a superioribus; summa retinæ sensibilitas est minuenda; juvant phlebotomiz, victus mollis & humectans, clysmata, balnea repetita, abstinencia a incubationibus, ab usu microscopiorum, a visione assidua rerum minutarum, & maxime lucis; unde sibi caveant aurifabri, phrygiones, calatores, vitriarii, &c. atque scriptores amanuenses, studiosi utantur perspicillis foci longissimi vulgo *converses*, vel etiam vitris planis colore subcæruleo, subviridi aut flavescente tinctis, quæ magnæ lucis splendorem mitigent, atque inter legendum & scribendum lucem a latere tantum excipiant, aut umbella moderentur, ut retinæ sensibilitas minatur.

3. *Suffusio scintillans; Marmarige* Hippocratis; *Marmariges* quibusdam; *scintillans* & *sub-*

gula

gure lacinis. *Beilae isclancante ou rayonnante*. L.

Huius speciei tres vel plures varietates sunt, sed alie fugaces aut aliorum generum comites, quæ proinde speciem suffusionis non constituunt; alia est constans & præcipuum symptoma, quæ proprio suffusio scintillans est.

a. Inter fugaces est *Suffusio radians*, quæ se de, symptomatice & eura discrepe ab aliis; in hac scilicet, cum obiectum quoddam radiosum, ut lampadem, cernitur, prælongi radii lucidi ex ipso obiecto, alii sursum, alii deorsum, protendi videntur, sæpius obiectum multiplicatur, & simul amplum, subrotundum atque radiolis minoribus circumdatum videtur. Illud symptoma accidit omnibus sanis, si faciem nubes hexapedis distant noctu palpebris convinentibus respiciant, atque si caput deorsum inclinent, evanescent radii inferiores; si sursum erigant, superiores; si oculos omnino aperiant, omnes e conspectu avolant.

Ut eorum ratio intelligatur, observandum est 1. Corneam humore lachrymali continuo madere, quem suppediat partim glandula lachrymalis, partim vero humoris aquei per poros corneæ transusio jugis; 2. convinentibus palpebris lachrymam humorem fluere inter palpebrarum limbum declivem non arcte corneæ applicatum, sed hian-tem spatulo triangulari & corneam; 3. aqua illa ibi palpebris adherens in tumorem assurgit, cujus pars jam ipsam corneam pellucidam tegit cum palpebræ convinent; ergo radii a face promanantes & in illam aquæ superficiem convexam illapsi refractionem patiuntur, qua non ad axim opticum, sed versus superiora retinæ tendunt, si de palpebra superiori quæstio sit, versus imum, si de inferiori agatur; ergo imago flammæ quæ in polo optico pingitur, est diversæ ab imagine horum radiorum, quorum illi in summo, alii in imo retinæ depinguntur, sed ambo ipsi flammæ coherant in corneæ & in retinâ; demisso capite vel protensa manu intercipiuntur radii qui in palpebram superiorem tendunt; ergo radii qui sunt in summo retinæ depicti, repræsentant radios inferiores facis; & vicissim erecto & retrorsum flexo capite radii inferiores palpebram per-tingentes non admittuntur in oculum, & evanes- cent eorum imago; quæ flammæ superiora pate- hat; ductis palpebris monitulus aqueus refrin- gens nullus est, nulli proinde facies radii supra dicti.

Interes in hac facis magna distantia omnes ho- mines huius respectu sunt veluti myopes, nam radii fere paralleli ex hac in oculis irruunt, adeoque juxta leges dioptricæ citius post crystal- linum corant; ergo si aliunde oculus myops fue- rit, imago facis magis ac magis confusa futura est, ut patet ex theoria amblyopiz distitorum, seu myopiz, atque ex ea theoria intelligitur cur flamma dilata, quæ pyramidalis est, videtur circularis & simul multo amplior quam proxima radioli quæ circumdata, cum conus lucis ab ea in oculum pertingens & inversus pone crystallinum,

iterum decussatis radiis non punctum, sed macu- lam in retina depingat.

Ea autem suffusio radians est symptoma epi- phoræ, ophthalmiz humidæ & amblyopiz, quæ magnam retinæ sensibilitatem comitatur, seu la- chrymosæ, quippe cum in his affectibus lachry- mæ continuo exundent, non solum illi radii sursum deorsumque protendi videntur ad con- spectum facis, stellæ, &c. sed etiam ejusvis obiecti imago interdum obnubilatur & turbatur a refractionibus quas monticuli aquei cor- neam & ellia enati excitant, ut quisque in- ter lachrymandum expertus est. Quorum ve- ro facies multiplices videantur, hoc inquire- mus dum de suffusione multiplicante agendum erit.

Curatio vero petenda est a curatione epiphoræ & ophthalmiz humidæ, quæ sunt præcipua sym- ptomata; suffusio enim radians absterfis lachrymis evanescit.

b. Altera *Suffusio* fugax est *cornescens* vel ful- gurans, quæ vel a principio externo dependet, ut ab ictu in oculum, vel ab interno, ut a cephalalgia, vertigine, phrenitide, epile- psia &c.

Notum est omnibus quod si digito oculus e latere prematur, etiam in tenebris, ex altera o- culi parte lux vivida videatur, eaque uniformis, semicircularis, quæ cum pressione recedit; si ve- ro alapa percutiatur oculus, tum lux splendidior irradians in toto oculo fulgeat; quod nares for- titer emungendo, aut etiam sternutando similis coruscatio observetur.

Quæ ipse in numeris pluribus observavi ac- curatius referam; quoties ingressi me cephal- algia ab austina aeris constitutione vel a pletho- ra dependens, eam per aliquot minuta pervideo, quippe marmariges hanc prænuunt; video scilicet, per horæ minuta septem vel octo, etiam oculis clausis, lineas lucidas quasi igneas, sed angulis acutis intersectas, inflexas, plu- resque simul semicirculorum constituunt; quod sin- gulare est in illis lineis, est motus tremulus con- tinuus quo agitantur, qui motus est multo fre- quentior arteriarum pulsatione; nunc vero illi arcus scintillantes, nunc alii; circulus ab illis effectus est paulo major toto oculi ambitu, & hoc phantasmate evanescente capitis gravitas accedit.

Ut hujus phænomeni rationem intelligamus, observandum puto 1. dari in oculo copiam si- lamentorum nervorum, quæ respectu ad mo- lem partis est fere decies major quam in ul- lo alio organo, etiam si solum nervum opti- cum attendam; & plura nervorum paria ad illum accidentia omittam, 2. verissimum est fluidum nervum esse vaporem fluido ele- ctrico imprægnatum, adeoque intra oculum plus esse fluidi electrici quam in alia corporis parte oculo æquali; 3. fluidum electricum in oculis potissimum coruscare, etiam sine afflic- tione præviæ, apud animalia valde electrica; quales sunt

sunt seles dum ipsorum pili non nisi hieme & ex affricu fulgurant vel scintillant; unde credibile est ipsos oculos in obscurissima nocte lucem objectis videndis præbere; aut apud nos illud fluidum minus activum est, nec sine affricu aut percussione quadam coruscant; nec in vitro, sulphure, aliisque corporibus electricis id accidit. Noctam tamen hanc vim electricam felis, observante D. Dufay, cum vita animalis evanescere, ut evanescit oculorum splendor; 4. omnia filamenta nervæa retinæ, cum ad orbiculum ciliarem deveniunt, efformant ex *VVinslovvii* sententia tunicam quæ anarorum vitreum amplectitur, & cum tunica altera crystallinum involvente, ac fibræ ciliaris *coronam* ciliarem efformant. Illa vero corona ciliaris terminatur circa anulum finalem a *Petito* detectum, cellululosum, vacuum, intestinulo valvulis distincto similem, quo circumdatur crystallinus, qui annulus vocatur *Canalis Torosi* vulgo *Petitianus* ab inventore, gallice *canal godronné*; is facile insufflatione detegitur, nec communicat cum capsula crystallini quæ similiter insufflatione detegi potest; 5. illius canalis Torosi usus nullus alius videtur esse quam ut fibræ ciliares superimpositas attollat, in semicirculum, eo sine ut commodius possint, si contrahantur, extrorsum adducere crystallinum, ut ad visionem distinctam sapius necessarium est: quippe si oculus esset idem in vivis ac in cadaveribus, quoad distantiam crystallini a retina & cornea, impossibile foret ullum objectum, vel proximum, vel remotum, videri distincte, sine interventu perspicilli convexi, ut ex dioptricis probari potest.

Verisimile est itaque, quoties quidpiam intueri aut distincte videre volumus, toties, turgescere canalem Petitianum, a quo vero turgescere potest canalis, in quo nihil post mortem reperitur, in quem milliæni tubi nervi desinere videntur, iique fluido electrico turgidi, nisi repleantur illo fluido nerveo electrico.

Si nullus esset in aere interna aer, nullus sonus audiretur: cum ad sonum necessaria sit aeris vibratio, & sonus diversæ frequentie vibrationem, diversos tonos constituat; ita verisimile est nullam lucem, nullumque colorem ab oculis videri posse, nisi foret in oculis materia lucis, quæ confusa splendat & albeat, in radios vero diversæ refrangibilitatis secreta colores constituit. Verum ut materia soni sine vibratione nullum sonum edat, ita nec materia lucis sine vibratione splendet, & ut quilibet sonus a determinato vibrationum intra datum tempus numero, ita quilibet color a determinato vibrationum numero pendet, ut putant *Illustr. de Mairan, Euler, &c.*

Si auctoritate thesæ nostræ comprobanda foret, præsto essent Auctores, non modo Poetæ, quibus lumina pro oculis continuo usurpantur, sed gravissimi Philosophi; sic ex *Aristotele* est *lumen oculi quasi percipit; qui species ab externo lumine ad insimul anima traducit; ex Platone, possum*

*quam imo vultu luciferos oculos insculpere (Dii) lumen illis igneum accendere. Galenus, de usu partium, dicit se scripsisse Librum de spiritu visivo, quod æthereum esse & lucidum putat. Oculos re vera lucem ex se in media nocte emittentes habuere plurimi non ignoti homines, ut Cælius Marius, Augustus Octavius, Tiberius, Albani omnes ex Plinio, Asclepiadorus teste Phorio; aut Calius Rhodiginus, Cardanus, Julius Cæsar Scaliger, Fremondus, Theodorus Bæza, de se ipsis testantur se nocturnis tenebris libros perlegisse ad lucem ab oculis emissitæ; unus sit pro omnibus testis *Illustr. E. de Mairan*.*

Apud ægros vero nihil est vulgatius quam oculorum splendores; multi homines semino & nocte sopiti, si insperato excitati oculos diducant, manifestum intuebuntur splendorem; de se testatur Th: Bartholinus; de ægro a se observato Galenus. At in vividis pathematis luxisse oculos, ut ab adstantibus splendor cerneretur, testatur Liber Ephorici de Asuero furore percito. In ira juxta Ovidium, *Oculi quoque pupula duplex Fulminat & geminum lumen ab orbe redit*; in Juliano Imperatore decedente; *Micantia sideris ignibus lumina* notat Mamertinus. Felibus æstro venereo percitis clarius ardent oculi; mense scilicet Febuario, quo electricitas fortius viget.

Ut itaque ad propositum redeamus, verisimilium est non ex simplici fibrarum nervearum oculi vibratione pendere coruscationem; cum ad vibrandum nihil sit ineptius ipsæ fibræ nerveis, nihil est mollius & flaccidius retina quæ pulposa est & flaccida; quid igitur lucem emittere potest, nisi impetus fluidi electrici in canalem Petitianum per vim intrusi, quod accidit in tussi, epilepsia, sternutatione, furore, nec non ejus concussio & frictio, ut in alapa, oculi pressione.

Unde vero figura circularis hujus luminis qualem descripsi, & qualem notat Calius *Aurilianus* de epilepsia, dum ait, *circulus igneus circumferri oculis sentiantur agitantibus*; de quibus epilepticis ait *Hippocrates in Coacis*, quibus convulsus oculi *intus volucres*, nec apud se ipsos sunt, & *divius agitant*; non video quorum circularis illa radiorum convolutio possit excitari, nisi ab ipso canali Peticiano valvulæ interesse, hujus luminis delineationem satis apte referente. Motus vero tremulus arcuum luminis videretur arguere similes motum in crystallino, vel fibræ musculosæ coronæ ciliaris crystallinum moventibus; cilia, palpebræ hiæce velocissimis motibus tremulis in nyctismo sunt obnoxie, qui motus in uvea *hippus* a *Manchartis* vocatur.

c *Suffusio Danusæ.*

Denique vera *suffusio* scintillans: quæ permixta est, sic se habet; æger in magna luce constitutus; uplurimum presbyta, vel oculis nictibus gaudens, continuo præ oculis observari sibi putat puncta lucida, quæ non hæc & illuc volu-

vollant nec a commoto capite agitantur, ut putat *La Hire*, & ejus in hoc exscriptor *Beerhaave*; sed constanter si oculus immobilis remaneat, deorsum lentissime delabi videtur; adeoque veluti pluvia aurea prae oculis eaque densa cernitur; quæ verticaliter semper descendit in quacumque capitis positura, sive erecta, sive lateraliter inclinata; hoc in me ipso expertus per annos, observavi in aliis possimum illis qui studio nocturno indulserant, & in egrotante qui de eo symptomate ad melancholiam sepe per multos annos sollicitus erat.

Si fides sit Auctoribus, iidem fere homines vident strias lucidas, sinuosas, quandoque ramosas, in medio lucentes, in marginibus umbrosas, quas cæteri pro suffusione reticulata vaga habent; sed diversa res est; cum in reticulata non locum mutant filamenta, & in axi obscuriora sunt quam in margine, contra quam in hac suffusionis specie a *La Hire* memorata.

Re diu perpensa nulla alia hujus speciei theoria mihi congrua videtur, quam theoria *D. Demours*, eximii Ophthalmiatri, quæ sic se habet: 1. Ex poris corneæ a *Vinslervole* notatis, æquæ oculi continuo renovanda, continuo ciliæ extrorsum corneam lubricata; in ipsa recens mortuis magna elasticitas globi expressionem illam continuat, unde nitorem corneæ tollit humor in pelliculam coactus, quo non refascito brevi remollescit globus antea firmissimus: 2. Illæ guttulae minimæ fecerantes in superficie corneæ paululum protuberant, adeoque hanc superficiem veluti totidem lentæ sphericæ exasperant: 3. Idem itaque debet exotici effectus si retina sit valde sensibilis, ac si vitrum tumoribus minimis exasperatum (vulgo *godonne*) oculis obversaretur, scilicet punctula totidem lucida, vel magis diaphana debent observari quot guttulae hemisphericæ: 4. Verum hæ guttulae continuo per corneæ convexitatem deorsum labuntur, & sic pluvia lucida, vel scintillans delabi videtur, cum hujus imago successive percurrat retinam ab imo ad summum; hæc sunt phenomena a me observata.

Si guttulae sint uberiores, rivulosque constituunt, illos in ramos dividi facile est; illi vero rivuli ramosi eundem effectum præstabunt, ac vitra prae oculis posita filamentis densioribus deturpatæ, Astronomis & Opticis invisæ; lux stridet in axi refracta major erit, in marginibus erunt tenebræ; ergo reticulum continuo in retina depergetur hujusmodi, ut in axi filamenta lucida obscuris lineis terminata, atque horum filamentorum situm, ordinemque facili mutari consequens est, quod in suffusione reticulata non accidit.

Non possum assentiri *La Hire* & *Beerhaave*, qui hujus morbi principium in humore aqueo reperiunt; nec intelligit in ea sententia, cur pluvia aurea vel lucida continua delabatur in quocumque capitis situ. Curatio vero in eo tota

versari videtur ut nimia retinæ sensibilitas, sine qua ea phantasma nulla sunt, simulque animæ melancholica attentio, hoc symptoma exagrans, tollantur.

Suffusio Danaes accidit sæpius in usu extracti hyoscyami albi, hoc vero finito evanescit, ut observat *D. Coulas M. D. Reg. Soc. Sec. meritis*.

A. Suffusio colorum. B.

Ea est quæ objecta alienis coloribus insuæc, excluso albo & nigro, qui propriæ coloribus non accenduntur. Colores vero sunt septem; rubrum, aurantium, flavum, viride, cæruleum, indicum & violaceum. Ruber color inhæret radiis minime, violaceum maxime refrangibilibus; molecule ætheris vel lucis rubrum constituunt sunt omnium crassissimæ, violaceum facientes minimæ; omnes summa, imo perfectæ elasticitate præditæ, infinite parvæ ac sphericæ; numerus vibrationum dato tempore absolvendarum est in illis diametro reciprocus; hinc tonus, proindeque color, cuique proprius & inhærens. Aequæ ut tonus determinatus ex aere cæterno in internum auris transmittitur, propter consonantiam molecularum ejusdem ordinis, ita color determinatus in lucem oculo contentam propagatur, atque per nervæ filamenta ad animæ sedem transmittitur. De his legi meretur magni Eleuterii Dissertat. *Memor. de l'Acad. de Berlin* 1754.

Ut percussa fidium rhorda, postquam sonus principalis immittitur, audiuntur a Musicis toni ejus harmoniaci tertia, quinta, & cetera si vivido lumine perstringatur oculus, ut a solis directo aspectu, insequuntur successive colores in lumine contenti, priusque confusi, scilicet ruber, luteus, viridis, cæruleus, violaceus, unde quoque convertat oculos homo magnas maculas subrotundas cernit in parietibus & chartis albis.

Verum si corpora quæ inspiciuntur jam colore quodam infecta sint, ex diversa colorum combinatione novi colores exsurgunt; sic in hoc experimento si color cæruleus in corpus luteum incidat, viridis erit macula; si in rubrum, purpurea, &c.

Corporum quorumcumque, modo prismaticis, puris coloribus tincta non sint, si trans vitrum prismaticum triangulare, vel limbum lentis vitæ acutum inspiciantur, margines inde cærulei, inde vero rubri apparent, ut docet experimentum vulgarissimum. Idem præstat in oculis crystallina lens, si ejus limbus, pupilla nimis dilatata, lucem refrangant. Idem experiuntur Astronomi quando lentem ocularem in debita ab objectiva distantia non collocant, tum maxime, cum apertura diaphragmatis, seu annuli chartæ, cui quoque vitæ objectivi limbus tegitur, nimis est parva.

Si in lentem, ejus convexitates sint sphericæ & lumen incidat, quoniam radii rubri sunt minus refrangibiles una 77^a parte quam violacei,

eci, focus non est punctum unicum, sed axis juxta quem radii violacei propius, rubri vero remotius ununtur; adeoque si sphericæ sint crystallini convexitates, colores in oculo separati visionem turbarent, ut in tubis astronomicis; sed huic incommodo triplici modo obviam irit supremi Numinis sapientia; primo quidem convexitatem corneæ & crystallini non sphericam, sed hyperbolicam fecit, quod peritissimi hominum in vitris poliendis, ac fingendis adhuc præfate non potuerunt, ea autem est hyperbolicorum vitrorum proprietas, ut radios in puncto uniant. Secundo pupillam ita apte concinnavit, ut apertura diaphragmatis excludat radios a limbo crystallini juxta proportionem quam demum invenit Astronomorum sagacitas; 3. Lentem crystallinam aëque humore, aut viresco ejusdem cum aqua densitatis involvit, & denique summus Nervitans vi sui ingenii, ac nuperime D. Eulerus hoc artificium ad colores ab imagine abigendos esse utilissimum cognoverit. Vide *Mem. de l'Acad. de Berlin. 1747.* Nullum est itaque tam sublime summorum hujus ævi Philosophorum & artificum inventum, quod in humanæ machinæ fabrica summi Numinis sapientia ante sæcula non occupaverit, & quo doctior ac peritior homo fuerit, eo sublimiora & veviora scientiarum Mathematicarum & Artium principia in peribus Dei demirabitur.

Guttula cruoris retinæ insidens & nigricans amnem lucem intercept, unde phantasma obscurum vel nigrum; verum si dilutus cruor radios rubros transmittat, tunc maculam rubram videbit æger, ut omnia trans. visum inspecta rubra unt.

Lumen candelæ sebaceæ flavesce, unde objecta alba ad illud lumen flava apparent, & cærulea viridescunt, luteæque pro albis habentur.

Qui ad solem diutius libros legunt, illi characteres intensa rubedine tinctos brevi vident: si nivem in umbra arborum aspiciant dum sol nitet, nix apparet cærulea.

Qui aurigine habent insectos oculos non ideo vident objecta lutea, sed minus collustrata, quia non subito intensus ille color oculos inficit, & dein omnia objecta diluto illo colore sensim tincta æqualem corporis nativi immutationem patiuntur, atque ob assuetudinem sensum inductam nativi coloris, si non gradum, saltem ordinem servare videntur, si subito flavescerent oculi, subito omnia flava viderentur objecta, sed brevi temporis intervallo hoc phantasma evanesceret ob assuetudinem.

Observavit *Valerius* hominem qui continuo præ oculis palatia pulchre decorata & colorata libi observari videbat; verisimile est illi fuisse combinatam suffusionem reticulatam cum colorante, seu pupillam respectu crystallini fuisse nimis apertam, unde oculi ejus veluti prismata triangularia omnibus objectis iridis cælestis colores inspergebant.

5. Suffusio metamorphosis. B.

Metamorphosis est figurarum mutatio; figura est limes extenſi & limites extensorum mutantur, si situs, proportio, numerus, magnitudo partium mutetur additione, detractio, translatione, &c. Videamus itaque possimur mutationes quas imagines objectorum patiuntur in magnitudine, situ, &c. ut intelligatur quomodo fiat metamorphosis illa, quæ species singularis suffusionis est.

Objectorum magnitudo apparet est 1. ut angulus visoriorum tum interceptus a radiis objecti extrema radentibus & in oculum concurrentibus, si visio fiat nullo oculo; tum ut angulus ab axis opticus objecti extrema radentibus efformatus; similis enim est in oculo angulus imaginem mensurans, cujus magnitudinis respondet apparet objecti magnitudo. 2. Quo objectum est magis distans, eo majus judicatur sub eodem visorio angulo; unde judicium de distantia objecti mutæ magnitudinem apparentem. Mutatur magnitudo apparet objectorum tum in visu distincto tum in confuso seu amblyopia; in visu quidem distincto, si utamur vitro concavo aut biconcavo, objecta minora simul & distinctiora apparent; sed etiam sine perspicillis, concavis, si pupilla angulatur nobis non jubentibus, objecta minora videntur. Sic a subitaneo frigore omnia objecta immutata se vidisse refert *Le Car* nativæ magnitudinis probe memor; ut plurimum tamen hanc immutationem, cum omnibus simul objectis accideret, non percipimus.

Contrariorum ratione si cornea fiat magis convexa, et si pupilla citra animæ imperium diducatur, objecta majora videntur.

In amblyopia nihil est frequentius quam augeri objectorum magnitudinem; cum enim myopes vident objecta intervallu imaginis confusæ, sed multo amplioris quam apud aptos seu aquilinos oculos, conus opticus inter crystallinum & retinam terminatus rursus dilatatur tum retinam attingit, illi objecta ampliora cernunt; sic si myops faciem accensam e longinquo respiciat, is videt flammam circularem & valde extensam. Idem autem accidit presbytis apud quos conus opticus ultra retinam pertingit adeoque ampla macula retinam inficit; sic acicula prope oculum collocata, respectu cujus distantie omnes homines sona presbyta, quadruplo crassior videtur quam seipse est, quia pone illam radii inflexionem a Nervitans detectam patiuntur; & sic angulus a radiis inflexis interceptus major est.

Homines qui fixe intuentur objectum proximum confuse vident simul objecta remota & reciproce; si aciem oculorum in remotum dirigant, confuse propiora cernunt; ergo presbyta evadunt vel myopes horum respectu, si mulque variam in iisdem objectis magnitudinem percipiunt. Sic si filo ferreo ante pupillam posito distans campanile intueamur, filum ferreum diaphanum & crystallinum videtur; si des-

etiam ad filum dirigamus oculorum aciem, campanile videtur minus quam antea.

Si in hoc experimento filum ferreum horizontaliter situm coram oculo moveatur, campanile & montes remotiores videntur exultare & subsidere vicissim, radiis per inflexionem ita mutatis ac cum per lentem refringuntur, Sic cum trans vitra fenestras tuberosa, nodosa & præterea ceruinis, in illis motus circula-re & figuras anomalas miramur.

Si itaque alterutrum lentis crystalline vel cornæ latus simili vicio laboraret, eadem metamorphosis oculis observaretur. Novi myopem qui quoties montes in horizonte positos intue-tur, in certa positura montes dextri lateris præruptos & deficientes ceruit, in eo vero sin-gularis mihi evenit observatio, scilicet ejus oculi fundum introspicere datum est, non fecus ac in sele aquis immersa, habebat scilicet a D. Laffrè Medico Uzoniensis arcanum quod-dam, cujus semigrano cornæ imposito, statim pupilla mirum in modum dilatata lucem in oculum admittebat & ex ejus fundo reflecti si-nebat: nihil morboſi in retina observavi, adeo-que mihi venit in mentem illud phenomenon in omnibus evenire posse, maxime myopibus ut in experimento Mariotti accide: non ita facile est intellectu cur illa hysterica Marcelli Do-nati, cui in dextro oculo sæpe dolenti lumen resplendebat, sinistro omnia objecta non nisi di-midiata apparebant. Vide Bartholin. de luce ani-mal. pag. 41.

In hac suffusione objecta mutantur per emar-ginationem, vel subtractionem, in altera per additionem; vel si respiciatur pruna ardens in cineribus, vel carbo nigricans in medio igne, & digitus accedat ad conum opticum ab ipso objecto procedentem, illius objecti latus vide-tur extendi, aut elongari versus digitum. Hinc explicari potest observatio Valsalva, qui refert homi-nis librum legenti, licet characteres æquales forent, alios alius constanter majores apparuisse.

Denique situs objectorum mutatus apparet in experimento sequenti, ex quo signum diagnosti-cum tum myopiz, tum presbytiz erui potest. Candela accensa aliquot hexapedas distitit re-spiciantur, flamma ea non pyramidalis, sed circularis & ampla videtur; si vero digitus sensim ad radios in oculum incidentes a dex-tris admoveatur, tunc vel latus dextrum flam-mæ emarginari videtur, vel sinistram, si dex-terum obiectum in situ inverso apparet, est ho-mio myop, si sinistram, homo presbyta est. Vide La Hire de diversis visus accidentibus Memor. de l'Acad. R. des Scienc. & La Cat. & traité de la vue, &c.

Mulier in accessibus epileptiz non solum di-plotopia laborabat, sed etiam spectra horrenda, atmospherarum ceruleo-viridem circa omnia ob-jecta, & ipsa objecta illuminata multoties ma-jora quam reipsa erant, videre sibi videbatur, ita ut musca gallinæ magnitudinem referrebat, Saurages Nosologia Methodica. Tom. II.

& gallina bovis volumen adæquaret: usus ca-storei hanc suffusionem abstulit, sed sequebatur vertigo quæ objecta virida repræsentabat. Journ. de Med. Nov. 1760.

6. Suffusio dimidiata objecta Abrah. Vater Dis-ferat. de visus vitiis 1223. VVittenbergæ.

Tres casus hujus morbi memorat, & theo-riam a compressione cerebri, ac nervorum op-ticorum decussatione supposita deducit. Vide Collection. Acad. Tom. V. p. 292.

7. Suffusio mutans.

Illustr. Medicus Narbonensis octogenarius per aliquot dies laborabat suffusione, qua omnia objecta inflexa, flexuosa, & in alterutrum la-tus nutantia ipsi apparebant: ita ut homines obvii ipsi viderentur trunco cruribusque tor-tuosi, simulque in alterutrum latus inclinantes, & ad lapsum proni, quos idcirco pri-ma vice monebat, aut sustentare conabatur; evanuit hic affectus, remansit vero visus soli-to obscurior.

III. DIPLOPIA; Suffusio multiplicans; Visus duplicatus Auctorum; Brund: Double Vue

Est hallucinatio qua idem objectum geminum, multiplicatum, vel multoties repetitum apparet. Illud symptomata fere semper fugax est, at-que libere illud patitur, ut in experimentis, idque vel unico oculo, vel binis aspicientes, experimenta vero magnam hujus theoriæ lu-cem fœneratura adducam.

Si digito oculum & latere premamus, dum quoddam objectum intuemur, illud geminum illico videtur. Si unico oculo, sed palpebris fere clausis, maxime oculis humidis objectum quoddam exiguum in tenebris præfulgens & diffusum, ut facem, intueamur, tum ætopiz, tum imprimis myopes, illud multoties gemina-tum videbimus.

Similiter si chartam lusoriam aculea bis per-foremus, ita ut foraminula non magis distant a se quam pupillæ diametro, atque carta o-culo uni admota, altero obtuso vel flammam candellæ, vel punctum nigrum in pariete al-bo apprime collustrato respiciamus, statim fo-ramina centies majora videbuntur quam reapse sunt, & quasi nebuloſa, seseque mutuo in-terfercantia; tum in segmine communis luci-diori, & medio videbimus punctum nigrum geminum, unum altero nigrius, removeatur charta usquequo punctum unicum, aut flam-ma unica percipitur, quod in presbytis qui-busdam vix unquam accide, ea distantia, si La Hire credamus, est extensio visus distin-cti, ea est præcise juxta ipsum distantia, cui debet esse æqualis semidiameter convexitati perspicillorum presbyta experienti convenien-tium, & concavitate perspicillorum myopi-dato eligendorum.

Si vero ulterius charta removeatur, iterum ob-jectum geminum apparet, imo si tria sint foramina,

la, triplicatum; atque ambæ notæ nigrae se mutuo tanto magis recedunt, quo charta ab oculo magis distat.

Quamdiu obiectum non est in distantia visus distincti, imagines binæ cuilibet foramini respondentes, in oculum illapsæ non ununtur in retina, sed distinctis in locis; adeoque polium opticum pro centro non habent, unde duplex videtur imago. Quippe longo usu edocti sumus per sensum confusum, esse unicum obiectum etiam ambobus oculis inspectum, duplicemque imaginem depingere, quod, cum inueniatur in polo optico, delineatur. Polus opticus est spatium circulare in fundo oculi, cuius centrum occupat axis opticus; quoties vero obiectum quoddam ambobus oculis intuemur, toties, nisi sit vitium in organis, ita convertimus oculos, ut axis uterque oculi concurrat in eodem obiecti puncto, & longo usu didicimus, tactu potissimum nos dirigente, duplicem imaginem respondere unico obiecto, unde quoties in polium opticum incidit imago, toties unicum iudicamus obiectum; sed si duplex imago incidat in eundem oculum, & non concurrat in polo optico, tunc videre nobis videtur obiectum idem in duobus locis diversis, adeoque geminum nobis illud videtur.

Si lentis vitreæ biconvexæ superficies charta opaca tegatur, relicti duobus foraminibus diffusæ, lentemque soli in camera obscura observetamur, duplex solis imago ultra lentem subgebit excepta in unico puncto quod distabit a lente evis convexitatis semidiametro, id est, in foco lentis in quo imagines combuuntur unicum obiectum representabunt; idem accidit in oculo, qui pro lente spherica potest haberi.

Si itaque palpebris conniventibus ciliorum interstitia veluti totidem foramina luci pervia reliquant, & homo myops vel presbyta fuerit, vel obiectum lucidum ultra citrave visionis distinctæ distantiam positum; nil mirum, si obiectum ter, quater, quingules repetitum videatur. Sic *F. De Chales* qui myops erat, cum hominis faciem respiciebat, sibi videre videbatur quingue, vel sex ejusdem vultus umbras, vel larvas horizontaliter positas.

Si simul lachrymis, aut diptericæ obducantur cilia, ibique efformentur totidem lentes aquæ, vel convexe, vel concave, minus mirum erit, si per totidem lentes obiecta multiplicentur, ut lippis accidit, vitæ inæqualis superficiei a perspicillo rum fabris dicuntur visum illudere, suffundere, vulgo *berluer*, quia obiecta multiplicat & immutat.

Sufusius multiplicans cum myode in experimento sequenti a *P. De Chales* proposito combinatur; sunt candelæ plurimæ ad minimum viginti passibus distantes ab oculo, caput aciculæ ortulo admoveatur, & attente cornatur, negligenter vero candelæ accensæ; macula nigricans in singulis candelis videbitur; sed si candelas attente intueamur, macula nigricans evanescet, nec aciculæ caput videbitur, nisi velut nebula diaphana.

Visio quæ binis oculis fit, si æque vigeant amborum oculorum acies; est una decima tertia parte clarior, quam quæ unico, juxta *surial* experimentum; aut non minus diplopie obnoxia est. Longo usu didicimus clariorem esse visionem, quæ fit ambobus simul oculis, modo axes optici in obiecto concurrant; planum ambobus pupillis parallelum, in quo concurrunt axes optici, vocatur *planum horopteris*, quæsi visum terminans; infeci, velut inviti & non attendentes, dirigimus axes illos ad horopterem, id est, ita convertimus utrumque oculum, ut lineæ pupillæ & crystallini centra conjungens in utroque oculo depicta est circularis, cuius centrum est polus opticus, seu extremum axis optici; in his circumstantiis utpote usitatissimis obiectum unicum iudicamus, licet imago duplex sit; verum si distorto, ore digiti, vel ab altera causa, alterutro oculo, axes optici non concurrant in obiecti centro, tunc imago obiecti non potest incidere in polium opticum utriusque oculi, & obiectum in duplici loco collocatum nobis videtur, indeque geminum. Sic si idem sonus non eodem instanti, sed diversis temporibus ad aurem perveniat, ut echo, duplicem sonum esse iudicamus. Oculis dexter cum sinistro non conspirat, vel quia alteruter strabismus laborat, seu non abscondendæ nudi voluntatis, vel quia non iubetur agere, quia cum visu multo breviori, aut debiliore doneitur, inutilis, est ad distitorum obiectorum intuitum; inde vero fit, ut inico oculo utamur ad intendum; unus itaque oculus sit otiosus, & quoquo verius vergat indifferenter; inde strabismus, non vero semper diplopia.

Si non possit ex libertate animæ oculus cum altero consentire; seu ad idem obiectum dirigi, illud fit vel quia musculus alteruter, ut abductor, nimis resistit, vel antagonista, ut adductor, fortius agit; unde oculus ager cum sano conspirare non potest, & tunc obiecti imago in illius polium opticum incidere non potest, proindeque imago dextri oculi refertur ad unum locum, sinistri vero ad alium; unde geminum iudicatur obiectum. Idem potest accidere absque muscutorum vicio, si scilicet crystallibus cum pupillæ plano parallelissimum positum non servet, ut si a fibræ coronæ ciliaris dextrorsum & sinistrorsum distorqueatur; tunc enim axis ejus similiter distorquetur, nec potest cum alterius axi conspirare.

Si sint duæ candelæ multas hexapedas ab oculo distantes & horopteris plano parallelæ; in media vero inter illas & oculos distantia interceptatur earum visio per magnâ chartæcam tabulam, in cuius tamen medio fit foramen exiguum unicum, radii per illud foramen ad utrumque oculum ex hisce candelis possunt accedere; dirigatur amborum oculorum acies in candelas, videbis duas candelas, & duo foramina, licet unicum sit, quia imago candellarum in polium opticum, imago for-

foraminis extra polum incidit; jam vero solum foramen fixe intueretur, unicum foramen videbitur quia ambæ candelarum imagines hic coalescunt, ita ut si vitrum cœruleum coram una, luteum foram altera candela ponatur, in foramine radii utriusque uniti viridem flammam expressuri sint.

Si anima itaque negligenter objectum quoddam lucidum intuetur, nec ad illud dirigat axes opticos, tunc illius imago in diversas utriusque oculi partes illabitur; unde duplicatus visus, quod accidit ebriis, quorum axes optici in vino natant & titubant; vidi etiam diplopiam in muliere quæ hyoscyami solia manducaverat, necnon in Anglo cæterum sano, sed melancholico, apud quem hæc hallucinatio aliquot dies perseveravit, nec principium verum morbi detegere potui; nullum vero remedium. suasi; quippe aliunde præfagebam fore ut hic error intra breve tempus evanesceret, ut fieri assolet in morbis acutis caput impetientibus; intente variola, phrenitide hoc symptoma rarum non est, ob spasmos quibus vel corona ciliaris, vel oculorum musculi distrahantur. Hæc suffusio fugax est, & ea quæ Arabum initio accidit, sponte curatur, quia anima erronea visus aliorum sensuum & iudicii interventu corrigit. Qui plura desiderat legat claudam *Differet. J. Claudam de visu duplicato*, Argentorati 1746.

Diplopiæ varietates sunt sequentes.

1. *Diplopiæ prædictæ.*

Est symptoma febres & pyrexias acutas quandoque comitans in impetu morbi, quoties potissimum delirium, phrenitidemve inducit; tunc enim axes optici irregulariter mutantur, nec ad idem objectum convergunt; imo adeo subito divergunt & moventur, ut eger quandoque ubi unus est Medicus, plures sibi videre videatur; in eo casu phlebotomia & sedantia quæ delirium tollunt, tollunt & diplopiam; inter sedantia sal sedativum Honbergia exteris præstat in hoc casu.

2. *Diplopiæ ab spasmo abductoris musculi in oculo sinistro VVilisi.* de anima brutorum, cap. 15. Vidi in epileptico.

3. *Diplopiæ a paralyssi musculorum unius oculi.* Rater. observat. lib. 1. pag. 132.

4. *Diplopiæ ab anisotropia Langii Epistol.* 74. lib. 1.

5. *Diplopiæ a catarrho Foresti lib. 1. obs.* 39. Aquilonii Optica pag. 346. L. Vide Cephalicam 10am.

6. *Diplopiæ a debilitate Boneti Sepulchret. observ.* 22. casu 43. 44. in morbi vicinis & convalescentibus.

7. *Diplopiæ remorsorum Aquilon. Optica, pag.* 346. Distincta duplicata videntur, non proxima.

8. *Diplopiæ a consensione Thuanii Act. Suecic.* 1731. pag. 230.

9. *Diplopiæ a errore Abr. Vater. dissert. de visus vitiiis* 1723.

10. *Diplopiæ a simulencia.*

IV. SYRIGMUS; *Syrigmus, Fluctuante, Semis autium, Tintouin.*

Est error imaginationis sonos, qui extra aurem non sunt, sibi representantis, seu hallucinatio ex imaginatione sonorum, quorum principium est in ipsis organis acoustici.

Variat ratione soni & toni. *Bombus* dicitur, si percussiones, vel lectu interpolatos repræsentet; *Tinnitus*, si tintinnabuli preste repetitos sonos acutos referat; *Otanechos*, si dum loquimur sonus acutus continuus sit; *Susurrus*, si murmur, gravisque sonus preste repetitus audiat, ut rotæ, flumini; vel forti, ut tonitru, &c. unde videtur nullum ex hisce nominibus generi designando convenire.

Character est sonus importunus & imaginarius, vibrationibus aeris externi non respondens.

Cognoscitur ex eo quod mutato sito capitis, obturatis etiam auribus silentibus vicinis objectis, idem sit.

Causa est motus vibratorius fluido nervo acoustico organorum impressus a principio interno, non ab impressione externa dependens; ejus itaque sedes in cerebro in originem nervi acoustici in osse petroso, in labyrintho, tympano, vel canali auditorio; alius est fugax, nullius momenti nisi ad theoriam; alius constans & incommodus, ex quo auditus perturbatur; qui essentialis, vel accidentalis.

Inasuetæ & impressionibus externis non respondens fluidi nervi acoustici agitatio pendet vel a motu expansivo, aut agitativo aeris interni tympani, labyrinthi, aut a vasorum sanguiferorum turgidorum pulsatione, ut in combo, vel a fluminibus arteriolarum non pulsantibus exundatis, aut a retrogressu sanguinis & lymphæ intra vasa labyrinthi, aut ad spasmodico motu catenæ ossiculorum, aut ab inardua corticis cerebri juxta originem nervi acoustici, aut a pulsatione dissona meatus auditorii cum catenula ossium, juxta Sauvcuriana principia.

Concurrunt sensibilitas facultatis, & nervorum, ut in hysteris in quibus sensus est acricea.

1. *Syrigmus a debilitate. B.*

1. A fame seu inanitione. 2. A convalescentia in morbis. *Riverii.* 3. A veneris abusu.

4. *Leipothimia.*

Hujus causa est motus retrogradus sanguinis vasculis labyrinthi; cum enim cor debilius impellit sanguinem, minus resistit sanguis contractioni elasticæ vasorum a qua columella sanguinis versus partem minus resistentem mittitur. Adde quod spasmus carni hinc inde sæpe oboriantur in debilibus maxime hysteris & hypochondriacis, in quibus regressus ille excitatur; nec deest similis spasmus etiam in leipothymia, ut in verecundia.

G 4.

Cura.

Curatur illa species analeptis, tonicis, pulvere de guttata, denum roborantibus.

2. *Syrignus arilicus* B.

In acutis bombus insalubris, & sonitus aurium lethalis. Si in febre ardente sonitus aurium cum visus caligine, & narium gravitate fuerit, delirium portendit, *Proberbicar*, alioquin hæmorrhagiam prænunciat ex *Caucis*, Quibus sanguis a naribus fluxurus est, aures tinnire, is tinnitus perfecta crisi finitur. *Riverius*.

3. *Syrignus plethoricus* Hoffmanni. B.

Est vel levis vel gravis, fugax vel continuus. Fovetur 1. a victu lauto opiparo, 2. a vita sibi deside, somnolenta; 3. Excitatur a capitis inclinatione, situ declivi; 4. Suppressioni hæmorrhoidum, catameniorum supervenit cum facie florida; 5. Concurrit maxime cum anarhopia sanguinis.

Causa hujus speciei est rivulus sanguinis fortius premeus peristoleum labyrinthi. Si manus applicetur tubis antillarum aquam in alrum ductum, fremitus continuus percipitur; & cum velocius fortiusve agitur machina a flumine altiori, fortior est ille fremitus, talis est syrygnus qui a plethoria pendet.

4. *Syrignus sibilus*; *Sifflement d'oreilles*. B.

Sibilamus quando ope lingue in exiguum rimulam contractæ, vel ope labiorum in exiguum foramen effluorum, aer vel expiratur; vel inspiratur cum velocitate; tunc enim exigua glottis labialis, vel lingualis efformata in vibratione tanto frequentiores agitur, quo peripheriam minorem illa glottis obinet. Sibilus est itaque sonus acutus continuus, sed exilis in aere, qui a transitu aeris per exiguum foramen procedere potest.

Tuba *Eustachii* obturata a mutua suorum labiorum adhesionem resistit pressioni aeris externi, quando aer internus debita elasticitate præditus renititur; verum si aer internus absumatur ut fieri solet, tunc pressione externi diducitur illa exigua glottis, & rivulus aeris cum sibilu in tympanum influit; si vero aer internus expandatur, aeris externi pressio vincitur, & reciprocæ ex effluxu interni fit sibilus qui resonat in aere, ut resonat in ore sibilus glottidis labialis, sive aer inspiratur, sive expiratur.

Post unum alterumve minutum sat aeris externi influit, aut interni effluit, ut nativum restituerat æquilibrium, unde cessat sibilus, quem vulgus tribus, maledicæ alterius quolæ, seu quod alteri male audiamus, *L'oreille me siffle*.

Errant ergo Neoterici qui Veterum vapores ab omni syrygno excludunt, & pulsationem arteriarum in omnibus incauant.

5. *Syrignus susurrus*; *Susurratio* quibusdam, *Brouillement d'oreille* au *bruissement*. D.

Est sonus ita frequenter repetitus, ut. rote vel cuticuli strepitum referat, nec ictus numerari possint.

Ille affectus est sæpe diuturnus, sibilus vero fugax, est duplicis est ordinis. vel enim est

exacerbans per intervalla, pulsationi cordis synchronus; vel est continuus, utriusque vero non idem videtur esse principium.

Susurrus uterque a sibilu quod fit sonus gravis, sibilus vero acutus, exacerbans; differt a bombo quod bombus fit intermitentis ictibus distinctis, susurrus vero sensum decrescat inter quolibet pulsationem, nec ullum sit intervallum a susurro liberum.

Susurri exacerbantes causa videtur affrictus undæ sanguinis majoris intra vasa labyrinthi projectæ, quæ injecto sanguinis ideo cordis singulis ictibus respondet, aut ictum ut impulsione vividam non repræsentat, quia in canalem osseum inflexum non incurrit, sed in mollem arteriolam lymphæ tantum velendæ destinationem a jam a rivulo cruoris dilatatum, unde inasuetæ periosæ superincumbentis, & acute sentientis distractio, quæ rivuli murmur aut undas repetitas exprimit; cum vero unda sanguinis initio distaltos projecti fit sortior, & sensum ad usque finem systoles decrescat, susurrus a prætereuntibus globulis excitatus per intervalla pulsationem cordis crescit & decrescit.

In statu sano vel assuetæ vasculorum sanguiferorum undæ non percipiuntur; vel rivulus cruoris non transit nisi per vasa parula sanguifera, in susurro vero lymphatica diducit, vel sanguifera solito fortius titillat; cur vero in febre quacumque non detur susurrus eadem est ratio, cur in febre quavis non incalecant aures; ut in leipothymia; vel genæ, ut in verrecundia; vel penis ut in libidine. De anarhopia fluidorum alias agemus.

Susurri vero continui, seu ita frequenter pulsantis ictus numerari non possint, diversissima est ratio; vel enim pendet a principio externo, ut insecto, verme in meatu auditorio, oscitatione, aqua lapsa, aere digito, manu, concha, obturata; vel a principio interno, scilicet a fero, pure, mucro intra tympanum, vel intra labyrinthum; quomodo vero ea susurrum illum gravis toni & continuum inducant, obscurissima est ratio, nisi a distantia & pulsatione Sauvcuriana procedat.

Dum nocte pacatissima in lectulo auscultamus attentissime, sonum quendam acutum quasi grylli tenuissimum percipimus, qui vigilantibus non percipitur? ut cum extra populosam urbem recedimus semileuca, murmur hujus urbis sentimus quod in media urbe non percipimus. Continuo scilicet vigilantibus vibratur catena ossiculorum tympani, quæ vibratio cum meatu auditorio harmonica est, non auditur assuetis.

Si duo tubi organi ecclesiastici consoni sonum quendam lenem edant, jam vero alterutrus tonus imminuat vigesima quinta parte, quod fit contractio vel partem obturata ejus extremo, imo manu ejus officio apposita, tunc auditur alter sonus fortior pulsatorius seu intermittens quem musici vocant *battement*. Si tubus sit quinque pedes longus, is centum vibrat.

vibrationes edit in secundo; alter vigesima quinta parte longior non nisi nonaginta & sex edit, ergo quilibet vigesimus quintus sonus utriusque occurrit quater in secundo: unde pulsationes quatuor singulis secundis, quæ proinde numerari possunt, & fortiores sunt sono prioribus; ex his sequitur.

Si tonus natus catenulæ officulorum paululum minuitur, tunc neatus eodem permanente; vel reciproce, debet supervenire pulsatilis sonus, qui quater, quinque, sextus, &c. in secundo repetitus videbitur continuus, aut ita frequens ut pulsationes vix numerari queant; talis est sonitus aurium ex experimentis sequentibus.

Si oscitamus, condylus maxillæ premit meatum auditorium, ejusque tonum minuit; si aqua infundatur intra aurem, ejus tonus acuitur, ut accidit schyrpho vitro; si digitus intra meatum insertus fixus & immotus teneatur, aut manus applicetur auriculæ, idem accidit; nec hoc pendet a pulsatione arteriarum, nec a calore digiti, nec a perspiratione, aut aere rarefacto; testa conchylii, baculus, aqua, &c. idem præstant. In his omnibus casibus paulisper muestur tonus natus meatus auditorii, adeoque dissonant cum catenula ossium, unde sonitus fortior, & in aluetus, qui proinde auditur.

Idem pari ratione accidit, si quavis de causa vel catenulæ tonus augeatur, ut a colapho, ictu, phlogosi, magna attentione noctu præstita, vel si ejus tonus a pure, lymphâ, muco remittatur; unde dissonantia cum meatu. Consonantæ organa exigua cum meatu brevi docebimus dum agitur de theoria vocis; si perforato palato vox prius suavis evadit dissona cum glottide, ut norunt omnes.

Si longitudo tubi organi in experimento Savvieriano sit ad alterius tubi longitudinem ut 1. ad 6. ad 4. &c. sexta, quarta quæque pulsatio concurret, sed cum centum sint pulsationes in secundo, erunt viginti quinque concursus in secundo, qui sonum uniformem, minime vero suffragantem edent, in hoc enim consistit dissonantia, quod soni tam raro concurrant intra secundum temporis, ut ferme possint numerari; unde liquet cur dixerim suffragantem pendere ab organorum auris dissonantia, quod certe nemo in acustica rudis intelligere valet.

6. *Syrigmus cephalalgicus*; *Paracusis* Græcis; *Osmidris* Latinis; ab infarctu vasorum cum vel sine febre. B.

Est ille qui in gravitate aut dolore interno capitis cum obscuritate auditus, gravi susurro vel sonitus accedit, quandoque accedente vertigine, unde metus debilis cophosus, epilepsia aut apoplexia, aut crisis per parotides, hæmorrhagiam; gravis est congestio, fluxiove in cerebri vasis, si gravis sit morbus; levior & fugax, ut in vomitione, insolatione.

7. *Syrigmus a ventriculo* Feid. Hoffmanni; ab *hypochondriasi* ejusdem. B.

Obscura est illa species, quam putat Hoffmannus

procedere ex ventriculo flatibus distenso, aortam premente & anarthropiam excitante, vel ab spasmi anarthropiam inducentibus.

In hac lenia cathartica, dein stomachica, si bombus ab aneurysmate pendat, ut observat *Duverney*, a levi exercitio intenditur pulsatio.

8. *Syrigmus cararhalis*; a causa frigida, a frigida, a perspiratione suppressa.

Si aqua in auriculam illapsa sit, pedi uni-insistens saltet ex fusu *Tralliani*.

Si a frigore suscepto, conveniunt suffitus aromatici ex absinthio, verbenâ vel ex bacis lauri, olivani, succini, vapor alkali volatilis cum bombace; sel, essentia calidior, aqua Regine Hungaricæ, moschus, vel gossypium moschagum, olenum rutæ, aqua fraxini, vinum album, succus capræ, porri cum aqua vitæ, &c. juvant.

A *Placero* laudatur potus sudorificus, &c. sternutatoria, &c. Aquarum Bellilucanarum usum suadet in hac specie *Deidari*; frequens capitis pestinatio, imo capillitii viscosi derafo, dein ulus scopulæ ad descergendum; pileoli aromatici, &c. electricitatis.

9. *Syrigmus ab exocoma*. B.

Ab exquisitiori organi sensu, a subtilitate auditus, ab organi fecitate, tensione, agrypnia, &c. Ab ictu, colapho, unde phlogosis, otalgia.

In otalgia phlebotomia, resolutoria, lac, oleum conveniunt, hæc species fugax est.

In exquisitiori sensu sæpe syrmus inveterascit, per annos perseverat, & vix unquam sanatur, maxime, si concurrat anarthropia sanguinis spasmodica, hysterica, hypochondriaca, in quo casu bæna, narcotica, victus emollicens suadentur, ut in agrypnia hysterica.

Syrigmus accedit etiam ab obstructa tuba Eustachiana ob aerem internum absumptum; myringa introrsum ab aere externo premitur, unde mutatur tonus catenulæ aurium, & cum solvitur obex tubæ, ærque impediatur, subito extrorsum radit myringa cum strepitu quasi ruptæ vesiculæ, & murmur evanescit.

10. *Syrigmus vertiginosus*.

Singulare est symptoma, vertiginis quandoque comes, necdum ab Auctoribus animadversus, quo fit ut, dum quis loquitur a dextris, ejus verba videantur a sinistris procedere aut vice versa: error ille acousticus est cognitus, verum a vitio interno pendens & morbum fugacem concomitans mihi novus videtur, & ab eodem principio procedit in nervis acousticeis, a quo vertigo in opticeis. In illa vertigine quam actu observo hoc est singulare quod objecta nequaquam loco moveri videantur, sed ægra subito sibi videantur vacillans ut lapsum metuat, sicut in vulgari vertigine.

Curatio Syrgmi. Omnium sapientissime scripsit *Galenus* de sonitu in auribus, cum notavit neutrius affectionis scilicet nec suffusionis imaginariæ in oculis; nec syrgmi certam cognitionem causæ initio affectus haberi posse, non convenit tamen citra cognitionem hujus cognitionis.

rationem auspicari, at ex principiis procata-
ficis, siquis horum vires norit, conjectare po-
test an ex frigidityte, an ex ardore, an ex ex-
quisita audiendi subtilitate fiat sonitus; potissi-
mum a juvenibus & lædentibus species dignoscitur.

De cætero quæcumque a duobus annorum mil-
libus in hoc scripta sunt, medicamina auricularia
dicta, a Galeno sunt tradita, qui ea mutatur ex
Archigene, *Apollonio* vel *Andromacho*. In hoc
morbo, ut in aliis multis, quorum theoria ob-
scurissima est, qui solentius conjectat, felicius curat,
qui de theoria sua non dubitat, lectores decipit.

Medicamenta auricularia sunt t. resolventia
acria, ut succus clatarii, capæ, allii, porri,
decoctum veratri, hellebori nigri. t. Mitiora
ut decoctum abinthii, myrrhæ, cum nitro, vel
nitro, cumino, aromamentum scriptorium, succus
raphani, alceæ, mel. 3. Vel aromatica, nervina,
tonica ut nardus, calthorum, cuminum, hyssopum,
oleum chamæmeli. 4. Vel lenientia, oleosa,
imo narcotica, ut oleum rosaceum, laurinum,
amygdalinum, adeps asnericus, lac muliebre,
succus mandragoræ, papaveris, cicutæ. *Riverius*
aromaticis & lenientibus fere usus est, cæteri
auctores acria stimulantia auri infundenda pro-
ponunt; haud dubie falsa theoria ducti, vapores
crassos esse attenuandos rati; a Pharmacis vero au-
ricularibus sonitum quandoque oriri notat *Galenus*.
Cave itaque, si non prois, saltem non nocas. *Tral-
lianus*, *Ascius* tantummodo *Galenum* exscribere.
et. *Syringus bombus*. Sonitus a plethora *Fridet.*
Hoffmanni.

Si pendet a plethora, tantum, tunc auditur
cum accedit grypnia, adeoque faciliat. audien-
di exquisita crescit a decubitu, quia sanguis hori-
zontaliter projectus spatium duplo majus per-
currit eodem tempore, quam qui verticaliter
ascendit, ergo quadruplo fortius impetit canalem
osium carotidis pone aurem insculpti.

Si pendet a febrili morbo, sæpius præcessit
tenio membranarum cerebri, capitis dolor,
agrypnia, impetus sanguinis est quoquo versus
major, at actio in arterias carotides fortior
prout infarctus vasorum capitis majorem ipsi
apponit resistentiam; nam actio est ut quadratum
velocitatis respectivæ seu differentia inter velo-
citatem virtualem, & velocitatem actualem; cres-
cit hic bombus aut sussurus in paroxysmis, cres-
cit in crisi, tunc autem expectatio suadet. a
Galeno: hæmorrhagia narium hunc solvit. Si
crisis fit parotidis expansio, ut vidit *Tulpius*,
cataplasmas emollientibus, ea est ajuvanda;
in paroxysmis phlebotomiis e pede impetus res-
trahendus, caput paulisper attolendum.

Si morbus sit inflammatorius capitis, auri,
ut in phrenitide, otalgia, eadem indicatio-
nes videntur; oleum amygdalarum, lac, laru-
dum insulsum in aure adhibenda, pediluvia,
phlebotomiæ, fomenta laxantia indicantur. Vide
oxycolam. / Hæmorrhagiam prænuunt cinnit

cum suffusione, narium gravitate, cephalalgia,
obauditione, baricæ, delirii prodromis.

V. HYPOCHONDRIASIS; *Hypochon-
driaca passio*. Latini; *Morbus hypochondriacus*
Frachaltorii lib. de Morbo Hypochondr. *Melan-
cholia hypochondriaca* Moroni Director; *Hypo-
chondriacismus* Huxham; *Ipochondria* Coc-
chi; Arabibus *Mirachia*; Gallis *Hypochondrie*,
Ægri Hypochondriaques, *vaporeux*, *malades ima-
ginaires*.

Morbus est chronicus quo affectus se in mor-
tis periculo versari ex cordis palpitatione, ru-
ctu, borborygmis aut aliis levidentibus & fi-
ne evidenti principio mutabilibus malis, imagi-
natur.

Hypochondriacos cognoscimus ex eo quod ma-
la multigena, nullo evidenti principio invicem
connexa, solo sæpe ægri relato cognoscenda,
cum scrupulosa minutiaturum attentione, ipsique
artis terminis, nobis enarrant: quod quæ alii
spemnerint incommoda, ipsi verbis exaggerent,
millenis & sæpe mutatis remediis impugnent;
Medicos suis querelis alios mox, & alios defata-
gent; de eventu solliciti & pessime ominantes
licet voraces, vegeti & functionibus omnibus ut-
plurimum, excepto circa suum morbum judicio,
bene se habentes.

Hallucinatio. mentis. in eis versatur. circa
phantasmatum propriam, quam multo magis per-
ditam, reputant quam res ipsa est, quamque con-
tinua ad corporis statum attentione molesta sci-
licet & fortiori, reapse labefacta maxime ex
eo quod Medicis suis diffidentes remedia proprio
marte vel inconcinne adhibent, sæpius suo morbo
contraria, ut repetita cathartica, frequentes
phlebotomies, clysmata quotidiana, dum gule
imperare nesciunt, aut digestionem morore
pravaque alimentorum qualitate viciant. Hinc
statu, ructus, borborygmi, hypochondiorum do-
lores, nausæ, vomitiones, acidæ, acres biliozæ,
atrabilariæ, alvi confusio, somni turbulenti-
ti & hinc macies, cutis squallor, color fuscus,
&c.

Diurna molestaque in nervoso ac membrano-
so systemate, oscillatorii, motus perturbatio &
dissonantia videtur. *Fracassio* hujus generis cau-
sa & essentia. Hallucinatio nobis videtur re-
petenda ex nimia mentis attentione ad corporis
valitudinem, tum ob nimiam phantasmata,
vitæque & voluptatis amorem, tum ob nimiam
systematis membranosi sensibilitatem. huic phi-
laurie conjungitur.

Nervos vibratorio motu gaudere est hypothe-
sis; eorum nativa laxitas & elasticitas omnis
defectus has vibrationes & consonantias esse fi-
ctitias evincunt: in rheumatismo, arthritide,
trixophya, &c. vibrantur & dissonant vasa
membranæ sine hypochondriaci; in epilepsia,
eadem sæpe sunt cætera hypochondriacos sym-
ptomata sine ullo habitualis moris metu, sine
scilicet.

Sensibilitate, deest sola animæ fortior attentio ad valetudinem, quæ initio libera est, successu vero temporis coacta & veluti necessaria evadit, ut omnia pathemata quibus indulgemus.

Hæc ægritudo periculosa expers est, nisi suc-
cesu temporis alias graviores accersat, tunc cum illis sit complicata; ideo autem est contumax, quia unde maximum expectandum est præsidium, mens ipsa laborat, & errore suo mortum facit ac fovet; ægri scilicet indocilitas, dissidentia, continua sollicitudo, non solum digestionem lædunt, sed impediunt quominus evidentia mala, quæ huic errori anam præbent, sanentur ap-
positis diuque continuatis remediis, quorum alia animam spectant, alia corpus.

Therapeia ex parte corporis exigit 1. victum humidum, cibos faciles digestionis horis determinatis, parca dosi sumptos, diu præsertim masticatos, potu aqueo, vel vini, aquati copioso dilutos; 3. somnum multum, vitando vesperinis horis lectiones, negotia, nuncios qui animam a somno avertunt; exercitium prædesti-
natum ventriculo sumptum, ut deambulatio, rusticatio, venatio, possimum peregrinatio, quatenus digestionem favent, 3. humectantia, laxantia in genere conveniunt ad sensibilitatem nervorum emendandam, & aliqualem fluidiorum demulcentiam acrimoniam: nihil est vulgari-
us in hoc morbo quam præscribere vere & autumno hac, præmissis jusculis refrigerantibus & a cathartici leni, æstate aquas minerales leviores, ut Euzetensis, Alesiensis, serum lactis & balnea, noctu emulsiones cum narcoticis.

Ex parte animæ duplici modo possumus attentionem ab objecto hallucinationis remove-
re, & 1. quidem sermonibus philosophi; quippe cum plures sint ingeniosi & literati hypocondriaci quam solidi & rustici, fieri potest ut rationum momenta sentiant; cum autem nimia philo-
sophia, vitæque & sanitatis nimius amor religiose opponatur patientiæ, ac philosophicæ Stoicorum apathæi, hypocondriaci admonendi sunt virum fortem dedecere hanc levium malorum intolerantiam, ac continuum de hisce querelam; Si enim satis persuasi forent neminem ex omni parte beatum esse in hac vita, nisi qui cædia & labores, cum animi, tum corporis eodem animo patitur, ac natus paternam manu castigatos, illi leves sanitatis alterationes non tamen facerent. 2. Expedit ut aliis fortioribus ideis excitatis, idea morbi ex eorum anima deleatur; plures vis sunt, qui super-
perveniunt liti, aut gravi negotio, morbi sui obli-
vis sunt, & qui ejus oblivisci potest, salvus est. In hunc finem nihil convenientius est equi-
tatio o per loca amœna, tempestata serena, aut quod eodem residit, & peregrinatione naviga-
tione, rusticatione; aut equitatio præstat ceteris; omni enim instanti continuo novis & variis objectis visus, auditusque percillitur, ita ut fere impossibile sit animam attentione fun-
cta non averti, & aliis cogitationibus non af-

fuescere in quo magna pars curatio consistit.

Quo homo debilius est corpore, eo saepe debilius est animo, seu minus fortis & audax ad adversa viriliter sustinenda; ea vero fortitudo animi quæ deficit in hypocondriaci augeatur amicorum colloquiis. Medici eos alloquuntur se-
curitate & promissis: aut uplurimum validis me-
dicaminibus corpus enervatur, cathartici repe-
titi, phlebotomis importunis debilitatur, unde vis animi perit, & recrudescit hypocondriaci; nihil magis facit ad læticiam excitandam quam sufficiens perspiratio, observante Santorio, adeoque ejus præcepta dietetica & gymnastica ad eam promovendam hic valent maxime, inter quæ iterum equitatio ceteris præstat.

1. *Hypocondriaci biliosi* Fracassini, seu calida & siccæ, 1. *Species* L.

Species omnium rarissima, quæ temperamento bilioso jungitur: Vide signa & principia huius temperamenti in Physiologia. Ager sæpius con-
queritur de cephalalgia gravativa, vertigine, sy-
rigo; dyspnœa, palpitatione, doloribus artuum, nephralgia, cardialgia, biliosa colica, gastrodynia, oris amarore, alvi constipatione; tristitia & morositas ad audaciam usque incrementum, intolerantia est petulans; jungitur citius macies, pul-
sus velox, calor, siccitas.

Cura. Nocent in hac specie calida & exsic-
cantia, ut rheum, aloë, amara, martialia. Ju-
vant juscula refrigerantia ex pullo, lactuca, en-
divia, ranis, emulsiones balnea, aquæ minerales leviores, potus aqueus, nec vitandæ sunt initio & in paroxysmis phlebotomiz.

2. *Hypocondriaci sanguinea* Fracassini, calida & humida, Spec. 2. L.

Ulla est species quæ plethoræ signa conjuncta habet, ut capitis gravitatem, dyspnœam a le-
vi motu lassitudinem, desuetas narum hamon-
thagias, suppresia catamenia, mariscas parces flu-
entes, tumidas, famem vegetam, victum opipa-
rum, colorem faciei floridum, &c. rara est hæc etiam species.

Plethora secum sanguinis spissitudinem impor-
tat, uplurimum vitam sedentariam, mollem se-
quitur. Inducantur itaque 1. sanguinis missiones repetitæ initio, quibus agrypnix, dolores capi-
tis, artuumque subleventur, quæ non adeo in hoc casu pertimescendæ ac in hysteria pituitosa & ve-
tusta merito permittit Sydenham: hirudines etiam pro re nata misericis eurgidis applicandæ; 2. Laxantia tum forma potus, tum forma clysternum optime quadrant, tum ad emolliendam & humec-
tandam; peccat enim calore & siccitate corpus; alio laxata caput melius se habet; potu theiformi subaromatico ex foliis melissæ, menthæ, cap-
prariæ, theæ, fluida diluuntur, urinæ fluent, sanguis edulcoratur; permittitque lenibus cathar-
ticis ex manna, tamarindis, infuso levi fenæ, juscula ex pullo, peditur in paroxysmis, ac sedantia profunt; aut opata cum cumphora & nitro injungenda. Inveterato morbo cascarella & china radix periodicos insultus avertunt.

Hypo-

Hypochondriaci, si frequentibus balneis corpora reddantur perspirabilia, & victu humido utantur, sani fiunt. *Saunder.*

Si obstructa sint viscera, adhibeantur pilulæ ex sapone, rheo & tartaro vitriolato, cum paxillo essentia juniperi, & syrupo aperitivo.

Pulveres absorbentes *Vedelii* cum succino cinnabari, & nitro laudantur, optime spasmos compescunt.

Liquor mineralis anodynus *Hoffmanni* roborat & sedat.

3. *Hypochondriasis melancholica* Fracassini, seu *frigida & sicca*, cap. 3. pag. 329.

Solida sunt rigida, vasa minima angustiora, pinguedo deficit, siccum est corpus, sanguis crassus, alvus sicca, digestiones statuofæ, nephralgiæ, colicæ, ructus accedunt, hepar difficile permeatur, mens anxia, morosa, tristis, mores feveri, ingenium acre, ætas virilis; species hæc frequentissima.

In hac species præter phlebotomiam parcam suadet corporis inunctiones, fomenta emollientia, balnea tepida, oleum amygdalarum alvo lubricando aptum ad uncias tres quavis, die, in decocto chamæmeli, vel in jusculo; dein catharticum lenè ex cassia cum rheo, alternis diebus ad tres vel plures vices; tinctura rhei, cum sale tartari, in decocto fumarie, agrimonie, & si sint obstructiones, in decocto foliorum saponariæ, chelidonis; valis deobstructis ad sedantia, paregorica deveniendum, pilulæ de cynoglossio cum nitro & camphora, niterum cum cinnabari & succino, pulvis Hanoverianus Marchionis in aquis tile, pæoniæ, calndulæ, ceraforum nigrorum; Lac cum decocto chinæ, cochleariæ, fumarie mixtum & ebullitum hujusve loco juscula ex pullo, ranis, cancris, hordeo, oryza repetenda sunt.

Rasuræ corni cervi uncia quatuor, cum aquæ libris viginti post digestionem ebulliant per sex horas, adde carnem duarum testudinum & gallinæ juniores, coquantur, dein expressa colatura cum lactis libris octo, aquæ naphthæ uncia una, florum borraginis, buglossi, foliorum cochleariæ, nasturtii aquatici ana manipulo semisse destillantur in balneo mariæ, dosis unc. x. servetur reliquum ad usum.

Dieta aut semidietæ lactea etiam maxime congruit; aloetica, & martialia, aquæ acidulæ sortiores, pillulæ Becherianæ, Stahlianæ minus conveniunt.

4. *Hypochondriasis pientrosa* Fracassini cap. 4. pag. 338. L.

Eos aggreditur qui frigidi sunt & humidi.

In illis solida mollia mians elastica, sanguis effusus, bilis iners, circulatio tardior, pathemata languida, pulsus mollis, calor minor, pallor, somnulentia major, minor audacia, major debilitas corporis & animæ. Si vero ob ærumnas, lites, dedecus, anima debilior eyadat, minus constans sit & facile deiciatur, inde mætor, languor, tristitia, quæ digestio-

nes pessumdant; inde cruditas, vaporum infarctus, status, aliaque symptomata hypochondriaci.

Hæc species exigit præmittenda cathartica stomachica, ut rheum, aloem, fennam; respuet phlebotomiam; exigit tonica ex marte, rheo, cinnamomo, macis; clysmata carminativa ex chamæmeli, mentha, anethi, carvi, foeniculi decocto, pilulas *Quercetani*, *Hermannii*. Curantur etiam illi hypochondriaci itinere, navigatione, venatione, musicis contentibus, potissimum equitatione; huc conferunt aquæ sulphureæ de Bagnols, St. Laurens, Cauterets, quæ tonum fibræ & fluiditatem lymphæ conciliant; huc pertinet processus ad hysteriam a *Sydenhamo* commendatus suppressis lacticiis & balneis.

5. *Hypochondriasis hysterica* Fracassini. pag. 338. part. 3. *Hypochondriasis muliebri* ejusdem L.

Cognoscitur ex signis conjunctis hypochondriacis & hysteriæ, scilicet quod a levibus pathematibus, ut terrore, repulsa, tedio ortu ducat maxime apud mulieres puerperio, diarrhæis, phlebotomiis debilitatis, quod in paroxysmis spasmi cutanei, palpitationes, carus hysterice, asphyxia hysterica, dyspnœa, angina, dysphagia, colica hysterica, gastrodynia, globus abdominalis, urinæ limpide, copiosæ, oscitationes, risus & stertus sine causa evidenti accedant & recedant. In terapeia distinguendi sunt morbi hysterici breves, vel acuti, de quibus jam cgmus, ab hysteriâ habituali, in qua non actus datur ullum symptoma grave.

In statu habituali respicienda sunt catamenia; si enim parcius aut nullatenus menses prægressi fluxerint, ille fluxus restituentus est, aut supplendus phlebotomia; in hunc finem in calidis aquæ acidulæ, equitatio, aqua ferrata, usus erotici in frigidis limatura martis, juscula aperientia cum rheo, radicibus aperientibus sunt advocandæ.

Menstruis bene procedentibus serum lactis, balnea, aquæ acidulæ, juscula emollientia, extitum suadenda.

Si vero acuti morbi accedant, vide illas species in suo genere.

6. *Hypochondriasis phisifica* Fracassini part. 3. cap. 3. C.

Hujus combinationis duo exempla refert auctor; phthisi vero hypochondriaci accedens ea est quæ ab hæmophthiæ ortum ducit; signa obscura non sunt: Remedia vero edulcorantia, diluentia, lacticia cum equitatione agrum sublevare possunt, non sanare.

7. *Hypochondriasis asthmatica* Fracassini part. 3. cap. 4. L.

Hanc speciem comitatur asthma vel convulsivum, vel humidum, vel mixtum.

Cum asthma convulsivum est, suadentur phlebotomiæ (in paroxysmo, hirudines ano applicandæ, unctiones pectoris, pediluvia; extra paroxysmum balneum pro remedio singulari habetur, oleum amygdalarum vel seminum poponis,

nis, ferum lactis paregorica frequentia, lac asinum.

In asthenie humoralis abstinendum a balneis, phlebotomia, alii que laxantibus; resolventibus abstinendum, ut croco, camphoræ suffragiis ex saccharo, olivano cum paucillo cinnabari, vaporibus humectantibus ex decocto verbasci, althææ, nymphææ inspirandis: intus cataracta lenia, ut manna in decocto pulilaginis, erythri, syrupus violarum, dein incisiva bechica, ut extractum enulæ, scabiosæ, ieros, sperma ceti, crocus, flores sulphuris, benzoinum, sal volatile succini, cornu cervi; imo si viscosa sint sputa, gummi ammoniacum in aceto scillitico, fuligo præparata, olivabum.

Hypochondriasis calculosa Fracassini part. 3. cap. 5. C.

Nephralgia calculosa accedit symptomatis Hypochondriacis, ut gastrodynia, hypocondriorum tensio, borborygmi, alvi constipationi, urinæ tenuibus, tuctibus acidis.

Curatur oleo amygdalarum, balneo aquæ dulcis, phlebotomia & leni cathartico præmissis ex-
tra paroxysmum, potu diluente, aquis acidulis; dein inter specifica adhibetur rasura saponis cum tartaro vitriolato, terebinthinæ ope in pilulis redacta, superbibendo decoctum saxifragæ cridastylitis & millefolii.

9. *Hypochondriasis tympanitica* Fracassini part. 3. cap. 6.

Ut plurimum intestinorum cavum status replet; alia vero tympanitis est indolens, alia doloribus atrocibus stipata; rursus hypocondriasis quam comitatur est pituitosa, vel est biliosa, aut melancholica.

Ubi tympanitis est dolorifica, oleum seminum lini melius est oleo amygdalarum, paregorica parca dosi sunt adhibenda, stomachica & discutientia intus sunt necessaria, quæ aromatica, spirituosas & volatilia sint; postea aquæ mariales sulphureæ & in pituitoso temperamento chalybeata & corroborantia; extus vero fomenta ex vino, radice bryoniæ, ieros, floribus chamæmelis, seminibus carvi, anisi, cerata resolventia, fasciæ ventrem comprimentes, clysteres carminativi cum melle solutivi, philonio romano.

At cum dolores absint, cathartica ex manna, stigma, tartaro profunde super bibendo aquas Tectarianas: pilulæ aloeticæ, theum, mercurius dulcis, dragydidum, pilulæ Berherianæ conveniunt, dein decocta rhei, extractum baccarum juniperi, decoctum calami aromatici, infusa menthæ, pulegii, concisæ aurantium.

10. *Hypochondriasis algida*.

Non rari sunt hypocondriaci qui præter status, constipationem, mariscas, subsultus convulsivos dum potissimum somnus accedit, pulsationes, borborygmos in hypocondriis, vertigines, cephalalgias, pectoris constrictiones, &c. consequuntur potissimum, tum æstate, tum hieme, & frigore continuo imprimis capitis & catarrhis, ita ut vestibus hibernis media æstate se coope-

riant, unde fervor sanguinis qui frigoris sensationem non tollit, nisi oborta sudatione; hinc sudores, præsertim nocturni, quibus emaciatur: sensatio verò illa frigoris eos durit ad thesmas calidissimas quarum ductis morbus intenditur; frigusque minime sublevatur, cum illud pendet a cutis erethismo: hic morbus est pertinacissimus, eum vidimus ortum ab intempestiva & largiori hydrargyri sine syphilide.

Indicantur & profunt reapse lacticina, balnea frigidiuscula, iuscula emollientia, equitatio successiva vestium immutatio. Hæc species exiguo mortis timore est stipata, ita ut inter algorem & Hypochondriasm anceps sit.

VI. *SOMNAMBULISMUS*; *Noctambulatio*, *Noctisurgium*; Græcis *Noctegesis*, *Hypnobotese* & *Nyctobasis*; *Maladie des somnambules*; *Ægri Noctambuli*, *Somnambulones*, Græcis *Nyctobata* & *Hypnobata*.

Est dormientium ea hallucinatio qua se vigilare putant, omnia vigilantium munia exsequuntur & se diversis periculis exponunt.

Somnus sanus est ille status quo omnes tum sensationes tum imaginationes silent, & seriantur, omnesque motus liberi suspenduntur; in somno vero sano sola viget imaginatio, omnes sensationes sunt obcurcissimæ, & motus omnes, ut in somno, exceptis vitalibus, seriantur, dum in *vigilia* & sensatio & imaginatio, ut motus liberi exercentur. Hinc patet quid sit *somnambulismus*, somnium scilicet in quo omnis sensatio seriat, sed imaginatio vividissima est, unde motus atque actiones arbitrarie exercentur, ut in *vigilia*.

Differt itaque somnambulismus a *vigilia* per sensum omnium sensationem; somnambulo scilicet nec videt, nec audit, nec gustat, nulla eorum quæ præsentia sunt apperipit, de cætero eandem ac vigilans actionem exercet.

Daturne in *encephalo* centrum quoddam ad quod omnes nervi sensiferi pertingant; quodque sit insarctum ita ut nulla sensatio fieri possit? verum nervi motus atque destinati sunt simul omnes sensiferi; quo pacto itaque fieri potest ut idoneis sint ad motum; dum ad sensum inepti sunt? an anima attentionem suam retrahit ab organis sensiferis, ut oculis, auribus, cute, &c. & tota attendit ad motus fibrarum medullarum cerebri, quæ imaginationes excitant? nonne similiter in *apoplexia* & *cero* retrahit suam attentionem ab organis sensiferis, sed eo discrimine quod nil agat in artibus apud *apoplectas*, agit vero per musculos artuum in *somnambulis*? æger ab utriusque morbi insultu rediens anteacturum omnino inscius est. Sic *apoplexia*, *syncope*, *somnambulatio*, *epileptici* post insultum æque ignorant quæ se præstita sunt, ac si non existeret toto illo suæ vitæ spatiolo, aut ad summum obcurcissimum quo-

quorundam ideam servat, ut a somnio, si insultu levissimus fuerit.

Si sensationes obscurissimæ sint in noctambulosis, reciproce imago vividissima est unde fit ut multo ingeniosius & sagacius munia sua perpetrent quam vigilantem; dormiendo scilicet scoliastici noctambulosi & themata sua accuratius, & carmina sua rectius componunt; murrorum structiores excelssæ tectorum turres obambulant quam qui vigilant, alii non sine periculo in h's circumstantiis a somnio suo excitantur; diffidit autem excitatur; sopor enim somnambulatorum multo altior est somno sanorum; licet levior sopore cataleptorum.

1. *Somnambulismus vulgaris*. L. P.

Est illa species in qua homo sopore excitabili dicitur, unde differt a cataleptico somnambulismo.

Duo vero sunt huius gradus, levior scilicet est ille quo detenti & lecto non exiunt, sed se movent & loquuntur, inter quos sunt qui entium distinguunt & vibrant, scopetum explodunt quasi aqtes aut latrones impugnandos haberent, non sine magno & sui & vicinorum periculo. Alii vero & lecto exsiliunt, se vestibus induunt, lampadem accedunt, claves inquirunt, foras referant, vinum & dolio extrahunt, aut quid simile parant, quin evigilent; alii fenestras insident & calcare equum, cui se impositos, pulant, exagitant; sunt qui flumen tranant; alii ea omnia oculis apertis faciunt, nec tamen expersunt. Illi vero se diversis periculis exponunt, maxime si imprudenter & inopportune excitentur. Inferturiorum exempla vide apud *Fabricium Hildanum centur. 2. observ. 84. & 85.*

Insultum determinant ebrietas, æcna, largior, cibi statulenti, duri, tegumentorum copia, decubitus supinus capite depresso, usus opii, semen cannabis, studium post cœnam, somnus initus ante digestionem peractam.

Ex his intelligitur quibus cautelis præcaveri possit insultus; verum si affectus sit hæreditarius, aut ab ortu congenitus, difficile est eum eradicare. Profuit in sene somnambulone repetita electrificatio, referente *Illust. Massy*; prodest etiam cupum aqua plenam lecto admoveere ita ut e lecto surgens balneo frigido exeat; prodest etiam si amicus noctambulum seingat & verum noctambulum verberibus prosequatur; interea, cancellis fenestras claudende sunt, ne se precipitem dea ager, ut sæpe accidit.

De hoc morbo vide *differt. Zuvingeri*; *Observationes curieuses de P. Reugeant*, tom. 3. pag. 156. *Thesim Dr. Gualdy* &c.

2. *Somnambulismus catalepticus*. *Cataleptis delirans* Act. Acad. Upsalienis anno 1743. pag. 41. & *Hist. de l'Acad. R. des Sc. 1743.*

Est species quæ paroxysmo cataleptico incipit & altero terminatur. Vide *Capraleptim*.

Medicus Ripelatenfis suam conjugem meam commiserat; ea 14 annos nata, menstrua, con-

rodice, recurrentem, a levi animi turba recrudescens, ejus paroxysmi semper horam durabant; eo subito omnem sensum amittebat, ut in cataleptis delirante, sed eo discrimine quod comians pergebat, muscando, gesticulando, vel loquendo, sui animi sensa ab initio ad finem manifestare; tunc in lecto sedens hostem suum videre sibi videbantur in Chirurgo cubiculum ingressi, & in ipsum insiliebant; tum umbram sui corporis in muro opposito pictam cernebat, & pro vario candelæ situ surgentem insequens, irascebatur in illam, intereandem maritum alloquentem nec videbat, nec audiebat, neque quovis modo puncta aut læcessa ulla sensus signa edebat. Hi paroxysmi plures menses redibant; frustra ubertim sanguis ipsi missus est, frustra balnea, refrigerantia adhibita sunt; Monspelii procul ab objecto iræ suæ melius se habuit, multo rarius recurrebant paroxysmi, imo ambulando, animum retinendo tantum, convalevit. In ipsis paroxysmis digitus, manus, artus, impressum litum retinebant quod in simili morbo nuper descripto ab *Illust. Larry D. M. Purif.* notatum non video. Hic morbus omni ævo fuit, ni fallor, obviis, sed a nemine observatus, antequam ejus historiam consignarem; vid. *Mem. de l'Acad. R. des Sc.* aliud etenim est videre, aliud observare.

ORDO SECUNDUS.

MOROSITATES.

Morositas est voluntatis aut noluntatis depravatio. Morosus, Gallice *Bizarre*, *capricieux*, *voluntaire*, est ille qui sine ratione quodpiam constanter appetit quod ipsi bonum reale non est, aut averfatur quod malum apparet est tantummodo, licet realiter bonum sit.

Eodem dicitur quod nos statumve nostrum perfectiores reddit, malum vero quod imperfectiores tendunt directe ad unum optimum finem, seu ad eum propter quem a Summo Numine creatus est. Media vero ad eum finem obtinendum apta sunt totidem fines prioribus subordinati ad quos tendere debent ejus actiones & dispositiones; qui enim vult finem, media ad ipsum ducentia velit oportet. Finis ultimus est haud dubie felicitas æterna, fines vero intermediarii sunt bona animi, bona corporis & bona fortune, ex quorum concursu felicitas temporalis etiam obtinetur.

Quidquid agimus, illud finis alicujus gratia suscipimus, & quod nos ad agendum determinat motivum est sive rationale sive erroneum: ratio exigit ut bonum majus minori anteponamus; qui itaque minus majori, breve diuturno, fugax constanti bono anteponeit, is motivo minus recto, adque erroneo duci se patitur; atque qui motivo erroneo ductus vehementius quidcupit aut averfatur, is morosus est; quippe minus bonum majori, aut quod eodem recidit, quidpiam quod malum est bono anteponeit, seu

malum reale pro bono iudicor. *Hippocrates in aphorismis* vulgo bonum reputat quod a majori malo nos liberat licet ingratum sit, sic amputatio brachii in se quid malum est, & dolorificum; si vero brachium sphaculosum sit, & ejus amputatio ad vitam servandam sit necessaria, ea pro bona merito habetur. Suavitas quam a saccharo degustato percipimus quid bonum est; verum si inde progerminet vermic morbo gravi ansam daturi, sacchari esus malus habendus est, cum suavitatis constans quæ a sanitatē expectatur, sit quid melius suavitatis fugaci ex esu sacchari percipiendā.

Ideo itaque erramus in appetitu, seu morosi sumus, quod de objecti cuiusdam bonitate aut pravitatē perverse iudicamus, quod v. gr. bonum minus majori anteponimus, ut sensibile intellectuali, fugax contanti. Id vero procedit ex eo quod objectum non satis cognoscamus & nosmetipsos ignoremus; id enim bonum solummodo censendum est, quod nos perfectiores aut minus imperfectos reddat, ergo quid nobis deficiat prius cognoscendum est quam eorum, quorum indigemus, cognitionem adipiscamur, seu id solum appetere deceat quod respectu nostri & in datis circumstantiis bonum est, licet in aliis circumstantiis forte nocivum esset. Sic medicamentum emeticum quod sano noceret, in quibusdam morbis & circumstantiis ejus morbi optimum est, & ejus aversio erronea censenda est ac morosa, cum verosimile est, quod ab ejus omissione vitæ periculum imminet, & ab assumptione sanitas restituitur.

Bona *sensibilibus* sunt voluptates ex sensationibus perceptæ, ut voluptas quæ a fame, siti, libidine expleta exurgit; illæ nobis sunt concessæ, ut ad individui sustentationem & proles generationem dato tempore invitentur, qui vero eam voluptatem pro fine sibi proponit, quæ tantum est medium ad bonum majus assequendum, ille voluptuosus, helleno, violentus aut libidinosus habendus est; sed illi errores, quatenus sanitati directe non nocent, sunt tantum errores *morales*; non vero *morositates*, quæ medicorum curam expostulant, licet pluribus morbis ansam præbent.

Ut hallucinationum, ita & morositarum duplex est principium, alterum corporeum quoddam vitium, alterum vero animæ ipsius error; sic libidinis morbosæ, seu satiriacos principium est feminis acrimonia, fibrarum nervearum sensibilitas major; aut feminis acrimonia ipsa potest pendere ab usu condimentorum gulæ placentium, liquorum ardentium; ac sensibilitas genitalium nimia potest intendi a lascivis ideis & phantasmatibus sapientis animæ oblati & voluntatis; ergo a causis *materialibus* & a *moralibus* non raro pendunt hi morbi; proindeque auxilia utriusque generis ad hos curandos sunt adhibenda, errantque Medici qui auxilia moralia ita continent, ut nullum in institutionibus artis eorum mentionem faciant. Errat maxime

Boerhaave, & Materialistis favere videtur, cum in definitione morbi nullam animæ mentionem ea ratione injicit, quia corporis statum determinatum idem, ait ille, anima statum individue comitatur; unde sequeretur nullum esse animæ imperium in pathemata, nullamque moralium auxiliorum in arte medica utilitatem, quod certe quotidianæ experientie refragatur, cum ex ipso *Boerhaave Aphorif. 304. quædam auxilia ex mente repetenda sint, ut quæ magnos affectus, ratiocinio, excitemente contrarii affectus vel diversendo, sopiunt*, & hac arte nimium sanguinis impetum retundunt. Status itaque corporis ab anima mutatur, necum status animæ corporis conditionem semper & individue comitatur.

Morositates alix sunt pathemata vividis, alix vero tristibus, languidis potissimum stipatæ. Pathemata *vivida*, ut ira, gaudium, cupiditas, pendente ut plurimum a fibrarum nervearum robore, tensione, elasticitate nimia, fluidique nervi activitate; pathemata *languida*, ut metus, animi deliquium, tridium, inappetentia, frigidity, qualia observantur in nostalgia, pica, morosi, amnesia, videntur pendere ab imminuto tenore medullæ cerebri & fibrarum nervearum, inde in organa distributarum, fluidorumque vapiditate, inertia.

Ad utrum ex hisce principiis morositas pertineat, docent prægressa; etenim si morbum præverint curæ mordaces, vigilæ, lucubrationes, victus opiparus, usus spirituosorum, aromatum, condimentorum, verosimile est fibras, siccitate, elasticitate, sensibilitate peccare; sensibilibus cum mollitie, & tenuitate fibrarum ponit earum *tenuitatem*, qualis in infantibus, puellis, hysterisque observatur; hinc animi mobilitas, inconstantia, iudicii levitas, ad delirium, metum, desperationem proclivitas. Medicus blandiens, crepundias offerens, spem promissa erigens, eardicis debiles, castoreo hystericas, vino convalescentes reficit.

Sensibilitas nimia fibrarum cum harum firmitate & robore *irritabilitatem* constituit, qualem in maniacis, ita percitis, fœtibus, rusticis, phreneticis observamus. Plethora commota, febris acuta, vini usus, dolor fungus, commotiones animi tunc excitant, quas phlebotomia, victu molli, refrigerante, somno, quiete, æncriis, silentio, narcoticis, extra febrem balneis, fomentis pacare opus est. Quænam sit illa irritabilitas in hydrophobis, in cephalæa discruciat? In otalgia, vel levis susurrus; in arthritide incessus supra pavimentum; in ophthalmia minimus lucis radius dolores gemitus, anxietates ægri ingemunt.

Animæ debilitatis lux conscia timori, pusillanimitati, deliquio, mœrori se totam tradit; infirmatum tenorem medullæ cerebri insulant Auctores quidam in omnibus animi morbis, ut *Kloekhoffius*; aut merito quæcum in ipsis affectibus, maxime cum videamus hanc pusillanimitatem, mobilitatem animi, pronitatem in risu

& mox in lachrymas, deliramenta, imaginatio-
nis ludibria supervenire, puerperis largas hæmor-
rhagias passis, mulieribus morbo chronico, cathar-
ticorum repetito usu debilitatis, viris delicatulis
quos ærumnæ, studia aciora, vita sedentaria,
prodiga seminis ejectione, ptyalismus ab hydrargy-
rosi, &c. infirmarunt.

Illis conveniunt analeptica; quæ iacturas repe-
rent, victus ex eupeptis, usus vini, quies sum-
ma animi cum exercitio moderato corporis, in lo-
cis amenis, animum divertentibus ab objecto mor-
oris, abstinencia ab omni medicamine evacuan-
te, usu prudenti opii.

In cura ægritudinum animi, quæ sere semper
cujusdam boni sensitivi cupiditate fovetur, aut
mali sensitivi averfationem habent comitem, nec
tenendum Medico, penes nos esse, nisi affectus
sic vehemens, illas cupiditates moderari, mentem
ad alia bona revocando, ideas novas prioribus
oppositas excitando; sic videmus bona physica
minori in pretio esse apud eos qui bona intelle-
ctualia, ut virtutem, pietatem, scientiam sectan-
tur; Medicus ergo cupiditatum & voluptatum
sensitivarum contentum inspirat ægris, earum
noxam, instabilitatem, effectus sanitati etiam fue-
ntos enumeret; si vero hac arte dolorem, mor-
orem ægri non minuatur, ad alterius boni cupidi-
tatem ægrum incitet; sic erotomania affectum a-
micorum consortio, conviviis, ludis, theatro,
venationis, mulieris illecebris a priori cura di-
moveat.

Ægro corporeis voluptatibus merso in me-
moriam revocare decet, hominem natum esse
qui summe voluptati consequendæ studeat, quæ
completatur usum bonorum omnium singula-
rium quorum quisque capax est; interea locum
longe principem tueri bona menti magis pro-
pria.

Apprime tamen attendendum est, alios hujusce
classis morbos a prava organorum dispositione
pendere, quæ medicaminibus tantum potest resti-
tui, ut pica ab acido in stomacho latitante,
typhomania ab acrimonia feminis; alios vero
quos causæ morales producant, ut pica, quæ ad
pallorem pulchritudinis causâ conciliandum exci-
tatur, nymphomania, quæ imaginationis libidi-
nosæ & voluntatis ad voluptatem prone effectus
est; harum vero causarum combinatio in eodem
morbo frequentissima est, unde & physica & mor-
alia remedia simul indicantur.

VII. PICA; *Picæ appetitus* Rod. a Castro
Lib. 3. *Citra* Cl. Linnæo, *Picæ* Barbaris; *Cix-
æa*, *picta*, *malicia*, ac *chitrosus* Græcis; *Ap-
pétit dépravé*, *gout bizarre*, *appétit bizarre*.

Pica est alimentorum consuetorum averfatio,
cum inasuetorum, sanisque insalubrium appetitu.

Duplex itaque symptoma picam constituit,
averfatio scilicet & appetitus; primum vocatur
proprie *cacafilia* & *apétila*, Latine *cibi fastidium*,
quod si solum sit, & seorsum ab inasuetorum

appetitu, vix genus diversum à *nausea*; est, aut
ad *anorexiæ* proximè accedit; verum sapius
conjungitur cum absurdorum appetitu; qui enim
alsueta alimenta averfatur, is fere necessario ad
inasueta recurrit; dico inasuetæ, alia enim sunt
insalubria sanis, ut calx, carbones, acetum,
araneæ, pediculi; alia licet minime sanis insa-
lubria, ita copiose, intempestive & ardentè ap-
petuntur, quod apud gravidas accidit, ut si his
frui non possint, gravissime angantur; fetus
navis singularibus notentur, observante Hip-
pocrate. Novi mulierem quæ ardentissime appetit,
dum grvida est, penem crassum nigricantem; al-
teram quæ noctu surgit, ut decem haleces cru-
dos voret; dantur quæ per novem menses tan-
tum limonibus vixissent; mitto loqui de iis quæ
carnem humanam e vivo homine dentibus avul-
sunt; nec deficiunt etiam scitophagi, æsthe puel-
la, (de qua *Zacutus Lusitanus*, centur. 304. lib.
3.) quæ oleo denegato, anxietate quadam vex-
abatur, & cor sibi lancinare sentiebat. Vide etiam
exemplum in *Estimulero*, de *Pica*, seu *Malicia*, pag. 88.

Ideo averfamur quædam alimenta, vel quia
deglutata male sapiunt, vel quia sumpta stoma-
cho displicent; male sapiunt, quia perversa est
salivæ crasis, quacum miscentur alimentorum mo-
leculæ, antequam papillis lingvæ feriant; ex hac
vero miscela exurgit sapor ingratus; verum idem
accidit eadem de ratione in stomacho, in quo li-
cet non detur gustus, datur tamen tactus; aut
sensus obscurus, qui moleste fert actionem ali-
mentorum simili saliva, aut succo viatorum:
hinc averfatio in organo digestionis, ut in or-
gano gustus; tunc autem homo alimenta vulgaris
respuens querit inasuetæ, & aliquali instinctu
fertur in salem, humum, haleces, succum limo-
num, &c. usquequo gratum cibum, aut potum
inveniat. Nihil mulierem gravidam, quæ per
mensem integrum animo suo revolvebat quid ap-
peteret, & posse non poterat; appetebat aquam
anxie quid sibi omnino ignotum; datur itaque
certe individui licet ignoti cupiditas, quidquid
vulgare adagium contradicât; sic canes ignotum
sibi gramen prima vice appetunt, & detectum
avide vorant; sic recens nati lac ignotum ap-
petunt, ut puberes venerem.

Potissime species picæ mihi videntur sequentes.

I. *Pica infantilis*; *Pica dei infans*. L.
Nihil est vulgatius quam infantes trimi,
quadrimi, cacochymi, potissimum apud plebeios,
qui humum, & murorum mortarium pogila-
tum & clam devorant per menses & annos;
non secus ac aves pulveratrices, ut gallinæ, in
stergulliniis lapillos, areculas eligunt, quibus
indigent ad trituram alimentorum in stomacho
cartilagineo juvandam; illi vero infantes debili
sunt stomacho, & ad acescentem saburræ pro-
no; nativo itaque quodam instinctu ducuntur
ad absorbentia terre, quæ hunc acorem corri-
gant asfumenda, ita ut natura in hoc sibi reme-
dium quærat, ut querit apud canes in gramine
cum

etiam in finem, vorando, ut vomitu rejectum viscosum sui stomachi saburram evarrat.

Quoniam vero ea medicina naturalis insufficiens est, ars medica suppetitas ipsi ferre debet, adeoque cathartica, amara, tonica, ut rheum, aloë, vel fenna in infuso amaro, antiscido, ut ablinthii, centaurei minoris, chamædrys debent præscribi; dein stomachica vitium salivæ & succi gastrici corrigentia præscribuntur, ut pulvis catharticus Hartmanni ex oculis cancerum, limatura ferri, pulvere cinnamomi, saccharo, &c. Huc pertinet Pica a scabie retro pulsata. *Estmuller. Colleg. consulat. cap. 3. Ephem. Nat. Cur. Dec. 1. A. 1. Obs. 83.*

2. Pica Chlorosientium; Pales couleurs. L.

Est illa quæ puellis pluribus, non menstruat, aut male menstruat, cum pallore, animi sæpe morore, solitudinali amore supervenit. Excrementitius ille cruor superfluous non retinetur in corpore, quin inde circulatio tardior evadat, quins serum superfluum pravam crasam, sapius pituitosam & viscosam, imprimat salivæ & succis digestivis ab eo mutatis; inde insipida est saliva, iners, fatua, linguam non titillans; inde inapetentia, alimentorum consuetorum averratio, & condimentorum necessitas; uti cogimus sale, aceto, succo limonum condire, quæ sunt viscosa, adiposa, insipida ad hoc ut gustui arideant; ita chlorosantes condimenta appetunt alimentorum instar, etque avidè vorant, sive liquida, ut acetum, oleum, muriam, liquores spirituosos; sive solida, ut piper, sal, halesces, &c., hisque mirifice delectantur; prima posset dici pica absorbentium, ista vero pica condimentorum.

Docet autem experientia quod restituit marzialium opæ catameniorum fluxu, & roborato stomacho, & solidorum aliorum tono, vitiosa hæc saliva & saburra non amplius generetur, genitaque per cathartum expurgata, utplacitum hic morbus sanatur.

Ad melancholiam vero dimittimus morositates illarum, quæ non alimentis, sed singularibus visus, odoratus objectis delectantur, ut numerandis vitrorum quadratis, tabulatorum tigillis, scabie gradibus, odorando pulveri, qui verrendo cucula spargitur.

A veneno scabiei repulsæ, historiæ *Estmulleri*; a veneno etiam pice, seu trichomatis induci pica *Stahl*i observationes docent; a primo vero induitur prima species; a secundo quænam inducitur ignoro.

3. Pica Malacia; Envie de femme grosse. L.

Malacia, Latinis mollities, effeminatio, est habitus suis cupiditatibus indulgenti etiam ratione refragante; Malacos Græci vocabant, quos Galli *Enfants gâtes* nuncupant, quod de utroque sexu, & quavis ætate dicimur, quoties ob molliorem vitiosamque educationem, pueri suis voluntatibus præfracte adhxrent, nec rationi aures præbent.

Itaque pica illa species quæ malacia est, proprie ab illo animi vitio procedit; a prioribus *Sauvages Nosologia Methodica. Tom. II.*

ratione originis discrepat, & licet gravidis mulieribus familiaris sit, non minus sexus virilis, & potissimum ætas puerilis, hac pluries afficiuntur.

Illæ cupiditates non solum circa alimenta absurda, aut inasuetæ versantur, sed etiam circa alia quævis objecta. Puer Monspelienis malacia correptus, languidus, gembundus, omnem cibum recusabat, & tantummodo vicini ejusdem pistorum noctu dieque sibi dari cupiebat prece & pretio; mater gnati vitam ab hujus pistorum esu pendere existimans, pistorum sibi comparat, occidit, & assatum filiolo charissimum offert; iste vero vehementius ejulans clamat se velle pistori cantum audire; talis est malacia; talis erat morbus ejus scæminæ quæ pistori humerum manducate ita vehementer ardebat, ut quovis pretio maritus coactus fuerit ab illo pistoro obtinere, ut conjux duobus moribus sibi satisfaceret, & ægritudini suæ alias insanabili hoc remedium optaret. Plura exempla apud *Sennertum* sunt obvia. Quare vero gravidæ hac malacia sæpe detinentur, dux possunt afferri rationes; prima est vitium salivæ tum a feminis virilis aura infectæ, tum a suppressis catamenii, ut in chlorosi, vitiatæ; altera ratio est moralis, recens nuptæ mollius a parentibus educatæ, mariti & non raro totius familiæ, prolem avidissime expectantis, blandimentis ita viciantur, ut quivis sibi licitum esse persuasum habeant, & ob averfationem ciborum assuetorum a prima causa ortam, continuo animum ad alia inquirenda versent, cupidique ut ut absurdus præfracte potiri velint; tanta autem est hæc cupiditas, ut in proverbium abierit *nihil gravidæ denegandum esse*, ex repulsa scetum ejus objecti cupiti notas gestaturum; atque hoc mirum est quod ab alimentis illis inasuetis, alias sæpe noxiis, vix unquam illæ lædantur; malacia vero non solum primis quatuor mensibus graviditatis, sed non raro ad finem ejus extenditur, totoque illo tempore viscosum mucum, insipidum, aut nauseosum mane & jejuno ventriculo quasi tussiendo eructant ex faucibus & stomacho, salivam mucosam saporis fatui, eamque copiosam excernunt, animo debiles, delicatule, fastidiosæ, molles sunt; ad hoc genus morbi juxta *Calium Aurelianum* attinet vocat horrenda cupiditas, quam maltachismus vocat.

Pica gravidarum differt ab aliis, 1. quod gravidæ edulia inasuetæ, sed non absurda vorant; 2. quod nunc istud, nunc illud appetant, 3. quod ab his vix unquam lædantur.

4. Pica absorbentium. L.

Sunt plures qui medicamina sibi convenientia appetunt, quos Medicis inter picanes numerant; eorum vero plurimi appetunt alimenta antiscorbutica, acrimonia sanguinis ad putre & alkalinum vergentis antidota, fervori sanguinis extinguendo apta. Sic novi puellam quæ edentula erat a vitio scorbutico, quæque per sex menses & ultra pomis tantum clam vescabatur, quo certe cibo vix quidpiam aptius ad scorbutum sanandum. Novi nobilem feminam

H quæ

quæ hemiplegia imperfecta scorbutica laborans toto anno invitis remediis a Medico præscriptis pejor habebat; autumnum vero rure degens pyrammatura a Medico prohibita in cibum frequenter adhibens, robur & sensum partium recuperabat; scorbutus autem adeo obscurus erat, ut ipsum Medicus ordinarius non suspicaretur; ast deinde filii duo & maritus scorbuti perierunt. In hunc censum revoco bene multos qui simili acrimonia ex fervore sanguinis affecti limones, aurantia vorant, acetum assatim bibunt, similiaque quibus olim Medici consuetorum inappetentiam, pallorem, obstructions tribuunt; cum meo iudicio ea esculentia & potulentia ægritudinis latentis sunt medicamina, quorum tamen usus arte medica melius quam a natura dirigi potest. In morbis chronicis pauci sunt qui spem sanitatis recuperandæ non foveant sumptis vere cerasis, vel autumnum manducatis uvis, nec distendunt est quin hæc sint ipsis non raro saluberrima medicamina.

5. *Pica voluntaria; Envyies bizarres. L.*

Ea est quæ ab amicorum consilio contrahitur; puelle si quidem plebeis & rusticæ non paucæ ab amicis quandoque suadentur nihil esse aptius ad album & decoctum colorem sibi conciliandum quam carbonibus, pulvere, muria, alisque absurdus uti, unde stomachus labefactatur, obstructions generantur, catamenia supprimuntur, & assuetudo sensum inualefcit, qua talia etiam sordidiora deinceps vorare coguntur. Puella mihi salia est se olim delectatam esse latrinarum crusta muris adherente: hæc est pica scatophagia *Hellmenitil* p. 271. *Zacutus* noverat puellam quæ per inscitiam cum olei sui paucillum degustasset, sensum magnæ copię assueverat, ita ut jam tota vita esset suavisimum alimentum, quo non poterat sine ægritudine carere; altera salis libras duas multoties intra diem ingerebat, unde incidit in diarrhœam biliosam, a qua pica, a parentibus objugata, & sumpto lacte caprino chalybeato, convaleuit, *Zacut. Lustran. Centur. 3. observ. 104. & 116.* Notum est Hottentotos tota die in vorandis propriis pediculis occupari; hic usus apud eam gentem invaluit, ut apud alios locustis vesci, de quo affectu videatur *Muller in Classe X. & historia itinerum de Hottentotis & Acridophagis.*

Maxima pars Auctorum tribuit picam vitio humorum ventericuli, vel salivæ; ast haud dubium est quin etiam error iudicii & voluntatis primario inculpandus sit, non vero in omni specie, sicut contendit *Dilembrœckius Anat. lib. 1. cap. 6.*

Stratagemate utendum est ad curandam picam, scilicet miscenda cum iis quæ appetunt medicamina amara, aut cathartica, quæ picantes ad horum esu deterreat.

6. *Pica simulata.*

Vidi duos circulatores qui ut fucum facerent plebi, questus sui gratia, pluries in die septem, vel octo lapillos nucis sere magnitudine, alter

totidem, & præterea notabilem copiam faxi cochlitis, quo urbs Monspelii structa est, vorabant; ipse commoto alterius abdomine calculos illos exploravi; an vomitu eos rejiceret non potui certo comperire, videbantur tamen calculi in intestinis, & ultimus lithophagus pro homine sero, seu sylvestre prædicabatur, ac lapidibus & aqua vitæ tantum victitans; sed quid non mortalita pectora cogit lucri utcumque exiguï cupidus! Dantur etiam vitivori, cultrivori, seu qui scyphos vitreos, cultellos, &c.; vorant non sine periculo, ut admirationem adstantium excitent.

VIII. BULIMIA; *Faim canine.*

Inepte, ut advertit *Dellus Menotius*, vertitur hoc verbum per *famem brevillam*, quo magna famies proprie Græcis significatur, *Boulimias*, *Boulimos* & *Cynorexia* Græcis; *Phagedæna* Cæli Aureliani, non Galeni; *Lycorex* quibusdam; *Bulismus* Godonii; *Palulimus* Plutarchi Symp. *Fames canina, lupina, bovina* Scholasticis. *Ægi* vocantur *Famelici*.

Bulimia est fames nimia respectu virium digestivarum stomachi, seu appetitus majoris alimentorum copię quam quæ digeri possit.

In fame sana eam copiam alimentorum sumimus, quæ in pastuum intervallis digeruntur; in anorexia vel minima sit ciborum etiam delectus, seu gustus consiluitur attente antequam cibus ingeratur, & hic ciborum delectus *appetitus gallicæ dictum* a fame distinguit; in Boulimia nullatenus consulto appetitu, vel brevissimis vel solitis intervallis plura appetuntur, & ingeruntur, quam quæ digeri queant.

Quantitas alimentorum quæ quotidie potu rure cibo ingeritur est circiter vigesima quinta pars ponderis hominis, si sanitate fruatur; huius dimidia pars urinæ, altera perspirationis via exhalat, excepta vigesima parte assumpti quæ subtiliora secum amandatur. Hieme non major est quantitas assumptorum quam æstate; sed major est tantum ratio solidi ad liquidum assumptum. Monspelii adolescentes circiter 72. unciæ, scilicet 46. in prandio, 26. in cena assumunt: ratio media esculenti ad potulentum est r. ad 2.

1. *Bulimia canina; Cynorexia Græcis; faim canine. A.*

Est ea species in qua magna alimentorum copia appetitur, ingeritur, & indigesta vomitione rejicitur.

Pendet ab speciali acrimonia succorum digestivorum & irritabilitate stomachi, unde sensatio molesta, quæ cibis sedatur paulisper, unde famies; sed illi succi digestivi nec ad molem assumptorum dissolvendam pares sunt, nec stomachus nimis irritabilis sufficienti tempore assumpta retinet, unde vomitio indigestorum.

Vigente hieme in locis nive conspersis hic morbus sæpius accidit, maxime si victus ex cibus acerbis concurret; morbus hic, si quarantæ, affici-

asciti, aliisque morbis chronicis superveniat, fuerit.

Curatur per medicamina secantia & acrimoniam corrigentia, cathartica & emetica facile dysenteriam aut choleram excitant, nisi sint mitillim, non nauseosa; anteposantur itaque aquae acidulae, tamarindi, casia. Corrigentia sunt vel absorbentia, ut creta, oculi cancerorum, corallia, forte etiam alkalina, ut oleum tartari aqua multa temperatum, maxime si ad acidum vergant rejecta; vel sunt oleosa pingua, ut butyrum, serum lactis, lac ipsum, oleum recens amygdalarum: demum narcoica irritabilitatem stomachi sopiunt, ut vinum meracum, theriaca, ctocus, laudanum, & si fas est, *Gesnero* innuente, utendum levissimo infuso seminum *Belladonnae* in vino. Pilulae ex aloe optime successerunt *Foresto*; umbra grisea ad grana quinque vel sex *Riverio* laudatur.

Boulimia morbus est chronicus lienteriam, & trophiam, ascitem demum inducens.

2. *Boulimia cardiaca*; *Fomes bovilla* Scholaram; *Boulimus* Ettmulleri, *faimvalle* Hippocrat. A.

Est species boulimiae quae potissimum cardiacam, imo frequentes syncopes inducit, in qua aegri paucis alimentis sune contenti, sed ea ut eumque panta non digerunt, & continuus leipothymia vexantur; praegrandis appetentia, quia intensa est cupiditas ciborum: interea paucio alimentis satiabilis in ebtis fastidium & leipothymiam brevi delens; sic definitur a *Manjetio* *differt. de Bulimo*.

Aggreditur eos qui per nivosa loca inter faciunt, ut *Brui* ac *Cyri* militibus accidit. Desinitur ab *Avicenna* famis incuborum cum satietate ventriculi; pendet scilicet ab inanitione corporis, & ut ajunt, venarum sectione; interea dum ventriculus male se habet, illico satiatur, nec ingesta valet digerere. Juxta *Hoffmannum* est perpetua leipothymia ortum habens ex magna fame, seu ex magna ciborum indigentia, consentitque *Galenus*.

In hac boulimia stomachus irritabilis est, dolet & facile convellitur, unde celer assumptorum immutatorum egestio, seu lienteria huic saepe se comitem addit; hinc quidam scholastici lupinam famem vocant seu Lycorem, sed frustra distindam speciem faciunt.

In boulimia ista anaesthetica, cardiaca & antispasmodica indicantur; cardiaca quidem dum urget solus deliquium, in quo casu vinum osse mixtum laudatur, nec non theriaca, sed frustra distindam speciem faciunt. In boulimia ista anaesthetica, cardiaca & antispasmodica indicantur; cardiaca quidem dum urget solus deliquium, in quo casu vinum osse mixtum laudatur, nec non theriaca, sed frustra distindam speciem faciunt. In boulimia ista anaesthetica, cardiaca & antispasmodica indicantur; cardiaca quidem dum urget solus deliquium, in quo casu vinum osse mixtum laudatur, nec non theriaca, sed frustra distindam speciem faciunt.

3. *Boulimia verminosa* Tralliani. *Morbis Epidemicis Saragosa fames dictus* Foresti lib. 21., observ. 28. D.

Hae species sovetur a lubricis, tania, aliisve infectis in ventriculo hospitantibus, cibum quidem paucum suffragantibus, sed pabulo suo ventriculum irritantibus, inde oris fetor singularis, febricula, nausea, dolores vagi, puncturitis, in abdomine, rubores fugaces faciei, cardiagia ex reatu lumbricorum in oesophagum ad nares usque, diarrhoea, stridor dentium, sopor, ejulatus, &c.: boulimia ante paltum est intensior, ea pro vermibus atate ac magnitudine urgentior est ac tania maxime designat.

Vide historias in *Zacuto Lusitano* lib. 2. *Medic. princip. Schenkii* lib. 3., observ. 27.

Inhinc Saragozz moriebantur hoc morbo, cum demum ope boli amenae vermes copiosi egesti sunt, & salus restituta est. Numquid absorbens illud acido dulce vermium pabulum correxit. Alii curati sunt amaris, aloeticis, quidam sylvio aquatico, cujus ope tania rejecerunt. Oleum nucum recens quovis mane sumptum ad uncias quatuor, superbibendo vini Hispanici haustum tantam saepius enecat.

4. *Boulimia surligo*; *Voracis*. L.

Est species famis intensa, quae vix est morbus. Aegri duplum, imo triplum consuetae ciborum copiae sumunt & digerunt, quod accidit gravidis, vegetis, & gulosis, nec non adolescentibus excratis, ut venatoribus, militibus fame exinanitis. Mihi ab hemitritae olim revalescenti per mensem accidit illa boulimia, quae ex macie tumma cito in corpulentiam mutabatur meus habebat, interea dum perspiratio mea odorem moschi intolerabilem referebat. Hoc morbo diu vexabatur *Randelius* condimentis nimis usus. Laborabat etiam miles, cui ad anorexiam curandam abinthium praescripserat *Riverius*. De usu kinkinz in Tertia familia vide *Ramazzinum* *Const. an.* 1690. n. 10.

5. *Boulimia addephagia* Nenter tabul. 174. c. 8.

Est famis summa & voracitas infantum circa quartum annum & ultra cum atrophica, saepe diarrhoea, pallore, abdominis inemacientia seu phisconia, vinum imbecillitate, carniem flacciditate; quae quidem verminosis affectibus saepe stipatur, alias vero sine illis eos infestat, & nisi regimini debito adstringantur, in diversos morbos conjicit.

Ea addephagia Rachitidem etiam comitatur. Vide curam phisconae infantum & rachidiae, quae repetenda ab usu martialium, rhei, cinnamomi, chinze, &c.

6. *Boulimia convulsorum* Muller. de morbo spasmodico disputat. Halleri tom. 1., pag. 79.

Non solum in convulsione epidemica Brandeburgensi anni 1741. in statu morbi aderat famis causa intensa tanta ut in ipso convulsuum paroxysmo aegri digitorum ministerio destituti esculenta in stragulis posita inclinata corpore labris & ore brutorum instar avidè deglutiens.

H. 2 sed

fed etiam in epidemia convulsiva a *Pollisio* & in altera a *Buddae* narrata, inno in eclampsia eypohde quam *Sennertus* refert ad annum 1597; quæque cum prioribus & raphania convulsione idem morbus esse videtur; in harum altera lumbrici quidem vomitu rejecti sunt; verum restat inquirendum num ab alio principio hæc boulimia repetenda sit, an fuerit effectus tribuendus seculi rubiginoso? Illa boulimia referente *Sennerto* lupina erat, seu cum diarrhoea. Boulimia quidem convulsione raphaniam subsequens semini- bus raphanistis pani commixtis hodie tribuitur.

7. *Boulimia ab acidis*, Mercurialis de ingenti fame p. 365.

Cognoscitur acritate oris, corrosione stomachi, vomitione pituitosa, acida, sitis carentia, habitu corporis melancholico; Curatur refrigerantibus, abforbentibus, sale tartari.

IX. POLYDIPISIA; *Sicis exæstive*. *Sitis morbosæ* Bonet. Sepulch. Tom. 2.

Est potulentorum appetitus immodicus.

Procedit a sensatione siccitatis aut salsedinis & fervoris in ore, ad quam sublevandam potulentis indiget natura. Intera prava bibendi consuetudo, potissimum extra mensas, huic sympto- mati ansam præbet, qui mos poetis & puellis sæpe familiaris dum cubitum eunt, ipsi multa incommoda procreant, digestionique potissimum officit, unde pallor, chlorosis.

Polydipsia raro morbus est, sæpius tantum morbum aliorum est symptoma secundarium seu minus præcipuum, unde varietates sequentes desumuntur.

a. *Polydipsia febrilis; sitis febrilis* Boerhaave Aphor. 613; *Sicis dei febricitans*. B.

Sitis intensius sub pari sensibilitate est in ratione siccitatis, fervoris, & salsedinis salivæ; verum in febris potissimum acutis biliosisque, ut in triacophya ardenti, in tertiana duplici, ubi maxima perspiratio, cathartico- rum usus, diarrhoea biliosa, aqueum laticem sanguinis absumpsere, est magna salivæ siccitas; ob attri- tum continuum valorum, & exsiccationem par- tium ignearum & alkalescentiam cruoris est magnus scvor in paroxysmis; denique ob princi- pium salinorum vehiculum desitutorum con- centrationem, eorumque copiam sensim, in febre crescentem, ut probant *Langrishii* experi- menta, est maxima salsedo; non mirum ergo si febris acutæ ea polydipsia comitetur, bibendi- que necessitas urgeat ad sanguinem diluendum, fervorem temperandum, acrimoniam demulcen- dam.

Si subito sine ratione evidenti cesset sitis in illis morbis, signum est sentiendi facultatem ferari, quod a paraphrosyne, comæ, aut de- bilitate summa potest oriri, sed vulgo a para- phrosyne febrili oritur. Si sensum sine ullo deli- rio signum cum pulsus minori frequentia sedetur sitis, signum est paroxysmum febris, fervoremque

mitigari, & ex cruore jam resolutio serofum la- ticem, ex glandulis oris salivam, segregari.

Remedia sunt 1. quæ siccitatem tollunt, adeoque salivæ, sanguinisque viscositatem diluen- do minuunt, ubi calida præstant frigidis sa- livam coagulantibus; huc aqua forma potus, vaporis, fomenti, gargarismatis, epichematis, &c., maxime vero aqua in qua vegetabile quoddam saponaceum, nitrosum, decoctum vel infusum fuerit, ut decoctum hordei, avenæ: 2. quæ fervorem extinguunt, ut acida, ve- getabilia, qualia acetosa, oxalis, ribes, limo- nes, aurantia, granata, ponia, cerasa, ex quibus syrupi, aquæ, gelatinæ parantur, nec non fossilia, ut nitrum, sal prunellæ, acidum salis, sulphuris ad gratam aciditatem, in magna aquæ copia: 3. quæ acrimoniam demulcent, ut emul- sio, farinosa, decoctum hordei, cremor oryze, emulsionis ex seminibus cucurbitarum, lactuæ, papaveris, serum lactis.

Si summa debilitas concurrat cum siti, con- veniunt vinum, acetum, cerevisia, aqua vitæ & similia; quoniam vero sitis imperat potum hic necessarium, ea non est narcoticis suppri- menda; ubi vero tussis adeit, licet acuta sit febris, ut in pleuritide, sitis exigua est vel nulla, non minus potus diluentis summa est ne- cessitas.

b. *Polydipsia hydroptica*. C.

Ea est quæ ascitem, phlegmatiam, hydrotho- racem, nec non quæ diabete, hydropemque ad matulam comitatur; quæque procedit ex aqueo latice sanguinis amillo, vel in cavum quodam derivato, vel sudoris lotivæ forma ex- creto.

In hisce morbis sitis intensitas sequitur salivæ siccitatem, ejusque acrimoniam; acrimoniam vero siccitatem respondet, quippe principia salina, se- ro deficiunt, concentrata, adeoque fortiora evadunt.

In siti asciticorum compescenda cavendum est ne copioso potu aqueo, inertis, solidorum laxitas & extravasalis feri copia crescant, adeoque vel illa sitis viriliter toleranda, aut frustranda est. Stimulantur, & temperant frustula fructuum acidorum lingvæ imposita, gelatinæ seu rob cerasorum, cydoniorum, gros- sulariæ, limonum, syrupi de agrestis, de limo- nibus, globus pumbeus ore decentus, pitæne leviter aperientes ex radice graminis, acetosæ, fragaræ.

In siti a diabete, dysuria, serum lactis acida- latum, lac cum aqua calcis mixtum, indicantur.

c. *Polydipsia fluxuum*. L.

Fluxus in quibus polydipsia frequentior & in- tensior est, sunt dysenteria, diabetes, diar- rhoea biliosa, pyralismus, epidiotosis immo- dica, &c.

Dysuria a vesicantibus excitat polydipsiam Nil tam cito post adhibita vesicantia supervenit quam sitis cum lingvæ acritate, quæ quan- doque tanta est, præsertim in ægris adultis tem-

peramenti & mente non alienata, ut quibuslibet remediis temperari vix posset; præterquam continuo aquæ gargarismo; durat hæc sitis ita vehementer per triduum circiter, prout scilicet serius aut citius, parcius aut uberius acres cantharidum feles e massa sanguinis fuerint separati; deinde sensum remittit; eamque appellare solet *scitum vexantium Baglivi de incommodis ab causa vesicæ cap. 2.*

In Ischuria ob miscelam urinx cum sanguine supervenit sitis inextinguibilis cum ardore summo, lingux siccitate, unde loquela impedita; deinde paraphrosyne cum tremore sitim extinguat & mors in promptu est: sedatur hæc sitis potu nitraeo & medicamentis ischuriam tollentibus; ut balneis, fenicupis, fomentis.

d. *Polydipsia a veneno; a morfu dyspneæ ex Luciano; a calore urinx. A.*

X. ANTIPATHIA; Antipathie.

Est quorundam objectorum tanta aversio, scilicet nativa, ut ex eorum gustatu, odoratu, visu, tactu, vel auditu homo gravissimas leipothymias, vomitiones, spasmos, similiaque symptomata patitur.

Hæc aversionum vel motiva quædam cognoscuntur, vel nulla; prioribus accenseri possunt aversiones rerum quæ perneciem afferre possunt, vel quæ sensibus injuncta vulgo sunt. Sic horror cadaverum, operativum chirurgicarum, suppliciorum reis inflictorum, sanguinis effusi ex naturali commiseratione oritur. Sic horror gladii nudi quo *Jacobus primus* Anglorum Rex laboravit, tonitruum qui diarræam & leipothymias multis incutit, procellarum, serpentum, atracarum, oritur a metu nimio quidem, sed tamen excusabili, rerum vere noxiarum, aut quæ vulgo noxiæ censentur.

Antipathia etiam casei, angillarum, panis, vini, fragorum, ovorum apud eos qui quondam ab eorum usu male habuerunt, v. g. qui lac nutritis caseosum, congruatum, cum suo gravi damno quondam hauserunt, qui ab his cibis inopportune aut copiose assumptis aut vitiose præparatis læsi fuerunt: hæc, inquam, aversio, utcumque nimia, ex consula antæctorum memoria & metu similium damnorum intelligi potest.

Verum sunt alix antipathix quæ non nisi ex singulari, ut ajunt, hominis idiosyncrasia solent deduci; seu, ut clarius loquar, quarum nullum motivum, nisi divinatione quidam cognoscitur, ut antipathia felis, murium, rofarum, ranarum, &c.: an effluvia ex his manantia cum humoribus hominis ea exhorrescentia combinata quidpiam tertium constituent, quod ipsis nocivum & venenatum est, uti mercurius cum acido marino chimice junctus constituit sublimatum corrosivum? an aniles fabulæ mentem infantis præoccupant circa horum objectorum nocumenta, ut accidit multis circa faga, larvas, lemures, objecta mere imaginaria, & circa venenum vespertilionum, *Sauvages Nosologia Methodica, Tom. II.*

serpentum vulgarium, scarabæonum, &c., quæ omni noxia carent?

Antipathia humana Zvingeri differtat. 1.

Licet sint antipathix odorum, colorum, sonorum, saporum, &c., quarum plurima exempla congestit *M. Aulær* in hac dissertatione, parvi refert eas sigillatim distinguere, cum simul concurrant, & qui v. g. café saporem odit, ejus visum non toleret & odorem utcumque latentem incredibili narium sagacitate detegat & abhorreat. Ex his antipathis vita hominum sæpe misera millenisque incommodis obnoxia evadit, adeoque illæ prævertendæ sunt; & si fieri possit, sanandæ. In puerili ætate hæc antipathix sæpius oriuntur, & crescente ratione plures evanescent. Puer qui caseum impense odedit, ita ut ex paucis ejus granis cibo alteri jucundo permixtis & deglutitis fere in convulsionem incideret, deinde ætate maturior sensum huic non sine summa animi contentione degustando assuevit; & hodie illum avidè deglutit.

In sexu femineo horror tonitruum, operationum chirurgicarum, quorundam medicamentorum difficillimè superatur, quia præjudicia ab animis nulla philosophia umbetis vix eluuntur, sed si mature physices studio incumbamus, si rationem excolamus, facile intelligemus non magis a fulminibus quam ab aliis peculis vulgo præteritis, ut a domuum ruinis, timendum esse. Si operationum chirurgicarum in quibusdam casibus utilitatem, imò necessitatem cognoscamus, ab illarum aspectu nimis turbamur. Si serpentes, salamandras, bufones manibus tractare audeamus, illa passere minus esse noxia experiemur, & sic ridiculo illo terrore liberabimur.

XI. NOSTALGIA, dicitur a Græco *Nostein* redire, & *algia* mœror; *Philopatridomania* Harderi; *Pothopatridalgia*, *Nostomania* Zvingeri Diss. 3., *Nostalgia* puorundam; *Helm-VVohn* Helvetis; *Maladie du pays*.

Est genus morositatis quo peregrini ad parentes & patriam suam reverti tam intense cupiunt, ut reditu denegato, mœrore, agrypnia, anorexia, aliisque gravibus symptomatibus divedentur.

Nostalgia simplex est vel complicata, utraque aggregatur juvenes mollius in parentum sinu educatos, qui prima vice peregrinantes, vel adversam fortunam, vel morbum incurrun, & amici orbatæ patriæ suæ delicias mente revolvunt earumque desiderio tanto majori tenentur quo pejor habet, ut si a sociis pro rudibus habitis illis lubris sint, si ob lingux, morumque differentiam, soli vivere cogantur, hinc alto mœrore detenti omnem societatem fugiunt, nemini suæ ægriitudinis causam declarant, anorexia, pervigilio, asthenia, aliisque gravibus symptomatibus extenuantur.

1. *Nostalgia simplex.* D.

H 3

ER

Est illa quæ nullo morbo gravi accedit; licet symptomata diversa secum adducat, scilicet morositatem, solitudinis amorem, taciturnitatem, cibi & potus aversionem virium prostrationem, febriculam vespertinam. In Nosocomio Monspelienſi pluries observata est in corpore Noſtalgicorum una aut altera macula livida. Vidi puerulum mendicorum filium, cuius proinde patria erat tantum trivia & vix publicæ, qui parentibus suis orbis hoc morbo laborabat. Rarissime Philarii Monspelienſes hunc morbum experiantur, quia in numerosa amicorum societate, facile parentum suorum obliviscuntur, quam diu voluptatibus sectandis eis copia sufficit. Apud milites Helveticos, cum a patria excesserint, frequens est hic morbus, & olim ea de causa plurimi castra deserebant; erat autem cantilena Helvetiæ delicias revocans, que ipsos in hunc affectum deducebat, quam deinceps repetere sua capitis pena prohibitum est. Hanc vide apud Zwingium.

Curatio ex auxiliis moralibus solum est rependa, ut ex amicorum consuetudine, ludis, theatris commensationibus, sufficienti nummorum copia, sed si paulo gravior sit morbus & illis remedia resistat, unicum auxilium est reditus in patriam; licet enim ægri prostrati, debiles, vix & lecto surgere possint, cum certa spes est se in patriam reversuros esse, mox melius se habent, vires resumunt, & in ipso itinere sæpe sanantur: pauperuli vero quos & noscomiis educere & apud se recipere non possunt parentes, aut qui parentibus orbi sunt, fere omnes hoc morbo moriuntur, atque auxilia chirurgica & pharmaceutica saltem inutilia sunt, erucantia vero omnia ipsi noxia.

2. *Noſtalgia complicata. A.*

Est illa quæ synochum, tertianam, trisophyram, vel aliam febrem comitem habet, in cuius quidem curatione summa virium conservandorum debet haberi cura. Si quis ex febri paroxysmis, nausea, vomitu, anorexia, concluderet saburram continuo præsentem, & e primis viis eliminandam, is potius animam foras eijceret quam totam quam fingit sibi saburram. Ad hancina consurgendum est; emulsiones cum sufficienti narcotici dosi vespere sunt exhibendæ, & non solum proxima spes redeundi in patriam ipsis faciendæ est, verum etiam utcumque æger fidelis, & febris correptus, vel rheda, vel lectica ad parentes suos est dimittendus, quippe hic solus ichterationis apparatus proximus plus valet ad morbum abigendum quam omnia remedia vulgaria; sunt etiam qui perspecta libertate patriam suam rependi, ex hoc solo illico convalescunt, & nostalgia liberantur, licet patriam suam non epetant, saltem ægri fere in medio itinere vires, & paulo post sanitatem recuperant.

3. *Noſtalgia simulata. De-Meyſerey Malad. des Armées, n. 25, p. 109.*

Dignoscitur dolus ex pulsus robore, æqualitate, faciei nitore, colore sano, fame, metu

dixæ tenuis, phlebotomiz & catharticos aversatione; ex cognito motivo vero que militiam ef-fugere cupiunt & militionem impetare.

XII. PANOPHOBIA; Thorybos & phobos Hippocrat. Aphor. 24., S. III.; *Panophobos* Herodoti Lib. VII.; *Pavor nocturnus* & *pavor in somno* Sennert. cap. 8. de morbis infantum; *Panophobia infantum*; *Panophobia* Morgagni Epist. VIII. 28.; *Conversatio confusio*; *Terror panique*; *Frayeur nocturne*. *Ægri Panophobi*, & *Omni pavori* Cælio Aureliano Acut. Lib. III., cap. 12.

Hic morbus est infantibus lactentibus familiaris, dum somno sepulsi febricitant, sudant, gemunt, aut evigilando clamant, tremebundi, perterriti, & fere convulsi ob phantasmatum terribilium aut spectrorum in somno visorum imaginationem.

Hic morbus, si gravior evadat, eclamptiam aut epilepsiam potest inducere. Accidit etiam juvenibus pueris, qui aniles servarum fabellas de larvis & lemuriſibus noctu vagantibus avidè exceperant, quique deinceps vel dormiendo, vel in tenebris soli has ideas resicando summo terrore percelluntur. De Cura vide *Tiffes Avis au Peuple* §. 32.

In lactentibus hic morbus fere semper pendet a saburra ventriculi, seu a lacte vitioso copiosius assumpto, & ideo præscribuntur levia cathartica, ut oleum amygdalarum, syrupus de rosæ solutivus, vel etiam opus est ut ipsa nutriti alumni loco purgetur: verum crediderim id sæpius evenire a stragulis densioribus aut ab aere calidioribus circa cunas undique clauso & non renovato, quo quidem nihil est aprius ad febriculam excitandam & sanguinem versus caput determinandum; memini me nunquam somnis iisque terribilibus magis divexari solitum fuisse quam cum stragulis aggravari, aut cum subiro nocte oppressas serenas & aequilanas mutabatur in calidam, humidamque, austro flante.

1. *Panophobia verminosa Benivenii. A.*

Est pavor infantum nocturnus a verminibus oriundus; materies verminosa sanguinem inspissat, quo, si in cerebri vasis hæserit, insomnia possunt excitari; maxime vero terribilia phantasmatum a repetito vermium iura oesophagum ascendentium ac quasi præscantium determinari possunt, unde præter cathartica & absorbentia debent anthelmintica præferri.

2. *Panophobia hysterica; Terror panique de vapour. L.*

Nihil est vulgatius hoc symptomate apud hystericas & hypochondriacos, si baculus delabatur, si fores ex improviso pulsentur, si suspensio pede quis earum cubiculum ingreditur, illico terrore, palpitatione cordis, pallore, lipothymia corripuntur: a fortiori vero non solum si tonitrua explodantur, si eruscent in celo fulgura, sed si offeant se visui aranea, vel per

peritio, scarabæus, scorpions, illæ præ metu fere animo linguuntur. Duo sunt itaque horum terrorem principia; primum est ea nervorum sensibilitas & tensus quæ a levissima impressione lædatur, qualis est in oalgia sensibilibus nervi acoustici, ita ut vel minimo sono dolor auris intendatur, vel in retina inflammata quam lux minima instar fulguris irritat. Secundum principium est phantasia exquisita seu vitæ & voluptatis amor nimius, ita ut vel minimam læsionem percepti nesciant, vitæ voluptatibus assueti assuetæ & mollius quam par est educæ. Hanc sensibilitatem adaugent debilitas corporis a morbis prægressis, a sanguifluxibus potissimum, ærumnæ, sollicitudines animi contentiones; auxilia vero sunt eadem ac hysteriæ.

3. *Panophobia phrænsi* Hippocratis; *La Maladie appelée Souci ou Terreur panique*, Le Clerc, hiltore de la Medec. par. 176. L.

Ægri inquieti sunt admodum, cœtus & lucem fugiunt, obscuritatem amant, cuncta ventent, tumet his extorsum diaphragma, timet vel levissimum sui corporis atactum & dolent; insomnia terribilia patiuntur, præcordiis quasi infixam spinam sentiunt & identidem vel mortuos, vel objecta terrefactientia sibi videre videntur. Hæc species hypochondriaci vel hysterici videretur.

4. *Panophobia a rabie*, Morgagni Epist. VIII., 27. A.

Est quæ a viru hydrophobico latente dependet, quæque non circa aquam & aerem, sed circa omnia objecta versatur.

Senex vegetus, qui ante tres menses cane rabioso demorsus fuerat, viginti diebus antequam hydrophobia corripetur & biduo post moreretur, minis & verberibus a quodam exceptus, ex eo tempore cepit miro atque insolenti timore agitari, ut non modo quicquid increparet semper contremisceret, sed & quicumque ignotus occurreret, proditores continuo eum putaret, & si quo posset aufugeret aut latebras quæreret; ad hæc luminis & aque demum horrores accessit, cum in noscomium importatus est, in quo biduo vixit. Inventus est ad summum pharyngis quidam rubor, arteriæ erant inanes, pulmones pollice gangranosi, ubique sanguine nigro turgidi, cerebrum non facies solito.

XIII. SATYRIASIS; *Satyriasmus* P. Agnetæ; *Priapismus* vulgi; *Satyriase*.

Est morbus viris proprius, cuius præcipuum symptoma est effrænis impudens veneris cupiditas cum libidinosa penis tentigine.

Difert a priapismo, si *Aresco* fidem adhibeamus, quod satyriasis sit morbus acutus, intra septem dies ægros e medio tollens, & libidinis voluptate stupetur erectio, verum dan-

tur species chronica ab illa multum diversa, quæ non nisi initio libidinis sensum inferunt, deinceps vero molestissimæ evadunt, adeoque ad priapismum proxime accedunt; de his iudicent qui plures observationes habuerint.

1. *Satyriasis acuta* Aretæi cap. 12., lib. 2. A. Satyri Baccho sacri affecto pene figurantur. Est autem morbus qui laborantis penem excitat, erigitque, atque ob Dei figuræ similitudinem, *Satyriasis* nuncupatur; est autem inextinguibilis concundi appetitus; verum neque, si ad veneris opus accedant, quidquam juvantur, neque multo, assiduoque concubitu sedatur erectio. Convulsiones autem omnium nervorum sunt, & tendinum distensio & inguinum, partisque ejus quæ inter inguina & semen est, (*plechada* Græcis dictæ) genitalium præterea inflammatio & dolor; & in facie rubor inest, & sudor torpidus, porro ipsi ægri sese incurvant & compriment; quiescent tristes, utpote calamitatem suam gravatim ferentes; quod si hominis verecundiam id malum superet, turpiter admodum lingua intemperantes efficiuntur; intemperantes quoque in alvo (flatibus) exoneranda, in venerem lascivientes, menteque indecenter titubantes, nam se continere nequeunt, siti laborant, pituitam largiter evomunt, quoniam labris spuma insidet, ut hircis libidinosis, quin etiam haud abominis odor est; lotium post longam retentionem effunditur album, crassum, genituræ simile: alvus resolvitur, costæ & axillæ sponte pruriunt, ac titillantur; convelluntur, a cibis abhorrent; sed cum eos assuunt, rapaciter assument; conturbantur; seu ad interitum ægritudo spectat, inflantur, ventereque in tumorem efferunt; tendines & lacerti omnes contenduntur, ægre admodum corpus movetur, membra contrahuntur, arteriæ parvo motu, debili, inordinatoque agitantur; hæc omnia quandoque discutiuntur, si alvus conrurbata multas pituitosas, biliosasque humiditates egerit, easdem quoque vomitus non absque discrimine effuderit, nempe medela non vacet discriminare; ea per somnum profundum longissimumque præstatur, siquidem refrigeratio & resolutio, stuporque nervorum mucus somnus est, stupor vero ac refrigeratio satyriasi medetur. Id morbi genus vere atque æstare potissimum scire consuevit; inter ætates, vero adolescentia & juvenus ei maxime patet, præcipueque illi omnes eorum natura in venerem propa est. Acutissimum id malum triste fœdumque est; nam plerumque in septima die ægrum consumat. Hætenus Aretæus.

2. *Satyriasis chronica* Cheyni de natura fibræ pag. 71. C.

Difert a priori quod contumax sit, ac diuturna, mensis plures, imo annos perleverans, & quod senes a venerem alienos aggrediatur. Rarus quidem morbus est, ait Cheynus; de quo vis quidquam meminit se legisse, & quo la-

borantes tres tantum ægros vidit; qui morbus non junioribus & libidinosis, ut prima species, accidit, sed infirmis, debilibus & laxæ fibræ hominibus, tarde & imperfecte alimenta conqueuntibus, hypochondriacis, flatulentis, animoque dejectis: raro interdiu, sed nocte præcipue, statim atque stragulis incaluerunt, invadens, quo tempore vehementem penis inflammationem & tensionem sentiebant, quasi quis eum manu vi avellere conartaret; nec libidinis tamen cæstro ciebantur, intensissimo dolore omnem lascivæ cupidinis sensum excludente, cuius species eorum animis odiosa, nedum grata observabatur.

Unicum iis doloris levamen erat lecto exilire, frigidoque se obficere aeri, unde statim subsidebat inflatio; inde somni interruptio, appetitus ciborum digestioque languidior, unde intra paucas hebdomades illi spectris potius quam hominibus similes, somni capiendi causa, quidvis facere aut perficere parati sunt, interea opiata & omnia calefacientia morbum augent.

Causæ ab emeticis lenioribus inchoabatur, dein lactis, sulphuris, xelipis mineralis & cinabaris antimoni longæ lex mensium usu cum florum benzoini, & salis cornu ceræ parca dosi; victus erat tenuis per longum tempus, ues scilicet erat quatuor carnis uncie & vinum Bristolienis mixtum ac paucillum singulis diebus concedebatur; postremo kinkine, corticis aurantiorum, & vitrioli maris aliquot grana præscribebantur cum modico exercitio, & frequenti in frigidam immersione; horum usu intra biennium duo priores ægri sanati sunt; alter remedia recusans diutius ægrotavit, per intervalla a victu pleniori facile in satyrialem relapsus.

Nemausi monachus ætate proventus & castus hoc morbo diutissime laboraverit, curvato corpore incedens & tristis, nec a periclitatis medicis levamen notabile experiebatur. A camphora ali-quid spei æsulget.

3. *Satyriasis venerea* Cheynzi de fibræ natura pag. 61. L.

Intelligit Auctor symptomata gonorrhææ virulentæ quod per se morbum non constituit, & curatur phlebotomia, potu emulsionato, narcoticis, pituitis lenientibus, mucilaginosi, fomentis emollientibus, nitro, semicupis, &c.

4. *Satyriasis hydropobica*, Cæli Aureliani.

Est & aliud symptoma multo gravioris morbi, scilicet hydropobæ observatum a D. Rivaller Medico. Lansanenſi apud Boneri. *Symptolemm*, & Græcis etiam cognitum.

In Hydropoborum cadaveribus cavernosa penis corpora inflammata bis notavit Ill. Morgagni Ep. VIII. & LXI.; nec non Ill. Brogiati venenum hydropobicum sensu esse affine semini vesicularum imo & prostarum, quippe hoc venenum in mulieribus nymphomaniam excitare videtur est: Vide Ill. van Swietenem Comm. de Rabie

5. *Satyriasis negamorum* Hatté Journ. de Med. Fevr. 1755.

Est species diversa a præcedentibus 1. quod ista assiduo cocundi desiderio frequentissimaque erectione & ejaculatione flupetur; ita ne æge per plures menses, ter vel quater in die coeat: 2. quod inde successe marcescat debilitque & macilentus æger evadat, dumque in lumbaginem 16ma delascitur.

XIV. NYMPHOMANIA; *Metromania* Sorani & III. Atrucci de morbis mulierum; *Nymphotomia* & *Symptoma turpitudinis* Mercati; *Melancholia uterina* Nenter; *Histeromania* Boeckli Dissert. 8.; *Theligonia* Ill. Linnæi de Tœnia, *Furor uterinus* & *Tentigo* Latinis; *Andromania*, *Nymphoclia*, *Gynaicomania*, *Entelipathia* paucis; *Furor uterine*.

Est hujus generis character in feminis effrenæ veneris desiderium.

Ratione audaciæ & impudentiæ differt ab Erotomania seu melancholia amatoria; an ratione sexus, adeoque organorum diversorum, genus diversum sit a satyriasi, judicent alii.

Metromania est vox æquivoca & musomanizæ synonymica, unde minus aridet. *Nymphomania*, quasi mania clytoridis, vox est ubertissima apud eos qui nomina consarcinata, seu e plurimis distinctis verbis composita repudiant, quale est *furor uterinus*.

Hujus morbi gradus sunt diversi pro diversis generibus a Sennerto habiti.

1. *Nymphomania salacitas* Sennerti de virginum morbis. L.

Hæc expositæ sunt virgines cum pubertatis ætatem, temperamento calido præditæ, lectionibus lascivis, cantilenis, fescenninis, adolescentum illecebris capte potissimum quæ sub severioris matris legibus aut cenobiorum clausuris diutius vivere, quæ turpi inaspiratione invidicula veneris excitaverit; in illis autem cupiditas a festiva alacritate; amatorium provocatione incipit; denegata vero venere, deposito pudore, verba lasciva blanditiis erga viros admiscunt, ante limis oculis, gestibus sollicitante procos; interea domi morant, gemunt, anxietate, agrypnia vexantur, marcescunt; idem accidit junioribus viduis, necrum impotentem aut frigidum expertis; nec puerperii labores passis.

Quæ vero pudori litant, maxime quæ virtutem & religionem cordi habent, illæ ob ærimoniam feminis & sanguinis ac organorum genitalium sensibilitatem simili, sed tacita veneris cupiditate incenduntur & eo ardore ac misurabilius flagrant, quo ardorem suum tegunt accecati; inde moror, agrypnia, anxietas, macies, pollutiones frequentes, quæ aversa a levibus culpis animis multum cruciant; novi puellam hujuscemodi quæ ad sui confessionem senis & putidi pedes prostrata & accrimetum calamitatem deplorans, interea hisce invidi-

feminis profluvis erat obnoxia, a duobus annis, his miseris cruciata & castimoniam inensis intermeratam servans: immane erat veneris desiderium sensifivum cui constanter reluctabatur voluntas.

Certum est matrimonium esse praxitantissimum in salacitate remedium, frustraque non raro auxilia medica adhiberi, ut phlebotomias repetitas, refrigerantia, potum humectantem, lenia cathartica, balnea, & serum lactis, antivenerica ut nymphæam, portulacam, emulsiones, &c. hæc ait *Zacutus*, his proficua, profuere nihil, & virgo huius vexata demum in puteum se præcipitare cogitabat, cum demum maritus cui nuptiæ juvenis, robustus, & officio suo strenue defungens ac cui tanquam sanguisuga illa adhærebat, optimam ipsi medelam attulit: brevi enim ea puella effloruit, revixit & pristinae sanitati restituta fuit: *Zacutus Lusitans de furore uterino observ. 84. lib. 2.*

2. *Nymphomania furibunda; Sarytasis muliebris*, *Amar. Lus. Cent. XI. Obs. 97. Furore uterino, A. C.*

Est alter gradus huius morbi in quo omni deposito pudore, nymphomaniæ notos, ignotique ad venerem sollicitant, pudenda etiam denudant, & ex denegato coitu dñtis aut pugnis recalcantes male habent; quæ prius erant castæ & decenter educatæ jam obscœna verba proferunt, obrio cuique sui copiam faciunt, atque lassatæ potius quam lassatæ recedunt; illis non raro ob attractis impuro clitoris multum excrescit, & irritatur, quod in regionibus calidis solemne est; frequens est feminis ejectione, vulva intumescit, & hiat, ardor est in abdomine, urina pauca & rubra; atque si hæc calamitas castis & monialibus accedit, tunc ob præfocatum merorem & occultum diutius malâ causam ægrotant miserrime, vel aut tarantismum & demonomaniam simulant, aut insaniunt eo fine ut rus foras e cœnobio dimittantur, millenisque in eo casu uenturæ stratagematis, aut demum se laqueo suspendunt.

Similem morbum in femina viro utente observavit *Marsilius de Grandibus consil. 80.* quæ statim atque a viro conceperat, libera erat ab illo furore; a viro vero si intra unum aut alterum annum non conciperet, suscipio evaderebat, ex appetitu veneris cum ventris sonitu, delirio, tremore, &c.

Hanc vero morbum delirii non accensio, quia delirium non est præcipuum symptomata, sed veneris effrenis cupiditas.

Cadavera ostendere clitoridem tumidam, ovaria solito maiora, tubas Fallopii clausas.

Præter remedia antiaphrodisiaca laudatur a multis usus cicutæ; verum quod genus plantæ hoc nomine intelligatur dubium est. Vide infra *Paraphrosin a canis*.

3. *Nymphomania furor uteri* Sennerti de furore uterino I.

Est alius affectus prioribus cognatus, quem *metialis furor* Antiqui appellauit, quando

nimirum universa uteri substantia incallescit, cum dolore, lumborum gravitate, horripilatione, fastidio, urinae ac sæcum suppressione, & scœmina coitum vehementer appetit, sed ob dolorem venire uti pertimescit.

Differt siquidem hic affectus a prioribus, quod nec a feminis acrimonia, nec a libidine morali procedat appetitus veneris; sed tantum a phlogosi, aut fervore uteri ejus sensibilitatem adaugeat.

In hoc quidem casu præter phlebotomias, vitium refrigerantem & humectantem, potus nitrosi, emulsiones, balnea, injectiones emollientes in vaginam, fomenta, similiaque proficua sunt.

4. *Nymphomania pruriginosa; Pruritus uteri* Sennerti l. b. 4. p. 2. sect. 1. cap. 2.; *le Prurit de uterus L.*

Non semper uteri, seu potius vulvæ pruritus veneris appetitum effrenum conciliat; adeoque ille pruritus est a nymphomania ipsa diversissimus; verum quandoque huius libidinose cupiditatis principium est, potissimum cum clitoridem oblidet materies herpetica acris, mordax, in scœmina aliunde ad venerem propterea; cum autem hæc cupiditas nec a feminis acrimonia, nec a depravata voluntate; sed a sede diversa affecta dependeat, diversum esse affectum visum est Medicis, ut Sennerto.

Curatio eadem est ac herpetis.

XV. TARANTISMUS; *Il Carnevalletto delle Donne* Baglivi; *Extro di ballare; le Tarantisme, le Janen.*

Est morbus in Apulia endemius, cujus præcipuum symptomata est inextinguibilis saltandi, aut choreas agendi cupiditas: dicitur Tarantismus a Tarantula, & ægri *Tarantati*, quia invaluit opinio hunc morbum a Tarantulæ morfu excitari, quod Baglivi judicat; nuper vero *Ill. Ceraso Academia Neapolitana a Secretis* inficiatur.

Romæ capta sunt experimenta cum Tarantulis; horum morfus dolorum excipit; dein tumorem livescentem, paucis post diebus crusta nigricante oblitum; accedit somnolentia, cardialgia, vel cordis oppressio, & deinde dolores in singulis corporis articulis; sed namquam saltandi vel necessitas, vel cupiditas demorbus incensit; hos diaphoretica vulgaria sanant.

Tarantismus ante sæculum decimum quintum a nullo Auctore memoratur, licet tarantula multo ante foret cognita; in Sicilia, Melita, Africa regionibus Apulia calidioribus sunt multæ Tarantulæ, nullus vero Tarantismus, ait *Ill. Ceraso*, cui contradicit *S. Gerovastus*.

Apuli habitant sub cœlo calido & sicco, sunt ingenio acuto, imaginatione vivida, temperamento melancholico, amore musices, seu musomania insignes; Tarantorum plurimi fatentur se a nulla Tarantula demorfos unquam fuisse quantum meminerint; solus Baglivi scorpionem Apulo, cæteri omnes soli Tarantulæ hunc mor-

morbum adscribunt: ob præjudicatam opinionem, ut Astrologi astrorum influxui bella, & epidemias tribuunt.

1. *Tarantismus Apulus* Baglivi Tarantula. A.

Est morbus apud Apulos endemius, quem morfus. Tarantule ob præjudicatam opinionem tribuunt ejus præcipuum symptoma est saltandi, aut choreas agendi, & modulamina musica audiendi effræns cupiditas.

Occasionem huic morbo forte præbuit olim succensus musicorum sonorum ad excutiendam somnolentiam quam morfus Tarantule excitat; inde orta apud plebem opinio adhucdum vigens, mulice inesse eam vim quæ venenum Tarantule per sudores a saltu excitatos abigat, verum & citra tarantule morsum, ac scorpionis vulnus his morbus, fervente calo, homines ad hanc vesaniam prædispositos, quavis data occasione invadit.

Morbus ille chronicus est cum paroxysmis acutis quolibet anno recurrentibus; paroxysmus incipit a moreore, solitudinis amore; quandoque furor, ululatus, vellum indecora abiectione, in ceno volutatio, quorundam colorum, ut nigri aversatio, aliorum amor; accedunt omnes ab instrumentis musicis pulsatis, potissimum a modulaminibus velocioribus, e fomno & profunda mollicitia excitati, & per triduum & ultra saltant ad sudorem usque, arborum ramos manu gestantes & exigantes, a dissonantiis, aut ingratis modulaminibus pejus habentis, alta suspiria trahentes, imo, si desuerit illud auxilium, in caro morientes: secus a sonis harmonicis & sibi gratis convalescentes usque ad annum sequentem; nam eo tempore quo ptimum affecti sunt, paroxysmus revertitur; quovis anno eundem morbum experiri solent, & si non saltaverint toto illo anno angine, anorexia, febricula, anxietate cordis, aliisque symptomatis vexantur.

Vacietates hujus morbi, si Baglivo fides sit, sunt repetendæ a diversis insectis, quorum morfus tribuitur hic morbus.

2. *Tarantismus a Tarantula alba* mitior est, ex morfu dolor ventris pungens, diarrhœa, pruritus.

3. *Tarantismus a Tarantula stellata* peior, inde dolor acutior, pruritus, capitis dolor, stupor, gravitas, horror, totius corporis.

4. *Tarantismus a Tarantula nuda* pessimus; inde symptomata stellatæ, & præterea tumor ingens, & dolor partis demoris, spasmi, sudor ligidus, aphonia, nausea, meteoismus, &c.

5. *Tarantismus a scorpione* Apulo Baglivi.

Demoris non vitis, palmites, sed enses, nodos gestare volunt.

6. *Tarantismus simulatur* Baglivi, cap. 7. il *Garnavaleto delle donne*.

Non a solo Tarantule morfu occasio præbuit huic morbo, sed etiam a chlorosi, ut observat Baglivi cap. 7. Mulæ chloroticæ, ait ille, eadem fere patiuntur symptomata, quæ Tarantata, & consuetudo more lingulis annis saltan-

do a chlorosi, & hysteria immunes omnino evadunt.

Romæ, licet Tarantule deficiant, mulieres ac potissimum hysterice & moniales Tarantismum non raro simulant, sive amoris igniculis, sive jactura rei familiaris, sive aliorum malorum huius proprium radio afficiantur; ob assiduum moreorem in melancholiam & disperationem abeunt, eademque ratione omni mulicos concentu & choris delectantur summopere. Citharistæ vero simulates a veris Tarantatis distinguunt, ex eo quod veri Tarantati, vel levissimum citharistæ errorem in modulamine, & dissonantiam acutissimorum instar musicorum percipiunt, non vero qui Tarantismum simulant, aut qui a Tarantula demoris non sunt, ut: cum Baglivo loquar; nec enim magis est simulatur qui a chlorosi, hysteria, melancholica, nymphomania, &c., pendet, quam qui Tarantule morfus occasionem præbuit, si illius. Sæpe fidem adhibeamus.

2. *Tarantismus entensus*; *Entusiasmus* Galei; *Salus Valentini*, ac *Salus Viri Fel. Plateri*; *Chorea S. Viri Sennert*. Lib. I., P. II., cap. 17. non vero Sydenhami; *Ægri Enterastici Herodoto*.

Est furor saltandi quem divinitus immittunt petant *Guillerimus Hister*, *Vincentius Belloracensis*, lib. 26. cap. 10, quem narrat anno 1072. sexdecim viris & tribus feminis accidisse ex imprecatione sacerdotis, eo quod in cæmeterio choream duxissent. Similem morbum causis physicis tribuendum narrat *Fel. Plater*. in *observat. lib. t. de femina*. Balthensi, quæ per mensem fere sine intermissione saltavit; imo cum sedere cogeretur, gressu, motuque corporis inquieto corpus veluti saltans agitabat.

In Circulo Suevici juxta Ulmam est templum Sancto Vito dicatum; eo multæ concurrunt mulieres circa Festum hujus Sancti quolibet anno mense Maio, ibique saltu cum perturbatione mentis nocte dieque se exercent, donec ecclesiasticorum instar corruant, quæ ratione sibi restituta sanitati videntur, & nihil per annum sentiunt: secus membrorum inquietudine, rensvus artuum doloribus, una cum lassitudine sportanea, & capitis gravitate torquentur, donec anno sequenti organum musicum quod in eorum gratiam hoc Fello pulsatur, audiant: Hæc testis refert *Gregorius Herpinus observ. lib. 2. Similia* est puellarum multarum apud Gebbenenses phantasia, aut furor, cum Divæ Mariæ Festum recurrit, & eas ad aliquod Sacellum una aut altera leuca distans cum amissis & sociis incedunt invitæ animi recreandi, ad fidium sonos libere saltandi, & longe a custodibus genio suo indulgenti pruritus illa delectamenta subvela devorionis licita tam ardentem appetunt plures, ut ab his denegatis ægrotent; expertus loquor, his enim festi interfui.

3. Paulo gravior erat affectus quem prope Courtray in Flandria observavit *Nicol. Tulpus* (obs. lib. 1.) Homo erat vere miser, volaticus & irrequisitus, qui noctes ad dies cursitabat, substat-

tu tam pernici, & agitatione tam perenni, ut sudoribus diffunderet, nec nisi inevitabili dormiendi necessitate preliis quiesceret.

Huc referatur inquietudo & æstrum ambulandi ac saltandi, quo plures tum viros, tum feminas exagitatas vidit *Villifus*, ut graviore molestias & lipothymias alioquin invasuras effugerent. *Villif. de morbis convulsivis, cap. 7.*

Vide quæ de melancholica saltante inferiori referuntur.

Tarantismus musomania.

Est vesanus mulices amor, unde denegata hæc voluptate moror, languor, quandoque furor & infania; concessa vero tranquillitas, læticia animi, sanitas. Si mulices cupiditas æstranis est, atque sanitate lædæ, *musomania* est; hic mulices amor omnibus fere innatus videtur, cum infantes in cunis vagantes, irrequieti, insomnes, miserie ac harmoniaca cuniarum agitatione subleventur; hoc restantur de cura doloris arthritici *Bonetus*, ichthudi *Athenensis*, epilepsia *Chrysippus*, phthisicus *Desault*, alique innumeri referunt, circa quod legi meretur egregium opus *Lud. Roger. Doct. Monspel. de vi soni & musice in Africa* anno 1758. Ipse non dudum iuvis adolescentem, qui in febre gravi quotidie remittente a cephalalgia vespertinis horis in paroxysmo revertente non levabatur, nisi sono tympani bellici, quod ut pulsaretur amicos rogabat, a quo quidem sono adstantes fere capite dolebant, ille tamen adolescens minime musomaniacus est, cum bene valet; ad hæc speciem attinet infania illa epidemica, sed fugax Abderitarum, qua percipi fure, dum agebatur Andromeda Buripidis, ex qua exuentes velut infani jambica capebant, vociferabantur, & tripudiabant Perseum imitantes, referente *Luciano*. Si sole sub ardenti, ut in amphitheatris Veterum, Tragediæ nostræ Opera dicta luderentur, non minor excitaretur apud nos vesania, nec desunt hujus corybantiasmi exempla quotannis dum Saturnalia celebrantur, necnon apud Tarasconenses, & Aquisextienses, cum dies festi ipsis sanctissimi revertuntur.

Huc attinet observatio musomaniaci relata *Hist. de l'Acad. R. des Sc. an. 1707, p. 7.* Quidam Mulices hemiplegicus detentus, septima die delirio corpeus fuit, clamans, terribus, lachrymans, insomnis decima die, paululum remittente delirio, quævis ut in cubiculo suo ferret contentus; accessere amici instrumenta musica afferentes, & ad primos sonos æger exultabat; præ gaudio lachrymas fudit, febris expens fuit toto conatus tempore quo finito recidit in priorem languorem; iterato remedio par fuit successus; imo deficientibus mulices, cantilena cuiusdam verale ipsum sublevarit; demum post decem dies repetiti contentus sanavere.

Similis fere prior est observatio facta *Alefix, & in Hist. de l'Acad. R. des Sc. relata anno 1708.* quidam choreæ Magister gibbus, nomine *Mallon*, simili morbo acuto laborans cum delirio, suavis Dñi de Mandajors, Acad. Reg. Numismatum Socii, qui antecedentem histo-

riam legerat, idem remedium adhibuit; ridebant adstantes quod fidem ad ægrum furiosum acceleraret, & variis sanis eum obtunderet, cum æge, contra omnium expectationem, tranquillitatem recuperans, in lecto corpus erigere, & dulcedine soni capris modulamina brachiorum & capitis motu imitari cœpit; post horæ quadrantem quo duravit ille contentus, æger, antea a somno alienissimus, placide obdormivit, sudavit, & sanus evasit.

4. Tarantismus Tingitavus; le Janon.

St. Gervais in libro cui titulus est *Mémoires historiques*, refert apud Africanos, Tuncti scilicet, endemum esse Tarantismum spontaneum, seu a nullius insecti morbo dependentem, mulieribus potissimum familiarem, quo ad saltandum, & choreas agendas impelluntur; & hæc morbo nomen est *le Janon*; hos quidem motus tanquam convulsivos Auctor reputat; verum verosimile est, eos ejusdem generis, ac quos vere tarantati apud Apulos edere solent.

In oppido *Dancere* dicto apud Delphinatæ idem mox invaluit in curando anthrace, ac olim in oppido *Requesourbe* juxta Castres, scilicet incito tumore, & appposito sale, aceto ac pipere, æger ad saltandum & choreas ducendas per biduum, tintinnabulorum sono, & amicorum exemplo incitatur.

XVI. HYDROPHOBIA; *Hydrophobie, Rage.*

Est morbus cujus præcipuum symptoma est incredibilis potulentorum omnium aversio.

Rabies, Græcis *lyssa*, est apud lupos & canes morbus cujus præcipuum symptoma est vim sibi aliisque inferendi æstranis cupiditas; Lupi scilicet rabidi obvios omnes mordent, sed non ideo sunt hydrophobi; constat scilicet repetita apud Gallo-provinciales experientia, canes luposque rabidos bibisse, manducasse, Aumen transisse, ut olim Marologii & bis Forolivi observatum, adeoque nec cibum nec potum averfari; æst in homine, quem canis lupusve momordit, præcipuum symptoma est aquæ, aeris, lucis aversio, cui rarissime supervenit bibendi cupiditas. Rabiei species plures assignari possent, ut *rabies canina* quæ mortu propagatur, & in homine est hydrophobia accidens; *Rabies maniaca*, *Rabies demonomanica*, quæ sunt accidentia maniz, vel demonomaniz, nec diversum ab illis genus constituunt.

1. *Hydrophobia vulgaris*; *Phrenitis larrans* Democriti; *Acrophobia*, *Panophobia* Cæli Aureliani; *Rabies Canina* Boerhaave; *Hydrophobia contagiosa* Brogiani de Venenis p. 108. *Ægri Hydrophobi*, *Phengyari*, *Aquifuga*, *Rabiosi* &c.

Ille morbus, Græcis præteritus, truculentissimus, sæpius ex animalis rabidi morfo communicatur; raro sponte febribus superveniens, unicum ut plurimum lethalem & brevem paroxysmum obicit, verum ejus venenum diu & circ-

citer quadraginta dies in corpore latitat antequam evolvatur; contagiosus est, salivæ scilicet interventu per morsum, linctum, bāsa a corpore in corpus transmittitur a canibus, lupis, felibus antea demorsis, aut spontaneam hydrophobiam patientibus.

Hujus historiam in *dissertatione qua anno 1748. premium Academia Tolosana reportavit*, fuisse tradidi; idcirco his paucis summa capita attingere sufficit.

Venenum hydrophobicum duplici materie constat, una fixa, mucosa, altera volatili; utraque in glandulis sebaceis faucium, œsophagique paratur, colligiturque, sive venenum salivam immediate affecerit, ut accidit celebri Baldo, qui caniculam rabidam osculatus est antequam eam occidendam mitteret, necnon his quos in facie lupi fauciant; sive venenum aliis parietibus infusum fuerit, quod morsu, imo linctu evenit, modo tamen densum mucus & saliva non deterfa omnino furit, ut accidit cum trans vestes crassas, lanatas, quispiam a cane mordeatur; saliva venenum infere vulneri ut plurimum crassam, quod ibi loci fovetur, exaltatur, resolvitur per mensiem & ultra, vulnere interea cicatricem cito inducente, & premorso, nisi æger timeat eventum, bene se habente; si vero venenum immediate salivam infecerit, illud intra paucos dies evoluitur, & hydrophobia accedit, ut accidit illis qui in facie vulnus acceperunt; inde enim chrymæ, saliva ducuntur cito ad œsophagum. Apud eos vero qui in locis ab œsophago distitis morsum passi sunt, venenum non evoluitur, nisi post mensiem & ultra, rarissime post annos; tunc vero vulnus antea sanatum dolet, rubet, intumescit, ardentes partes demorsæ, linctæ; æger fere semper oblivioni mandatum infortunium suum in mente revocat; imo refrigeratio hujus veneni evolutionem accelerat; inde ut plurimum moror, tristitia, cibi & potus negligentia, tunc autem sive timeat, sive non, angina quadam species eum devexat, potum, utcumque sitiat, deglutire recusati, salivam etiam suam horret; incredibili quadam antipathia, adversus omnia liquida oris, aut etiam oculis oblata, afficitur, cujus rationem ipse non intelligit; nulla hætenus in pulsu mutatio, nullum virium decrementum; æger, si animo miti sit, & ingenue educatus, maxime vero si infans, placide potum renuit, lac a matrice oblatum recusat, frustra bibere conatur, cibi etiam lobulus raptim & cum summa difficultate devorat, & nemini minuitur; si vero rusticus, aut minus mollis indolis, dioriora patitur symptomata, maxime si diram quæ imminet mortem, & quæ de rabidis vulgo feruntur non ignoret, is scilicet quadam obvio omnes mordendi prurigine tenetur; quotquot videt, tot fingit amphoris armatos hostes, qui eum ad bibendum cogant; ægri ad aquam, aut amphoræ nomen, exhorrescunt, salivam longe expuunt, imo vel mini-

mum flatum aut ventum pertimescunt, raro sebricitant, rarius delirant, plurimè devotas preces ad Deum fundunt, simulque amicos monent ut sibi consulant, ut manibus vincula injiciant, at a morsu & sputo suo caveant, & intra unum, alterumve diem convulsi, turbati moriuntur.

Paulo post obitum secta cadavera horrendum foetent, venter intumescit flatu, ichor viridus stomachu notat, maculæ atrorubæ œsophago sunt inulse, cruor fluxilis paucus in venis, viscera sicca, arida sunt, nec mirum, cum per biduum, triduumve æger omni poru abstineat. Animalium rabidorum carnes comestæ, excepta forte gula, aliis hydrophobam intulisse non constat; jecur ipsum pro hydrophobæ antidoto multis laudatur; veneni ergo sedes in œsophago fixa videtur.

Phænomena intelliguntur, si ibi loci supponamus humorem calcis vivæ instar cum saliva & aqua assumpta effervescente aptum, & cujus energia caustica dilutione extirpatur; hinc dysphagia atrox, nausea, gingivarum pruritus, expulsiō, &c.

Si itaque hydrargyrum, affinitate qua gaudet, adhæreat mucos faucium, & illius excretionem promoveat, illud hujusce veneni in his glandulis præparationem impedit, exaltationem a mora pendente arcebit; eliminationem promovebit, sorte huic adhærendo illud concentrabit, ut acidum marginum sublimati corrosivi corrigat hydrargyrum, involvit in aquila alba.

Multiplici observatione a viginti retro annis constat homines a rabidis demorsos, maturo & constanti hydrargyri usu ab hydrophobia antequam accedat immunes evadere; hoc docent observata clariss. *Desault Burdigalensis, Darius Forolivienfis, Fratr. du Châtel Jesuitæ*, qui in Pontichery trecentos hac methodo servavit, mea demum pluries a quatuordecim annis repetita, cum ante hocce invenimus nesciamus vere hoc veneno infectum convalescisse vulgo creditur.

Ex diversis hydrargyri præparatis, forma turbich, cinnabris, &c. præstantissima est potius vulgaris Neapolitana, cujus drachma quantocius vulnere & vicinia est inungenda; imo si tempus urgeat prima vice semiuncia, dein singulis diebus ægro e balneo exeunti iteranda est inunctio unius, alteriusve tantum drachmæ, quod repetatur per quindecim, vel viginti dies, ita ut æger ad summum pauci spura, plura quam pro solito more ejiciat; ea vero servatis servandi, sub victu refrigerante & humectante, vitando aerem frigidum, diro huic morbo præcavendo sufficiunt. Plura vide apud *M. Van. Swieten, Commentar. in Aphor. Boerhaave.*

In accessu hydrophobiz mosches ad gr. xxiv. cum succello, cum vel sine cinnabari gr. xxiv. & aqua vitæ, sudorem & somnum procreat, Hungari suadent scrupulum scarabæi Majas-

his vorandum ad ciendam hæmaturiam quam in hoc morbo salubrem dicunt. *Heisterus* pejus adhuc consilium suadet ut vulnus recens ore sugatur. *Scarabeus Maialis* est *Melos profcrabans Linnæi*.

2. *Hydrophobia spontanea.*

Ha est quæ citra ullum contagium oritur potissimum in hemeritici specie qua affectos phreneticos *Brachypotas Hippocrates* nuncupat; paucæ vero sunt hæctenus huius morbi historiz; de quibus videlicet *Journ. de Med. de Vandermunde*.

Hanc *Lycanibem* Græcorum esse putat *Ill. Broglani*; oritur autem vel sine morbo progressu, ut bis vidimus *Montpeli*, vel a calore itineris referente *Un Laurent*, vel a commotione capitis, *Journ. de Med. Fevr. 1766*, cum cephalicæ ab ictu capitis, *Essais d'Edinbourg*, a potu aquæ frigidæ zeitante corpore *Kochlens a Morgagnio* citatus, vel supervenit in accessu epilepsiz quam fugacem bis vidit in suo sermo *Ill. Vandoillius Muzianensis Archiater*, ex epilepticæ filiz morfu matrem in hydrophobiam incidisse testatur *Malpighius*, & *Journ. de Médecine Avril 1761*, in typho hydrophobiam ortum refert *Salmuth. Cent. 2. Obs. 52.*, necnon *P. Borrellus Castrensis Cent. 117. Obs. 38.*, in cynanche morbilla fugacem referunt *Ad. Ar. Nat. Cur. T. 3. Obs. 105.*, in peripneumonia *Journal Encyclopedique, T. 13.*, in amphimeria cynanchica & in gastritide, *Essais d'Edinbourg, T. 1.*

Datur itaque alia primaria, alia, ut ajunt, symptomatica & deuteropathica. Spontaneam esse periculum plenam testantur aliquot observationes; interea quæ gastritidi supervenit uberrimis phlebotomiis sanata fuit; hydrophobiam spontaneam & periodice recurrentem quæ lethalis fuit citat *Mead*: fugaces & symptomatice illæ hydrophobiz, ut quæ paroxysmum epilepsiz, quæ anginam comitantur, periculi expertes vix sunt; quæ methodo tractari debeant sola docebit serior experientia; an contagiosa sit per morsum hoc dux observationes suadere videntur. Quidam, nomine *Matthæus*, cum anatem amore petictum vexaret, ab illo demorsus fuit in labiis, collo, pectore; partes inflammatz & cito gangræna affectæ fuerunt, unde mors; ipse furor itaque morfus quasi venenatos excitat.

Collatis fere omnibus Recentiorum scriptis de therapia hydrophobiz, nequaquam assentiri possum *Illustribus Viris Nugent & Le Camus*, qui licet mercuriales, tot curis celebres, toties & feliciter adhibitos, dimittere volunt: experientia, quæ sola Practicos ducere debet, docuit ab anno 1779. ex quo methodus *Cl. De Saule Med. Burdigalensis* in nostra Dissertatione ob præmium *Academiz Tolosanæ* fuit latius ebuccinata, quædringentis, saltem, homines ab animalibus rabidis demorsos, quorum fere nullus antea hydrophobiam & mortem effugisset, a litu mercuriali in tuto, fuisse collocatos, cum unicum citetur a *Neotericis* exemplum mulieris quæ ope antispasmodicorum ab hydrophobia libera evasis; illud autem exemplum, si non pro litu mercuriali, saltem

pro mercuriali, medicamine, cinnabari scilicet pluries repetita, æque nullit ac pro antispasmodicis: illa quidem mulier jam ad hydrophobiam devenerat, quod mirum, cum ab ea convalesceret; sed præter duo exempla a *Cl. De Saule*, totidem a *Jesuita du Coisel* citata *Journ. de Med. Augst. 1756.*, aliquot hydrophobias superatas, seu horrorem aquæ, spasmos furorem, hydrargyrosi inflatos videre *Clariss. Darluc, Cavalier Medici Gallo-Provinciales* in agro dicto *Beuf*, & in *Johanne Delphinatæ*, qui similiter convalescit, & in quatuor rabidis quos curabat *Clar. Ham Chirurgus Divionensis*, qui tamen deinceps obiit.

Vera methodus curandæ hydrophobiz consistit in ea mercurii administratione cito post morsum instituta, & quindecim saltem diebus continuata, antequam mensis a morfu elapsus sit, cum æger in facie vel capite læsus est, & per mensem perseverante in casu morsum partes extremas afficientium; quippe docet observatio, ut in nostra Dissertatione olim monuimus, multo citius a morfu supervenire lethalem aquæ metum, cum facies vel caput vulneratum est, quam cum manus & pedes; terminus hydrophobiz in primo casu, observante *Ill. Darluc*, est ut plurimum unus mensis, alit in secundo ad tres menses & ultra extendi consuevit. Qui itaque in primo casu ultra dimidium mensem caruerunt litu mercuriali auxiliorum alibi, in tuto minime sunt; atque si tunc temporis brevitatem temporis perpulitis velimus iterata & largior mercurii dosi, vendicare, metus est ne æger ab hydrophobia sanatus, febre, sudore, spasmi, pyralismo, viscerum & capitis inflammatione correptus, dein percat, seu citra ullam rabiem & aquæ horrorem moriatur, ut sexies factum esse novimus, tum in Gallo-Provincia, tum in Burgundia; cum autem æger serius implorat auxilium Medicum, necesse est parum tutum, sed unicum quod superest remedium tentare; ea lege *Sapientissimus D. Darluc* magnam pomatæ Neapolitanæ copiam fecit quatuor rusticis in facie a lupa rabida demoritis, vigesimo quinto a morfu die, quibus itaque hydrophobia proxime imminerebat: inter quos duo, qui totum corpus hydrargyro sibi inunxerunt procul a Medico, in furorem acti, & post triduum uberrimo pyralismo medio in nemore expurgati, tamen contra omnium spem convalescere, ut scriptis ad me *D. Cavalier*.

Altera lex est ut, cum sufficiens tempus suppetit, & primis a morfu diebus accitissimus Medicus, more *Cl. De Saule, Du Coisel, Beterand Massilienfis Medici*, quem usque secutus sumus & olim deprædicavimus, exigua dosi pomatæ Neapolitanæ, ad drachmam scilicet, alternis diebus, interpositis si commodum sit balneis, illinatur, ut hydrargyrus pacatissime omnes corporis vias pervadens, sine tumultu & in-

& inflammationis meto, venenum ubique extinguit, quod in syphilide curanda duplo tamen majori dosi, ob prægressas præparationes ægri, insinuerare consuevimus, adeoque ea lege ut sensibilem pyralisimum viemus, quo scilicet sit ut hydrargyrus citius quam par est extra corpus delabatur. Quicumque has duas regulas secuti sunt, nullo excepto, ut demorsus in facie vel capite, quantum mihi hæcenus notum est, evasere. Huic methodo insistent post laudatos Auctores, multoties vidi a canibus, ab asina rabida, a sele rabida demorsos a periculo liberatos esse; & quod majus est, non solum a canibus & in artubus, sed etiam a lupis rabidis & in facie, demorsos quamplurimos curavit & sanavit *Ill. Darius*, qui neminem hujusce conditionis ultimæ demorsum unquam vidit sine lita mercuriali sanatum; vidit autem duas hydrophobæ epidemias, in quarum prima anno 1747. viginti septem homines, & in secunda duodecim anno 1651. demorsi sunt Forolivi in Gallo-Provincia, præter multos alios sporadice hoc viru contaminatos.

Ufus turpethi mineralis, panaceæ, aquilæ albe, forte & spiritus antivenerei, eerte utilis est; sed multo minus tutus, saltem usus turpethi, quam litus mercurialis; hydrargyri moleculæ quæ a vasis cutaneis accedunt ad malsam sanguinis vasa omnia minimæ prætereunt; si vero via chyli ad cor accedant, inde ob gravitatem specificam maximam, juxta hydraulicæ leges, vascula tantum majora in axis majorum directione posita, lateralisbus insinuantur, penetrant: & turpethum minerale, utpote emeticum energeticum, stomacho inflammationi proximo, nisi mature, & ad granum unum in mulieribus, aut duo tantum in viris, more *D. Berrand.* adhibetur, nec pluries repetatur, potest inferre strages non hæcenus cognitæ, qualis est paraplegia lethalis quæ observata in hac methodo. Quod antispasmodica spectat, ut moschum, camphoram, opium, succinum, ea parca dosi præscripta minime spernenda sunt, maxime cum superveniente aquæ horrore nullum aliud superest perfugium; aut multo tutius in prophylaxim, quam ea medicamina, adhibetur hydrargyrolis.

Hydrophobis in furore constitutis oculi noctu lucent, ut felibus, quod *Ill. Darius* testatur, & ultra mediam noctem Brunellæ hydrophobæ opem ferens *D. Cavalier Medicus* Forolivi observavit; inde roboratur quam olim tradidi de fluido nervo electrico sententia, meaque de hydrophobia theoria, quæ admittit in hoc morbo fluidum illud in phosphoricam activitatem exaltatum.

Nunquid ea activitas phosphorica fluidi nervi a vehementi affricu concitatur in cæstro epileptico, venereo, phrenitico, in fervore febrium ædentium, in phlegmasi supra citatis? nonne epilepsia parva est in cæstrovenereo; quo vigente hieme exardescunt feles, quo tempore leviter febricitæ scintillant undique, & oculis solito intensius lucent; æstate pluries accidit hydro-

phobia spontanea laporum quam tempestatibus temperatis ob calorem, quo fluidum nervæum magis electricum evadit, modo ventus austrinus, dent: vigente hieme lupi hydrophobi etiam evadunt, nec non feles, ob vin electricum tunc temporis vehementionem. Sed de his in hypothesisum sphaera contentis hic agere locus non est.

ORDO TERTIUS.

DE LIRIA.

Ratio est facultas percipiendi nexum veritatum universalium; inde homo dicitur animal rationale, quod cum ætatem sufficientem attingit, capax est hunc veritatum nexum percipiendi, seu quod idem est propositiones generales veras & abstractas ex pluribus individui concretis observatione compertis valeat effernare: *Intellectus* enim quo pollet homo est facultas abstractum in concretis pervidendi, seu ideas generales effonnandi, cum bruta nil cernant nisi in individuo seu in concreto, unde veritates universales, quales sunt elementa scientiarum, capere nequeunt.

Ratiocinari est ea duabus propositionibus terminum communem habentibus, tertiam elicere; hoc præstant homines etiam in rebus intellectuales, ut circa virtutem, viciu, sanitatem, ægritudinem genericè sumptas; bruta vero bonorum vel malorum sensitivorum ideam sensu sentiunt, & similia in similibus circumstantiis expectant, quæ expectatio est quid analogum humanæ rationi, & vulgo *insinatus* dicitur aut *sensus communis*, nam sensus seu facultas percipiendi impressiones objectorum presentium sere sufficere memoria, ad hanc similitudinem eventuum expectationem.

Morosi hoc instinctu minime destituntur, & mala sensitiva non solum percipiunt, sed & quædam præ aliis impense appetunt, & prosequuntur, atque in hoc errant quod organorum extra cerebrum posteriorum vitio seducti, bona hæc sensitiva intellectualibus multo majoribus anteponant, ut nymphomaniæ illecebras veneris castimonie, famelici alimenta temperantæ, denique pro bonis finimis & realibus exigua & apparentia sumant ac prosequantur; interea ex eo solo inter delirios non numerantur, quia animæ sedes, scilicet cerebri medulla, non vitiata est, adeoque ipsi cupiditatibus morbofis resistere possunt, ac ratione quæ pollet, ac liberatæ quæ fruuntur, errorem suum corrigere potius sunt; verum deliri cerebrum habent læsum tum in toto tum in parte, nec proinde ipsis possibile est suum errorem agnoscere, nec ægnitum emendare; illi quorum encephalus totus afficitur sere ut maniæ inconcinne de pluribus diversissimis objectis judicant & errant; melancholici veto, quorum medulla

cerebri in parte tantum vitata est, de uno aut altero delirii sui objecto pessime iudicant, in aliis sane recte cogitantes, ingenio & acuti.

Præterea morosi quidpiam bonum essentialiter & constanter appetunt, aut malum averfunt quoddam præfacte, & in hoc morositas consistit; saluum tamen remanet ratiocinium, nisi delirium cum morositate complicitur; at delirantes etiam quædam avidè appetant, aut sine ratione averfentur, interea plures circa indifferentia errant, ut qui se cererem, figulinum, vitæum caput gestare, se Reges esse, aut equos, aut Deos reputant; illi de his aliisve subiectis absurda, minimeque sibi coherencia deblaterant, aut multa perpetrare quorum motivum in sanorum mentem nunquam fere venire potest: sic maniacum vidi, qui per quadraginta dies cibum & potum recusabat, solo tabaci fumo contentus, nec fux abstinentiæ ullum motivum ascribat; idem filix sue trienni pollicem cultro abscidit, nec eadem die huius vel meminerat, vel pœnitebat, & sciscitantibus aliena omnino respondebat.

Fingite concentus eujusdam Rectorem & Præfideam, qui non solum diversorum instrumentorum ab aliis pulsatorum sonos percipiat, sed etiam quos ipse in clavicymbalo aut organo ecclesiastico pede, manu producit, regit, ut ajunt, omnibus eductis; ille si mentis compos, liber, & nullis aliis negotiis distractus, sonorum harmoniam, & si quæ sit, minimam dissonantiam facile percipit, omnium partium actionem sapienter moderabitur & dirigit; talis est anima in statu sano, dum præest machinæ humanæ recte constituta; verum si instrumentorum, quibus utuntur focii, chordæ sint male ad concentum aptatæ, vitiosæ, instrumentaque ipsa male disposita, sive instrumenti cui præest registra quædam sint clausa, ut si organa auditus, memoriæ, imaginationis feriantur, aut ipse alio distractus, impossibile est rectum & jucundum concentum fieri; deficiente præsidis regimine, omnia confundi & perperam misceri necesse est.

Talis est confusio in regimine actionum liberarum apud delirantes, licet plures ex actionibus naturalibus, v. g. vitales pacare & continere exerceri pergant, quæ scilicet non actualement præsidis systematis nervi attentionem exigant, sed velut oblongam ejus assuetudinem ab ipso inscio fiunt, ut fidicem inscius capite & pene mensuram denotat, interea dum modulaminibus diversis excitandis est intentus.

Delirium a Boerhaave definitur, *visus idearum non respondentibus objectis externis, sed interna cerebri dispositioni*; a Piscarulo *insomnium vigilantium*. Hallucinatio error est qui a vicio cerebri non pendet, sed a prava organorum externorum dispositione, ut in vertigine, suffusione, & error ille differt a morositate, ut pica, satyriasis, quod non notabilem & constanter secum inducat appetitum vel averfationem; delirium vero pendet a vitioso cerebri ipsius statu, & non nisi confu-

quenter ad ejus vitium ipsi hallucinatio aut morositas sæpius adjungitur.

In statu sano animæ, qualem depinximus dum de concentus præsidis agebamus, omnes actiones & idæ, indeque pendentes appetitus & motus, determinantur, & a circumstantiis externis, & a ratione ac memoriæ veritatem, vel præceptorum universalium custode; unde fit ut omnia rectè percipiatur, absientia imaginemur, præteritorum recordemur, futura prævideamus, omnia bona malæ ad recti judicii stateram libremus, sicque omnes idæ & actiones ab his principis internis & simul externis determinentur. Verbo, datur consensus inter externas circumstantias, & notiones acquisitas boni & recti; unde determinatur quid in quavis circumstantia sentiendam, appetendum, & agendum sit.

Deest ille consensus in omni vesania, nam hallucinati imaginantur & percipiunt quæ non sentiunt; morosi loco voluntatis ab appetitu sensitivo diriguntur; deliri brutorum instinctu, non regimine rationis, ducentur, & sunt similes equis & multis quibus non est intellectus, ipsis etiam peiores, si simul gravibus pathematis aut morositatibus agitentur. In amencia fere nulla sunt pathemata, nec tristitia, nec hilaria; in melancholicis tristitia sunt, in maniacis vividæ ad audaciam & iracundiam vergentia.

In phrentide, paraphtensi & cephalitide paræxia acuta inflammatoria est, unde differunt hi morbi a vesanis quibuscumque ratione delirii conveniunt; in his morbis est insarctus vasorum corticalium & medullariorum cerebri aut cerebelli, atque impetus sanguinis in ea vasa & inde orta neurolymphatica excitat medullarium fibrarum pulsationes, distensiones insolitas objectis externis non respondentes, inde idæ inconcinne, hallucinatio, morositas & delirium, quod sedato sanguinis impetu, resolutio vasorum insarctus, utplurimum cum ipsa pyrexia intra aliquot dies evanescit.

In paraphrosyne etiam fugax est utplurimum delirium, febris quædam sæpe comes, aut veneni effectus. Verum in mania, melancholia & amencia, constants, diuturniusque est error mentis, nec a fugaci fluidorum vitio, sæpius vero a solido tum ipsorum labe dependens, unde medelæ difficultas summa; morotrophia his ægris non sanandis, sed tantum fere custodiendis & nutriendis dicata, hanc difficultatem satis testantur.

Ratiociniis, monitisque Philosophicis hos vesanos aggredi foret operam oleumque perdere, aut surdo canere, quos ad medicamina, vel alimenta necessaria sumenda minis & verberibus cogere non raro opus est. Hi soli sunt ægri apud quos morbus non est molestia, seu qui suam ægriitudinem non ægre ferant, nec de ea conqueruntur; non mirum itaque si ad ejus sanationem concurrere recusent, sorteque Medicis faustum eventum sortitis responderet mania-

nicius, ut respondit ille, de quo *Horatius*: *Palmæ occidit amici*. Interea adeo tristis est acturpis ille morbus, ut, si non ægrum, saltem parentes, amicos & cives omnes sibi obstringat Medicus, qui insanum ad rationis viam reducat.

XVII. PARAPHROSYNE; *Delirium Latinis*; *Temulentia* Platero; *Mentis alienatio*; *Gallis Delire*, *transports au cerveau*, *alienation d'esprit*.

Est fugax & sæpe febrile delirium, unde a mania, melancholia, aliisque morbis constantibus diversum, nec non a phrenitide, paraphrenesi, synocha & typho, quorum sæpe comes est, ut pars a toto discrepat.

Oritur ut plurimum ex tali vitio cerebri quod valet certas æstherii (a) fibras distrabere, succedere, unde determinatur in mente exsurgunt idææ objectis externis non respondentibus, ex quibus tamen omnes appetitus & actiones determinantur.

Vere somnium est vigilantis; somno derenti minime possumus phantasmata quibus detinemur abigere, & errorem corrigere: ast statim atque evigilamus visis & auditis objectis ambientibus, atque ita cum objecto somnii collatis errorem nostrum agnoscimus dum sani sumus. Verum in paraphrosyne nec omnino evigilamus, sed tanta est impressio facta in eniporio, ut eam inde exortam minime abigere possimus, unde ea idea vehementer percussis, consequenter appetamus, aversemur, iudicemus, & actiones omnes dirigamus; nemo est qui inter somniandum, errore v.g. percussus, si expergeat, paululum has idæas non rejicere possit; verum si somno iterum indulgeat, illa phantasmata nobis invitis iterum innoti obversantur; ita ut pluries hanc luctum inter somnium & libertatem intra horam experiat. Si itaque febricitans talem in vasis sanguiferis infarctum patiatur, ut certam idæam alte inhxam non possit amovere, quæque impressiones forinsecus advenientes superet, is frustra objecta externa percipiet, ea prætersivisus ut mox in insomnium etiam interitum relapsus, atque ille paraphrosyne laborare seu delirare dicitur.

1. *Paraphrosyne temulenta*; *Delirium ex narcotici*, *venenis* *amentantibus*. *Temulentia* Plateri. B.

Est illud delirium quod ex liquoribus fermentatis, ut vino, cerevisia, horum spiritibus immodice haustis, forma potus, vaporis, balnei, elysmatii, &c. oritur. Horum spirituum energia fluidum nervum in cerebro mire exagitat, inde millenæ idææ turmatim exortæ in anima; verum ex illis quedam sunt cuique magis familiares; quæ proinde nos magis afficiunt & delectant, his proinde fortius adhaeremus & acquiescimus, unde cunctosque mores & ingenium in temulentia declinant; iracundus exardescit, amatus suspirat,

nulus a circumstantibus objectis quibus vix afficitur ad simulandum determinatur, unde vulgo dicitur: *In vine veritas*.

2. *Paraphrosyne a venenis*. D.

Datura Metel, DuGuid Etkimburgensis, *Diarmidæ*, *Novemb.* 1757.

Decoctum trium fructuum in lactis pinta jejune haustum a robusto sexagenario induxit sequentia symptomata.

Illico vertigo & vacillatio ut in ebrietate, sensuum omnium obscuratio, nulla nausea, lectum æger petiit; lingua & os aridissima, balbuties; immobilis fuit, multavit, delirare visus est in gestibus, genubus flexis; brachia tendens, & aliquid inquirens, oculi graves; tristes; dein applanus, tranquillius, sine pulsu, artubus resolutis, per sex, septem horas stupidus, dein furibundus se iactabat in lecto, infinita signa adstantibus non intellecta edidit, tranquillius dein ac eodem vespere omnino sanus evasit.

Datura stramonium, seu pericarpis erectis, in Occitania vulgaris, suppeditavit decem ab hinc annis latronibus venenum, quo nefarii per aliquot annos usi sunt; semen scilicet contusum in vino infundebant, sed qua dosi nescio; majori scilicet qui bibunt venenum, pereunt, & plures sic interceptos vidi vel audivi; minori dosi paratum vinum ore assumptum intra pauca minuta hominem somno tradit, quo tempore a furibus spoliatur, dein intra paucas horas somno excussus, æger vesanus, demens, millenis minime injucundis deliriis agitatur, mutus utplurimum & gestibus appetitus suos demonstrans, sine nausea nec cardinalia, deinde per multos dies oberrat phantasmatis suis detentus, hilaris, ac demum ad rationem redit, sed debilis ad progressum & veneri impar; hæc in pluribus vidi, viderunt etiam Senatores Prædialis Monspelienis, qui hos nefarios morte damnaverunt. Carnifex Aquilexienis sumpto olim hoc veneno per noctem in cæmeterio choream agebat, & ejusdem urbis canidia morti fuit addicta quod puellas sic dementatas ægemonibus tradidisset. Hoc criminis genus apud Orientales familiare est, docente Acofia. Plura videlicet apud *Gardes Hist. des Plantes de Provence*.

Hyoscyamus niger radice, flore, foliis, similes effectus inducit. Mulier Monspelienis cuiusque maritus radices illas pro radicibus scolymi manducaverant; vespere post quadrantem horæ guttur fuit constitutum, vox extincta, dysuria accessit, amaurosis fugax, risus ineptus, continua loci mutatio per dies duos, dein cephalalgia, debilitas, quæ cunctis emeticis, catharticis cessare. Vidi similes effectus solorum in jussulo decoctorum in altera muliere.

Sumptis *hyoscyami nigri foliis decoctis* superveniunt vertigo, stuporque velut a temulentia, post

(a) *Æstherium*, seu sensorium commune, est, ut multi existimant, corpus callosum cerebri, quod anima sedem esse dicatur.

post tres horas delirium febrili simile, pulsus irregularis, color faciei sæpe mutatur, oculi torvi, pedum gravitas. Liberantur ægri assumpto ypecacuanha, cum aqua calida & oleo, si evomant, secus vero si sudore diffuant & copiose mingant; quidam per mensem adhuc laborant æsthenia; gæstrodynia gravativa, torminibus ventris, cephalalgia, vertigine. *Trans. Philos.* 1752. a D. Steudman.

Corlaria Nilfolii, *Aut. Academ.* vulgo *recloul*, cujus bacce epilepsiam creant, foliis etiam nocet hominibus, & hoc singulare observavi in muliere Montepeliensi, quæ decoctum foliorum ejus in jussulo assumpserat, quod scilicet se in medio aere consistere ferme putaret, nec lecto insistere; visus erat obnubilatus: hæc per biduum.

Solanum hortense baccas diversicolores producit, quarum septem vel octo in ossa comestæ, quod rustici montium vicinorum ludibrii causa quandoque faciunt, similem paraphrosynem aut emulientiam inducunt. De effectibus atropæ Belladonæ, vide *Carum*.

3. *Paraphrosyne ab opio.* Collect. Acad. tom. 3. pag. 676. a Christ. Schellhammero. B.

Tribus granis & semisse, tozidemque croci, deglutitis a viro circa noctem mediam, vir 1. per horæ quadrantem sono tumultuoso, insomniisque turbato, irrequieto indulsit; 2. evigilavit ore sicco, & cum loquelæ, articulationisve impedimento; 3. post horam caput stupefactum & vertiginosum; 4. tunc sibi videbatur ipse in aere suspensus, & omnia circumrotari, 5. progredi coactus turbabatur, ægre procedebat, stupor sensum decrecebat, æst ætuum torpor identidem subito augebatur; 6. penes se non erat omnino, & suæ existentie vix conscius erat, quæstus tamen satis apte respondebat; 7. post semi-horam sensibus orbatus fuit, excepto visu & auditu, sic ætuum nulla æsthenia præditum, spiritus volatili falsis æstheniaci inodorus, tactus fere nullus, ipsi videbantur; 8. manuum tamen suarum genis applicatarum frigus sentiebat; frigeat autem post semi-horam toto corpore maxime extremis artubus, inde stupor musculorum, & progressus impeditus, unde ad hypocaustum exalefactus fuit, & ambulare coactus ne moreretur, sic progrediens obdormiscebat somno obtritus; 9. hora tertia matutina ratio prius obnubilata emicuit, pulsus prius vix sensibilis succitæ: tunc somnus ipsi concessus fuit, sed huic indulgens æger turbabatur, sui imos erat statim ab oculis clausis; iudicio liberiori factio, ipse somnum a se arcebat, a quo timebat; 10. hora quarta matutina, sumpto potu spirituosio vires recuperavit, & in omnibus artubus formationem brevi sensit, repetitis frictionibus stupor superficiali corporis evanuit, sensusque in ea restituitur; 11. hñita hac æsthenia æger lassus est suas toto hoc tempore ideas tantum vagas, & cognitionem status sui non nisi confusas fuisse, licet præteritorum clara remaneret

Sauvages Nosologia Methodica. Tom. II.

memoria; 12. addebatur quod oblato sibi lectoque libro lecta non intellexerat, oculosque suos quater majores apparuisse, ita ut metueret ne aspicientibus horrendum videretur; hujus autem narcotici operatio post sex horas omnino evanuit, & valetudo tunc integra restituta fuit.

Ex hac egregia observatione multa ad psychologiam periciendum deduci possunt corollaria. Facultas attendendi ad objectum seu ideas devagantes recolligendi ab opio turbatur, impeditur, quidam præ aliis sensus obscurantur, memoria tamen vigente; tactus videtur esse duplex, uno obscurato quo corpora distinguuntur, alter quo percipitur frigus, clare sentit: imaginatio quæ æger in aere suspensus sibi videtur, sumptis aliis venenis, ut hyosciami imo coriariæ foliis orta, singularis est.

Ab atropæ Belladonna. Vide *Observ. D. Dumoulin, Medici Cluniacensis, Journ. de Medecin. An. 1759. pag. 219.*

Nota. Paraphrosynes diversi tantum gradus sunt delirium, furor & rabies.

Delirium est primus gradus in quo ægri pacate & tranquille verba effusiunt, aut ineptias agunt. *Furor* est paraphrosyne cum audacia, vultu truculento, voce alta, gestu expedito, sæpe minaci. *Rabies* est paraphrosyne cum insana sibi aliisve nocendi, imo vim intendendi, cupiditate, est itaque ultimus gradus delirii.

In eadem morbi specie datur nunc delirium, nunc furor, nunc audacia; sic in hydrophobia canina, vidi puellam, quæ poætissima erat ad mortem usque, tantummodo aquam horrens, ejusque aversectionem superare omnimodo tentans: vidi puerulum a sele demorsum omnino hydrophobum qui morum suavitatem ad mortem usque servavit, adeoque immenito *hydrophobia* a multis synonyma dicitur *rabies*: cum dentur & rabiosi non hydrophobi, & hydrophobi minime rabiosi.

In phrenitide tum legitima, tum febrili idem æger nunc pacate delirat, nunc in paroxysmo furit, nunc verò si irriteretur rabidus evadit; male itaque *phrenitis* per *furorem* vertitur, utrumque furor in phrenitide, ut in mania, frequenter accidit.

Rabies itaque non est genus morbi, sed accidens, quod mansaciis, hydrophobis, melancholicis, dæmoniacis, aliisque supervenire potest.

4. *Paraphrosyne a conio* Linnæi; Conion Græc. Galen. A.

Cicuta major C. B., Cicuta Maechioli est *conium* Linnæi; vulgo confusidetur cum cicuta aquatica VVeppersi. A conio, ait *Galenus*, illa sit æsthenia, quæ a Græcis ipsis *conion* appellatur.

Folia illa asinis tantummodo carum procreant, ita ut non tantum stupidi, sed prostris mortuis videantur, ac rustici illis sæpe pellem detraxerint, qui in medio opere exasperati sunt, non sine magno excoriantium terrore & spectantium risu.

Ast hominibus radices, testante ipso C. Bauhino, manducatae post tres vel quatuor horas rationis iacturam faciunt, ita ut ægri, quos viderat, huc & illuc per domum in tenebris vagarentur, amentia & furore ducti: unde adeo capite parietes impetiverant, ut mane occurrentibus vicinis, lividam, cruentam, ac horrendam ostenderent faciem. Idem accidit Monacho, qui huius folia petroselinii vice in iusculo incoxerat, ille per plures menses modo amentia, modo furore agebatur; hos omnes sanavit C. Bauhinus, Comment. in Matthioli. de cicuta, pag. 588.

Venenum vero quo Socrates olim exinctus est, creditur esse succus non conii, sed cicutæ Linnæi, quam sum eruca folio Tenuesfortius nuncupat: Venenum multo periculosius, cum homines cito perimat; illud vero cum opio permixtum fuisse, monet Theophrastus; unde mors placida: sic Socratem sumptio toxico oculos fixos, torporem & gravitatem expertum esse dicitur.

An conium illud extus genitalibus applicatum ad fasyriasm sanandam valeat, ut plures de cicuta allatae testantur historię, ignoramus; certum est huius extracti usum internum hodie vulgarissimum illis viribus non esse præditum.

5. Paraphrosyne magica. Delirium magicum Kempher. Amœnit. fasciculus 3. pag. 651. A.

Apud Indos frequens est usus electuarii magici ex semine daturæ, opio & polline cannabis præcipue constati, additis pro subito aromatis, quæ ferociam corrigant, & vitales spiritus roborent. De directione Pharmaciae ad diversa pro libitu inducendum phantasmata, multa referuntur admiranda, sed partim incredibilia, partim fabulosa, ut marium execrari, dum adulter ejus torum confendit. Ast plura vidit ipse Kempherus, ut sequentia. In Malabarâ pro compescendo Idolo cui annonæ caritatem aut tempestatem tribuunt, virgines multæ, pulchræ, compæ e templo Brachmanum comitatu educæ in publicum prodeunt; cum vero ex Bibliis Gentilibus verborum formulam Sacerdos prælegit, puellæ tripudiare, subsultibus crebris, inconditis, & gradatim vehementioribus corpus fatigare, torquere artus & oculos, spornare & horrendas actiones edere; opipante populo illas ita agitari ob industriis demonibus, seu genis quibus obsequenda offeruntur; hæc dum aguntur, cymbala, tympanaque lætum resonant, populo vocæ & suspiriis applaudente; lassatis Brachmanes reducant in templum, cubare jubent, & propinato pharmaco quod prioris vim retundat elapsa horula menti relictas ostendunt populo, ut turba Gentilis liberata a genis videat & idolum (Vidisse) credat conciliatum.

Ipse Kempherus in convivio amicorum bolum electuarii a Benjamin oblato, accepit & alii accepere, hoc hausto omnes repleti sunt & persuasi incredibili gaudio, risu, eacchinis, amplexibus solum explicando, nocte accedente equos descendunt, & tunc sibi visi sunt cum pegaso

volatu per nubes ferri, iridibus circumdatis; apud se perventi, lupino appetitu oblata voravere, postmodum sanissimi mente & corpore fuerunt.

Bethel dicitur medicamentum quoddam masticatorium in universa India usitatissimum, quod a plebe & magnatibus continuo masticatur; componitur vero ex foliis piperis Bethel Linnæi, fructu seu nuce Cycadis areca dictæ, & calce ostrearum calcinatæ; hæc in trochisci formam folio Bethel involvuntur; hoc salivam prolicite, labia rubore sanguineo tingit, gratum halitum oriconciliat, gingivæ roborat, & areca licet exigua dosi addita, cerebrum leviter inebriando spiritus demulcet & exhilarat. Kempherus vero Bethlem nunquam potuit mandere, quin anxietas, sudorem frigidum & vertigines, æque ac a tabaci fumo, experiretur.

Indi etiam tinctura opii tabacum insciunt, ut fumus ipse usitatissimus caput vehementius turbet.

6. Paraphrosyne febrilis Pathologi. Meth. & Delirium febrile Boerhaave aphor. A.

In febribus acutis, potissimum syncho, typho, triplex phosia, aliisque, cum vis cordis sit adaucta, sanguisque recta fere via a cordis ventriculo sinistro impulsus ad eosdem immitatur, inde ad eerebri vasa cum impetu ruat, ea vasa fortius impetit quam visa ejusdem a corde distant; sed frequentioribus & acutioribus angulis inflexa, ut docent leges Hydrodynamicæ a Mæchelero traditæ, a nobis vero per experimenta firmata (Disser. de Medicam. specific. actione) inde vasorum cerebri infarsus, seu majores afflicti sanguinis intra illa vasa fluentis, inde fibrarum cerebri afflicti, & idem objectis externis minime correspondentes, nec a voluntate corrigendæ; inde delirium, inde stupor mentis ad necessitates solitas appetendas, inde anorexia, adipsia, asthenia, languor circulations, secretionum omnium, inde typhi symptomata. Aperto eadavere inveni pluries vasa viz meningis citiore turgida; ante delirium adeo pulsatio temporum, seu impetus vehemens carotidis intra ossa transiit decurrentis, in formam S incurvatur, ibique fortius impoentis; præcedunt pervigilium, idæ vividæ, promptæ, pathemata varia, vox insolita, auidæ, oculi truces, similiaque. Pulsus dein oborto delirio paululum tardior quam antea, respiratio rara, magna, suspiciosa, quia anima non percipit necessitatem frequenter respirandi, pulsus accelerandi &c. ex delirio sequitur quandoque, aucto infarsu, carus, convulsio, peioraque symptomata.

Sæpius delirium paroxysmus remittentium aut accessus intermittentium comitatur, his cessantibus cessat, secus in vigore continuatur observatur, & quandoque per longum tempus perseverat. Vide Phrenitidem calensuram.

Ut hinc occurrat si febris sit vehemens, phlebotomia ex brachio, pede, collo instituenda, in hæmorrhoidariis hirudines mariscis admoventur, caramenia suppressa pediluvii, si fieri potest, revocantur, alius elysmat' laxa serva-

ferunt, fuscula tenuiora conceduntur eo sine ut impetus sanguinis in caput factus, retundatur. At initio typhi caltrens & carcerum pulsus parvus est & a phlebotomia magis deprimitur ac delirium accedit cum majori athenia.

7. *Paraphrosyne a pathemate Plater. B.*

Calculus. VI. Gallie Rex insolationem passus: & a quodam ignoto de periculo traditionis monitus, in delirium furiosum adactus fuit, spectata gladiis armata sibi fingens, omnes adstantes imperiebat, percussit, per triduum mentis impositus fuit.

Novi plures homines qui laudano tum liquido tum solido assueti cum delusi a me & sumpta pilula succi liquiritie laudano tincte in locum opii, ut ab eo deficerent, in delirium incidere cum pulsu parvo & virium languore. Novi Chirurgum qui assuetus aliquot drachmas opii deglutire, eo pauperatis redactus ut opium emere non posset, delirabat cum furore, & assumpto opio respiciebat.

Qui vino, aquae vitæ, similibusque assueti sunt, si ab eis interdiciantur ob febrem obortam, aut vulnus acceptum, pejus habent, delirant cum pulsu parvo, frequenti, siti, cephalalgia; quæ omnia evanescunt, si vinum, aquæ vitæ similique cupita concedantur: horum exempla lege, *Essais & Edimbourg Tom. VI. art. 46. par Alexandre Mouru*, quibus constat libram aquæ vitæ per singulos dies epotatam fuisse non solum impune, sed cum successu a vulneratis, qui hoc potu destituti furebant & pejus habebant, hoc assumpto a febre, delirio, aliisque symptomatibus immunes evadentibus, erant autem illi ægri potatores. vini libenterissimi.

8. *Paraphrosyne puerperarum* Morisot Destandes apud D. Pazos, *Traité des Accouchemens*, Preface pag. 44. A.

Delirium apud puerperas vel est hystericum vel apoplexiæ prodromus. Hystericum incipit a cephalalgia, sed aliis hysteriæ signis, præcipue habituali mentis ad hysteriam dispositione, ut levitate, sensibilitate, vividitate, meticulositate, distinguitur; illud potu antihysterico cardiaco tolli quotidie videmus.

Verum delirium obscurum, per intervalla recurrens, licet lochia fluant, si superveniat subitus capitis dolor quasi a mallei ictu, si aurium timulus, convulsio faciei accedat, lapsus in carum vel apoplexiæ lethalem terminatur, maxime si officiosi adstantes, abinentiam & cerebri vacuitatem incusantes, cibum copiosorem gravidæ obtulerint.

9. *Paraphrosyne calentura* Philosoph. *Transact. Stubbes* num. 36. art. 2. *Collect. Academ. Tom. I. pag. 142. A.*

Differt a phrenitide calentura ex eo quod sit sine pyrexia ulla, pendet a sabbura & vomitione sanetur fugax est delirium, iuxta tropicum navigantibus familiare, subitaneum, lætum; in medio mari folia, arbores aut similia sibi videre videatur; interea ni caveant adstantes in mare se,

projiciunt nullus calor immodicus, lingua nitida est. Curatio; præmissio emetico, quo solo sæpe delirium evanescit, præscribitur dieta mediocri, & sequenti die una aut altera phlebotomia.

10. *Paraphrosyne febricosa*, Vandermonde *Journ. de Med. Mars. 1717. p. 195. A.*

Alterius diebus adolescenti superveniebat delirium quod catharticus, phlebotomia, vesicatorius sanguisugis per duos menses testebat, æger apyretos ferme, summa athenia prostratus erat, venire exhaustus; usu vero kinkinæ feliciter profligatus fuit morbus.

11. *Paraphrosyne critica*, Preysinger cap. 2. de diagnosi. A.

Ea est quæ iminentem in acutis crismum denotat, coctione prægressa cognoscitur, reliquisque signis criticis præsentibus die critico, brevique subsequente evacuatione aut metastasi critica fedatur.

12. *Paraphrosyne hysterica*, Ill. Lorry de Melanchochia *Tom. I. p. 78.*

Est delirium, seu insomnium vigilantis, per vices recurrens, ita simile somnambulismo cataleptico mulieres Ripsaltenfis, ut in historia ab *illustr. Lorry* tradita, nil præter flexibilitatem artuum ceream delicias, ut idem morbus, sit. Mulier scilicet parum menstruata, nondum Lucinæ labores experta, animo liquebatur, sine ulla convulsione feroci, sed obscura primum loquela, delinclaris distinctisque vocibus aliquem & præsentibus alloquebatur, cum videbat, ejus vel minimus gestus observabat, cum eo de quavis re poterat loqui, sed uni idem intenta ad eam omnia revocabat; nullum alium adstantem videbat aut vociferantem audiebat, quod vix credibile pluries vidi, non sine stupore summo; hujus vero facti testes multi supersunt; inexpectata morte mater ei abripitur, tum primum cepit cum mortua imo fusa matre quasi præsentem colloqui, ei tamquam interroganti respondere, hanc suppliciter exorare ut de sanitæ suæ curam fuscipiat, hunc vel illum medicum, utpote præstantiorem accersat & de futuro matrimonio, quæ tamen dudum nupta erat, sanissime & puellæ ad morem inordinate loquebatur, obiciens plura, resellens alia, & quasi in sinum matris secreta multa effundens: uno verbo recte omnino; imo & ingeniose, de omnibus loquebatur, nisi quod circa tempus & præsentiam matris erraret. Illa mulier cæteroquin sana erat, nisi quod ad minimum horreret strepitum, ad visa & audita expavesceret amens. Illa demum in phthisin lapsa est, ast ubi primum febricula oborta est, evanuit omnis tumultus nervus. Hæc *illustr. Lorry*.

Mulier Ripsaltenfis similiter in accessu somnambulismi, omni sensu destituta, ita ut puncta nihil sentiret, alloquebatur nunc suum maritum, ut ut abiret, nunc alium quem adesse imaginabatur, gestu, tono vocis, oculis apertis, ut in statu sano pacato, loquebamur comitantibus, ut bis observavi per semihoram,

horam; imo, ut narravit ejus conjux Medicus, cum quidam Chirurgus eo tempore cubiculum ingrederetur, ea, quae maritum praesentem nec videbat, nec audiebat, percepit Chirurgum quem hostem suum reputabat, & illo viso maxima ira commota est; & quod ipse non semel observavi, durantibus hisce accessibus, modo paulisper quiesceret, velut moribundus, si flecterem ejus digitum, manum, brachium, vel extenderem, illae partes statim impositum retinebant, usquequo gesticulandi necessitas eos artus a statu cataleptico dimoveret: finito accessu nihil eorum quae ante acta fuerant reminiscitur.

Huic affinis erat morbus puellae decem annos natæ, pallidula, malique habitus, quæ, referente *Illustr. Lorry*, in quotidianas convulsiones inciderat, in quibus per plures horas super lectum prostrata, sensibus amissa, celerissime, sine ulla intermissione loquebatur, ingenium ætate majus ostendens in dictis: sedula mater misellæ frontem comprimens eam fovebat, quæ pressione cessante illico convulsiones repetebat; seriantibus autem cæteris sensibus tanta erat tactus subtilitas, ut si altera mulier huic pressioni frontis solerter ministraret, ægra irata adversus matrem suam debaccharetur, usquequo pristinam stationem mater reciperet. Sunt certe in his morbis, ut in catalepsi somnambulæ phenomena, quæ non facile crederet quod horum testis non fuit; nos autem quod vidimus testamur, ut psychologia quondam perfectior evadat.

XVIII. AMENTIA; Græcis *Paranola*; Latinis etiam *dementia*, *fatuitas*, *vecordia*; Gallia *imbécillité*, *becite*, *niaiserie*, *démence*. *Ægri amentes, dementes, imbecilles animo fatui.*

Est ineptitudo ad recte ratiocinandum, & iudicandum: differt a morosi seu stupiditæ mentis, quia amentes objectorum impressiones sentiunt apprimè, non vero stupidi, ad amentes eas non attendunt, non curant, sed quasi omnino indifferentes prætermittunt, harum consequentias flocci faciunt, harum minime satragunt; infantes minime dementes sunt; etiam si graves & serias res prætermittant, quippe frivolas & pueriles magni faciunt & crepundias suas attente ac sollicitè curant; amentes vero omnia perinde negligunt; ridere, canillare, in iisdem circumstantiis in quibus sani de fave, sit, frigore gemebundi conqueruntur; minime iracundi, audaces ut maniaci, nec tristes constantet & meditabundi, ut melancholici.

1. *Amentia senilis, delirium senile; Esas d'émancie; Raderia;* Græcis *Paragena*, delirio; *Serema & paralemera*, a *læto*, iugor, ineptio, unde forte *delirio erymon*.

An propter rigiditatem fibrarum sensibus similitarem, illi minus sensibiles, sive objectorum im-

pressionibus, inde res etiam momentosas pro nihilo & nugis habent, nihil satagunt?

2. *Amentia serena* Fabricii Hildani Centur. 4. observ. 10. de Hydrocephalo; VVesper. exercit. de apoplexia hist. 4. C.

Licet hydrocephalus internus & laxitas cerebri morosum & soporosum affectum sæpius excitent, non minus sæpe observata sunt copiosæ aquæ in cerebro amentiam cientes; & ex *Kerkringio* latinum expertum citante, oves fatuæ, quæ nec edendi nec bibendi sentiunt stimulum, post mortem apertæ, nil cerebri habere, sed huius loco tantum aquam continere competere sunt, & hæc est *fatuitas ovina Kerkringii observ. anatom. 46.*

3. *Amentia a venenis* Rati histor. Plantar. de stramonio pag. 707. J. Bauhini histor. Plantar. de Hyoscyamo; *Cresco* Barrere observat. anatom. 3. p. 54. edit. 2. 1753. a *transfusione sanguinis*, Dionis. L.

Post varia symptomata ab assumptis raditibus seminibusve harum plantarum ut ab usu opii non raro ægri amentes evadunt, ut retulimus dum de paraphrosyne; illa vero venena sanguinem dissolvere conitatur (ex observatis *Illustr. Hamberg. Diff. de Narcoticis*) qui sanguis potissimum cerebri vasa ingurgitat.

4. *Amentia a sumere* Platæci observat. lib. pagini 13.

Bonecræti olim strenuus miles istum capitis passus post tres annos mente imbecillus evasit, adeo ut nihil secundum rationem ageres, cibum nec peteret, nec per vim intrusum caperet, lectum non nisi coactus adiret, nec nisi interrogatus verba quædam, quæ ad rem minime pertinabant, proferret: stillabat e naribus piquita aquea copiosa; ad mensum obdormiscens sedebat. Aperta talvaria insignis tumor globosus scirrhoso-fungosus, porri magnitudine, supra callosum cerebri corpus inventus est, aqua etiam in ventriculis cerebri inventa.

5. *Amentia ab hydatidibus* Panacoli Pent. 4. observ. 17. L.

Utrum a vesicis lymphæ turgidis; necum a sero ex illis effuso pendeat morbus, dignoscere difficillimum & inutile, cum nec inde diversa curandi methodus innotescat.

6. *Amentia microcephala* VVillis pharmac. rationalis. L.

A solito minori cerebri capitisque mole parvitatē ingeni, judicæ immutationem deducunt quidam Philosophi, verum consequentia non videtur legitima, licet verum sit quod apud hominem moles cerebri majorem telationem obineat ad molem corporis quam in ullo alio animali, ut ostendit in *Atti. Sac. Reg. Monspeliensis Doct. Arlet*. In microcephalis organa omnia imigationis non esse evoluta verosimile est. Exemplum ejusce amentie præbet puellula Nosocomii generalis, quæ *finia* vocatur ob capitis parvitatem & cum *finia* quædam similitudinem.

7. *Amentia ex siccitate* Boneti Sepulchret. To. 1. p. 260. L.

Civis.

Civis Leodienſis poſt paraphroſynem furibundam ſapius & veluti repuerſcens evaſit; illi poſt obitum ſicciſſimum cerebrum atque in ſumma parte digitis friabile, flavedine citrea undique tinctum, inventum eſt.

Nota. Tres puellæ quæ hieme ſæviente iter in rheda faciebant, domum reverſe per quatuordecim dies ſaræ evaſerunt; Bartholini pelle vervecina calente ſingulis caput obvolvi curavit, eaſque reſtituit.

Quidquid itaque fibrarum medullarum cerebri flexilitatem tollit, ut ſiccando, coagulando, refrigerando, illud ſenſibilitatem exquisitam admittere videtur, ſimulque rationem; verum quæ naturam flexilitatem minuunt, ſeu ultra modum relaxant, ſenſibilitatis etiam naturæ multum detrahunt, unde mentis functiones tollunt.

8. *Amentia moroſa*; Græcis *Ania*; Latinis *Ingenitū ſuſor*, *tarditas*, *ſtupiditas* VVillii cap. 13. *Stupiditas*, *beſtie*. Agrii *blenni*, *bardi*, *ſtolidi*. L. Eſt facultatis imaginandi, proindeque iudicandi debilitas, tarditas, abolitio, ſine delirio, quæ an diſcrat ab amentia ſeroſa dubium eſt. Vide *Amneſiam*.

Magnam autem eſt diſcrimen inter amentes, & ſtupidos: amentes ſatis prompte imaginantur & memoria non carent, ſed male iudicant & ineptiendo, pleraque ſiniſtre aut ridicule agendorum aſtutibus movent: aſt ſtupidi imaginatione & memoria carent, nec bene nec celeriter capiunt dicta; non nugando ac geſticulando, ſed herbe & inſulſe ſe gerunt, ſunt hebetes, obtuſi.

9. *Amentia ab itū*. L.

Vide apud Boerllum *Centur. 2. Obſerv. 73.*

10. *Amentia rachialgica*, Cl. Bonte Journ. de Med. Nov. 1761. p. 317. L.

Ea ſuccedit Rachialgiz, poſtiſſimum melancholicæ.

11. *Amentia a quartana*. L. Vide Sydenham. *Seçta 1. Cap. 1.*

Eſt ea quæ febribus intermittētibus, curatis per phlebotomias & catharſes repetitis ſupervenit. Hanc ſpeciem paſſus eſt Moſpeli meritiſſimus Anatomicus ſexagenarius, qui per tres meſes rationis uſum recuperaverat uſu extracti de hyoſcymo albo, cujus drachmam demum quotidie vorabat, ab hoc vero coactus abſtinuit, cum in urbe hoc medicamentum deſiceret: initio proſuſerat etiam uſus Diaſcordii juxta Sydenham mentem præſcriptis: hic morbus erat ſine furore & audacia, potius cum læticia, unde ad maniam non attinet, contrarium inſuente Sydenham.

12. *Amentia calculoſa*, Kerckringii Spicil. *Obſervat. 36.*

Is in ſemifultis quæ deerat invenit calculum pituitiformem ſero ventriculi innatantem. An a ſero, an a calculo amentia penderet? Calculus in cerebro reſertos naſcant *Ephem. N. C. Dec. 1. Ann. 2. Obſ. 27. Dec. 11. Ann. 1. Obſ. 33. & 131.*

Sauvages Noſologia Methodica, Tom. II.

XIX. MELANCHOLIA, ſic dicta a *melaina nigra*, & *chola bilis*; Hippocrati Aphor. 21 & 56 lib. VI. *Mania* dicitur; Gallice *Manie*, *Folie*, *Tic*, non *Melancholie*, quæ mororem tantum involvit, non delitium. Agri vocantur *Melancholiſti*.

Charact. Melancholici dicuntur, qui uni poſtiſſimum cogitationi conſtanter aſſixi circa ſemetipſos aut ſtatum ſuum delirant, de cæteris objectis riſe ratiocinantur.

Qui vertigine, tinnitu, ſuffuſione laborant non uni ideæ conſtanter inhzrent, & eorum error non a cerebro, ſed a cujuſdam ſenſus organo dependet, unde a melancholicis diſſerunt.

Qui noſtalgia, hydrophobia aſſiciuntur, quædam cupiditate, vel averſatione continuo exagitantur, cum melancholicis objectis cujuſdam amor, vel averſatio non ſunt eſſentiales.

Qui addunt melancholiam eſſe cum morore & triſticia, illi omnes ſpecies ſua definitione non includunt, cum ſint veri melancholici moroſi dicti qui felices ſe reputant: Maniaci vero de plurimis aut omnibus objectis promiſcue delirant, & apud eos non ſola imaginatio, ſed ipſa ratio vitiatur.

A phrenitide, cephalitide, paraphroſyne diſſert melancholia, quod eſt chronica, & apyretica; illi vero morbi acuti ac ſæpe febriles; ab hypocondriaſi & hyſteria quod ab interni cerebri vicio, non partium cæterarum culpa deducendum ſit delirium.

Non perverſe ratiocinantur melancholici, ſed a principio falſo cui conſtanter inhzrent conſequentias ſuas recte ſæpius deducunt. Inclytum melancholiz exemplum præbet fabula tomanenſis Don Quichotte a Michael Cervantes ingenioſe ſcripta. Origo itaque huius morbi eſt fortior & conſtantior attentio ad unam ideam, neglectis inde aut præterviſis cæteris circumſtantiis, unde non reſpondent actiones liberæ hiſce circumſtantiis, ut in mente ſana fieri debet, ſed huius obſecto cujus idea totam mentem detinet.

Galenici humorem atrabiliarium, nigrum, ſtulinofum; VVilliiſus fluidum nerveum vitriolicum vel acetofum; Mechanici fibræ nerveæ cerebri magis ſenſum inſcant, ſed hæc omnia ſunt gratuita.

1. *Melancholia vulgaris* Michael Engelman diſſert. de melancholia 1754. L.

Novi Medicum qui ſanatus a ſyncho in eo delirabat quod ſe veneno affectum eſſe a pharmacopola crederet. Parochum, qui divitiis affluens ſe paupertate preſſum exiſtimabat; lectio affixus ut veltibus parceret, omnia ſua munia intermittens, de cætero recte ratiocinans. Novi mulierem quæ a domo ſua vel minimum recedere non poterat ſine metu inexplicabili. Fuere qui ſibi caput vitreum; alii ex glacie conſectum putabant, & conſequenter ad hanc opinionem eſe gerebant. Ludimagiſtri non pau-

ci a puerorum educandorum cura dementantur; viri ingeniosi, Poetæ celebres, ut ille *Tasso*, artifices præclarissimi inter Pictores, Musicos, &c. huic morbo fuere obnoxii. A zelotypia plures infaniunt, unde species est apud *Villelmum* melancholia zelotypa. Inter errores melancholicos accusandus est qui olim vivebat epidemice, *Punfili* honoris dictum, quo ad singularia certamina provocabatur honoris vindicandi gratia; quidam se testam putans timebat ne allideretur a vicinis: *Galenus*. Alter se gallum gallicantem putans, cantum & alarum plausum galli imitabatur; *idem*. Alter timebat ne Atlas gravatus sibi mundi onus imponeret: *idem*. *Abenazar* narrat quemdam se mortuum esse affirmantem.

Grimmulus vidit alterum qui pedes suos stramineos esse credebatur. *Trailianus* mulierem adducit, quæ digito orbem sustinere imaginabatur.

Schuld alteram, quæ nihil edere voluit, quia se pauperem putabat; *Nemaus* vivit puella quæ sibi assidere continenter putat centurionem, quem odit, & qui ipsam rapturus est, qui centurio ante decem annos ipsi concubium proposuerat.

2. *Melancholia amatorum*. *Erotomania*. Patholog. Method. *Amor insanus* Sennerti. L.

Ea species a satyriasi & nymphomania in eo discrepat, quod erotomaniaci non impudenter objecti amati amplexus cupiunt, sed e contra illud pro numine venerantur, omnibus ejus nutibus obsequiosi ac quasi devoti, vitam in perfectionem illius admiratione ducunt, ejus absentia contristati, presentia exhilarati, alimenta, somnum, negotia sua parvi faciunt; verbo, suam amantem eodem modo colant quo Dom. Quichotote suam Dulcineam. Hoc delirio Aristotelem ipsum affectum esse, & ad thura suæ conjugis offerenda inducunt, ferunt. Hoc laborasse scriunt Poetæ celebres Orphæum, qui ut conjugem suam recuperaret, tartara subire non dubitavit; quo enim non deducit insanus amor? *Salomon* ad idololatricam usque amore desipuit. *Lucretius* philtro & amore dementatus, sibi violentas manus intulit. *Tasso*, alter Italorum *Virgilius*, Principia mulieris amore captus, per quatuordecim annos desipuit.

Diffimulatus amor cognoscitur ex coloris subita mutatione, & pulsus acceleratione ad conspectum aut nomen objecti amati, quo signo *Galenus* & *Erasisstratus* hunc morbum celatum dignoverunt.

Si melancholicus amor celebs sit, optimum est remedium hunc cum amata connubio jungi; si vero matrimonio locus esse non possit, auxilia moralia omnium sunt efficacissima, inter quæ 1. preces & jejunium cæteris omnibus præstant, teste Evangelio; dein 2. gravium virorum monita, circa hujusce vesaniæ dedecus, sanctas sequelas, sanitatis scilicet, fortunæ, temporis, honoris detrimentum. 3. Longum iter fugiendum, ut monet in hisce peritus *Ovidius*; omnia quæ objecti amati memoriam refrigerant abicienda. 4. Otium fugiendum; qui vis

sanari, vos ago, *imtus eris*. 5. Vitia objecti amati detegenda, exaggeranda:

*Exige quod cancet, si qua est sine voce puella,
Non didicisti chordas tangere, posce lyram;*

*Turgida si plena est, si fusca est nigra vocetur,
Et poteris illic rursus, si qua proba est.*

6. *Horror* & ut pariter vinas habeatis amicas.

Alterius vires subtrahitis alter amor.

Intrat amor mentes usu, desiderat usu.

Qui poteris sanum fingere, sanus eris.

7. Fugienda alimenta quæ semen adaugent, ut chocholata, pistacia, pini, viduus lautus, piperata, &c. vinum vero ea dosi quæ curas abigit, prædesse potest.

Huic aliique animi morbis sanandis ac prævertendis, adeoque felicitati etiam temporali assequendæ nil aptius esse summi nominis amore, argumentis geometrica soliditate præditis, fuisse evincit *Illustr. Cheynæus*, Cap. VI. de animi affectibus, num. 21. ex hoc amore etenim, pergit ille, ad perfectionem Dei imitationem nos componetumus; & inde odium, malitia, luxus, libido, ignavia, aliaque mentis vitia, morborum corporis secundum fontes exarserunt.

3. *Melancholia religiofa* Cheynæi, de sanitæ tuenda, pag. 200. *Melancholia supersticiosa* Profper. Alpini. de morbis Egypti. Foresti, lib. 20. observat. 24. *VVillii*, cap. 41. pag. 245. C.

Constitit in alio more et immo dico iudiciorum Dei metu, simulque defectu dulcis illius fiducie, quam ejus paternæ clementiæ debemus.

Illa ut plurimum melancholia accidit illis qui fractum infortunis animum aut corporum voluptatum tædio affectum, voluptatibus quas vere suis cultoribus spondet Religio, recreare cupiunt. Hominis vere pii est Deum præ cæteris omnibus diligere, infortunia tanquam merita penitentis instar accipere, & viriliter, ut bona, & ad nostram perfectionem a Deo immissa, sustinere, interea de optimi Patri nos tunc castigantis misericordia minime dubitare, eique in læticia servire. Melancholici e contra veræ religionis ignari, quo se versant nescii, fluctuant incerti, indociles, supersticiosi & meticulosi sunt nonnunquam, & ad ultimam desperationem rediguntur; alii ut inter Sanctos a plebe habeantur, ut narrat *Alpinus* de Egyptiis, in locis asperis vivunt, miseria mundi prædicant, divitias, voluptatesque spernunt; cælibes quidem honesti, religiosi vivunt, sed a vera religione longe absunt; horum corpora nigra, squalida, gracillima, nimis arefactis similia sunt; suos sic diaboli habet martyres.

Hanc melancholiam avertunt non qui imaginationem spectris, phantasmisque terrefaciunt, sed qui potissimum optimis veræ religionis documentis mentem imbuunt.

Vidi delirium in muliere pia de sua salute desep-

desperante, quæ eo devenit, ut dimissis domesticis ad trabem cubiculi sui laqueo se suspendere. *Lufianus* vعو suum ægrum hoc artificio in rectam rationem revocavit. Angelus quidam aut ejus personam agens amicus detractis prius tegutis, læva acceniam faciem gerens, dextera gladium, melancholicum noctu evigilavit, et quæ omnium quotquot paravisset scelus veniam a Deo datam denuntiavit, unde ægæ securitati & sanitati redditus est.

4. *Melancholia argenti.* *Melancholica ægrotum imaginariam* Francisci Chiconesii Archiatrorum Comitum, in Dissertatione, an ægrotantes imaginarii sola diversitate idearum sanandi sint? anno 1713. *Maladie Imaginaire.* L.

Ægri imaginarii, quos belle derisit *Moliere*, sunt illi qui corpore bene valentes se ob momentaneos affectus in mortis periculo versari constanter judicant, unde mortis, queruli, omnea Medicos suis consultationibus divexant, vel de sorte sua desperantes solitudinem se addicunt, ubi indefinentes desunt; vel ad abigendum morbum, pavum quoddam & damnosum vitæ genus eligunt, & gravioribus malis inde se exponunt. Dissert ab hypochondriaci hæc melancholia, quod nullo morbo corpore labore melancholici illi, aut multiplices laborant hypochondriaci, ut flatulentia, rubus acidis, spasmis, qui simul hanc melancholiam sibi adiungunt habent, unde vulgo sed immerito, confunduntur.

Imaginarii ægroti nunc se tales præbent quales sunt, & vultu florido, viribus integris, indefessa loquacitate, de vertiginosa & fugati cephalalgia, de histeria in capite aut pectore symptomatis, tanquam promptam sibi mortem allaturis, de debilitate suavia, fortissime, eloquentissime per totam diem conqueruntur, vel si ab eo quem consulit se deridendum fore expertus metuat æger, ille se firmum intrepidumque mortis contemptorem simulat, atque brevi stylo, vocisque sono familiari, symptomata sua enumerat, ita ut veram esse ægitudinem facile incautus existimet, sed si facilem aures præbeat auditore, jam narrator personam hanc diu non sustinet, & ad luctus, mororemque suum revertitur.

Itaque hoc signo potissimum imaginarius morbus cognoscitur, quod cum melancholicus de gravissimis capitis, cerebrique læsionibus conqueritur, ut de turba, vertigine, vapores, hæc distincte, eloquenter, nitide depingat; cum summam debilitatem se experiri affirmat, illud pectoris, vocisque robur exhibet, illum vultum & colorem præfert, quæ cum statu depicto minime consistere possent.

Sunt qui curam abigant, rationem exuere conantur, & idcirco se vino, veneri, ignavie ludio, vel alicui vehementi affectui se dedunt. Sunt qui morosi, contentiosi, desperabundi, milles mutatis & Medicis & remediis generibus, morbum suum obstinate silent, interrogati renuunt, mortisque cæte, ut putant,

& imminentis formidinem alta mente recondunt, iique ut plurimum insanabiles sunt, & ad manum vergant.

Hic morbo divites, otiosi, laute viventes, ingeniosi; rarissime vero pauperes, laboriosi, negotiosi, habetes, obnoxii sunt; pueri nunquam, raro senes, sæpius ætatis consilientis viri ac mulieres.

Prædisponunt ortus a parentibus hypochondriacis, studia immodica, educatio effeminata.

Excitant vero hunc morbum acres & attentæ meditationes circa suam valetudinem, philautia nimia, pulsus sui frequens exploratio, levis Anatomia & Medicinæ cognitio; medicamentum ab incauto Medico suorum usus, quæ omnia ideam morbi imaginarii excitant, revocant, foveant.

Curatio hujus morbi frequentissimi & pertinacissimi ingeniosum & prudentem exigit Medicum, qui eo tantum collimet, ut animi attentionem a morbo dimoveat, alioque distrahat; verum difficillimum est persuadere illis ægrotantibus morbum ab imaginatione læsæ, a præjudicata opinione pendere: sæpe Medicus, ut eo deveniat, ægri erroribus attentis se fingat, ut fortius eos errores impugnet; imo ægrum astute debet adducere ad ea, quæ ideas novas a morbo longe remotas excitant, adeoque ab omni medicamentum genere eum dimovere: suadeantur itaque festiva spectacula, amicorum colloquia, ludicæ concertationes, exercitia corporis jucunda, ut ambulationi, cantus, concentus Musici, venatio, sed potissimum peregrinatio facta equitando, vel vectura ex navis, rheda, concurrente simul sobrietate; & denique si ea omnia inutilia succint, utile erit ægro, si, gravi quodam superveniente negotio, vitæ, honoris, fortunæ discrimine, priorem ideam dimittere cogatur.

5. *Melancholia moria* Nenterii, Tabul. 171. *Horræ.* Epist. 2. lib. 2. *Moria* Erasmi, Boileaus Despreaux, Satyre 4. vers. 103. L.

Est ea species læta & jucunda, in qua se cæteris hominibus felicioribus existimant ægri, alta quæque spirant, & se Principibus, Regibus, imo Diis pares autumant.

*Fuit homo ignobilis Argis,
Qui se credebat miris audire tragædos,
In vacuo lætus sessor, planisque theatre,
Hic ubi cagnatorum epibus, curisque relictus,
Expulsi hellesbore morbum, biletique merano,
Et redit ad sese: Pel me occidisset amici,
Non servavisset, ait, cui sic extorta voluptas.*

Hæc facetus reddidit. Gallice. *Despreaux*, Satyre 4.

Alexander adulterum encomiis delusus, se Deum putaverat; verum, accepto vulnere ex cruoris effusione suum errorem agnovit, quippe Deos, non cruorem, sed alterum liquidum in venis habere pronunciaverat. *Plautus*.

Scholaris quidam per. *videt* eurrente, clamabat
I. 4. se.

fe Gallorum Regem anno 1503. Qui se Jovem existimarent inventi sunt, ut Salmoncus, curru supra pontem aeneum agitato, tonitrua imitans; Virgil. *Æneid.* lib. 6.

Vide simile exemplum a datura excitatum, & remulensis familiarissimum, ubi de Paraphrosyne & Drimonomania.

6. *Melancholia arzonita* Bellini, de Melancholia, pag. 380. L.

Vidi in Nosocomio generali vesanum quadragenarium, qui dudum demens constanter tacebat, per multum tempus immobilis & velut stupidus, per septem dies cibum & potum renuebat, & cum minis eum coegisset ad forbendum jusculum; ipse jusculum aliquandiu in ore vel oesophago detentum, voluntario rejiciebat. Cadavere aperto inveni omnia exsucta, sanguinem viscidum, & cerebrum maxime firmum ac compactum.

In hac specie æger loco non movetur, imo nec sicut; sedens nunquam assurgit, stans nunquam sedet, jacens vix unquam se erigit, nec pedes agit, nisi ab adstantibus promovatur, & loco pellatur; hominum frequentiam non fugit, interrogatus non respondet, licet dictis animum advertere videatur; monita nihil curat, ac si surdus esset, objectis visui & tactui non attendit; quasi cogitabundus & cogitatione aliarum rerum distractus dormit, vigilat per intervalla, cibum ori admotum comedit, potum haurit. Rarissima morbi species nec a *Sennario* visa, sed a *Jano*, Medico *Eleboris Saxoniae* semel in viro triginta annos nato, observata: is iudiciorum Dei terrore percussus, per quatuor menses autumnæ & hiemæ hoc morbo laboravit, & denum ad se rediit. Descriptio vero optime quadrat cum descriptione mea mox memorata.

Architectus *Barcinonensis*, 37 annos natus, merore ob ærumnam affectus, incidit ante annum in melancholiam arzonitam: is continuo timet & patriam fugere meditatur, inquisitionis metu & conjugis odio motus; is constanter silet nullique interrogationi respondet, nec gestu, nec voce; raro signis manus aut oris mingendi vel alvi deponendæ necessitatem indicat, audit tamen & intelligit; minis coactus manducatur & bibit, ast dein inceptum passum vix intermitte; unam aut alteram horam noctu dormit, reliquo tempore immotus manet, oculis apertis; pulsus bene se habet, vires constant. Frustra phlebotomia, vesicatoria toti capiti admoda, emetica, aquæ Bellucanæ potæ & irrigatæ, nec non pitana sudorifica &c. adhibita sunt. Suavissimus usus moschi, camphoræ, balnea frigida, remedium *Muskeri*. *Lecheri*: & verosimile est insitumem scabiei in simili casu feliciter tentatam, exterius præstantius fore remedium.

7. *Melancholia crubunda* Bellini, Montali, &c. *Luscomoria*, & passio hydrotes. Græci. *Curnanth Arabibus*. *Chalraz* quibusdam. L.

In hac æger, nec per horam quiescere nescit,

sed cogitat huc & illuc continuo vagari, nesciens quo vadat; timidior est omnibus melancholicis, hominum frequentiam fugiens, noctivagus, per sepulchreta, per solitudines; nec scit unquam quid fugiat, quid querat, quid velit. Corpus siccum & aridum, oculi concavi, sine lacrymis, exsucci, sitis aliis, lingua arida, color corporis citrinus, ulcera non raro in cruribus, a quibus non consolidantur.

A tribus annis hoc omnino morbo laborat Mulier septuagenaria *Montspelliensis* epileptica, ex quo ad curandam epilepsiam sumptis per triduum magnam dosim hepatis lupini exsiccati, illa non quidem hominum consortium fugit, nec ulceribus tibiarum afficitur, sed de cætero omnino quoad colorem, habitum, & quietis intolerantiam, est optime a *Bellini* depicta. Inquietudo est, & veluti ædium intolerabile, quo sit ut continuo locum mutet, sui ipsius perisæa, secum habitare minime valens, tristissima, siti continua, & oris siccitate divexata, macilenta, de cætero timida, minime delirans, rariores & multo minores epileptiæ insultus patiens, sed melancholia illa errabunda miseriam multo divexata, quam quis facile crederet; juscula refrigerantia, pitanae nitratae, aliaque in casum fuere adhibita; & miror quod a tanto malo nondum erepta fuerit.

Rarissima est etiam hæc species, & a nullo Neotetico observata aut recognita; nisi *Ephemer. Natur. Curios. Decad. 2. ann. 5. append.*

8. *Melancholia saltans* Mezeray *Histoire de Charles V.*

In *Hollandia* viguit anno 1373. morbus epidemicus, quem *Cheriam S. Joannis* vocaverunt: plebei hoc tentati vestibus abiectis & nudi, floribus coronati, resili ducentes, per vicos & templa saltando, cantando, currebant asqueque plures anhelosi humi procumbebant; ita intumescbat illis abdomen, ut plures crepuissent (nisi vinculis coercita foret ea intumescencia). Malum in adstantes nimis attentos serpere credebatur, & diaboli operationibus tribuebatur, unde ad exorcismos confugere motus. Huc attingit *Antoneasmus* mirabilis *Guillerini*, *Specul. historiar.*: Huc *Enterastich* *Herodoti* & *Membrorum saluosa dispositio* *Arabum*.

9. *Melancholia hippantropica* P. le Comte, *Lectres édiñantes*, &c. *Zoantropica* varietas. L.

Sinenis quidam persuasus fuerat a Sacerdotibus seu Bonzis, fore ut sua anima migratura esset post mortem in corpus veredi, jussa Imperatoris in Eliseos campos translaturus; eum proinde hortabantur ad recte currendum, abstinentiam a morfu, calcitatione, &c. Bonus ille senex turbulentos somnos vix cupiebat, cum se ephippio instructum & freno, iam ad veredarii flagrum profecturum credebatur; ast expergescit sudore diffusus, non equus esset an homo, dubitabat. Conversus in Christianam Religionem, reliquit.

10. *Melancholia Scytharum* Hippocrat. de aere, aquis, &c. L.

Divitiores apud Scythas erant illi qui equitando mercari soliti erant; cum autem nullis itineribus uterentur, crura pendula erant, & genitalia diu compressa, unde ineptitudo ad generationem, quo perfectio constat, fere a Diis afflictis hoc morbo reputabant, & in mulieres convertos: unde muliebria vestimenta inducebant, colum ac fufum tractabant, a plebe superstitiosa simul colebantur, meruente ne quid simile a Diis pateretur; pauperes vero, utpote minime equitantes, ab hoc morbo erant immunes.

Cura Scythica erat larga, & ad animi deliquium facta missio sanguinis ab arteria aut vena temporari, quæ ulterius debilitati pejus habebant.

11. *Melancholia Anglica*, vulgo *Tatium vita*. Le Geomædium D. Grefst, cui titulus est *Sydney. C. Puellæ* Milesiæ quondam delirio singulari acta tanta moris cupiditate ardebant ut turmatum se laqueo suspendendi, nec motum quilibet agnoscebant; tandem sapientis civis consilio Senatus Edicto iussit, ut quæ prima suicida reperta foret, ea mortua omnino nuda in media platea exponeretur: quo decreto illico puellarum furori finis factus est: *Plutarchus de veruena, faits des femmes* Tem. I.

Simili melancholia actæ mulieres Lugdunenses, referente *Primoroso*, se turmatim aquis immergebant, & iis suffocata peribant.

Apud Anglos etiam frequens est suicidium ob tradium vitæ, quo capti languidi, mæsti, omnium remedium perterriti, res suas componunt, testamenta scribunt, amicis per epistolas deinde transmittendas valedicunt, & deinde laqueo, veneno, vel alio modo vitæ suæ finem imponunt; quod criminis genus admittunt illi qui religionem omnem exegerunt, & ita debili fuit animo, ut æternas vitæ humanæ sustinere nequeant, apud Gallos hoc scelus lege prævertitur, quæ sancitum est ut suicidarum cadavera carnicibus ducta in cratæ pœnaria per vicos & compita trahantur.

Pluribus maniacis melancholicis suicidium familiaris est; ab melancholia Anglica in hoc differat ab aliis, quod sine ullo dolore, aut gravi ærumna, ex solo vitæ tædio tranquille mori decernant; quod Chiliarcha Tövvnshead solo voluntatis imperio coram Medico Cheynæ exsequatur, post mirum suæ veluti voluntariæ resurrectionis specimen.

12. *Melancholia lycantropia*. *Lycan* Aetii. *Galenotropia*, *lycanthropia* Auditorum. L.

Domus cuiusdam religiosæ omnes puellæ singulari laborabant melancholia, quæ peritæ quavis die determinata hora, se seles esse reputabant, & felium vocem imitando concentum efformabant: refert D. Raulin, *des maladies vaporeuses*. Vide *Singulum epileptico-maniacum* huic morbo affinem.

Lycantropum se vidisse testatur *Forestus*; plurium historiam refert *Schœnkius*. *Galeantropum* ipse vidi, qui canis aspectum horrebat.

Verum notari meretur artificium quo quidam sanati sunt melancholici, qui scilicet se raras in ventriculo gestare putabant; assumpto ex jussu Medici emetico sanati sunt, clam inmissis ranis in craterem in quem vomitu rejectæ colligebantur materiam; alii qui in capite cuniculos se habere existimabant, facta incisione cruciali, & exhibitis cuniculis cruentatis quasi ex vulnere extractis, ab errore suo liberati sunt.

Qui lupo vel cane rabido demorsus sunt, ab hoc delirio non sunt immunes, quo lupum aut canem ululatibus suis imitantur, teste *Calo Aureliano*, & aliis; verum est illud hydrophobia symptomata.

Artificio quodam *Zacharius Lusitanus* sanavit olim melancholicum, qui se perpetuo frigere arbitrabatur, & vidimus hic Gratianopolitanum simili delirio per annos etiam calidissimos detentum; ipsum spiritum vini madida pelle lanigera cooperuit, & accenso spiritu per semi-horam ea lescecit ad combustionem usque *Philotimus*, unde lætus & tripudians se jam nimis calere exclamavit æger, atque brevi convalescit melancholicus.

Quidam ne omnino caput se habere putaret; ad quem sanandum *Philotimus* excogitavit pileum plumbeum, a quo gravatus caput se habere intelligeret: *Aërius*.

Duos lycantropos se vidisse testatur *Donatus ab Altomari*, qui per avia vagabantur, cadavera humana, aut partes eorum secum gestantes; de cætero luridos, siccos, adustus siccantes eos depingit, ut lucomorbum omnino referant.

14. *Melancholia enthusiastica* Pauli Æginetæ. *Enthusiasmus*. *Ægri*, numine affliti. C.

Quidam vero etiam putant se ab aliquibus poetaribus majoribus impeti, & futura prædicare velut numine afflari, quos etiam privatim numine afflatos nominat *Paulus Ægineta*. *Paracelsus* existimabat se in acinapis capulo suum æozoth, seu genium suum genere. Mulieres fatidicæ, quibus itipati errabant Gebennenses fanatici, se cœlius afflatas putabant, futura prædicare, abscondita cognoscere se fassitabant; has vero prophetias non prius edebant quam epilepsie paroxysmum simulatum passæ forent; itaque humi prostratæ, mirum in modum se exagitabant, & ad se reversæ futura prædicabant. Mirabilia similiter prædicant de enthusiastis, qui *convulsionarii* hodie dicuntur. Vide *Hecquetum*, *Naturalisme des convulsions*.

Forolivii D. *Cavalier M. D.* vidit quatuor hydrophobos, qui mortis suæ diem, imo horam, prædicta ferme hora animam essillant; Vidi ipse Tarascone sexagenarium qui ante mensum mortis suæ determinatum diem prædixit, & epiala dein correptus die prædicta occubuit.

14. *Melancholia phrenitis* Hippocratis; *nousos chalepe* Libr. II. de Morbis. Cura gravis morbus. Foeli pag. 486. *Maladie fœu*. Le Clerc Hist. de la Med.

Viscera veluti spinarum aculeis pungi videntur, anxietudo ipsum invadit, lucem & homines refugit, tene-

tenebras amas, metus corripit; septum transversum exteriore parte intromittit, ab contactu dolet, expavescit, in somnis terribilissima & formidanda cernit, quandoque & mortuus: a morbus hic interdum plurimos vereprehendit. Veratrum huic propinato & caput purgato: post capitis purificationem catharticum exhibito, postea lac asinum: cibis quam paucissimis, nisi infirmis fuerit viribus, utatur, iisque frigidis & alvum laxantibus, non acribus, non salis, non pinguibus, neque dulcibus: calida non lavet, neque vinum bibat nisi multa aqua dilutum, neque se exerceat, neque deambulet; quæ cum fecerit, temporis successu morbo liberabitur, at nisi diligentem curam adhibueris, ad mortem usque comitatur. Hactenus Hippocrates.

Hic morbus recte intellectus est melancholizæ species non rara, in hoc diversa a cæteris quod æger minime deliret, nisi summus profundusque mœror sine causa evidenti accedens delirium dicatur; mœror ille sponte accedens est spina viscerum metaphorica, æger quotannis hoc prehenditur & per mensem unum alterumve insomnis, inappetens, solitudinis amans, debilis, omnem cœtum refugit, atque huius morbi causam se ignorare fatetur, apyretus stans, continuo cogitans, timet ne aliis fastidium moveat, domi se continet. Cura Hippocratica minime mihi ardeat quoad helleborisum & abstinentiam ab ambulatione, a balneo; de cætero feliciter adhibetur.

XIX. DÆMONOMANIA. *Dæmonomania, rage.*

Est delirium vel sincerum vel simulatum, quo magi, sagæ, maleficiarii, sæpius præstigiatores se tanquam a dæmone obsessos aut possessos ostendunt.

1. *Dæmonomania sagarum.* Desirio. Disquisit. magicæ. L.

Est delirium eorum qui se arte diabolica & pacto cum dæmone convento, quid miri præstare posse existimant, indeque auctoritatem apud idiotas sibi conciliant.

Tales sunt illæ vetulæ, quæ fascino recens nuptos ligare, morbo infantulorum tum afficere, tum liberare se posse imaginantur. Pastores qui se, suosve, arietes cum ridiculis cæremoniis dæmoni devovet, ut gregem residuum a lupis eripiant, ut montem volantem seu inamissibilem obtineant, quæ omnia in fascinatibus & fascinantibus sunt vera deliramenta, quibus puerorum & credulorum animos deludunt aniles fabulæ, maxime si philtre & venena dæmantia concurrant. Certum est enim quod oleum ex seminibus daturæ elicitum temporibus illis, vel pessarium podici notu inditum, hæc somnia prædispositis excitent. Simili pessario ex seminibus stramonii & sebo pastor Gallo-Provincialis, referente *Gafendo*, se muniabat cubitum iturus qualibet die Sabbati, unde somniabat se ad impurum dæmonum cœtum via camini devenisse, & ibi hircio præsidii litaf-

se: vide quæ de *paraphrosyne magica* diximus. Hunc morbum in Pomerania familiarem dicit *Hoffmannus*. *Rufus*, Auctor sæculi secundi, primus huius morbi meminit.

Fuere qui se diabolum in visceribus gerere, qui cum eo decumbere, conventicula celebrare ideo sibi persuaserunt, ut in suppliciis contra ipsos olim decerni solitis, id ad ultimum vitæ spiritum affirmaverint. Vide *Aët.* *Med. Brodin. Decad.* 1. volum. 4. & *Natur. Carol.* passim.

2. *Dæmonomania*. *Vampirisimus* *Tournefort* iter in Indias Orientales.

Vampiri activi sunt vel passivi. Activi sunt quidam præstigiatores, qui ob fines sibi cognitos cadavera recens sepulchrorum exhumant, & vulnerant; atque eorum cruorem tertia die ut plurimum putrefactum, adeoque fluidissimum effluere sinunt, & vulgo fuxisse dicuntur: passivi sunt illi, vel vivi vel mortui, in quibus talis scena luditur; horum præstigiatorum rumore commoventur ita populi, ut urbem desertant inde factam videri *Tournefortius*. Plura videlicet in Vampiriorum historia non dudum evulgata.

3. *Dæmonomania simulata*. *Cerybantasmus*, *Encyclopædix*, T. 3. *Histoire des Diabes de Loudun*, 1636. Bayle, *Diction.* ad *Brostier*.

Constat ex Evangelio olim plures homines summi Numinis permisso, a diabolo obsessos fuisse, unde Sancta Ecclesia Catholica ad eos liberandos exorcismis uti consuevit; verum non minus certum est plures malitia surmorositate singulari, ad similem obsessionem simulandam frequenter induci, quod apud adolescentulas & vitæ religiosa addictas sæpius observatur: illæ ut quædam turpitudinem vitæ occultent, illæ ut sanctimoniz famam sibi concilient, quædam ut aliis impone noceant, imo ut de se magnum rumorem spargendo credulos ludibrio habeant.

Præstigia quibus utuntur sunt diversissima; æst sæpius futura prædicere, absentia prospicere, linguas ignotas intelligere, morbos anomalos potissimum convulsivos experiri, vires portentosas exere; ad aquæ lustralis asperisionem, rerum sacrorum aspectum cruciari, ulnare. Eo autem affligit plurimorum vafrities & malitia, ut non solum plebi, sed etiam & Sacerdotibus & Medicis imponant illæ præstigiatriæ, ut ferro & igne probatæ suas fraudes confiteri vix cogantur, adeoque ad eas confundendas necessum est ut a viris acuti ingenii diversis modis summa cum astutia examinentur, circa quæ vide quæ de epilepsia simulata diximus.

Celebris est historia Ursularum Laudun apud Pictones. Monachæ huius urbis oderant parochum Urbanum Grandier, virum paulo elatioris animi, & doctus. tum animi, tum corporis superbientem; illi hæc religiofas induxerunt, ut afferrent se a Grandiero fascinatias, & ejus afflatu diabolum suscepisse: quid non religio potuit suadere, maxime si cum amore repulso ad hunc perdendum parochum & Magnatum & Monachorum invidia conspiraverint; eo demum de-

venia

venit furor, ut igne damnatus sit parochus, utque cum Sacerdos impius, qui cum ad supplicium deducebat, crucifixum ferreum candentem osculandum huic misero præberet, is renuens parochi metus pro signis diabolicæ possessioni plebi venditabat.

Interdum pro dæmonomania vera sumitur delirium febrile, cuius erroris exemplum præbuit monialis Pafina candore & pietate insignis mihi cognita; hæc Theologicis Doctrinis imbuita, Latinam Linguam elam addidicerat, & nuper a fratre suo eruditissimo elemento Græcæ Lingue secrete pariter hauriebat; hanc invasit synochus, caputque tentavit, unde delirans hæc virgo sermones græcos & latinos miscuit, quos prius ipsi ignotos existimabant ceteræ moniales; hinc fascinatam & obsecram iudicavit, usque quo frater ejus rure reversus delirii Græci & Latini rationem reddidit.

Dæmonomania simulata deegitit dolis pro re nata diversis. Sic Ill. de Haen sanctæ Cruets imaginem involutam dæmonomaniaque simulanti applicans ad contactum, vel aquam communem, quam lustralem esse fingebat, aspergens, vidit eam decipi & suam fraudem prodere: tunc autem eam nefariam toties aquæ amorphos injectis irrigari iussit, quoties sua præstigia iteraret. Alter vero Medicus in simili casu phlebotomias simul ex pede & brachio ad syncope usque præsterebat, ut nefariam præstigiaticam plecteret; alii verberibus dæmonem abigere tentantur.

Minime assentimur *Fridrico Hoffmanno*, aliique Medicis Germanis, qui uno ore cum plebe Gallica contendunt magos & sanas hodie dari, qui vere diabolo obfessi & possessi & ab illo instigati patrant mirabilia. Dæmonomania sinceræ signa plura ab *Hoffmanno* tradita sunt: 1. non solum horrendæ vociferationes, gestuum deformationes, admirandæ & insolite corporis motiones; sed 2. mirificæ convulsionibus subito sine prævio morbo accedentes: 3. Blasphemias, verbi divini abusus, obscenitas verborum: 4. Rerum secretarum & præteritum futurarum noticia & revelatio: 5. Peregrinarum linguarum scientia: 6. Robur insolitum: 7. Singularium rerum ut crinium, silicon, &c. vomitio, ex oculis, aure rejectio cum benevolæ ventris torminibus &c. Dudum Senatus Gallici, qui magos & sagas igne damnabant, hodie inquam miseros insanos dimittunt, nisi eorum molestia, blasphemationes, aliaque malitiæ specimina plectant. Non dubitamus tamen quin olim Deo permittente a Dæmonibus plures obfessi fuerint, verum cum *Sancto Athanasio* putamus, ex quo tempore verbum *Del* apparuit, *spētra hujusmodi & ludibria recessisse*. Et omnes pythionifas, magos, sagas, fascinatos, vel morbo a causis physicis ergo laborare, vel esse deceptos aut impostores qui parum cautos suis præstigiis deludunt. Ridemus itaque credulitatem *Bodini* & dolemus forem tot millium vesanorum quos sæculi elapsis, referente *Nicolaso Remigio*, Senatus *Burdigalensis*, *Rothomagensis*, *Tolosanus* clammis

addixit, qui in morotrophio tantum erant custodiendi.

Præstigia mira videbis *Journ. de Med. Avril 1757. p. 244.* de muliere ventrilloqua sonum tympani flatus abdominis imitante, & *Mars p. 165.* de puella ex cuius corpore pallium acus innumere extrahabantur.

4. *Dæmonomania a verbis Cardani. L.*

Plura sunt exempla ægrotorum qui pro dæmoniacis habiti lumbicis & tenuis tantum exagitabantur, & trismo, tetano, delirio, aliisque miris symptomatibus vexabantur; plebs autem dæmoni, sagarumque fascino tribuit illa symptomata dira; quorum nexum & causam non intelligit, ut convulsionibus, elamores, distorcionibus, deliria quibus obnoxii sunt verminosi; ea vero omnia cathartici, emetici & antihelmintici scilicet auferrunt.

5. *Dæmonomania fanaticæ*, vide Dissertationem sub præsidio D. R. deaux Profess. Monspel. ventilatam: An fanaticismo verbera?

Quot furores, incendia, bella, cædes excitaverit ultoties falsus erga Religionem tum veram, tum falsam velus, plures testantur historici. Primi fanatici Helveticæ solo suo aslatu catapulæ idus, quibus crudeliter tumatim trucidabantur, eludere se posse putabant; miserabile delirium genus.

Fanaticismus ad incredibilia fascinora nullenos nostra ætate compulit, & ad patibulum, ignemve deduxit; ita ut pestis nulla majores strages ediderit: lege historiam Fanaticismi D. Bruys Monspel. Ideo hæc refero ut omnes persuasum habeant fanaticismum inter vesanias & deliramenta esse numerandum.

6. *Dæmonomania hysterica*. Observatio D. Descottet D. M. Argenton in Berry 1760. ad me scribentis.

Dux famulæ viginti annos natæ, amicissimæ, vere hysterice, antihysterice, ut castoreo, ruta, nec non terebinthina sumptis, ab hysteria melius habere. Verum singularia phænomena per sex menses exhibuerunt, quæ vulgo obfessionis tribuuntur. 1. Scilicet diversis dominibus sejunctæ altera alterius nec non sua accidentia suisque paroxysmis præstigiabatur ante quadratum triduumve: 2. Diversorum animalium vocem, ut canis, felis, gallinæ facis apte imitabantur: 3. Portentosam exhibebant memoriam & ingenium solito vividius, quo nominibus scitis singulos adstantes designabant & ludibrio habebant: 4. In profundum soporem delabatur, e quo nec vellitate, punctæ, ultæ excitari poterant: 5. Verum sponte excitabantur clamantes se in quadam parte, ut femore, tibia vehementer lædi, perstringi, & pars assignata livida, læsa unguitur videbatur; quam tamen tetigerat nemo ex adstantibus. 6. Tripliei stadio peragebat paroxysmus, in primo mentis compotes peracta in mentem revocantur rubescabant & dolebant; in altero delirabant, convellebantur & quatuor robustis viris vix coeci-

eeri poterant, atque ventura quoad paroxysmi futuri tempus, durationem, aliaque præfigebant; denique in soporem lapsæ sensuum omnium abolitionem experiebatur, e quo tamen somno hora & minuto quod prædixerant, excitabantur, sæpe e lecto procul exsultantes & clamantes: *Bone Deus! quis mihi semper vel tibiam crudeliter perfrinxit, &c.*

Per sex menses quotidie hæc ludebatur scena, nec quidquam inde roboris, habitusve detrimenti passæ sunt, hodie vero adhuc dum languent, & lipothymias, catameniorumque suppressionem patiuntur, meumque de illis consilium expetunt Medici.

Multa sunt in hac historia, quæ nimis adstantium credulitati, & haram fycophantarum præstigiis tribuenda videntur. Interea non minus est mirum quod sine ullo motivo cognito rursus talem egerint Comœdiam, si Comœdia snerit: mirum etiam quod similis imaginationis vis similes effectus in aliis subjectis ediderit, quos vix relatos in catalepsis hysterice & catalepsis somnambule historia. Quod imitationem vocis animalium, hanc olim juxta Aleham observavit D. Gilbert D. M. in Melancholico qui hora prima pomeridiana singulis diebus simili paroxysmo tentabatur, nec ab hac hora declinabat vel minimum paroxysmus, licet horologia de indoluit retardarent, aut accelerarent observatores.

Suavi balnea, serum lactis, & in paroxysmo syrupum de karabe, sal sedativum, &c. Anno 1765, quo hæc scribo eas sanatas & nuptas esse accipio.

7. *Dæmonomania Indica*, Kempfer. amœnit. fasc. 3. pag. 750. *Rage de l'Hannuk*.

Viget apud Indos Nigritas abusus opii execrabilis ad effundendum animos ad homicidiorum patrandum audaciam, dum vel vitæ suæ, vel injuriarum petraei se devovent morti per ultionem & mortes aliorum oppetendæ; eo sine opii bolum deglutiant, ex quo intentionis idea exasperatur, turbatur ratio, & effrenus redditur animus, adeo, ut stricto pugione, instar tigridum rabidarum excurrant in publicam, obvios quosvis sive amicos, sive inimicos trucidatû, donec ipsi ab alio perforati prosternerent. Actus hic vocatur *Hannuk*, apud incolas Javæ & ulterioris Orientis crebro spectabilis. Vocabuli sonum ibi horret quicumque audit; nam qui vident homicidam, illi vocem *Hannuk* summo opere exclamant, monituri inermes ut fugiant, & vitæ suæ proficiant, dum ad extinguendam bellum accurrere debet quisquis armatus, & cordatus est.

8. *Dæmonomania Polonica*. Stæbel. Hist. 4. de plica Polonica.

Ea est quæ a viru trichomatis repulso ortum ducit, seu a plica resecta, vel ab illa non evoluta; Formina quinquagenaria plethorica fortissimo corripiebatur furore maniaco, cum summa arypnia, convulsionibus, inconfusis borborygmis; jungebatur blasphemationes, robur insolitum,

aliaque stupeuda symptomata per annum sine intermissione eam discruciantia & diabolicæ obfessionis adscribi solita.

Remedia antimanica frustra sunt, nec eedit morbus nisi evolutioni plicæ, quam, post annum in casu citato applicatum capiti lycopodii decoctum, intra aliquot dies excieavit; alia vice cum hæc mulier iterum plicam imprudenter abscedisset, exorta est cephalæa cum doloribus rachialgicis & phantasiæ depravatione, rursusque eum plicæ capitis sese explicuisset, ea symptomata desierunt.

9. *Dæmonomania a Cardiogmo*, Morgagni, Epist. XVIII. 19.

Talis censetur esse morbus ab *Harveio* & a *Morgagni* observatus, qui tamen pendebat ab aneurysmate aortæ ascendentis; alii cum hysterica, alii etiam venenico adscribendum putabant; ægi capite antorsum inclinato respirabant facilius: vide *Harveium de circul. exercit.* 3.

XX. MANIA. A Græco *Mainma* infansio, furo. *Furor* & *insania* Latinis, Gallice *folle* & *manie*, licet ultimo nomine (a *majoralis cupio*) intellegamus etiam vehementem quandam cupiditatem, ut musomaniam, argyromaniam &c. *Ægi maniaci, insani*, Gallice *fous*, *maniques*.

Genus est morbi chronici, apyreti, quo non solum ægi circa quævis objecta indiscriminatum delirant ob imaginationis vitium, sed etiam ob ratiocinationis depravationem cum audacia & robore, brutorum more se gerant.

Differt ab amentia per audaciam, robur & furorē a levi oblata causa redeuntē; amentes vero sunt mites, pacati, nemini nocent, nisi vehementer incitentur. Differt a melancholia per delirii universalitatem; non enim uni objecto constanter infixi delirant, sed successively nunc de uno, nunc de alio objecto sunt solliciti; præterea melancholici recte & acute ratiocinantur ex præconcepia opinione, consequentias rationales educunt, ast maniaci perverse etiam judicant. Differunt a dæmonomaniis ut a melancholicis. Hydrophobi fere omnes judicant, adstantesque monent, ut sibi caveant, dicentes non penes se esse ut abintineant a mortu, conspuatione, e contra maniaci pravum nocendi, evadendi desiderium caute dissimulant; paraphrosyne, hydrophobia, phrenitis intra paucos dies terminantur, ast mania menses, annosque perdurat.

Maniaci sæpius omnem cibum obinate recusant, & tamen robur insolitum conservant, vix dormiunt, continuo mente plures ideas revolvunt, nullitant, clamant, insidias adstantibus struunt, obvios quosque, etiam parentes, natos, quandoque sine ullo cognito motivo percutiunt, trucidant, vinciri eos necessum est ne sibi vel aliis manus violentas inferant, frigoris & caloris patientissimi sunt, vestes suas dilacerant, media hieme nudi humi jacent, nec multum refrigerantur, balnea frigida sustinent, inviolati tamen;

men; quidam ingenio acutissimo præditi mire delirant; sæpius delirant; plurimi quidem quoddam objectum sui odii aut amoris sæpius in animo variant, verum non illi ea affixi sunt quin ad alia divagentur; atque milleis vividissimis, præcipitibus, confusis ideis noctu diuque agitantur; mores a mania mire mutantur; mulier antea pia & modestissima accedente mania verba scortis & bajulis familiaria impudenter effudit; qui prius erat mitis & amicus jam torvis oculis, voce feta loquitur, & ex horum symptomatum syndrome, licet a plebe confundi & iisdem morotrophis incarcerari soleant, distinguuntur maniaci & melancholici.

Mania continua est periodica; continua ea est quæ nunquam intermittere, licet remittat quandoque, verum illud discrimen non in curandi modum, sed in prognosim influat; quippe continuæ sanandæ multo minor spes est quam periodicæ mania.

Mania periodica est, quæ per intervalla revertitur, illa vel sæviente hieme quod frequentius accidit, vel æstate recurrit; tum continua tum periodica sunt sæpius hæreditariæ; dantur etiam regiones in quibus multo frequentiores sunt: Junio & Decembri mania frequentior: *Huxham*.

Mania ex quartana *Sydenhami* ad dementia potius atinet quam ad hoc genus, ni fallor.

1. Mania a pathemate; Locheri de mania; a melancholia, *Preyingeri* spec. I. a terrore *Locheri*; ab amore, *Ephem.* N. E. Dec. II. sine materia, *Locheri* cap. 2. p. 73. L.

Maniaci ut plurimum a magno quodam animi pathemate, ut amore, metu, spe laborare incipiunt. *Mead* refert quod in Nosocomio mente captorum Londinensi multo plures inventi sint quos dira auri cupidio huc deduxerat, licet jam divites, quam quos paupertas divexerat.

Metus tartari & iudiciorum Dei plures ad insaniam ducit, maxime cum a concionibus vehementibus eorum quos *hissimarios* vocant per otiduum, ut fieri solet, mentes commotæ fuerunt. Vidi Religiosam quæ insanivit & demum se trucidavit, cuius menti infixa erat opinio se a suis sociis propter peccata, quæ admisisset aut admitti putabat, laqueo suspendendum fore; & mulierem honestam quæ simili metu percussa fuisset, exanimavit; puellam quæ amasi sui periculum non sustinens eodem modo vitam terminavit; virum qui zelotypia furens conjugem & se ipsum jugulavit; mulierem præclaram, quæ recens poëta circa religionis sue veritatem dubia movens in maniam incidit & per decennium nuda quadrupediæ more in suo cubiculo gradientis *Nabuchodonozoris* speciem apprimè referebat; verum licet a melancholico delirio ortum habuerit hic morbus, non minus successu temporis videtur mania alterius generis quam melancholia, ob rubeam, andaciam & idearum vividarum varietatem.

Maniaci utcumque audaces sint, reapse metu maximo quodam ad insaniam fere omnes ducuntur, & licet a pluribus adstantibus se regi mini-

me patiantur, attamen a quodam minaci bajulo, vel milite fustem & vincula gerente, ita dominantur, ut supplex & meticulosi statim obsecunder, quod necessarium est in cura. Caveant autem sibi custodes, nam maniacus nunquam dormit & custodem, si potest, male habet atque infidiose impetit, ita ut per longum tempus sapientis personam agat, ut suum finem assequatur. Qui cibos tenuit & continuo vigilat sibi animo, metum inancem inhxerunt, ne scilicet ab amicis toxico mixto cum cibis, aut alio modo inter dormiendum tuocidentur, sed de sui metus objecto, de spectro quo terrentur, ne verbum proferunt.

Sanguis maniacorum viscidus seroque exutus, fibræ vero musculares firmæ, rigidæ censentur.

Mania statim atque ægrum alio modo ut phthisi, ascite laborantem afficit, ab aliis morbis, quod mirum dictu, liberat, ut observavit *Mead*; nec pestem ipsam patiuntur maniaci.

Cura. Nihil magis prodest maniacis sanandis quam victus mollis, refrigerans, humectans; phlebotomiæ largæ & repetitæ ex brachio, pede, jugulo; potus laxans, diluens, frigidus, copiosus; balnea per mensem bis in die repetita in aqua frigida, caput ipsa irrigando. *Valsalva* plures maniacos sanavit emulsionibus & syrupo de papavere, abstinendo a gravioribus narcoticis. Furorē mire compescit camphora ad scrupulum data in cochleari aceti, observante *Tralles* & *Ill. Lientau*, quod bis in die iteratur, inde sudor & somnus, pluresque sanati maniaci.

Narcotica vero sæpe delirium intendunt. In tenebris detinendus maniacus, atque sufficienter cibandus, vinculis coercendus; cum vero omnis cura tanquam frustranea omittat est quandoque data tempestate ratio revertitur superstitie memoria factorum, & ad recidivam dispositione, si catamenia vel hæmorrhoides fluere desierint, illi efficacius revocandi; cathartica fortia præmissis diluentibus non sunt omittenda; acida, nitrosa, serum lactis, emulsiones, fructus refrigerantes, clysmata enollentia & similia profunt.

2. *Mama lactea. Dépôt lacteux sur le cerveau.* Puzos, 3. *Mémoire*. Hippocrat. de mulier. morbis L. I. c. p. 45. L.

Est species mania quæ circa decimum a partu diem cum delirio febrili mulierem aggreditur, dein sensim evanescente febre, perseverat, atque jure tribuenda venit lactis retentioni, ejusque stasi in cerebro. Vide *Ill. van Swieten Comm.* 1127.

Rarus est hic morbus, & ut plurimum insanabilis, ipsumque initio ab hysteria distinguere difficile est, quippe omnes morositates, avertationes absurde, a quibus incipit, facile tribuuntur hysteria, quam puerperæ plures incurrunt; inerea successu temporis delirio appyreto constanti, & initio a parcioti lactis & lochiorum luxu, cognoscitur.

3. Mania ab hemierania.

Ea est quam dolor constans sinuum frontali-um ab insecto in ipsis latente infert; sic *Comrad. Schneiderus, de esse cribiformi.*, pag. 440. recent.

recenset rusticam quae mente abalienata & maniaci evaserat, quae rejecta ex naribus eruca. hi-
spida ab hoc morbo convuluit.

Ananias de Potxis, in Ephemer. Nat. Cur. Decad. 1. anno 4. observ. 37. refert rusticum qui cum sub ardore dormisset, per sex menses maniacus fuit, & erucam nigram, longam, pilosam, a tabaco assumpto per nates excrevit, sicque convuluit.

Cum aëstrum subivit nares bonum, aliorumque pecorum, ut in eorum sinubus frontalibus ova sua deponat, non raro illi in maniam aguntur, imo cervi rangiferini a solo metu circumvolitantis & avidae insequentis aëstri furunt, & triginta leucas intra paucas horas excurrunt, observante *Illustre. Linne* in Lapponia.

In oppidulo Gange dicto, homo quidam dolore capitis dudum divitiatus eo insanire devenit, ut sibi caput effringi vellet, atque cum in finem ex aliorum fenestra & precipitem dederit, sed frustra, cum forte in praetercuntis asini corpus incidisset: quapropter ad aliud tempus. ob proximorum jurgia rem disulit, atque altera vice reapse sibi caput effregit, unde, forte et sinibus copioso pure dimanante, convuluit, ut a fide dignis viris audivi.

4. *Mania metastica*, *Locheri de Mania. I. ab ulcere fuscato*, *Amati Lulsi. Centur. 2. cur. 67. a rejecta plica*, *Frider. Hoffmanni de delirio p. 263. Ephem. Nat. Cur. a represso herpes*, *Locheri ibid. a mensuris retentis, a semine retento*, *Schenckii fol. 157. a repressa scabie, a graviditate*, *Ill. Lortz Part. I. cap. 7.*

5. *Mania a venenis*, *Ephemer. Nat. Cur. a billadonna bacca Decif. II. ann. to. Observ. 118. a datura semine*, *Decif. III. anno 3. Observ. 170.*

Vidi inde ortas paraphrosynes fugaces, non maniam.

6. *Mania periodica*: *Ephem. Nat. Cur. Decif. III. an. 3. Obser. 31. L.*

Est species per totum diem tantum durans, sole recedente intermittens; quae solaris dicitur; datur lunaris quae quovis plenilunio revertitur *Ephem. Nat. Cur. Centur. IX. Observ. 12.*

7. *Mania vulgaris*; *Locher de Mania, cap. 3. pag. 61. L.*

Est mania cum materie. *Vide Auctores.*

8. *Mania hystericalia*, testante *D. C. D. M. M. anno 1766.*

Virgo quadragenaria, quae olim sanguinem vomuerat, deinde vero pus cum cythidum fragmentis ano eiecerat, ab octodecim mensibus obnoxia est, per paroxysmos nocte redeuntes, doloribus uteri & vicinarum partium, ita atrocibus, ut ea, licet bene morata & pudicissima, juret, blasphemiam fundat, deliret, genitalia manibus aut quolibet obvio instrumento vel comestare, vel dilaniare conetur; nedum sit, ullus veneris appetitus, quod quis facile crederet; huius est summa aversio, tantus horror ut viros maxime odiret; voluptas nulla, pollutio nulla: ea obvia quaque morfu impetit; transa-

cto paroxysmo scrupulis agitur, dolet animo metuens ne peccaverit.

Adhibita sunt remedia omni genera, edulcorantia, diluentia, detergiva, sedantia, nitrota, balnea innuenerunt subfrigida per horas octo, serum lactis, aqua pulli, lac asinum, laudanum, sal sedativum; petisana demum camphorata aliquandiu sublevavit; suspicio est alicuius suppurationis internae, unde paroxysmus.

ORDO QUARTUS.

VESANIAE ANOMALAE.

Seu.

Morbi prioribus affines.

Phantasia est facultas objecta absentia sibi representandi; ejus actio vocatur *imaginatio*, ea in somnando ideas claras & vividas excitat, unde aequae percellimur a phantasmatis seu ideis imaginariis, dum somniamus, ac ab ideis sensationum, verum id non accidit ex claritate & vi absoluta phantasmatis, quippe quae multo minor est quam vis sensationum; sed ex eo quod anima ab objectis externis non distracta, fortius ad ea phantasmata attendat, unde qui imaginari profunde vel attendere volunt interdum, illi ab aliorum consortio remoti longe ab strepitu in loco obscuro meditantur: anima eo fortius percelsit ab idea quae paucioribus ideis simul distractitur, seu quae majorem suae attentionis partem illi tribuit, & quo fortius est impressio eam excitans.

Docet experientia ideam longa attentione, fortique meditatione elatiorem fieri, quae neglecta obscura foret: sic memoria studio, & repetitione ejusdem ideae roboratur, maxime si conjungantur ideae cum loco, litteris, aliisque signis ad memoriam acquirendam facientibus.

Lex est imaginationis, si qua simul percipimus, & unus perceptio deus producat, imaginatio producit etiam perceptionem alterius. *VVolf. Psychol. Ephem. 116.*

Memoria est facultas ideas reproduciendi, & reproduci recognoscendi. *VVolf.* Ea vero tribuitur flexilitati fibrarum medullarum cerebri, quae insuper chartae pergamentae plicatas & impressiones retinet; verum ea theoria est mere fictitia; & fatius est in his tenebris nullam theoriam, quam falsam amplexari.

Ad ratiocinandum proindeque ad judicandum necessaria est imaginatio & memoria. Si quis albedinis ideam abstractam, adeoque imaginariam non retineat, is utrum haec charta quam cernit alba sit, vel alterius coloris judicare non valet: unde sit ut qui imaginatione caret, ut stupidi, somnolenti, illi nec discurrere valeant, nec qui memoria deserviuntur, valent ratiocinari, saltem circa objecta quorum ideas non possunt in mentem revocare; his de causis evidens est cur inter morbos hujusce classis obli-

vio &

vio & amentia referantur; cum hæc vitia secum inferant iudicii depravationem, aut speciem erroris quæ lethargicis valde familiaris est; quod scilicet nesciant quid dicant, quid appetant, quia eorum oblii sunt quæ petiere, antequam responsum accipere possint: live sensationes a fibrarum nervearum vibrationibus repetas, quod falsum videtur, live a fluidi nervi electrici refluxu, requiritur ex parte machine fibrarum cerebri libertas, flexilitas, cui collapsus, laxitas, obstructioque opponuntur, & ex parte fluidorum mobilitas, fluxilitas, tenuitas, puritas, unde videre est cur a venenis, vaporibus narcoticis, cerebri vulneribus, obstructionibus, aliisque vitiis, imaginatio, memoria, acumen, ingenium, libertas aliæque animæ facultates laedantur.

XXI. AMNESIA; *Lazophrosyne* Græcis; *Obli-vio morboſa* Auctorum. L'oubli.

Est morbus qui tollit facultates ideas in mente reproductas recognoscendi, seu memoriæ est abolitio aut imminutio. Ideo recognoscimus ideas quæ in anima reproductuntur, quæque ideo illam olim vel antea affecerunt, quia satis vividæ sunt & sociis clavis stipatæ; si vero obscuræ sint, tum idem principes, tum earum sociæ, aut solum alterutræ, tunc illas recognoscere non possumus: ideam autem quam antea habuimus iterum habere, hoc ad memoriam non sufficit, necessum est ut cognoscamus nos eam antea habuisse; sic si quis dum legit Ciceronis librum non recognoscit se eum olim legisse, ille huius antiquæ lectionis recordari non dicitur. Quoniam omnis idea imaginaria supponit prægressam ideam sensitivam seu sensu acceptam, & non sentimus nisi individua, seu concreta pluribus simul ideis sociis stipata; idea imaginaria socias secum olim perceptas in mentem revocat, nisi obscuriores evaserint, ergo obscurio idearum est quod oblivionem producit; obscurantur idem a gravibus animi pathematibus totam animi attentionem alio divertentibus, a somno & sopore morboſo, a paralyſi organorum ex quibus idem illæ natae sunt, a morbo quovis soporoso, ut caro, apoplexia, epilepsia, nec non a syncope; qui enim ex his morbis resurgunt, ignorant omnino quid paroxyſmi tempore peractum fuerit, & se ne quidem cogitaſſe, aut quasi non extitisse afferant.

Cognoscitur initio amnesia ex eo quod oblivioſis non sibi coherenter loquantur, nisi monosyllabis utantur: *Vide hystoriam amnesiae in Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Observ. 198.*

In curanda amnesia attendendum an juvenis, an senex sit homo; in senibus medicamenta spirituosa, cephalica, calidiora conveniunt: In juvenibus, diluentia, analeptica magis profunt, & memoria læſio a venenis abusu sæpe dependet.

1. *Amnesia a Venere*, Salmut. Centur. I. Obs. 6. Etzmüller de memoria læsa. L.

Res est consideratione digna quod usus veneris nimis memoriam maxime debilitet, & quod

aphrodisiaca, aromatica, spirituosa, satyræa ad memoriam roborandam conducant, si tamen cum horum usu veneris itemus, memoria in totum abit, si vero veneri pareamus, inde confirmatur.

Usus ambra, adeoque coeholatz, optime prodest ad amnesiam curandam, ut & aqua magnanimitatis, quam ingrediuntur somnice, item confectio alkermes & anacardina, licet hæc ultima suspensa sit. Apud senes usus theæ in hoc morbo valide laudatur; hæc autem omnia medicamina vi quadam inebriante pollent, ambra scilicet, anacardina & thea Sinenſis recens.

2. *Amnesia senilis*. Etzmüller. ibid. Collect. Acad. Tom. III. p. 165. L.

Non omnes senes obliſioſi evadunt, sed maxime illi quorum vita antea multis curls aut studiis subtilioribus non fuit defatigata; qui scilicet laute & ignaviter vixerunt in deliciis & voluptatibus; Docti vero & negotioſi utplurimum iudicium & memoriam diutius servant.

Præter usum theæ commendantur in hoc morbo solia betonicæ, salviæ, lavendulæ, roſis marini, roſarum petalæ; nux moschata, piper, galanga, cyperus, caſſoreum, thus &c. infusa in spiritu vini quo humectantur nares, tempora, &c. ninsing & gensing specificia censentur intus ad scrupulum.

3. *Amnesia traumatica* Schenckii observat. Horſtii, lib. 2. obser. 7. Hildani centur. 3. observat. 1. L.

Ea est quæ a capitis percussione, vulnere aut ictu quovis ortum ducit; ea initio phlebotomias & auxilia alia contuſis convenientia exigit; Extas resolventia spirituosa, balsamum Commendatoris, aquam vulnerariam &c. hæc species sæpe sanabilis est.

4. *Amnesia plethorica*; a suppressis hamorroidibus Zacuti Lusitani lib. 1. observat. 47. prax. admirab. a lochis suppressis Salmuth. centur. 5. observat. 72. L.

Auxilia a principiis illis satis indicantur. Horſtius vidit hanc speciem cum stultitia successisse illis, qui post longam inedia comederet incepterunt.

5. *Amnesia a pathemate* Schenckii observat. & Ephem. Natur. Curios. L.

Ex metu & terrore subitis quandoque memoria abolita est, nec non vehementi tristitia.

6. *Amnesia cephalalgica* Aët. Acad. Par. 1711, L.

Ex diuturno capitis dolore, gravativo, memoria sæpe aboletur, nec non a cephalalgia scibrilli.

7. *Amnesia a temulentia* Villigii de moroſis. Est ea quæ ab ebrietate, ab opio, a phleris, seu venenis dementantibus ortum ducit.

8. *Amnesia febriſigna*, De Meyſerey Tom. 2. num. 243.

Est obliſio quæ post febres acutas accedit; ægri vires analepticis reficiantur, dein vesicatoria vel fontanella adhibeatur; cathartica etiam utilis.

utilia sunt, necnon exercitia fortiora, demum ad thermas confugiendum est.

XXII. AGRYPNIA; Latinis *pervigillum*, *vigilia immodica*, *vigilium morbosum*. Gallis *insomnie*.

Est pervigilium immodicum ex quo vires immineunt, anxietas, inquietudo, cephalalgia, aliaque molesta symptomata obsuntur.

Vulgo duastertias nycthemeri partes vigilamus, seu in ideis claris ex parte animæ, & in aptitudine ad motus liberos exercendos ex parte corporis, vivimus; altera pars tertia somno dicata est, seu quieti corpori, & animæ, in qua scilicet torpent omnes artus, & jacene minus apti ad motus musculares, sensatione orbat, dum tamen, si insomniæ adsint, idææ imaginationi oblatæ sunt clarissimæ, idææ vero præsentium objectorum obscurissimæ vel nullæ sunt, motusque vitalis pacati, regulares, exercentur.

Cum in vigilia vires ab actionibus animæ & corporis continuo absumuntur, eque somno & quiete debeant reparari, evidens est quod a longiori pervigilio robur debet sensim innuui, hinc lassitudo, anxietas, continua situs mutatio, perceptiones præsentium objectorum continuo nosaficiunt, attentionem deinceps: hinc capitis gravitas, molestia animæ, mæror, tædium, & quandoque typhomania.

1. *Agrypnia Arthritica* Boneti Sepulchret. observat. 1.

Somno carere qui doloribus vexantur, mirum non est, & ea non est species de qua agitur, sed est symptoma omnium dolorum comes; Ex arthritica arthritica oriundum pervigilium, atque ex siccatate sanguinis sero ad exteriora continuo fluente sustentatum exhibet observatio præsens. Post diutam colicam arthriticam homo usus vesicatorio, incidit in pervigilium nullis remediis domatum, quo occubuit, sero quidem continuo ex vesicatorio affatus effluente, & ætatem aperto cadavere ventriculi omnes cerebri aqua limpida repleti videbantur.

2. *Agrypnia a pathematis* VVillisi, de anima brutor. p. 2. Sennerti Species 55.

Montpellier mulier adolescens quæ a scariis maritum suum omnino cruciatum, & se ipsam pro mortuo derelictam viderat, exinde per tres plures menses somno indulgere non poterat; quoties enim oculos clauderat, dormiendi desiderio victa, toties cruenta illa scena oculis ejus se sistebat, stridos scariarum gladiis, conjugem morientem, ipsæque brachia tendentem, se ipsam gladiis confosam videre sibi videbatur, & perterrita, sudans, febriliens evigilabat, ita ut metus horumque phantasmatum somnum horreteret. Similia exempla refert VVillisi.

Ufus sum in hoc casu non narcoticis, sed emulsionibus, julepis refrigerantibus, &c.

3. *Agrypnia hysterica* VVillisi, de anima brutor. part. 2. Cap. 5. L.

Taliter affectis, ut hypochondriacis, hysteris, quoties clausi oculi somnos invicant, accidunt cordis tremores, subsultus & constrictiones, cum animi deliquis & respiratio impedita: aut viscerum intumescens, ardores, presocationis sensus, aliaque symptomata pro hysteris vulgo habita, succedunt; alii in cruribus & brachiis tendinum subsultus, spasmos, tantasque experiantur morborum inquietudines & jactationes, ut æri haud plus quam equuleo torti dormire possint.

In hoc casu VVillisi crasim fluidi nervi vitriolicum esse contendit, & vesicatoria laudat ad serum acre educendum, sed errat maxime, & tætius est sanguinis siccitatem & aerimoniam, præmissis phlebotomiis, sero lactis, emulsionibus, acidulis aquis, lacticinis, balneis temperate, & deia ad hypnotica confugere, interpositis lenibus cathartics ad viam his medicamentis parandum.

4. *Agrypnia cephalalgica* Boneti Sepulchret. To. I. de Vigil. Observ. 2. & 3.

Post contumaces capitis dolores cum febre & vigiliis, morte succedente, observarunt Auctores, vasa piz meningis sanguine atro referta, ipsas meningis tumore phlegmonode distensas, puniceas, nigras, gangrenosas; sanguinem fluxilem, nigrum & cerebro exstillantem; quandoque ulcus, seum copiosum in ventriculis, ut ex observatione 45. 50. 60. sequitur.

5. *Agrypnia ex pancreate* Bonet. Sepulchret. observat. 8.

Mercator, quoties dormire conabatur, inciderebat in leipothymiam cum sudore frigido faciei; de cætero bene valens. Incusatus est ventriculus, adhibita cathartica, cardiaca incassum.

Eo mortuo pancreas inventum est abscessu tentatum, quod etiam in observationibus Tulpii, Rivieri, Hyghmoni in hoc morbo incusandum venit.

6. *Agrypnia a dolore* Sennerti Spec. 3.

Omnis sensatio fortior & molesta, ut dolores omnes, omne desiderium vehemens, ut sitis, fames, pica, tabacomania, libido, amor, mingen-di, deiciendi necessitas, usquequo expletum sit desiderium, somnum tollant.

Difficultas respirandi, tussis in hydropicis, & asthmaticis, hydrothoracæ, ubi situm somno commodum æger servare non potest, ubi expectorandi necessitas urget, ea omnia somnum abrumpunt; idem producit omnis sensatio vivida, ut lux, strepitus, tactus corporis duri; verum tamen leve frigus ad auroræ exortum, sonus lenis, qualis susurrus rivi, pluvie & similia, somnum invitant.

7. *Agrypnia ab indigestione* Sennerti 2 a vomibus primarum viarum Horstii; rustici afflicti succedens VVillisi.

Qui se in cena ingurgitant ut plurimum post primas somni profundas horas evigilant cum calore, anxietate, sudore, febre, & vix somnum iterum capere possunt.

8. *Agrypnia febrilis* Sennerti. Spec. 14. *Pervigilium*

Hum febrile Boerhaave, Aphor. 708. Riverii, de Symptom. febr. putrid. cap. 2. A.

Non modo febris potest somnum turbare ratione moleste sensationis, ut sitis, calor, doloris; sed etiam a vehementi oscillatione arteriarum cerebri, ejusque phlogosi; hinc enim cephalalgia pulsantis, seu pulsatio importuna.

Curatur quiete musculari corporis, pace mentis, absentia lucis, strepitus, objectorum ideas vividas excitantium; frigore modico; aere humido; victu blando, molli, potu farinoso, leni, emolliente: susurro leni, assiduo, grato, blande tinnulo; medicamentis farinosis, suboleosis, humectantibus, demulcentibus; odore vegetabilium soporiferorum, usu anodynorum, paregoricorum, narcoticorum; præmissis quæ inflammationi curandæ valent, ut phlebotomia, potu nitroso, &c. Succus & aqua lactuæ hic præ cæteris laudantur.

9. *Agrypnia senilis* Henrici ab Heeres Dissert. Langii, lib. 1. epist. 26. de vigilis senum. L.

Quæ senibus familiaris est agrypnia vix narcoticis est impugnanda, quibus scilicet narcotica ischuriam non raro inducunt, & diversis modis ab Heeres recensitis nocent. Optima quæ in hoc casu conveniunt remedia, sunt vinum paulo majori dosi sumptum, & analeptica stomachica, spiruosa, ut ambara.

Senum vigilie, quæ si non excedant, ipsis minus nocent quam juvenibus, videntur pendere ex eorum sanguine sicciore & acriore, nec non ex curis & sollicitudinibus, quæ vino abiguntur.

10. *Agrypnia critica*, Preysinger Class. I. B.

Ea præcedit maxime hæmorrhagiam narium, si eognitionis signa præcesserint, varque alia hæmorrhagie præsagia comitantur, ut capitis dolor, cervicis tensio, oculorum rubedo, narium pruritus &c.

11. *Agrypnia ab insectis*

Insecta, forte dicta quia nos insectantur, magis importuna sunt noctu *cimex lectularius*, qui morsu, reptatu, fœtore irrequietos nos reddit; *pulex communis* qui vellicat & ut cimex vasa sanguinea pungit, cruorem extra vasa fundit; unde macula rubra virulenta non carens; *culex pipiens* susurro & punctura ut culex pulicarius nos vexat; sordidos etiam ingrate titillat *pediculus humanus* capillitii hospes, *pediculus pubis* qui scortis familiaris & a pube ad cilia & supercilia sæpe reptat; *asilus calcitrator* qui interdum tibias rostro tanquam subula perfoliat; *musca domestica* quæ turmatim ædes ingressa per ætatem, austrino potissimum cælo, vultum, manus, importune lacessit & pomeridianum somnum interrumpit.

Unguento mercuriali illitis lectulorum compagibus ligneis, aut iis spiritu antivenereo *Servientill*, decocto yumbaginis, lotis, abiguntur cimices: odore tanacetii, abrotani idem efficitur, pulvere tabaci, hordei caustici vulgo *cevadille*, seminum staphisagrie pediculi enecantur; pulex vero non nisi frequenti linctorum mutatione & sagaci venatione exterminatur. Quoad culices eorum in cubacula ingressus arcetur sedula tenestrarum per diem clausura, arboribus a domicilio remotis; nocturna luce in cubiculis abstinentendo, lectulum tela sericea insectis impervia involvendo. Lappones pice fusa, Americani succo Bixæ vulgo *Rocen* corpus suum obducunt ut a culicibus & muscis se defendant. Muscæ capiuntur si salicis fasciculi in camera suspensi fuerint, dein sacco involvantur, dum muscis orusti sunt; si mel arsenico, sublimatore corrosivo, napello infectum ipsis offeratur: an satius est interdum clavis fenestris ædes obscurare & insecta enim illa tenebras fugiunt.



CLASSIS NONÆ SYNOPSIS.

F L U X U S.

CHARACTER. Fluxus sunt morbi quorum præcipuum symptoma est exitus insolitus cuiusvis fluidi solidive e corpore.

ORDO I. SANGUIFLUXUS est sanguinis, vel sanguinolentæ materiæ ejectione sine alvi fluxu.

- I. **HÆMORRHAGIA**, (*Hæmorrhagia*) fluxus sanguinis e naribus.
- II. **HÆMOPTYSIS**, (*Hæmoptysie*) sanguinis expectoratio cum tussi sine pyrexia acuta.
- III. **STOMACACE**, (*Affection scorbutique*) fluxus sanguinis e gingivis sæpius foetidus, putridusve.
- IV. **HÆMATEMESIS**, (*Vomissement de sang*) sanguinis reiectio ex œsophago cum vomitorio conatu.
- V. **HÆMATURIA**, (*Piffement de sang*) sanguinis, fluidive rubri per vias urinaris emissio.
- VI. **MENORRHAGIA**, (*Perte rouge*) sanguinis per uterum aut vaginam fluxus vitiosus.
- VII. **ABORTUS**, (*Avortement*) fetus immaturi, sæpius cum menorrhagia, ex utero exclusio.

ORDO II. ALVIFLUXUS est materierum in primis viis contentarum vitiosa per os aut anum reiectio.

Dividuntur in sanguinolentos & faculentos.

1. Alvifluxus sanguinolenti.

- VIII. **HEPATIRRHŒA**, (*Flux hépatique*) est alvi fluxus per inferiora sanguinolentus, nec ater, nec torminosus.
- IX. **HÆMORRHOÏS**, (*Flux hæmorrhoidal*) est fluxus cruentus, ex podice, vel recto mariscis ruptis obdito.
- X. **DYSENTERIA**, (*Dysenterie*) est frequens, torminosa, sæpe tenesmodus, sæcum cruentarum per inferiora dejectio.
- XI. **MELÆNA**, (*Maladie noire*) est fluidi attri per superiora, vel inferiora frequens reiectio.

2. Alvifluxus non sanguinolenti.

- XII. **NAUSEA**, (*Nausée*) est inanis vomendi conatus, & status tantum per os emissio; affinis est aerifluxibus.
- XIII. **VOMITUS**, (*Vomissement*) seu frequens vomitio, est palpabile materierum, non eruentarum, facta per os, œsophagumque reiectio frequens.
- XIV. **ILEUS**, (*Passion iliaque*) est atroci circa epigastrium dolore, seu gastrodynia, alvi constipatione, & faculentæ demum materiæ vomitione, notatus.
- XV. **CHOLERA**, (*Cholera morbus*) est syndrome ex vomitu, diarrhoea & gastrodynia sæpe cum furarum crampo.
- XVI. **DIARRŒA**, (*Diarrhée*) est excrementiciorum humorum frequens, vel intempitiva dejectio.
- XVII. **COELIACA**, (*Passion coliaque*) est albescens, aut chilacearum materierum dejectio.
- XVIII. **LIENTERIA**, (*Lienterie*) est celer statim a pastu facta ingestorum, vix mutatorum dejectio.
- XIX. **TENESMUS**, (*Tenesme*) est muci pauci frequens dejectio cum intensa deijciendi cupiditate, & assiduo conatu.

ORDO

ORDO III. SERIFLUXUS, est fluidi cuiusvis, sed non sanguinolenti, nec alvini effluxus.

- XX. EPHIDROSIS, (*Sueur*) est sudoria quantitate, qualitate, intempestivitate peccantis effluxus.
- XXI. EPIPHORA, (*Larmoyement*) est vitiosus ex oculis humoris lacrymalis, sebacei, vel purulenti effluxus.
- XXII. CORYZA, (*Coryze*) est humoris serosi, mucosive e naribus effluxus sine ozana, sæpius cum gravedine.
- XXIII. PTALISMUS, (*Pyralisme*) est salivæ uberior, frequentiorve rejectio, aut destitlatio.
- XXIV. ANACATHARSIS, (*Expédition*) est muci, purisve e pectore facta per os cum tussi rejectio.
- XXV. DIABETES, (*Diabète*) subita post pastum. potulentorum cum magna siti, per urinæ vias, emissio.
- XXVI. ENURESIS, (*Incontinence d'urine*) involuntaria, doloris & ardoris expert, mictio.
- XXVII. DYSURIA, (*Ardur d'urine*) difficilis & dolorifica, sæpius ardens, urinæ emissio.
- XXVIII. PYRIA, (*Pissement de pus*) est purulentæ, albescens, aut viscido-mucosæ materiei mictio.
- XXIX. LEUCORRHOEA, (*Fleurs blanches*) est seroso-flavæ, vel puriformis materię ex utero delapsus.
- XXX. GONORRHOEA, (*Gonorrhée*) est stillicidium fluidi seminalis, vel puriformis ex urethra, aut ex vagina.
- XXXI. DYSPERMATISMUS, (*Serre de stérilité virile*) est tarda, vel debilis feminatio in actu conjugali facta indeque ad generationem insufficiens.
- XXXII. GALACTORRHOEA, (*Ecoulement de lait*) est stillicidium lactis ex mammis.
- XXXIII. OTORRHOEA, (*Ecoulement de l'oreille*) est fluxus ex auri cavo, ambitu, aut parte postica.

ORDO IV. AERIFLUSUS, est flatus, halitusve vitiosa emissio:

De *Nausea* vide Alvi fluxus. De *Tussi* vide Anhelationes.

- XXXIV. FLATULENTIA, (*Ventosité*) est morbus flatuum per inferiora, vel superiora. emissionem frequenti, & borborygmis stipatus.
- XXXV. EDOPSOPHIA, est flatuum per urethram, vaginam, vel uterum emissio.
- XXXVI. DYSODIA, (*Puanteur*) est miasmatum foetidorum exhalatio.

Nota In hisce morborum characteribus non tradimus eorum definitionem; ut existant. plures Philatri, qui characterem cum definitione confundunt; ut recte definitur quodvis genus, referendum est præcipuum symptoma, sed non omittenda alia quorum concursus ipsum genus constituit; in characterem vero quem tradimus, sufficit præcipuum symptoma, cujus ope in data classi & dato ordine hec genus ab aliis sufficienter distinguitur.



CLASSIS NONA.

FLUXUS,

SEU

MORBI EVACUATORII.

Que debent intra corpus humanum aliquandiu retineri, ut quibus destinata sunt usus, inserviant, si citius, frequentius, uberius quam par est ejiciantur, vitiosam evacuationem constituunt.

Evacuatio est itaque morboſa, si continenda ad sanitatem utilia, aut tardius, rarius, dato tempore ejicienda, uberius; maturius, difficilius importune foras amendantur, atque hæc fluxus nobis vocantur. Quæ effluunt sunt vel *ſolida*, ut foetus, secundinæ; vel *peregrina*, ut calculi, insecta; vel *fluida* ordinaria, ut sanguis aut humor: vel *vitiosa*, ut pus, ichor: humores vero sunt vel *excrementitii*, ut ſex, urina, sudor; vel *recrementitii*, ut saliva, bilis; vel *reparantes*, ut chylus, lac, semen, vel demum *ſtatus*, &c.

Vix per quas sunt evacuationes, sunt vel ordinariæ, ut eos, nares, urethra, anus; vel in ſolite, ut vulnus, ulcus.

Morbi evacuationis dividi poſſunt in *sanguifluxus*, cruoris effluxus notatos; *ſerifluxus*, lymphæ, urinx, sudoris, muci, ſimiliv fluidi evacuatione insignes; in *alviſluxus*, & demum *acriſluxus*, ut in flatulentia, &c.

Fluxus sunt vel activi vel paſſivi. Activi dicuntur quos natura prorit, ſive materiei morboſiſcæ, ſive medicaminis ſtimulo ſolicitata, ſive conſentiat, ſive diſſentiat voluntas; ſic activa eſt foetus excluſio. Paſſivus eſt fluxus quem potentiz animatis corporibus propriæ non excitant, qualis eſt fluxus ſanguinis ex vulnere, humoris amnii ex utero, urinx ex vefica, cujus ſphincter eſt reſolutus.

Theoria. Fluidum in vefica contentum, effluit quoties vix expulſrix quæcumque fuerit, vires quibus intra veficam retinebatur, ſupprat, adeo que cauſa effluxus eſt vis expellens exceſſus ſupra retentricem, ut loqui amant Veteres.

Vires autem quarum actione expellantur fluida, ſive conceptaculis aut vaſis ſunt, vel ex parte fluidorum, vel ex parte vaſorum, & parrium adjacentium: fluida enim ſive contenta poſſunt niti in exitum vel ratione 1. Gravitatis ſuæ; ſic ex recto cadaverum, ex vefica paraplegicorum, ex ore ſalivarium, ex vulnere liquida, ſi loci declivitas permittat, propria gravitate prorumpunt: 2. Rarefactionis energia; ſic ſtatus in inteſtinis vel in ventriculo expaſi propria elasticitate, tum ano, tum cæco exploduntur: 3. Vi propria, ſi quæ continetur animata fuerint, ea poſſunt partim exſilire, ut foetus ex utero, infecta ex oſophago, ano, &c.

Continencia vero poſſunt, agere in contenta,

etque foras expellere, 1. vi muſculari vel voluntaria, ut vis linguæ & labiorum ſalivam exſpu; vel naturali, ſive coacta, ſive ſpontanea, ſic coacta per dolores natura fortum ex utero propellit, ſponte vero ſalivam appoſito jacundo cibo in oris cavum prolit; coactæ hydrophobus vicina conſpuit, ſponte & cum voluptate alvus pigra exoneratur; 2. Vi elatiſca; ſi prius parietes receptaculi continentis fuerint diſſenti & minuat orificiorum reſiſtencia; ſic puncto tympanitici, aſciti abdomine, etiam poſt mortem, fluida contenta ejiciuntur.

Principia effluxuum frequentiffima ſunt 1. in contentis moles adaucta; ſic urinx moles intra ſex horas collecta pondere ſuo moleſtiam creat, ex qua ad nictum ſollicitatur: 2. Acrimonia; ſic ſeminis fervidioris ſtimulus naturam ad ejus emiſſionem prorit; & calculi in veficæ collo vellicantis ſtimulus cogit ad evacuandam ſæpius veficam: 3. in continetibus vitioſa conſuetudo voluntarie acquiſita facit ut ſalivam utilem exſpuant melancholici: 4. Pathema animi lachrymas exprimit in meſtitia, urinam in ira deſtreſcencia, ſæces in terrore, ſudorem in ſumma anguſtia, vomitionem excitat in abominatione: 5. Natura quo ſe verat neceſſia & ſummo periculo perturbata conarus ſpaſmodicos, anomalos exercit, unde vomitus hyſterici, ſpuma epilepticorum, alique ſimilia molimina: 6. Sraſibilitas nimia, ſive conſuetudo, ſive a philoſophi oriunda anſam præbet conſuetibus excretoriis; ſic inflammatus venter omnia vomitu rejicit, etiam blandiſſima; ſenſibilis nimium, & ut aiunt, delicatulus, ad nomen rei ſæpe naſcitur.

Effluxibus paſſivis anſam præbent 1. quæcumque oriſicia nativa dilatant; ſic reſoluto ani ſphinctere faeces effluunt; vel 2. quæ oriſicia inaſueta erundunt, ut vulnerantia, rodentia, ſuppurantia.

A vero longe aberrant Neoterici qui principium effluxus paſſivi, pro cauſa effluxus cuiuſvis inculcant, nec attendunt ex ſolutione, vel ruptione venæ non neceſſario ſequi ſanguinis effluxum, quod barbitonſoribus iſtis notum eſt. Secta enim vena ſanguis non effluit niſi præmiſſa ſigatura vena ſanguine diſtendatur aut contratione manus, tuſſi, vis expellens intendatur.

Diabreſis eſt erofio vaſorum vel receptaculorum facta a cauſis phyſicis, ut ab energia puris, ichoris, putredinis; ſic a diabroſi vaſorum pndit puris effluxus.

Rixis ſeu ruptio eſt ſolutio continui facta a preſſione mechanica contentorum in continetia ſive a diſtentione ab intus extro vergente; ſic crepant clauſtra abdominis in hernia ventrali, vaſa ſanguifera a ſanguine congeſto rumpuntur, unde hæmorrhagia.

Diarrheſis eſt ſolutio continui a cauſa mechanica extus agente, ſecante, vulnerrante, ut in phlebotomia, amputatione, paracentefi.

Anaſtomoſis eſt oriſiciorum nativorum diductio, unde:

unde fluxus jaxatur, vel augetur; sic intruso cathetere, intrusa candelula diducitur urethra, unde fluxus urinae vel enurefis.

Diapedesis est diductio fibrarum mutuo decussatarum parietes vasculi vel receptaculi constituentium a vi fluidi diducendis; sic vesica fuit, per tubum ejus orificio adaptatum, recipiens aquam ex aliquo pedum altitudine superincumbentem, diducitur & per fibrarum intercapedines aqua undique transfusa; sic cystis fellea bile vicinum colon inficit; sic fœcus stercoris halleus per intestina in herniosis distensa transfusa.

Omnis effluxus vel simpliciter *evacuatorius* est, vel simul *revulsivus*, aut nunquam *derivativus*. Evacuatorius dicitur quatenus molem fluidorum corporis humani immittit; *Revulsivus* quatenus ripatur constrictione aliarum partium e quibus fluidum exprimitur, & sic minor est in vasibus ita contractis fluidi copia quam fere nativa illorum diameter.

Effluxus evacuatorius cujusque fluidi cæterorum fluidorum molem sensum minuit, quia cum omnia corporis vasa invicem communicent & nitantur in sui contractionem, detracta aliquibus fluidi mole & resistentia; cæteræ partes facilius contrahuntur, & versos partem minus resistentem suam emittunt fluidum usque ad æquilibrium: sic detractio per menorrhagiam uterino sanguine sanguis pone sequens ex arteriis hypogastricis & spermaticis abundantius in uterum affluit, nec tantumdem per venas cognominas reficitur massæ, unde parior in cor reversa moles parcius cuique parti distribuitur; hinc minuitur motus fluidorum & solidorum pressio, minuitur pondus, sensus molestus ex hac pressione oriundus, laxantur solida, fluida, si eadem vi protusa fuerint, facilius provolvuntur in ratione immittente resistentiæ; hinc plurima in plethoricis commoda: aut in sanis vitiosa exarsit laxitas, debilitas, mentis languor, cutis pallor, frigoris sensatio, & mala hinc plurima.

Effluxus revulsivus est, si quedam pars contracta fluidis suis exoneretur, & sic minori proportionem recipiat novum fluidum quam fere ejus vasorum consueta capacitas; sic *phlebotomia* ulceribus vesicæ apertis cum urina qua data porta effluit; ita contrahitur urethra ut ne minimam urina guttulum transmittat; sic vomitu habituali, ita coarctantur intestina ut quadruplo minorem acquirant diametrum & alvus pertinaci configuratione claudatur; sic in hæmoptysi febrili non raro frigens & contrahuntur partes extremæ cum cruor in pulmones faucibus uberius influit, ille ab artubus revelli videtur.

Præcis. Fluxus sunt vel salubres & critici, vel insalubres & noxii, quod discrimen ex æqua & juxta Medici penetratione repetendum est, nec enim omnino insalubris censendus ille qui vires ægri detrahât, nisi tantam detraxat ut ad superandum morbum & vitam protrahendam non sufficiant, quæ supersunt. Salubris censendus est ille effluxus ex quo rationabiliter

sperandum est fore ut gravior morbus avertatur aut asseretur, nulla itaque affluxus quantitas absoluta salubris aut insalubris pronuncianda est cum vel minima debilibus lethalis & maxima robustis, plethoricisque salubris esse queat; Medici prudentes est accurate pendere num fluxum intendere & prorogare, num sistere, num vero naturæ committere debeat? quod pro diversis morborum generibus, speciebus & pro diversis ægri circumstantiis variat; in genere effluxus passivus, intemptivus, uberiores, sistere opus est; criticos, activos, difficiles, pariores, assuetos sæpe juvare & proritare convenit; moderatos activos in robustis cum non evidentia rationum momenta nos huc vel illuc determinant, satius est naturæ committere; provocant vero effluxum omnia principia superius exposita, ut quæ augment fluidi molem, acrimoniam, receptaculi pressuram, erethismum orificii, vel sphincterum, laxitatem, debilitatem; hinc vero liquet etiam quibus auxiliis sisti vel imminui possint qui sistendi sunt vel imminuendi. Auxilia vero sunt gymnastica, dietetica, chirurgica, vel pharmaceutica; quiete mentis & corporis sedantur omnes effluxus quos musculosa contractio promovet; aut somno sador & catamenia uberius fluunt; postura quæ gravitatis liquidi fluxui vellicat ut vitanda ne affluxus liquidi vix expultrix irriteret ulterius.

Alimenta quæ intendunt vitium fluidi, unde fluxus procedit, ut stimulantia, condimenta, spirituosia in hæmorrhagiis activis fugienda, atque vegetabilia parum nutritientia in plethorica cæteris sunt anteponenda. In effluxibus passivis mira præstant vincula, fasciæ, ligature, turundæ, corcularia, si ad originem mali hæc auxilia perveniant: in certis casibus phlebotomia revulsivæ, tincturæ, nimum a Veteribus laudatæ; medicamenta quæ vasorum constrictionem & fluidorum coagulationem inducendo valent effluxum cohibere *adstringentia* nuncupantur. Ea intus & extus adhibentur impari successu, felicius semper ubi loco affecto immediate applicantur, infelicius cum eluctanda sunt vasa chyliifera, ut ad partem læsam deveniant, maxime si stomachus irritatus & male se habens ea respuat & ab illis laedatur, quod sæpius accidit, adstringentia in fluxibus hæmorrhagicis passivis tucissima sunt; aqua stiptica D. Martæ quæ imbui pulvere vitrioli vulneribus, naris, hæmorrhoidibus applicantur; lamina boletii igniari vulgo *amadon* quæ amputatis, vulneratis partibus; feliciter apponitur; lintea carpta quæ recens scissis abscessibus, ulceribus exsiccandis induntur; stupæ pulvere vitrioli, colcocharis, aluminis, sanguinis draconis onustæ; quæ excisis partibus ad cohibendum sanguinem superimponuntur; *crochus lapi*, cujus pulvere asperguntur; hic & nummularia, musci quercini, usnea, geranium Roberianum, millefolium possident.

Adstringentibus tuciora sunt in fluxibus activis internis, quæ vel naturæ conatus moderantur, ut anodyna, narcotica, ut in dysentæ-

K 3 ria,

ria, tenefmo; vel quæ principium morbi tollunt, ut cathartica in diarrhoeis, vel quæ utrumque simul præstant, ut mucilaginosæ in tæsi, dysuria, tenefmo; tum & absorbentia, nec non quæ conatus naturæ alio divertunt & materiem morbosam ab intestinis derivant, ut sudorifica in diarrhoea scrofa.

Nuper clarissimus Medicus Universitatis Moospol. Doctor Theophilus de Borden inventis Dem. Solano & Nihell sua de pulsu critico addidit, & ex pulsu diversos fluxus præfigendi modum docuit: contendit scilicet, ut fluxus ita & pulsus alios esse superiores, alios inferiores; superior pulsus seu qui fluxus ex naribus, gutture, œsophago &c., prænuñciat in morbis acutis, cognoscitur ex pulsatione seu diastole identidem duplicata seu bipartita: *Dicrotum* pulsus dixit D. Solano. Inferior pulsus denunciat fluxus alvinos, hæmorrhoidales, uterinos, urinosos &c., & cognoscitur ex pulsationibus magnitudine & ordine inter se inæqualibus cum aliqui subultu; huc pertinet pulsus *inclaudens* qui sudorem præfigit; omnes pulsus critici tunc evoluti, non contracti, & dividuntur in simplices, compositos & complicatos, de quibus auctor ipse consulatur.

Omnes fere fluxus sunt periodici, præoxymis per intervalla recurrentibus, exceptis fere gonorrhœa, galactorrhœa & leucorrhœa, quæ continuæ sunt.

ORDO PRIMUS.

SANGUIFLUXUS.

Sunt illi quorum symptoma præcipuum est materię cruentę, vel sanguinolentę, aut rubrę effluxus: *Hippocrati* Phleborrhagię de diarr. l. 4. n. 86.

Pulsus, qui sanguifluxus criticus prænuñciat, est fortior initio, & magis renitens quam qui aliorum fluxus præcedit, vel comitatur: est autem simul dicrotus si superior, subintermittens si inferior, ex *clariss. de Borden*.

Theoria. Cruor in arteriis, venis & corde ita continetur, ut per excretoria vasa ipsi arteriis continua, & extrorsum patula non possit amandari, tum quia resistit ratione viscositatis suę quæ impedit quominus in adeo minutas guttulas dividatur, quæ possint tam angusta vasa subire, tum quia non sufficienti cordis vi pellitur, ut ea vasa diducere, & in minutias resolvı, seu subdividi queat. Unde, ut sanguis e vasis suis effluat, necessum est ut vires trusivę augeantur, vel ut resistentię ex parte sanguinis & vasorum imminuantur, vel utrumque simul accidat.

Vires quibus potissimum sanguis traditur sunt altę & veloces cordis contractiones, quales sunt in exercitiis violentis, febribus ardentibus, unde hæmorrhagię, necnon nifus musculorum quoddam partes ambientium, ut nifus ad fortium expellendum, ad facies efficiendos, quibus hæ-

morrhœis, menorrhagiis, similesque sanguifluxus vel excitantur, vel renovantur.

Principia nifus cordis sollicitantia sunt ut plurimum, 1. plethora quæ vasculorum systema mollescat suo pondere, infareit, & obstruit sua viscositate, unde qui opipare lauteque vivunt, qui liquoribus spirituosiss, ferulis nimium conditis & succulentis utuntur, his malis sunt sæpius obnoxii. 2. Infarctus & stases quorundam partium, ut uteri in mulieribus quadragenariis, podici, & hepatis in otiosis, unde hæmorrhœis, capitis in pueris insolationem expertis, unde hæmorrhagiæ narium: 3. Ferror & spirituositas crasis sanguinis vasa etillans excretionis sanguinis etiam sollicitat, maxime vero acrimoniam scorbuticam.

Vires quibus sanguis intra vasa cohercet, sunt 1. vasorum integritas & clausura, 2. ipsius sanguinis viscositas.

1. Arterię omnes firmiter structę sunt, atque quorum majus rixis periculum immineret ab impetu sanguinis, ut in arteriis majoribus, harum nativa firmitas tanta est, ut, pressione sanguinis vigiesci majorem quam in sanitate consuevit esse, citra rupturam possint experiri, observante *Halesio*; verum a vulneribus per diarrheam factis ea tenacitas potest superari; sic eniculis commotis vasa renalia lacerantur, unde hæmaturia; ingestis hirudinibus vasa ventriculi sauciantur, unde hæmatemesis, vel hepaticorrhœa, &c.

2. Vasa minima vim quidem habent sufficientem, qua transfusenti sanguini ea debilissime prementis resistent; at illis obstructis tunc integra pressio cordis in sanguinem illa subeuntem fertur in eorum parietes, adeoque sufficit ad eos vel rumpendos, vel saltem diducendos, inde hæmorrhagię per rixim, vel per anastomosim, si nulla diapedesis obtineat: hinc iterum patet quare infarctus ad hæmorrhagię dupliciter conferat. *Vide theoriam pulsus*.

3. Vasa tum majora, tum minora a purulentis, ichorosis, sphacelosis, cariis, cancris, scorbutico &c., viru possunt erodi; inde verę hæmorrhagię magnę vel parvę; quandoque ruptis aneurysmatibus subito lethales oriuntur: aneurysmata sic rupta semper inveni, intus cartilagineis quidem lamellis in crustata, sed in punctis nigris, sphacelosis hiantia.

4. Viscositas nativæ est maxima parum a Medicis perspecta; sed si decies eluantur vasa & viscera aqua purissima continuo renovata, ultima lotura etiam viscida est, ut ex sapone dissoluto viscidior non sit: hæc visciditas robustis sanguineis major, debilibus, cachecticis minor, in quibusdam morbis puridis; malignis, minimis, ea sublata quid obstat quominus cruor vasa secretoria subeat, ut experientia docent fieri in pulmonibus satis elotis, ut sudor sanguineus & hepaticorrhœa suadeat.

Praxis. Causa morbi incidat ut principia conatus cordis & vasorum sollicitantia, ipsique conatus auferantur, simulque ut resistentię ex parte sanguinis & vasorum resistuantur, augeantur

tur, si sanguifluxus imminuendus fit, vel sistendus, seu fit insalubris.

Ea vero auxilia cæteris sunt anteponenda, quæ pluribus simul indicationibus satisfaciunt, live indicationes sint rite perceptæ, live per conjecturam subodoratæ.

Sanguifluxus principium esse plethoræ commotam judicamus ex causis plethoræ in pathologia recensitis, & ex signis velocitatis sanguinis.

Ingesta fœculenta copiosa, vires digestivæ magnæ cum vita otiosa; suppressio catameniorum; hæmorrhoidis, verna tempestas, ætas juvenilis, color floridus, calor intensus, pulsus plenus, ea omnia indicant phlebotomiam repetitam initio morbi factam, victum tenuem ex vegetabilibus, cremoribus, quietem animi & corporis, potum refrigerantem, subadstringentem; sponte cessant sanguifluxus, & ægrum sublevant sæpius.

Si sanguifluxus oritur a fervore, velocitate fluidorum, indicantur etiam iteratæ phlebotomiæ, quies potus acidus, inter quos nullus præstantior ad syllendam hæmorrhagiam quam aqua Babel, parca quantitate, aut gratam acidæ ætem immixta aquæ fontinæ, conveniunt etiam insula ex floribus rosarum, decocta foliorum plantaginis, polygoni, radicem symphiti, bistortæ, quæ vi refrigerantia simul & adstringente utrique indicationi satisfaciunt.

Si vero sanguinis dissolutio, acrimoniæ scorbutica hæmorrhagiæ ansam præbet, parcius vena secanda est, sed acida, acerbæ cum in crassantibus, edulcorantibus sunt præscribenda, quo pertinent catecha, sanguis draconis, sanguis melitenensis, hyposticis, balaustris, acacia vera, & radices tormentillæ, bistortæ, symphiti folia, vineæ, geranii, equiseti, asferinæ, agrimonie, faniculæ, ex quibus variz formulæ parari possunt. Si quando sanguifluxum ex quocumque parte foveat febris cum indicis putredinis primas vias infestantis, ut cum lingue forditiæ, oris amarore, cardialgia, nausea, & præmissis phlebotomiis natura via monstrat, ipsamet emetica, sed prudenter sunt adhibenda, quod in dysenteria vulgo fieri solet, sed etiam in menorrhagia pluries successit; tunc autem usurpanda misissima, ut raphani semen, Symplicii Glauberi, vel & simul adstringentia, ut radix specuaculanz, quorum operatio potu aquæ diluente paranda est; profusus hæmorrhagias sequitur cachexia & ascites cum pedum oedemate, sili, urina lixiviosa, &c.

F. HÆMORRHAGIA; *Aimastimos* Dict. Univ.; *Præfluxum* sanguinis; *fluitans* sanguinis; *Hæmorrhagia* du nez.

Docet *Galenus* Comm. 1. *Epidemic.* hoc nomine, sine partis epitheto, narium hæmorrhagiam intellexisse *Hippocratem*, in quo sensu a nobis sumitur. Hæmorrhagiæ proprie dictæ nomine *Hippocrates* intellexit fluxum sanguinis cum im-

petu e naribus erumpentis: *Erronsum* vocat eum qui sensum fit, & *Stalagmon* qui stillatim; sed plus vel minus non mutat genus, nec nomen genericum.

Character. Hæmorrhagia est quicumque effluxus sanguinis e naribus; membranarum piceitariam, adeoque sinus frontales, sphænoideales, maxillares irrigant arteriæ & maxillari interna orindæ venæ ad jugularem externam sanguinem revehunt, & non solum ab arteriis congeneribus hunc reducant, verum etiam a sinibus orbitariis, & e sinibus duræ matris quibuscum communicant, ita ut aucta versus jugulares internas resistentia ex illis & sinibus duræ matris cruor versus nasales venas divertatur, & data eorum apertura effundatur.

Glandula piceitaria, corpus spongiosum selle turcicæ impositum, ope infundibuli accipit ex tertio & duobus lateralibus cerebri ventriculis, serum superfluum, quod in illis in statu morbofo exundat; illa vero glandula cingitur varculis, seu sinibus circularibus qui cum cavernolis utrinque communicant, hæc via serum illud cum sanguine ad narium vasa, potissimum, si rupta fuerint, derivari posse verosimilimum est; hinc hæmorrhagia cerebrum a pluribus infarctibus & morbis liberari quotidiana docet experientia.

Sanguis eo fertur ubi minor est resistentia, cum undequaque premittur; in majoribus quidem arteriis impetus a corde acceptus tantus est, ut vix possit retrogredi a levibus obicibus oppositis; verum in minimis vasis, potissimum venosis reticularibus, sanguinem levi oblato obice non solum per venas, sed etiam per arteriolas retrogredi docet inspectio microscopica in pedibus ranarum, imo ex minoribus vasis rapiti, aut velut attrahi in majora, quoties velocitas in illis majoribus est notabilis, & facultas fluxus magna, docet *Bernoullius* in *Hydrodynamica*, docet transfluxus chyli ex canali thoracico in venam subclaviam; hæc ideo adduco quia a paucis cognita, & tamen ad intelligendam horum morborum theoriam apprime faciunt; hinc enim patet quorundam ab hæmorrhagia narium internæ capitis partes sublevantur.

Symptomata. Capitis gravitas, cephalalgia, vertigo, somnolentia, pruritus narium, motus febrilis hæmorrhagias tantum activas præcedunt, & designant naturæ conatus ad se liberandum, a sanguine superfluo & oneroso.

1. *Hæmorrhagia passiva.* D.

Ea est quam casus, ictus in nasum & frontem, vel capitis concussio excitant, vel quam corpora acuta aut stimulantia in nares immissa producant, & in hoc casu sæpe sternutamenta eam comitantur.

Curatur 1. mechanica compressione per turandam ex linteo factam, & intra nares immisam a. physice per stipicæ sub forma fluidi, vel pulveris in nares inersa, aut inspirata, ut aqua stipica D. Matte, alumen, vitriolum viride, ex quo ad solem calcinato fit pulvis *symplicicus* dictus.

2. *Hæmorrhagia plethorica*. B. P.

Illa sine febre junioribus ætatis vere & initio ætatis accedit, sapius horis matutinis cum prima vice accedit; deinde vero occasione insolationis, aut alterius erroris in gymnastica, vel in diæta, unde plethora crescit, vel commovetur; hanc præcedunt capitem, stupor cephalalgia, vertigo, similiaque symptomata, quæ sanguine effluente sublevantur.

Si copiosior sit hæmorrhagia, ea vix sectione, refrigerantibus, acidis intus sumptis, exsiccisque applicatis, demum adstringentibus superius recentitis, sanatur. Novi adolescentem qui ætate ob insolationem hæmorrhagia corporeus se demisit in flumen, atque sic hæmorrhagiam alio senavit.

4. *Hæmorrhagia febrilis* Boerhaave aphor. A. P.

Hæc vel est essentialis, vel symptomatice.

Essentiali comitatur motus febrilis, intermitens, typo quotidianæ, qui adoriatur cum levi frigore, deinceps calore, capitis gravitate, & tunc sanguis effluit. Symptomatice ut plurimum ad morbos febriles exacerbantes, vel continuos sub finem accedit, & ea vocatur *critica* si salubris, *morbosa* quo insalubris.

4. *Hæmorrhagia critica*. B.

Tales sunt quæ moderata quantitate cum symptomatum graviorum imminutione, post ægritudinis statum, non vero in augmento fiunt, quæ hæmorrhoidis, aut catameniorum vicaria est, ut mulieribus hæmoptoicis, aphor. 32. 5. quæ cum sudore in febribus accedit, aphor. 604. quæ die critica debita copia accedit.

Hæmorrhagiam præfigit pulsus dicrotus, vel subsaltans, seu cum identidem pulsationes coincidunt, si prima pars sit major posteriore, quantitas sanguinis parva est; si ambo ætus vehementes, æquales, hæmorrhagia mediocris erit, si primum idem altissime sequatur, cito fiet hæmorrhagia; quo sæpius in serie pulsationum revertitur pulsus dicrotus, eo citius fiet hæmorrhagia, ut si qualibet trigesima pulsatione revertatur, hæmorrhagia intra quadriduum; si qualibet decima sexta, intra triduum; si qualibet octava, intra biduum; si qualibet quarta, intra diem superventura est hæmorrhagia; si ex carpo dextero major sit subsaltus, ex eodem latere expectanda nris hæmorrhagia; si inconflans sit subsaltum recursus, ineertum est tempus hæmorrhagis: *Nihil illi observo*. Præcedit quandoque hanc hæmorrhagiam nausea, vel vomitio, aut manuum tremor.

5. *Hæmorrhagia insalubris*.

Illa est, quæ tum in morbis acutis initio & augmento fit, sine ægrotae levamine, cum delirio, sopore, spasmodicis motibus, pulsu molli & parvo, vel inæquali, quæ stillatim procedit, statimque evanescit. Quæ diebus criticis cum refrigeratione eximia. *Dures. 10. Coac.* Quæ & diverso latere fluit, ut in lienosæ dextro *Cpac. 202.* Quæ cum delirio, aut spasmus sit hæmorrhagia, mala *Aphor. 9. S. 7.*

Dupliciter est insalubris hæmorrhagis symptomatice, tum quæ profusa, ita ut vires exsolvat, unde pulsus parvus, inæqualis, mentis terror, delirium, spasmus; tum quæ viribus exsoluit, etiam sub finem morbi, sed die non critica v. g. undecima, accedit; imperfecta, ut leve stillidium etiam repetitum, quod frustra neos naturæ labascentis conatus incidat, *Coac. 22.* malum si cum locali sudatione, pejus si cum extremorum frigore; male quæ in febribus malignis, petechialibus, imo quartanis, accidunt.

6. *Hæmorrhagia in chronicis*.

Quæ hydropicis, quartanariis, hypochondriacis, cachecticis superveniunt, male; ita quæ senibus obstructis, quæ etiam scorbuticis.

Verum in junioribus plethoricis perperam suppressæ dolores, inflammationes, febres acutas, apoplexiam, epilepsiam post se trahunt.

7. *Hæmorrhagia ab hirudine*, Schneider Lib. II. cap. 22. pag. 220. & Ephemer. Nat. Cur. Dec. II. Ann. 1. obs. 99.

Ea est quæ ab hirudine in nates intrusa accedit; qui itaque aquas limosas ore ipso immediate combibunt, ut jumenta, huic sunt obnoxii.

II. HÆMOPTYSIS, *Hæmoptoe* Græcis.

Emptoe Gordonii; *Emoptois*, *hæmoptica passio* Gilberti; *Sputum sanguinis* Latini; *Hæmoptysis*, *cachement de sang*. Ægri *Hæmoptoei*, a pueris expectorare, & *alma* sanguis.

Character. Sanguinis expectoratio cum tussi, sine febre inflammatoria: loco tussis *Ræscationem* accenset *Sallustius*, id est excreatum sonorum; in peripneumonia & pleuritide sanguis etiam expectoratur cum tussi, sed parvus & cum febre inflammatoria.

In hæmorrhagia narium, stomacacæ, sanguis interdum expulsetur seu ex ore, gingivis, promanat, verum tussis, si quæ sit, non adducit secum sanguinem, ut in hæmoptysi.

In hæmatemæli sanguis cum vomitorio conamine plerumque niger, aut alimentorum reliquis commixtus sine tussi rejicitur.

Theoria. Pulmones trorantur vas sanguiferis duplicis ordinis, arteria scilicet pulmonari, quæ & ventriculo cordis dextro oriunda, bifariam statim divisa, ramis suis bronchorum divaricationes sequitur, & arteria Ruysschianæ quæ ex aorta descendente sæpius orta similem viam sequitur; sed vix quadragesimam partem sanguinis pulmonariæ arteriæ suppledit; oleimi utriusque ramuli rete instar uniti vesticulas pulmonum exterius ambiunt; prioris arteriæ vero sanguinem revehunt, ad cordis ventriculorum dextrum pulmonares venæ; Ruysschianæ vero sanguinem referunt ad venam azygam, aut ad auriculam dextram venâ Zännichellianâ. Capacitas venarum pulmonarium simul sumptarum ad eandem a corde distantiam est ad capacitatem arteriæ pulmonariæ ut 26. ad 21. circiter. Quantitas sanguinis per arteriam pulmonarem

trajecti æqualis est quantitati per aortam immittæ, utriusque diametere eadem est, sed firmitas pulmonaris est triplo minor quam aortæ; moles vero pulmonum vix est vigesima quinta pars molis totius corporis per aortam irroratæ, adeoque moles movenda a corde dextro est toties minor quam quæ a sinistro corde protrahitur.

Injectiones factæ in arteriam pulmonatam multo facilius, expeditiusque transeunt ex arteriis in venas, quam quæ per aortam instituntur, unde merito concludendum est plus esse patulas ultimas pulmonaris arteriæ propagines, paucioresque esse lymphaticas quam propagines aortæ. Expeditior itaque est in pulmonibus sanguinis circulus ad quem vires triplo minores sufficiunt; vasa ultima patula & numerosa sunt, nec inde tamen velocitatem sanguinis majorem quam in æqualibus aortæ ramis expectandam censemus; vasa pulmonum sanguifera transversim rugosa explicantur in inspiratione, amplioraque proinde evadunt; ad angulos minus acutos simul divaricantur dilatatis ab aere vesiculis: ea utpote triplo magis extensibilia, quam aortæ rami, possunt in magnis animi & corporis commotionibus sanguinem undique expellendum recipere, & ab illo turgere, quod non sine respirationis incommodo accidit; quod difficilior autem est respiratio, eo majorem esse sanguinis in vasis pulmonum congestionem cognoscimus; aut ea congestio solvitur vel oborta febre, seu frequentioribus & altioribus cordis contractionibus, quæ sanguinem velut exantant ex pulmonibus, & in arterias corporis dilatatas distribuant, vel etiam ductus vasis secretorii in vesiculis hiantibus, quæ in statu sano parspirant tantum; in hæmoptysi vero cruentum etiam transmittunt; unde sublevantur, pulmones ab infarctu, & prævertitur dyspnœa, febrisque inflammatoria. Si intra arteriam pulmonatam mediante tubo pedem alto & verticaliter erecto insistant aqua tepida per horam integram, aqua partim venar, partim tracheam arteriam subit; ista vero copiosam, viscidamque spumam secum auferit; qua tandem sere exhausta, si aqua cruenta trajiciatur per eundem tubum, ipsa per tracheam arteriam pleno rivo effluit; cum autem vis aquæ injectæ sit minor vi sanguinis a corde immissi, nec ab ista vasa rumpantur, ab illa non læsati verosimile est. Sanguis itaque per oculos vasorum lymphaticorum intra vesiculas hiantis, sed mucos infarctis, deterso hoc mucos sponte in vesiculas irruit, & sit hæmoptysis per anastomosis, quam nulla sequitur suppuratio.

Si vero inflammatorius præcedat infarctus, ut in peripneumonia, febrisque acuta adit, quæ majori vi sanguinem intra vasa pulmonaria orgeat, ea vasa rixam patientes, unde hæmoptysis ad phthisin inclinans. Idem accidit, si vulnere externo, aut deglutitis vel inspiratis clavibus, aciculis vesiculæ dilacerentur, ut *Morriani*, observavit. Verum si glandulæ bronchicæ, in quibus toties veras conctiones reperiuntur

est, in suppuratione abeant, quod in phthisi scrophulosa potissimum accidit erosæ a pure sanguiferis vasis, hæmoptysi viam parari evidens est, quæ per *diabrosum* facta dicitur. Ex dictis elucelcit praxis.

Rejeksi vero per tussim sanguinis color nunc est rutilantior, nunc magis ater, prout magis aut minus in vesiculis resistat & concresecit, nec inde potest judicari num arteriæ, num venæ sectæ fuerint, quandoquidem ubi rumpuntur vasa minima, nullum fere inter venas & arterias discrimen est: in pulmonibus vero venæ sanguinem paulo floridiorem suppeditant quam arteriæ, contra quam in aliis partibus.

1. *Hæmoptysis accidentalis* Morton. Phthisiolog. cap. 5. D.

Ea est quæ a plethora, potissimum commota, eitra præviam humorum acrimoniam, aut pulmonum hæreditariam labem, ab erroribus in gymnastica aut diæta, procedit.

Antecedentia. Quæ copiam sanguinis augent, ut victus lautior, potus spirituosus, assuetæ plethoræ, catameniorum, hæmorrhoidum suppressio; quæ sanguinis impetum intendunt, & simul eum in pulmones determinant, ut vociferatio, cursus, cantus nimius, lectio alta voce facta, iræ paroxysmus: hinc vero gravamen pectoris, sensus titillationis in faucebus, rauco & siccitas pulmonis, tussis, dyspnœa.

Concomitantia. Gustus humoris falsi, titillatio major faucium, tussis sonora, si partem sanguinis expectoretur; tussis vero obscura, & pro vomitu a multæ habita, si pleno ore ejiciatur, unde ægri in lecto federe coguntur ne a sanguine suffocentur; interea dyspnœa rejecto crure sublevatur, dolor, si prius aduerat, mitescit, sicut oppressio pectoris.

Succedanea. Ab uberiori sputo sanguinis debilitantur ægri, pallor occupat artus, terrore quem cruoris aspectus pluribus iniecit, crescit debilitas, pallor, frigus, pulsus minuitur, & frequentior evadit, ut accedit a debilitate.

Subiecta. Adolescentes a vigesimo quarto ad trigessimum sextum ætatis annum, maxime qui prius hæmorrhagiæ narium erant obnoxii. Lectores, cantores, concionatores, præcones publici, Rabulæ forenses, phanasci acutius cantantes, frivolarii mercatores, Professores, operarii, ut lapididæ, qui ad magnas moles versandas violentos conatus edendos habent.

2. *Hæmoptysis habitualis* Morton. Phthisiolog. c. 5. C. P.

Ea est quam prava fluidorum crasis ad acrimoniam vergens & nativa vel acquisita pulmonum debilitas accersunt, quæque ut plurimum febricula amphimerina aut quotidiana stipatur.

Antecedentia. Eadem ac in accidentalibus & præterea dispositio prævia pectoris, scilicet ejus debilitas, quæ patet ex voce clangosa, tono acuto aut falso; scapularum prominentia, pectoris angustia, genarum rubor, pulsus plenus & fre-

& frequens, febricula vespertina major quam in sanitate, sensus titillationis & ponderi in pectore. *Concomitantia*. Singulis fere diebus accedie frigus febrile spontaneum cum tussi statim sicca, dein calor maxime circa pectus cum anxietate & dyspnœa, mox expectoratio cruoris floridi, spumosi, quam semper tussis & faucium titillatio comitatur, intra aliquot dies cessat expectoratio, sed vere sequitur ut plurimum reverbera.

Succedanea. Febris ratione ventriculus labefactur, digestionem vitiantur; hæmoptysi uberiori vires, posternuntur, pallor & macies invadunt, tussis perseverat; & si parentes phthisici fuerint ab anno 18. ad 36^m ipse hæmopticois in phthisim delabitur.

Subiecta. Viri & puellæ in ætate virili constitutæ, potissimum anxie, morose, de nihilo ita scissiles, in cibo & potu eligendis difficiles morose, rauce, macræ, sudantes noctu, catamenia suppressis, sanguine falso, victu ex falsamentis utentes.

3. *Hæmoptysis a diapedisi*, Mahon Journ. de Med. Juill. 1757. A.

Cognoscitur hæc species ex eo quod sanguis ejectionis sit coloris diluti, rosei, spumosi; quod sine tussi expectoretur, imo ita fluxilis sit ut post mortem e pulmonibus diffuset: illa hæmoptysis in observatione illata a plethora fuit determinata.

4. *Hæmoptysis catamenialis* Nicol. Pechlini; *Passio hæmoptica periodica menses suppressis* Plater Expositio. L. P.

Illæ sunt catamenia ante terminum consuetum suppressa supervenit, singulisque mensibus moderata dosi eorum vices supplet cum sanitatis integritate. Reserunt etiam *Plinius* & *Sennertus* exempla virorum, qui quotannis sanguinem expuentes, dato tempore ad summum seuium pervenire, hæmoptysi forsan hæmorrhoidis vices supplente.

5. *Hæmoptysis periodica*. Nicol. Pechlini Amat.; Lufit. cent. 4. cur. 3. C. P.

Vir quadraginta quinque annorum jamdiu hæmorrhoidali fluxu singulis mensibus assuetus erat, hæc catamenia subistere, & ecce sanguinem per os, multum, rutilum & subflavum emittit; consilium perit æger perterritus, & sequenti modo sanatus est.

Scopus est hæmorrhoidalem fluxum revocare, quod fit hirudinibus ano applicatis numero quatuor ad extrahendum cruorem ad uncias sex; dein cruoris spissitudinem & falsedinem destruere, usu antiseptico butyricorum, lupuli, fumaris, endivivæ, eichorii, formæ, extracti, syrupi, iulculi vel spozomatii per dies aliquot, servata interim dieta humectante, ex offis, panatellis, interpositis lenibus pharmacis ægri manna, theo & tamarindis & ceteris universalibus.

Hæmorrhoidum apertio, Græcis ignota operatio, fit vel per hirudines vel per linctum canis, lanceola, frictus ex asperis, ut foliis ficus, ut aloës & similibus.

5. *Hæmoptysis scabietica* Sennerti. C. P.

Adolescens cujus gingivæ erant molles, ulceroſæ, fortidæ, dentes nigri, vacillantes, &c. incidit in hæmorrhagiam, qua curata accedie hæmorrhoids ex intestinis, cum pulsu vegeto; his suppressis per medicamina, supervenit copiosa & pertinax hæmoptysis, quam ex sanguinis dissolutione oriundam judicavimus.

7. *Hæmoptysis variolosa* Sydenham. p. 95. & 597. A.

Hoc spūm sanguinis, ante eruptionem saltem plenariam postularum in variola confluente, iis accidit, quorum sanguis nimis servidus est, & vinosis liquoribus excalescens; mortem autem certam prænnuntiat: hoc vero sanguinis dissolutioni debetur; adeoque indicat potum adstringentem cum spiritu vitrioli ad gratam aciditatem. Vide curam hæmaturia variolosa.

8. *Hæmoptysis catarrhalis* Bontii Medic. Indor. Boneti Sepulchret. *Hæmoptysis peripneumonia* Læzii a Fonte. D. P.

In catarrhis, tussis serena, pleuritide & copiosius in peripneumonia, cruor, vel sputa rubiginosa expectorantur, deterio nimis per tussim mucos bronchiali & expressis vesiculis.

Praxis. In hæmoptysi passiva, scilicet a vulneribus, vis sanguinis expellens est multo major quam resistentia ejus effluxui oblata, quæ a sola cruoris viscositate petenda videtur, usquequo vasis scissi labia ad sese accesserint; ut itaque tollatur causa, resistentiæ vasis mechanicæ augenda per ligaturas & compressiones &c., quod cum in vulneribus internis fieri nequeat, superest solum ut tantum detraheatur de viribus sanguinem trudentibus, quantum opus est citra mortis periculum ut vasa sponte contracta ejus effluxui resistant.

Phlebotomie quarta quavis hora e brachio repetitur, imo quovis bihorio instituta feliciter adhibetur. Dieta ita tenuis requiritur, ut sola aqua pro omni potu & cibo pluribus vulneratis sufficiat ad vivendum & convalescendum, per plures non solum dies, sed etiam septimanas; quod mirum dictum, est in Nosocomio Montpelienſi pluries observatum. Quies animi & corporis in positura horizontali omnino necessaria est ad sedandum sanguinis morum, & vires vitales inutitiler non impendendas; medicamina cum vulneri nulla possunt admodum, vix intus sumpta profunt, nisi aqua Rabel ad gratam aciditatem potulenta aquæ affusa, aut potui ex decocto plantarum subadstringentium, modo ventriculo non gravamen afferant; huc decoctum ex polygono, radice symphitici, insusum ex floribus rosarum, succus. rx urtica, geranio sanguineo, plantagine; fugiendi potus cardiaci qui post discussum, si quæ sit, lithothymum, uberiores hæmorrhagiam concitant; solus acetici odor ad vires lapsas rehendendas & juvandam expectorationem congruam intera pulmones. cruoris videtur indicatus.

Si vulnerato thorace cruor effusus sit in cavo pectoris, is situ ægri commodo, fistula suavitatis.

ria, dilatatione vulneris, cavendo ab intercostalibus arteriis, est educendus.

Si inspirando immixti sint elavicali, soli nature conatus hos possunt tollendo expectorare. Medicus narcoticis, phlebotomis, conatus inutilis aut jam noxios debet sedare & phthitim prævertere.

In hæmoptysi activa ab anastomosi eadem juvant auxilia quæ in rixi, sed non tam rigida requirunt abstinentia; cremores diluti ex oryza, hordeo, avena, panis mica in aqua coctis, præstant jusculis, quæ fervorem & febrilium excitando sanguinis effluxum promovent. Phlebotomiz quarta quavis hora initiui solent ebrachio; artuum vincturæ non sunt usitate; succus urticæ vel ejus seminum decoctum, intermediis jusculis propinatur. Levissima narcotica nocturnis horis concedenda, quæ non adeo sensum obdunt ut necessaria ad expectorationem tussis supprimatur, sed quæ anxietates, dolores ex quibus agitur sanguis sedare valeant; syrupus nymphaeæ, papaveris cum aqua rosarum, plantaginifve sufficient; semina hypocyami *Hippocrates* præscribere non verebatur. Sublata plethora, sedato sanguinis impetu febrili, si quis erat, hæmoptysi suppressa, æger ossis, panatellis, cremoribus spissioribus, ovis forbilibus, sed parce, nutriatur; verum si ex oris inspectione, odore, ventriculi pondere, borborygmis, suspicio sit depravate ut fieri solet digestionis, cathartica micia non commoventia ex pulpa cassiæ, tamarindis, floribus persicorum & manna sunt adhibenda, præmissis clysmatis laxantibus; quæ catharsis repetenda; si febris a frigore incipiens singulis diebus revertatur ut fieri solet, juscula ex carne vitulina, vel pullo cum lactuca, vinca, plantagine, radice symphiti aut similibus paranda mane per septimanam usurpanda, ut ea lege duntaxat, quietem servet æger, & sic labente tempore vasa contrada in suo tono roborentur, & æger ab hæmoptysesei recidiva immunis fiat.

Si hæmoptysi a diabrosi vel a scorbutica dissolutione sanguinis pendeat, eadem generalia indicantur auxilia pro robore pulsus & impetu sanguinis effluents, verum narcotica, ratione stimuli majoris, fortiora, licet sanguinem paululum dissolvant, suadenda, ut laudanum liquidum cum aqua plantaginis vel syrupo rosarum rubrarum vespere offerendum: in diabrosi edulcorantia, glutinosa, gummosa etiam in ore volutanda; ut tabella de alchæa, gummi arabicum, &c. intus eadem refrigerantia, agglutinantia usurpanda & cibo præmissa leni caphari ad lacticinia confugiendum: in scorbutico vero præmitrenda etiam sunt juscula ex testudine vel raris cum lactuca, vinca, malicoro, becubunga, acetosa, agrimonia, pimpinella, & si magna spuatit cruoris copia; in quovis casu ex æquali partibus aluminis & sanguinis draconis fiat pulvis qui cum conserva rosarum detur quater in die ad grana sex, octo &c.; imo frustula aluminis identidem vorentur, licet nau-

seam proritent: in jusculis equisetum, plantago incoquantur; in julepis tinctura rosarum cum aliquot guttis aquæ Rabel adhibeatur; in potu bacæ sumach, myrtilli, folia brunellæ, portulacæ usurpentur.

In hæmoptysi catameniali cui chlorotica constitutio faret, unde catameniorum suppressio, ferri limatura ad granum unum vel alterum per annos continuata catamenia revocat, tussim aufert & hæmoptysim prævertit, ut observavi: phlebotomia et pede, pediluvium calidum, similiaque ingruente paroxysmo debent in usum advocari.

9. *Hæmoptysis phthisica* J. Helli; a Tuberculo, ad *scirrhus pulmonis* Bonet. Sepulchr. & *vomica prodromus* Bonnet theat. tabidor. C. P.

Rupra vomica sæpe pus & cruor cum tanta difficultate & suffocatione expectorantur, ut æger subito et medio tollatur, ut accidit *Vauglassio*.

10. *Hæmoptysis ex tuberculo pulmonum* J. Helli. *Hæmoptysis phthisica*. VVagner Diss. Lips. 1742. C.

Cuidam circa furculam ad latus dextrum pulmonis erat tuberculum quod identidem crescebat & rubrum erat, vel descrecebat, & concolor apparebat; ille tussis catarrhali laborabat jamdudum, ac demum hæmoptysi accedente suffocatus est; apertum cadaver exhibuit hoc tuberculum spongiosum pulmonis adhzrens, purulentum, cruorem vero inde in brachia effusum, ceteris partibus fere exsanguinibus. Hæmoptysim quandam observavit *Cardanus*; quam admirabilem vocat, eo quod cum hæmorrhagia narium conjungeretur, adeoque dubium esset an sanguis a naribus an a pulmonibus exiret; sed mirum est quod talia miretur subtilis ille Medicus.

11. *Hæmoptysis a sphacelo pulmonis* Dodon. obs. cap. 24.

Per sphacelum intelligenda est illa laxitas pulmonum, quam sæpe observare contingit nobis, quæ mollitie, porositate, lividine sua fiderationis similis videtur; in aliis morbis cruor expulsiit vel purus & tutius, vel purulentus, vel salivæ aut pituitæ pennixtus; in hæc vero specie spumofus, nigricans cruor cum tussis vividâ ejicitur, & simul particule ipsæ seu frusta pulmonum nigra, sphacelata, citra puris aut cruoris puri rejectionem; hic sanguis non ex vase rupto nec ex ulcere, sed e pulmonis substantia remulsa, flaccida quasi ex spongia exprimitur, & hic morbus serius vel citius lethalis est; qui enim spumofum spumant sanguinem illi de pulmone expulsiit & moriuntur: *Hippocr.* 13. l. 5.

12. *Hæmoptysis traumatica* Hollerii Comm. in Cosc. A.

1. Vel a vulnere externo accidit, & tunc præmissis generalibus, ut venæ sectione & clysmatis, æger per quietem animi & corporis, abstinentiam a loquela, sive in vulnus recurvente, dicta tenui ex jusculis, consuetumatis, ovis, vitæ suæ consulat optet; si vero

magna copia ex ore & vulnere cruor effluit, mors ostia pulsat; nec non si pulsus deprimitur, syncopes adveniant; aut si parvus fuerit cruoris effluxus, si vulnus pulmonum non tantam aeris copiam admittat, quam glottis; si magna vasa arteriosa vel venosa non sint vulnerata, petusio licet pulmone, salutis spes est; adsunt in hoc casu symptomata peripneumonica, nam febris acuta cum dyspnoea, spatio crucento, dolore thoracis gravativo & pundoario accenditur. Vide *Peripneumoniam ex causis mechanica* Morton. De vulneribus thoracis, Munnicks & alios. Dubitant Chirurghi an vulnus externum sit obturandum necne, aut eorum controversiam solvendum sic censo: vulnus non semper aperit servandum est, æger enim inde in aphoriam, suffocationem & majorem inflammationem pulmonis incideret, sed nec claudendum penitus, ut cruori effuso via pateat; secus ex retento cruore in cavo thoracis suffocatio, ex putrefacto mors quoque adventaret.

2. Vel a vulnere interno hæc hæmoptysis accidit, ut a deglutitis inter ridendum aciculis, clavis, ossibus, arstis, &c. Ex his claviculis cientes tussis ferocissima, hæmoptys immanis, dolor pectoris, & nisi expuantur, peripneumonica mala, his peractis phthisis & mors, ut observavit Morton de phthisi a calculis Phthisis. Lib. III. cap. 6. Hæc. 4. In hoc casu præmissis venæ sectionibus multis ad opiata cito confugiendum, & si hæc corpora extranea glottidi vel tracheæ adhaerint, instrumentis aptis, imo laryngotomiz ope, extrahenda sunt; demum phlebotomiz iterata, laudant liberalis & repetiti, quietis animi & corporis & similium ope consopienda pulmonum in hæc corpora arietatio; ut vita saltem potrahatur.

Hæmoptysis a percussio pectoris Felic. Plater. Expunctiones, 687; ex casu ab alto, ex magnis contusionibus pectoris, Plater Lib. III. hoc morbo perit Tournefort.

Hæmoptysis a vulnere pulmonum. Heister Chir. Lib. I. Cap. 10. §. 14.

Expulit ubertem sanguis; simulque ex vulnere cum cruor, tum aer cum sibilu emittitur. Has species Pleuretica symptomata comitantur, unde dolores, inflammatio, suffocatio, tussis dolorifica; sed cruor copiosus, non vero ut in pleuritide sputa rubiginosa; hæmoptysim determinant.

13. *Hæmoptys ab Hirudine* Galen. L. IV. cap. 6. de loc. aff. Journ. de Med. de Vandermonde 1758. pag. 327, a C. Passerat de la Chapelle Medico Regio in Insula Minorica. B.

Milites quatuor mense Augusto & Septembri sanguinem cum vel sine tussi, angustia vel impedimento faucium, voce mutata per semimensem & ultra exspuebant quotidie, alii ad plures, alii ad pauciores libras; intra morbi decursum quibuldam aderat sensus stitillatio, motus vermicularis in œsophago; alii intra nares posticas: omnibus erat huiusmodi aqua olim deglutita, œsophago insinistrata,

dein ad fauces ascendens, ibi adhærens, qua denique inventa & forcipibus solerter extracta brevi cessante spiritum sanguinis pro hæmoptys habitum.

14. *Hæmoptys calculis* Morton. Pet. Hol. cap. 6. C. Hæc accedit vel calculis ab extra in pulmones per cachinnum delapsis, quod ad speciem superiorem actinet, vel a calculis sensum in pulmone genitis, iisque asperis, levia enim phthisim tantum cum tussi & pondere creant, iisque per causam quandam in motum actis; tales calculi pulmonum communes sunt asthmaticis, dyspnoicis; aneurysmate juxta cor & palpitacione laborantibus, nec non artificibus pulverulentis, ut iis qui lapides secant, frumenta in aeris parant. Vide Ramazzini de morbis artificum, Lepidiorum, stricis mensuram: &c.

Calculi vero in motum aguntur cantu, vociferacione, cachino, sternutacione & similibus; & si angulati sint vel in bronchia impacti, tussis vehemens & arida cum dolore thoracis horrendo & cruoris insigni sputacione excitantur; hi autem dolores prægressæ hæmoptys calculosæ indicia sunt, quibus adde calculos ipsos per tussim reiectos. In hac specie morbi, calculorum reiectio fovenda, juvanda, proritanda, sed interim ob doloris & effluvi cruenti vehementiam, venæ sectiones iterandæ, quies pulmonibus concilianda per opiata larga dosi & frequentet exhibita cum julapiis adstringentibus, dieta tenuissima vel lactea, quiete corporis & animi, abstinentia a loquela, oleosa & lubricantia bechica fere nullius pretii sunt.

2. *Hæmoptys Catarrhalis*. Galen. meth. medic. L. 5. *Hæmoptys Indica* Bontii. A fluxione Bonet.

Hæc species pro causa habet phlogosim pulmonum ex aere frigido, humido, decubitu in locis recens structis, sub dio, ut Indis communis est, &c. Signa hujus sunt tussis magna cum sibilu; coryza, levi frigore, cum febrili compositione; ariditate & calore, nec non potius thoracis, &c.

Curatur 1. generali methodo, phlebotomis revulsivis, clysmatis, dieta ex jusculis, potu ex succo vel decocto urticæ, cichorii, borraginis, julapiis narcoticis & similibus. 2. Galenus strictioribus revulsivis & ligaturis utebatur, nec non ceratis thoracem & caput ab aere tuebatur, ægrum balneis tepidis immergebat forte & subfrigidis, noctu theriacam recentem aut simile narcoticum exhebebat, fere sola sorbitione vel cremore hordei ægrum nutrebat, & veterascens morbo ad lac confugebat.

15. *Hæmoptys Asthenica* Nenter. tab. X., Sydenh. de Hydrop. C.

Hydropes æro moriuntur quin per aliquod tempus tussis identidem cruenta defatigati fuerint; quæ hæmoptys mortis est prodromum.

16. *Hæmoptys splenetica* Strigell. Miscell. Cur. Valleriol. obs. 2. lib. 3. C. P.

Qui obstruccionibus & scirrhis lienis ac aliorum viscerum laborant hæmorrhagiis variis ac hæ-

hæmoptysi obnoxii sunt, quia prædeditus in illis locis obstructis cruoris circuitus aliorum impetie, versus loca minus resistentia; in hac specie palior occupat artus, ægri admodum debilitantur, insomnia, deliquia accedunt; talem morbum usu aperientium extra paroxysmum aggredi oportet, sed levissimum, cum sedantibus mixtorum & diu coarctatorum, valet ad hunc scopum usus limaturæ ferri ad granum semis-unum, duo, per plures menses adhibetæ.

17. *Hæmoptysis Helvigiiana; Oris hæmorrhoides* Helvigii Hist. Morb. Uratislav. p. 49. P.

Ille procedente citillatione, & ardore circa uvulam, ex faucibus, naso, nulla rursi comitante, sanguinem horridum, non spumofum, cum sereatu vel simplici sputatione ejicit.

III. STOMACACE. *Ileos Hamastiles* Hippoc. de intern. affectibus. Vide Plinium lib. 25. cap. 3.

Est genus morbi in quo non solum ex ore gingivæ remollescit, fordidis, cruor promanet: sed etiam ita dissolutus est, ut facile ex diversis corporis locis erumpat.

1. *Stomacace scorbutica. Stomacace* Plin. lib. 25. cap. 3; vulgo *affectio oris scorbutica*.

Cognoscitur ex oris fetore intolerabili, sanguinis spontanea ex gingivis eruptione; gingivarum erosione, putredine, lapsum dentium, horum nigredine, vacillatione, erosione; ossium maxillarium carie, putredine; genarum etiam lividitate, sphacelo citissime serpente, psoriasis fortis: pulsus vix mutatus: in hac specie fames & cæteræ functiones vigent, æger vix se ægrotare cognoscit.

Pessima lues hæc puerulis Nosocomiorum neglectis, fordibus, male nutritis, ex impuro sanguine oris, cachecticis, non rara est, eosque e medio tollit; talique fetore aerem inficit; ut merito pro contagiosa habeatur; scorbutum etiam fere semper comitatur in adultis.

Curatio in hoc versatur, ut 1. statim quidquid est putridum in carnibus & sphacelofum vossellis auferatur ad vivum usque; quidquid est cariosum in alveolis deradatur, utrumque aqua vitæ camphorata eluatur; dein bis vel ter id e exprimitur tabum putre sanguinolentum ex gingivis, quæ si turgidæ sint, lanceola sunt aperienda; detritio optime fit ex succo limonium, foliis symplicii aquatici, vel nasturtii, acetosæ, Britanice; beccabungæ, raphani rusticani, cochleariæ, quibus finitis æger iterum purgatus lac vaccinum usurpabit.

2. *Stomacace universalis*.

Corolus Nonus Franciæ Rex hoc morbo petiit, sanguinem scilicet suum ex omniibus corporis emissariis profudit non sine veneni suspitione.

Hæmorrhagia universalis VVelf. VVoddeli, Observationes curiales, 3. vol.

Amplior hujus desideratur historia. Memorabilis est historia adolescentis in Transact. Angliæ.

x. 471, qui per novem annos pluries quovis anno patiebatur profusam, & septem dies durantem hæmorrhagiam ex pede, vel naribus, vel intestinis, vel renibus.

3. *Stomacace ab hæmorrhæo; Cursemen* Guill. Pison. Hist. natur. de venenis, cap. 3.

Coluber est veonatus, a quo ictus corrigitur vertigine, tremore, torminibus, animi deliquis, febre ardenti, quibus sudor frigidus, ac denique mors intra diem circiter succedit; præter enarratas vires, peculiare est huic serpenti diabolico quod ex morfu venæ erodi videantur, tantamque inflammationem & ardorem efficiat, ut sanguis bulliens, mox e naribus, auribusque, imo manuum & pedum unguitibus promanet, teste Lucano.

Curæ. Caput hujus colubri emplastri formæ vulnere applicetur, tum & allium & folia tabaci calefacta cauterii loco admoveantur; sed maxime succus herbæ colubrinæ *sanctæ* distillæ hauriatur, & vulnere applicetur; dein sudorifera usurpentur.

4. *Stomacace purulenta*, Fouchard Chirurg. Dent. Tom. I. Ch. 22. p. 275. L.

IV. HÆMATEMESIS *Aimatos Ecclisii* Dict. Univ. *Vomitus cruentus* Stahl. Diff. *Vomitus sanguinis* Auctorum. *Vomiting of blood* Anglis. *Vomissement de sang*.

Causæ. Nauseæ, sive conatus vomitorii, atque rejectio facta simul per os materiem cruentam & deglutitam prius, cum ventriculi levamur; cruor vero rejectus suppete grumulosus est, inferne vero quæ subsequuntur dejectiones sunt nigricantes, & botellos, imitantur.

Theoria. Ad hæmatemesin duo requiruntur sanguinis in ventriculo effusio, vel præsentia, quod peregrinum seorsu quodam molesto ventriculo sollicitat ad expulsionem, & deinceps conatus ventriculi ad hunc sanguinem superne rejiciendum, qui, si robur non sit fractum, ad resistentias superandas vulgo sufficit, modo congruatio cruoris non sit strictior; adeoque vis expultrix ventriculi a sanguine effuso irritata, & versus œsophagum directus ejus conatus idem ejus morbi abolivunt.

Cruor vero in ventriculi cavo præsens est, vel quia deglutitur, quod rarum nisi coctus fuerit, & tum majori copia sumptus, melancram tantum excitat; vel quia ex œsophagi, aut intestini duodeni, aut demum, quod frequentius, ex ipsius ventriculi valis ruptis in ejus cavum confluit; vasa arteriosa ventriculi sunt ex gastrica, vel ramis hepaticæ, aut splenicæ, quæ omnes cœliacæ sunt propagines; venæ sanguinem ad splenicam, inde in venam portam reducunt.

Sanguis ex illis vasis effundi potest per dixerim, ut hausta hirudine; per rixim & forte etiam anastomofum, ut congesto sanguine inter hepar obstructum, & arterias fortius pulsantes; vel demum per diaphragmum, ut in ulcero ventriculi. Collata decimam quartam. sal.

saltem decimam quintam sanguinis aortæ partem suscipit, & ventriculus quadragesimam quintam; sanguinis actio in vasa ventriculi eo major est, quo majori vi pellitur retro a corde, ut in nausea, ira, exercitio immodico, febre; & quo fortius reinitur sanguis venosus, ut in hepatis infarctu, obstructione; nullum est viscus quod uberiorem recipiat quantitatem aquæ cruentæ per tubum in aortam insusæ, quam cavitas ventriculi & intestinorum, ut expertus sum in eadaveribus hominum, & brutorum; ergo sanguis vasa excretoria ventriculi diducens in ejus cavum per anastomosim effundi potest, quod fieri fœdenter feciones eadaverum hæmatemeli defunctorum, in quorum ventriculo nullum vulnus conspici potuit.

Morbus frequentior est mulieribus quam viris. & velocior; rarior ambobus quam hæmaturia. Mulieri sanguinem evomenti menstrui crumpentibus, solutio; *Aphor. 34. sect. 5. Hipp.*

1. *Hæmatemesi plethorica; Vomitus cruentus a plethora* Schæl. Theor. med. 431. A. P.

Ea est quam præcedunt catameniorum, vel hæmorroidis suppressio, copiosa ciborum succulentorum ingessio in corpore otioso, dein plethoræ commotio per cursus, equitationem, itæ paroxysmum, vini & liquorum abusus.

Quoniam ventriculus nervis copiosus est intertextus, ejus vasis infarctis, ruptis, fit gravis anxietas, cardialgia, & accedente uberi hæmorrhagia, vires subito labascunt, unde sæpe syncope ingruit; sanguis, non qua proportionem effluit, sed sensim cumulat & conglutatus, identidem vomitione rejicitur, cum alimentorum reliquiis, non spumosis, sed nigricans; hæmatemesi cum febre, lethalis, ex *Aphor. 57. sect. 7.*

Cura exigit phlebotomia & brachio parcas, pulsus facile in hoc morbo concidit, sed tamen iteratis, victum ex jusculis cum incoctis solis astringentium, ut plantaginis, hederæ terrestris, buræ pastoris, radicis symphitæ, bistortæ, tormentillæ, quinq̃uefolii, anserinæ, ita tamen ut juscula stomacho ingrata non sint; potus sit ex infuso rufarum rubrarum, baccarum sumach, prunorum sylvestrium, balustinorum, vel aqua Rabel, aut spiritibus vietioli ad gratam aciditatem aquæ fontanæ miscetur; clysmata laxantia injiciantur, julapia narcotica & astringentia noctu exhibeantur, pulveres ex fossilibus, mole, gravitate nauseosis maxime ex aluminosis vitentur, quæ vomitum concitant. Si tamen cruorem conglutatum dissolvere opus esset, oxycratum, in hæmoptysi a *Hædonio* commendatum, valeret. Cathartica a *Sydenhamo* licet commendata fugienda sunt; syrupus de symphito, de rosæ rubris, eorum conserva ad excipiendum sanguinem draconis anteferenda sunt; aquæ distillatæ ex rosæ rubris, plantagine, stomacho minus ingratae sunt.

Potus aquæ frigidissimæ hunc morbum a *Michele* curatum, vide *Trafact. Philos.*

2. *Hæmatemesi ex aneurysmate.*

D. de Senes, magnus Academiæ Montpelienfis Geometra, post lapsum ex alto in dorsum patiebatur dolorem dorsi medio respondentem cum pulsus intermissione; crevit hoc malum per biennium, denique æger incidit repente in syncope m fere lethalem, ex qua rediens magnam grumosi sanguinis evomit quantitatem, libras saltem quatuor; sequentibus vero diebus botellos nigras alvæ excrevit; præscripti aquam Rabel ad gratum acorem in aqua fontana pro potu; posituram horizontalem; quietem constantissimam, & juscula, quorum ope per aliquot dies convaluit; aneurysmatis rupturam & commercium aortæ dilatatæ cum cæphago per arteriam cæphageam suscipiabat; nec inviro & lecto surrexit, viribus paululum resumpsit, mortem instantem frustra prænuñtiavi, & cum ex libri lectione rideret, subito fato functus est. Cadavere aperto inventæ quæ prænuñtiaveram, ventriculum scilicet septem vel octo libris sanguinis distentum, aortam ad brachii magnitudinem per spatium septem, vel octo pollicum dilatatam, & orificium denarii magnitudine aortæ & cæphago continuo commune, quod tamen quinque cristæ carnes veluti valvulæ ex ambitu orificii oriundæ & circumpositæ poterant obturare, per hoc orificium sanguis ex aorta fluxerat in cæphagum.

3. *Hæmatemesi traumatica.* A.

Vulnera ventriculo inflicta, cardialgia, syncope, pauci sanguinis vomitiones, sed summam & cito lethalem virtum prostrationem indixisse observavi.

4. *Hæmatemesi ab hirudine* Gal. de loc. affect. *Sckenk. p. 227. Riv. cents 4. obs. 26. a lumbicis VVedelii.*

Si luctulentis, vel paludosis aquis potu assumptis, simul hausta fuerit hirudo, quod bobus solemne est, hæc vel cæphago, vel ventriculo adhærens morsu suo fluxum sanguinis excitat; unde hæmatemesi sequitur; hoc vero insectum sale marino largius assumpto, amaris etiam anthelminticis enecatur, aut emericco assumpto soas amandatur, dein cruor astringentibus restinguitur.

5. *Hæmatemesi catamenialis; Vomitus sanguinis mensuribus* Alard. Cumini; *Vomitus sanguinis a suppressis mensibus* Etmuller. pag. 106., Kullandi curat. empir. Hochsteteri decad. 2. cap. 6.; *Salmuth. cent. 2. hist. 54.; Schrenckii lib. 3. obs. 4. in gravid. lib. 4.; Fernel. cent. 21. Ab hamorrhoidibus* Ramazzini. Haller. Comment. T. VI. p. 84. A. P.

Ille vomitus sanguinis catameniorum vices gerit, sæpius innoxie, etiam in primis graviditatibus mensibus, nullaque fere remedia exigat; dissertationem de hoc morbo cum historia vide in *Theoria medica Stablii*, pag. 731.

6. *Hæmatemesi in pancreate* Etmull. pag. 106. Sylvii Prax. lib. 1. c. p. 15.

Ex pancreate ulcerato sanguinem, & pus in duodenum effundente, simulque pressione sanguini durioris ventriculum irritante, huc sanguis

ne & durè in ventriculū refluētibz, fieri creditur; agri dolorem ad pancreas referant, pūque cum sanguine vomunt; hos vomitus præcedit dolor lumborum gravativus circa regionem pancreatis; partim per inferiora sanguis ejicitur.

7. *Hæmatemesis ex splene* Ettmuller. pag. 106. Schenck. Obs. lib. 3. Zacut. Lusit. lib. 2. Med. princ. hist. 10.; Glissonii, Obs. Dodon. p. 47. C. P.

Præcedit & comitatur lienis moles, durities, tumor; accedunt pulsationes circa dorsum in sinistro latere, succedit vomitus sanguinis, sæpius salutaris. Lienem sanguinem accipere ab arteria splenica, cujus ramus irrorat ventriculū, sanguinem etiam suum in venam splenicam refundere, in quam vasa venosa ventriculi abeunt, docet Anatomia; si vero sanguis per lienem libere transire nequeat, illū in arteriæ splenicæ ramis, adeoque in valis ventriculi congeri, & accedente conatu naturæ illa vasa diduci, sanguinem effundi facile est; a vomitu splenis tumor concidit; hoc viscus sanguinem ex distenso ventriculo expressum accipere videtur: *Rhodii centur. 2. obs. 65. Junckeri, pag. 52. tabul. 9. Medicina theoria practica.*

8. *Hæmatemesis scorbutica.* Vide Stomacacem, Juncker. de vomitu cruento, pag. 24. num. 10. C. P.

9. *Hæmatemesis cholericæ.* Cholera sanguinea Panaroli, Pentecost. 1. obs. 11.; Cholera hæmorrhagica Mangeti. A.

Acutissimus morbus, qui adultos, biliosos, phlethoricos, communiter ex iracundiæ paroxysmo corripit, sanguinem ano & cæco profundit, & intra paucos dies, vel etiam horas, e medio tollit, ut vidisse memini. A venenis corrosivis assumptis etiam accidit, in quo casu oleosa, narcotica, & antiemetica Riverii profunt.

10. *Hæmatemesis simulata* D. Hagenot Profess. Reg. Montspeliens. Obs.

Puella in Monasterio decetna, ut inde emitteretur, hæmatemesis simulavit, eamque vehementem, quippe plures cruoris libras, præsentem etiam Medico, vomitu per aliquot dies objiciebat. Detectum est tandem eam quotidie sanguinem bovillum clam hausisse, singulis diebus furtim delatum.

11. *Hæmatemesis carnea* Ernest. Claud. Ephem. Nat. Cur. Hoechsteter. Dec. 3. & 6. fol. 155. *Hæmatemesis a compressa aorta* Regis. Ephemerid.

12. *Hæmatemesis atra* Loesekii, obs. pag. 48. apud VVarnum. Frid. Hoffmanni, de vomitu cruento. *Morbis niger* J. Lud. Leberrecht Loeske, D. Med. Berolin. 1754. A.

Puella Indica, temperamenti sicci, cum pulsu duro, sanguine spisso & atro, ter hoc morbo conflictata fuit, tussis convulsiva copiosa, fluidi, tenacis, spissi, atro-rubri, ultra tres, quatuorve libras vomitione; dolor erat fixus, pungitivus in iu hypochondrio sinistro, ut in splenitide; ride-

bat illa mediis in doloribus, & sese ad risum excitare videbatur; pulsus & urina non diversa a statu sano. Frustra plures phlebotomiz intra annum & semelsem repetitz sunt; sanguis extractus niger erat; diluentibus, laxantibus, & leviter resolventibus brevi sanata fuit. In chronicis morbis non raro lienem flaccidum, facile digitis lacerabilem, observavit *Loesekius*. Ipse memini quod prætæto tubo aqua continuo pleno ad arrem splenicam, plus quam quindecim libras transfudi per lienem laceratum viri chronico morbo perempti, & nunquam potui eluere atrum humorem, qui continuo per lienem transfluxit.

13. *Hæmatemesis ab hepate* Dodon. obs. c. 26. Galen. de loc. affect. l. 5. cap. 5.

Aderat calor febris, sitis, lingue ariditas, urinx rubedo, subinde dolor in hypochondrio dextero; sublevabatur identidem aqua cichorii, acetosæ, intybi; sed languore revertente, cum citrino cutis colore, vomitus sanguinis cum abstitit.

A vomitu sanguinis nullum fere sanatum vidit *Dodonæus* præter paucas mulieres, in quibus supprella erant catamenia, nec unquam venæ sectiones adhibere licuit, propter summam agri debilitatem syncopalem. Qui convalescunt in ascitem facile delabuntur; unicum virum ex unico hæmatemesis insuleu servatum vidit, idque usu iterato abstinenti quomodocumque usurpati.

14. *Hæmatemesis a veneno*, Martigues Jour. de Med. Juill. 1751. A.

Ille accidit post horrendas convulsiones, aliaque symptomata, ab applicatione tabaci in diversis partibus ad scabiem sanandam. Caveant ergo qui succum nerii, plumbaginis, aliaque venena exstus adhibent adversus scabiem.

V. HÆMATURIA, ab *auro mingo*, & *alma* cruor; *Mitius sanguinens* Moron. Direct. & *Mitius cruentus* Sydenham, Juncker Tab. X., Frid. Hoffmanni II. 232.; *Orina di sangue* Italis, Gallis *Pissement de sang*.

Character est effluxus cruoris, vel urinx quasi cruentæ, vel feminis sanguinolenti ex urethra in viris & mulieribus.

Principium est vel in renibus, ureteribus, vesica, vel in vesiculis seminariis, vel deum in ipsamet urethra; *materiæ* est vel cruor merus, vel lotium sanguinolentum, vel urina rubredinem intensam adeptæ, vel semen cruentum.

1. *Hæmaturia spontanea*; *Mitius cruentus vermiciformis* VVincel. Ephem. Nat. Bur. *Lumbicorum mitius* Plater. l. 3. fol. 790.; *Mitius cruentus menstruus* Brassavoli, Com. *Mitius cruentus simplex seu spontaneus* Juncker. Tab. 10. in Aphor. 25. 4. C. P.

Est multus cruoris sinceræ a coegestione illius in renibus facta, & erronea. Institutur a natura hæc evacuatio ad plethoram tollendam.

Nullas dolor acutus in renibus præcedit, ut in violenta aut calculosa; senibus, plethoricis fa-

familiaris est; præcedente torpore corporis, molestia in vesica; si parca copia & lente delabatur, ille cruor in ureteribus vermiformem figuram adipiscitur, vermes illi aliquot lineas longi, calamoque angustiores fundum matule petunt; urina supernatans, aut in intervallis emissâ, citrina est; hæc vermiformia corpora vidi; sunt tubuli pellucida sero rubro pleni.

2. *Hæmaturia violenta ex vomitu Schenkii; ex alii usu Schenkii, ex equitatione Schenkii, lib. 3.; ex casu Amati, cent. 5.; Mictus cruentus violentus Juncker. A. B.*

Ea est quæ ex prægressa longiori equitatione, venatione, animi exandescencia, abusu cantharidum, diureticorum fortiorum, lapsu ex alto, ictibus lumbos contudentibus, similisque ortum ducit.

Celebris Medicus *Habnins*, qui commotionem in curru passus erat, profusam idem hæmaturiam per annum expertus est; is urinam & sanguinem in vesica concretum, non sine horridis cruciatibus, ejiciebat. Præscripsit *Ill. van Swieten* decoctum radicis symphiti & plantaginis pro potu, interposita subinde manna in sero lactis soluta; *Celeb. Hallerus* phlebotomiam, victum ex vegetabilibus, rheum tostum præstans diabetis remedium, lac serum lactis & emulsiones; *Clar. VVerleissius* phlebotomiam, kinkinam, aquas Spadanas, mannâ in sero lactis solutam, serum lactis pro potu, dictam lacteam, decoctum equiseti, injectiones in vesicam; at æger morbi reversionibus in aescitem incidit & obiit; *Tralles de Opil. sect. II. p. 34.*

Præcedunt lumbago, hypogastralgia, maxime dolor vesicæ ad grumos illos ejicientis.

Eorbaave pluries vidit hæmaturiam in infantibus, a fasciis & vestibus ætioribus oriundam.

Quadrupedia jumenta huic speciei sunt obnoxia, ob citatiorem progressum, & anora lumbis imposita. *Liger*.

In nephritide similis hæmaturia quandoque accedit.

3. *Hæmaturia deceptiva; ex ficibus opuntia, rubis idals. B. P.*

Cum primum Hispani appulere Americam, fame compulsi in ficibus opuntiz & cerei irruerunt, iisque liberaliter votati omnes postriede urinas, non cruentas, sed dilutas & rubras, minxerunt, ut hodie accidit ex succo rubello harum ficum, qui affectus periculo vacat hunc in ovibus excitat efus cissi laurifolia.

5. *Hæmaturia purulenta. Mictus cruentus ex renum ulcere VVitticchi conf. 51. pag. 362. C.*

Distinguitur ab aliis ex floccis purulentis urinz sanguinolentæ mixtis & signis prægressæ nephritidis suppuratæ.

5. *Hæmaturia calculosa Juncker. tab. 10. Mictus cruentus ex calculo renum Plater. lib. 3. fol. 385. 5.*

Gradi, consil. 67., Scholtzii, consil. 151.; *Sydenhami*, p. 566.; *Vide Nephralgiam calculosam. C. P.*

Si vero calculus sit in vesica, hæmaturia inde oriunda est diris symptomatis stupata ob vesicæ sensibilitate, unde facile distinguitur ab hæmaturia hemorrhoidali; adeit dysuria, pulsus frequens, obscurus. *Cyrolli Consil. T. I. p. 56. 350.*

6. *Hæmaturia in exanthematis. Mictus cruentus in variolis, morbillifus Sydenham. A. P.*

Mictus cruentus qui supervenit variolis, certissimum mortis præsagium. Unicus æger servatus memoratur in *Transact. philosoph. rom. 9.* Idem dictum esse de hæmaturia in petechia, purpura, miliari, &c.

a *Hæmaturia variolosa Vandermonde, an. 1756. pag. 158. Trans. Philos. n. 470. Pierce Dodd.*

Sæpe accidit hæc hæmaturia apud Anglos qui in variola vesicatorii utuntur, & tunc periculo vacat hic mictus sanguinis, qui si a virus variolosi energia tantum pendeat lethalis est sapius.

Fit vel per *diapedesim*, ut observat *D. Varnier*, & tunc pulsus est parvus, frequens, intermittens; æger cacoehymicus, frigidulus, debilis, conveniunt kinkina & nitrum in apozematiz, vel ex *Sydenhamo* limonata mineralis ex spiritu vitrioli ad gratam aciditatem in aqua cum saccharo; vel fit per *rixim*, quod cognoscitur ex violentia febris, pulsu pleno, frequenti, cum calore, robore, &c. Præscribitur Angli aquas acidulas pro potu, & camphoram. * *Ex Sydenhamo pag. 597. de febre putrida variolis confluentibus superveniente.*

Mictus sanguinis variolis confluentibus, potissimum nigris aut sanguineis supervenit, sub morbi initio pulsus nudum erumpentibus, aut alicubi sub cute latentibus; maculæ interim purpureæ hic illic superficiem corporis obident, tristem eventum interminantes.

Licet debita sanguinis contemperatio maculâs hujusmodi purpureas auferat, nihilominus hæmaturia, & hæmoptysis indubie mortem præparare solent; atque intensæ sanguinis inflammationi ac dissolutioni tribuendæ sunt.

Indicantur iraque remedia tum æstum temperantia, tum incrassandi vim habentia; quamobrem post unicam phlebotomiam liberalem paregoricum exhibeat, ut aquæ papaveris rheados unxæ duæ, laudanum liquidum guttæ quatuordecim pro adulto, acetæ distillati drachmæ tres; misce, fiat haustus. Deinde sequentia præscribantur; trochisci de terra lemina & bolo armena ana ancia una, terræ sigillatæ, lapidis hæmatitis, sanguinis draconis, & corallorum rubri scrupulus unus; misce, fiat pulvis, cujus capiat drachmam semissem tertia quaque hora, superbibendo pûsanam de radicibus symphiti, aut julapium ex aqua plantaginis, rosarum cinnamonum, quæ recipiant spiritum vitrioli ad gratam ac-

* Distinguitur cruor in urina, si lineum album immergatur; rubedine scilicet sanguinea tinctum apparebit; quod non fit, si rubedo urinz sit a lixiviali ejus diathesi. Præterea a cruore mixto urina opacitatem ostendit cum sedimento grumoso nigro; si vero rubedo sit a salibus, ea est cum pelluciditate & sedimento paucis, linearato, vel cinabarinis.

aciditatem; noctu vero emulsiões cum narcoticis necessariae sunt; finita vero sanguinis mictione aut expectoratione reliqua peragantur, ut in variola confluente convenit.

7. *Hæmaturia ejaculatoria* Philosoph. transact. n. 466. by D. Schlichting.

Est jeaculatoria eruenta loco seminis, quæ juvenibus venere effrazni repetito utentibus familiaris; sed etiam observata est in viro raro venere exercente, sed prius gonorrhœam experto; initio non mictus erat cruentus, sed sanguis erat jeaculatorio.

8. *Hæmaturia stillantis* Regner de Graaf. *Hæmorrhagia ex rene*.

Illa species ab aliis discrepat, quod cruor ex urethra, non vero ex vesica procedat, adeoque non mingitur, sed ut pus in gonorrhœa stillatim continuo ex urethra effluit.

9. *Hæmaturia hæmorrhoidalis* Cælii Aureliani lib. 4. *Mictus cruentus ex hæmorrhoidibus vesica* Juncker. Uratylav. tom. 1. Alia species *ex vesica, ejusque sphinctere* Frid. Hoffmanni, pag. 234. Altera quæ a *vasis sanguiferis varicosis urethra* dependet. Illa sensibus familiaris est, & facile periodica evadit, tuncque doloris & ischuriz experta est.

Illustriſſimus Franciæ Polemarcha, Dux de Bellisle, bellii Administrator, septuaginta quinque annos natus, animi contentionibus, curis assiduus exagitatus, sæpè stomachi turbas patitur, licet sobrie vivat; inde auriginosus evadit, & identidem sine dolore sanguinem mingit; alvum constipatam, & quandoque erythema in tibis experitur. Infantantur sanguinis spissitudo, siccitas, & acrimonia, in viro temperamenti biliosi, & vividij. Ex animi pathematis & curis turbatur digestio, inspiſſatur sanguis, & hæret in hepate, unde aurigo fugax, vas quoddam urethrae varicosum primo infultu hæmaturiz ischuriam induxit. Suavissimus juscula decem ex pullo, millefolio, & canero, dein ut purgaretur ætate ex aquæ Vallesii libris quinque; postea serum lactis bis per quindecim dies usurparet, interpositis quindecim jusculis ex pullo, telluridine & foliis plantaginis; autumnio sumatur bac alinum, æger exercitio corporis indulgeat, bis in die cibum sumat, a negotiis animum remittat.

10. *Hæmaturia spuria*. *Urina rubra* Sennert. lib. 3. part. 8. Frid. Hoffmanni. pag. 231.

Est mictus urinz intense rubræ & lateritiæ, quam tamen a cruenta distinguimus ratione sedimenti, quod grumofum est in cruenta, non in spuria; præterea in cruenta mictione urina limpida cruori supernat; æst in hac specie tota urina intense rubra est & limpida, excepto sedimento coloris incarnati. Observatur in ascite, dysenteria, triacophya ardente: urina lateritiæ est comes intermittebant febrium, ut quartana, Galen. ad Glaucon. c. 7. *De don. observ. c. 32.*

Urinam vero rubram, non cruentam, tamen sæpius observavi in scorbuticis, qui ex quartana convalescunt, monet Sennert. l. 3. de urina rubra.

Sauvages Nosologia Methodica. Tom. II.

Hoc vitium a piscium & crudorum usu redintegratur, & cibis stomachicis monente *Dodonæo* curatur; itaque a vinis albis, cerevisia abstinentum; vino Hispanico generoso, roborantibus, calefacientibus indulgendum.

Si coaguli cruoris putridi guttæ aliquot urinz sanæ adiciantur, urina colorem igneum adipiscitur, quod in febribus & scorbutis sæpius accidit: post horas duas apparet in hac mixtura nubecula qualis in urina cruda acutorum morborum, & desuper una alterave macula quasi oleosa similis spumæ quæ in urinis veterum scorbuticorum observatur.

a *Hæmaturia lateritiæ*. *Urina rubra* Sennert. ibid. *Urinæ brigueuræ, ronges*.

Sunt illæ quæ lateribus contritis tinctæ videntur, quæ quo pauciores sunt, eo magis ætiorum, quo vero copiosiores, eo colorem dilutionem obtinent.

Illæ urinz lateritiæ observantur simul & paucæ in ascite, & aliis morbis hydropicis, ut hydrothorace, anasarca & utrumque rubræ sunt, ut plurimum sine dolore & ardore.

Vel observantur in febribus intermitteñtibus potissimum in quartana, æque harum, si lateant, signum præbent optimum, eademque ac illæ febres remedia expostulant.

Non raro etiam comitantur morbos acutos summo ardore, sudoreque stipatos.

Tam discrepat autem curatio hujus hæmaturiz in acutis morbis a curatione hæmaturiz in chronicis, ut observante *Dodonæo* Cap. 32. a calidis medicaminibus intendatur rubedo urinz in acutis & curetur in chronicis. Qui ex quartana convalescunt, si indigestionem patiantur obpotum cerevitiz, ob crudorum esum, illi iterum, monente *Sennerto*, hæmaturiam lateritiæ incurrunt.

In pyrexia & febribus ardentibus acutis urinas lateritiæ diluunt potus aciduli, aquosi, iterari, emulsionati &c. qui in ascite & quartana nocuerent.

Deceptivas illas hæmaturias a veris, seu sanguineis distinguere quandoque difficile est; linteæ vero in urina tincti color facit apte huic distinctioni favet.

Urina turbida jumentorum dicitur ad piuriam proprius accedere.

11. *Hæmaturia nigra* Cap. 7. lib. 3. p. 7. *urina nigra* Sennert.

Sanguinis ætissimi mictu subito auriginosam fuisse sanam observavit *Marcell. Donatus*, *histor. mirabil. lib. 4. cap. 29.* Lienosum, cui vere & autumnio lien intumescerebat, cum dolore & facie sublivida seu *Meisistero* affectum, toties liberari solitum quoties per aliquot dies urinas atramento limiles fudisset, observavit *Valesius in Hollerium*.

In dysenteria maligna vidi urinas atras coloris caffè, cum alvinis excrementis concoloribus, per aliquot dies ejectiones, fetidasque, subsequente morte, æger autem fuerat hypochondriacus: Urinas non solum rubras & lateritiæ, sed etiam nigras in hydropis fundi docet *Sennertus*.

necius, & observant *Natura Curios.* Vide *Synopsis Ephemeridum Germanica*.

A *scabia* retropalsa urinas nigras emitti solitas, observant *Sennertus* & *Natura Curios.* Vide *Synopsis Ephemerid.* Frid. Hoffmann. II. 237.

Vidi & in puella pallida cuius ventriculus languebat, & male digerebat, urinas fulcas, quæ cathari & levibus stomachicis adhibitis evanuerunt. Nuper vero in puero anasarca affecto similes urinas critice emissas easque uberissimas cum morbi prioris levamine, vidi.

12. *Hæmaturia catamenialis*, Ill. Haller Comment. in Boerhaave 669. p. 89. L.

Ea est quæ quolibet mense supplet catamenia.

13. *Hæmaturia a transfusione*, Denys Collect. Acad. Tom. I. p. 129.

Ex quinquaginta animalibus quæ exceperet sanguinem alterius per transfusionem a D. Denys institutam, virginis hæmaturia laboravit, & in maniacio qui similem operationem passus erat, hæmaturia nigra feliciter aborta est.

14. *Hæmaturia traumatica*, Observatio 64. Medici. practica; a *nifu*, Jouin. de Med. Avril. 1761. D. Landeau A.

Lumbi hominis calce equi impetiti fuerant, illico libra sanguinis per vias urinæ effluxit: repetitis phlebotomiis non cessit mictus cruoris; præscripto succo urticæ cruor in vesica figebatur, unde ischuria, meteorismus, dyspnœa; balneis, emulsione, diureticis prorabatur mictus sanguinis, demum adstringentibus & diureticis interpolatis æger convaleuit.

15. *Hæmaturia a verme*, Ed. Barry Essais d'Edimbug. T. V. article 72.

Thomas Hutchius per quinquennium urinas sanguine tinctas mingere solitus erat, sedimento nigro intra dies singulas ad uncias duas ascendente, cæterum doloris expertus; quo plus bibebat, eo dilutiores erant urinæ, nec ab exercitio, diæta aut medicamentis ulla oriebatur mutatio; decantata omnia signa calculi, arenularum. Demum ob diuturnitatem illius hæmorrhagiæ debilitatus, œdematæ, ascire, lassitudine, aurigine, dyspnœa, inappetentia, siti immodica, amphimerina æger absumebatur.

Tunc emeticum & die sequenti mercurium dulcem, deinceps vero infusum anasum, pilulasque ex sapone, croco martis, gummi ammoniac, rheo, curcuma, kinkina &c. assumpsit, nec non elixirii viterioli guttas triginta quovis die præter aquas Pymoneanas. His præmissis eminxit vermiculum pollicis longitudine, anguillulæ similem, rubrum, oculis, oreque & annulis instructum, quo emissio sensim convaleuit.

VI. MENORRHAGIA; Etymon a *Græc* *mea* mensis, menstruum, & *rho* fluo, erumpo; *Catameniorum fluxus* immodicus Hippocr. Foelsi p. 567. *Almoræia* Dioscoridis; *Sanguinis stillicidium ab utero*, Ballonii; *Hæmorrhagia uterina*, Moroni Dircæ, Junker. Tab. 14.; *Lochia immodica* Juncker. pag. 991. Tab. 135. *Aphadros*, Dict. Univ. *Pertes de sang des femmes*. *Ægræ hæmorrhœia* vocantur in Evangelio S. Matthæi; Gallis *Hæmorrhœie*.

Character. Menorrhagia est fluxus sanguinis ex utero sæpius vel ex vagina morbosus & quantitate vel difficultate precans.

1. *Menorrhagia difficilis*; *Menstruatio difficilis*, *Menses cum molesta fluentes* Sennert. lib. 4. pag. 2. A. P.

Morbis est periodicus, singulis scilicet mensibus recurrens, puellis puberibus & non viro utentibus sacis familiaris, qui ante eruptionem mendum eas lumbagine, doloribus vagis hypogastrii, capitis, imo cardialgiis, vertigine, epilepticis insulsiis, aliisque symptomatibus illas cruciat, quæ etiam symptomata fluentibus catamenis perseverant.

Hic morbus afficit viragines plethoricas, sanguineas, libidinosas, & gravidatione ut plurimum curatur nec non semicupis. Huic affinis est, diversa tamen, apud annosas matres hystericalia catamenialis.

Adolescentulæ lotrici quoties imminerebant catamenia, toties superveniebant cardialgiæ; epilepsiæ paroxysmi; dein, erumpentibus catamenis nec interruptis, hæc symptomata aliquando perseverabant. Adhibita fuere diluentia iuscula, præsanæ ex floribus chamæmeli, pediluvia, fomenta emollientia, nec non semicupia tepida, e quibus, potissimum ultimis, multo pejus habuit. Tunc contugiebat Medicus D. Conlas ad *hyocyan* albi extractum, & uno grano sumpto vultus supervenit epilepsiæ accessus, nulla cardialgia; verum catamenia non fluxerunt. Cum autem experta esset ægra sub catamenia pluries prodixit dum flumen frigidum pedibus nudis ingressa fuerat, Medicus, arrepta indicatione, durante menstruationis labore totus ex aqua frigida abdomini & pubi applicandos præscripsit, & his rite succedentibus etiam semicupia frigida, ex quibus factum est ut catamenia prospere & ubertim effluerent.

2. *Menorrhagia illacina*; *Stillicidium mensesum* Aetii tetrabil. 9. sem. 4. cap. 63.

Est effluxus stillicitis, sed diuturnus & dolorificus, sanguinis menstrui; stipatur scilicet hystericalia & propter diuturnitatem ægram debilitat; hinc ægritudo, anxietas; differt a menorrhagia difficili quod non ex abrupto ubertim fluxe sanguinis, & intra tres vel quatuor dies cesset, verum stillicem per longum tempus effluit, quod valde incommodum.

3. *Menorrhagia immodica*. *Menses inordinati, invertebentes* Sennert. lib. 4. *fluxus mensesum nimius* Sen-

Sennert. de morbis Mulierum. *Hæmorrhagia uterina*. Junckeri tabul. 14. Tralles de opio. Tom. I. pag. 41.

Merito hæc menorrhagia dividitur in acutam & chronicam. In chronica prodest decoctum corticis aurantiorum subviticum, ob vim adstringentem pulpæ albæ; in quo serum candens extinguantur: valet etiam vini rubri aquati potus modicus, terra catechu alijs adstringentibus mixta, rhabarbarum tostum parva dosi diu usurpata; kinkina etiam a utulis laudatur; valent & aquæ Spadanæ ex fonte *Pouchon*, aliæque tonica corroborantia. Si immorica confestim tuerit menorrhagia, dissolve gypsi albi manipulos duos in solutione aquosa gummi Arabici; hæc cataplasma hypogastrio nudos per tres horas admovendum & iterandum, quod cataplasma nec hæret, nec induratur; In hoc morbo licet narcotica a *Kod. a Castro, Sennerto, Ettmulario* laudantur, ea respicit *Tralles*: verum si sint hysteriæ ligi. dolores, ut solemne est, ab iis ego nequam possum abstinere, nec inde crescit effluxus: omisso opio & borace pulvis Lindani adhiberi potest, quæ sit ex coralli, succini, boli Armenæ, sanguinis draconis, ana drachmis ij, seminum plantagin. a. drachma una, croci maris. scrup. j, syrupo de ros. siccis q. s. dosi drachma una, ter de die: hoc remedium innumeras mulieres restituisse se asserit. *Ill. Tralles*.

In acuta menorrhagia & profusa cum pulso forti & magno, quies animi & corporis, phlebotomia, portiones nitrate cum cremore tartari adhibenda; feri vero acetum; aliquando potus aquæ frigidæ spiritu vitrioli acdulatæ, aut infusum rosarum saturarum, aut emulsiones cum nitro & syrupo papaveris juvant: idem præstat effus. stercus. aluminum cum aceto, nec non epithema ex aqua, aceto, nitro saccharo saturati, imo intra vaginam linteum solutione vitrioli maris madidum adhibetur: Valet etiam intus indigo ad grana xij bis in die.

Juxta *Hamiltonum* & *Sepalium* sumantur cortices sex aurantiorum amarorum, bulliant in aquæ libris iij ad libras ij, colatura saccharo edulcorata sumatur ad cochlearia x ter in die. *Hoffmannus* mulieri gravi terrore percussa & inter lypothymias anxietatesque gravem menorrhagiam patienti antispasmodica feliciter præscribit, ex floribus chamæmelis, millefolii, croco, castoreo, camphora & assa foetida, ut systematis nervosi commotiones sedaret.

Quantitas ordinaria sanguinis menstrui est circiter unius libræ Medicæ in spatio quinque vel sex dierum, ita ut plures sint mulieres quæ per sex dies & forte plures intra singulis diebus uncias duas, quam quæ intra id temporis spatium non semi-unciam effundant; hic effluxus noctu sæpius ingruit, antecedit gravitas corporis, anxietas, ægritudo, cephalalgia, sensibilitas, difficultas catharticoorum tolerantia, ita ut his assumptis valde roquerentur, sebrant, nauseant, & cum modicus est effluxus quoties quantitas emissæ

ea est quam vires sensibilibus imminuat, adeoque est in ratione quantitatis realis emissæ & debilitatis nativæ mulieris; quantitas emissæ est æstimanda ex profluvio quotidiano, & ex numero dierum per quos perseverat, seu ex copia quotidiana, ex diuturnitate & ex recursum frequentia.

Menorrhagia immorica sæpius accidit mulieribus ea ætate qua catamenia brevi valedictura sunt; quovis mense sensum uberius ea fluunt accedit pallor, pervigilium, alibentia, anorexia; & successu temporis phlegmatia; raro mulieres syncope ob menorrhagiam extinguntur, sed in phlegmatiam aut ascitem delapsum dein satoc succumbunt: sanguinis vel est vividus & purus vel cænosus & maculas rubras amplo sero circumdant in linteo notat; in utroque tamen casu phlegmatia supervenit.

Therapeia hujus morbi diversa est pro periculi urgentia. Si enim a profluvio sanguinis metus sit ne cardialgia, syncopeque superveniant, sistendus est ille fluxus per adstringentia, ut decoctum burse pastoris, geranii robertiani, radicum tormentillæ, bistortæ, vel per succum urticæ, infusum rosarum rubrarum, aquam Rabel ad gratam aciditatem aquæ potandæ aditam, imo possunt usurpari pilule Helvetii ex sanguine draconis & alumine. Vidi casus in quibus ob nauseam & cardialgiam urgentem viribus adhuc stantibus, ipecacuanhæ dosi vomitionem feliciter excitavit, saburram ejecit, & ipsa diæ fluxus cruciatus evanuit.

Si vero periculum non imminuat, sed phlegmatia accedat, & chronici faciem morbus induat: tunc ab adstringentibus abstinendum puto, ut saltem mitioribus utendum, ut decocto radicis symphiti; sed acrimonia sanguinis est contemperanda, licet phlegmatia contrarium suadere videatur; novi plures quæ ab hoc morbo se liberarunt usu diluentium, demulcentiumque & potissimum lactis: inter demulcentia, juscula ex pullo juniori primas tenent; pro re nata illis stomachica admiscenda sunt, ut flores chamæmeli; stomachi enim functiones in hoc casu sæpe languent, dum acrimonia humorum ex pervigilio, pruritu vaginæ, & temperamento mulieris calido designatur; cathartica vitanda sunt, quia catamenia promoveant, & vires detrahunt, aut parce sunt adhibenda, eaque mitia; denum lac caprinum vel vaccinum diutissime usurpandum, quod aliquoties in ipsa phlegmatia cum metu acicis præscripti, unde mulieres restitute sunt.

Cortices aurantiorum amarorum sex bulliant in aquæ libris iij ad lib. ij: colatura saccharo edulcoretur: dosi sit cochlear. x ter in die. *Hamilton*.

Mulieris Judææ gravi terrore percussa, & inter lypothymias, palpitationes, anxietates, gravem menorrhagiam patienti antispasmodica feliciter præscribit *Hoffmannus* ex floribus chamæmeli, millefolii, croco, castoreo, camphora, & assa.

& alia scitida ut systematis nervosi commotiones sedaret.

4. *Menorrhagia erronea; Mensium per aliena loca excretio*, Scnneri. de morbis mulier. cap. 15.

Menses ex oculis fluentes, Dodonzi observ. cap. v5; Lud. Mercat. cap. 7; de mulierum morbis; Boerhaave Aphor.

ex maribus, Bravvol. ad Aphor. 33. Sect. V. Parzi Lib. XXV. cap. 12.

ex alveolo dentis, Roussel de hominis primordiis cap. 28.

ex auribus, Bravvol. ad Aphor. 25. Sect. IV.

ex mammarum papillis, Amati Cens. II. cur. 21. Parzi Lib. 23. cap. 51. Cordaz Comment. in lib. Hippocratis de morb. mulier.

ex venter, Hippocrat. de morb. mul. 1. Aretzi lib. II. cap. 2. Benivenii cap. 4. de abortus causis.

per intestina, Galen. in 35. Aphor. S. V.

ex pedice, Parzi Lib. 23. cap. 12.

per urinam, Bravvol. in Aphor. 35. S. V.

ex umbilico, Nicolai Florentin. Sem. 2. capit. 8.

ex digito, Mercat. de mulier. affect. l. 1. cap. 7.

ex cute, Haller Comment. 667. p. 87. L. P.

4. *Menorrhagia ab hysteroceli* Mauriceau de morbis puerperarum, cap. 6. lib. 3. Heisteri Chirurg. de uteri prolapsu 157. L. P.

Symptomata sunt, 1. sensus ponderis in pelvi; 2. difficultas mingendi, seu stranguria; 3. lumbago gravissima versus ligamentum lata; 4. fluxus uunc cruentus, nunc leucorrhoeicus copiosus ex vagina; 5. moles carnea cruentata ex vagina prolapsa. Vide iconas apud Heisterum.

Alia est hysterocela imperfecta, Galii *Descende de matrice*, in qua uterus extra vaginam non elabatur; alia est perfecta, Galii *abute de matrice*, in qua extra vaginam uterus elabatur.

Hysterocelam mentitur prolapsus vaginæ, & in hysterocelo uterus est vel inversus, vel non inversus; non inverso utero orificio ejus intima parte apparet, nullum vero foramen in inverso; hysterocelo simplex dignoscitur a vaginæ prolapsu ex altitudine ad quam stylus per foramen immisus pervenit, quæ major est, si sola vagina prolapsatur, & semipedem attingit, multo minor si solus uterus; in virginibus nunquam hysterocelo inversa datur, quæ puerperis tantum accedit brevi post partum.

In polypo vaginæ nullus datur effluxus, nulla lumbago; menorrhagia ab hysterocelo quandoque est ita abundans, ut per plures menses perseveret, æque copiosa quam uberrima catamenia. Vidi virginem religiosam quæ hysterocelam a leucorrhoea contraxerat, in qua per duos annos quovis mense fluebat cruor, exceptis octo diebus, quibus mucus lymphaticus tantum extillabat; hic vero effluxus ex ima parte hujus molis pyriformis pendule, seu ex orificio uteri extillabat; aderant lumbago, progrediendi difficultas, & a sanguifluxu debilitas; uterus in læto cruibis erectis faci-

le restituitur, nisi recens sit prolapsus, & uterus inflammatus, ac turgidus.

Curatio consistit in prompta repositione uteri; frustra etenim phlebotomia, adstringentia extus vel intus adhiberentur ad hanc menorrhagiam cohibendam; illa quidem singulis menibus quoddam inducias dare possent, verum singulis menibus etiam reverteretur, & quæ copiosior & diuturnior quam in catamenis.

Repositionem sequi debet retentio, quam juvat situs supinus per seminehem, pessarium commodum ex subere cerato annuli instar aperto, vel subtriangulari, argenteo, buxo; laudatur etiam pessarium Anglicum, cujus descriptio & icon traditur *Essai d'indolence tom. 3. tab. V.* juvat etiam sponsia noctu gestanda liquore saturni, vel decocto verbasci in vino madida, item aqua fabrorum ferrariorum injecta, & similia; sed repositio debet prius institui.

6. *Menorrhagia gravidarum; Hemorrhagia uteri* Heisteri Chirurg. cap. 154. vulgo *Blessure; Parties rouges de sang*, Mauriceau. A.

Si hæmorrhagia uterina gravidæ terminum nondum attingenti superveniat ob plenioram, febrem, lapsum, animi commotionem, &c. metus est ne abortiat, quod ut vitetur, præscribenda est phlebotomia, victus refrigerans, & quies corporis ac animi; hæc sufficiunt ad sustinendam hæmorrhagiam quæ primis graviditatis mensibus supervenit.

Si vero menorrhagia perseveret, leniter diducendum est uteri orificium immisissis digitis obstericis, lacerandæ sunt chorii membranæ, ut exitus præbeatur aquis in eo contentis, quo facto romina partus intendi consueverunt, & contrafacto uteri menorrhagiam sistit expulso foetu, observante D. Puzos *Mém. de l'Acad. de Chirurg. Tom. 1.*

Consultatur Mauriceau *des maladies des femmes grosses observat. 49. & Heister. Chirurg. cap. 154. part. 1.* Si invitis auxiliis diæreticis hæmorrhagia intendatur quocumque graviditatis mense, Chirurgus non potest gravidam mori eripere, nisi immissa leniter manu intra uterum foetus pedesprehendat, & cum foras educat cum placenta; sic enim liberatus uterus & sponte contractus vasorum sanguinem fundentium officina præcludet, ut multis exemplis confirmat Mauriceau; est in illa praxi dimidia pars puerperarum paulo post partum moritur, observante Puzos p. 330. *Traité des Accouchemens.*

Aliæ sunt menorrhagiæ trium primorum mensium graviditatis, aliæ vero trium posterio- rum.

Primis graviditatis mensibus principium menorrhagiæ est abortus, vel placenta post abortum superstes in utero, falsa germina expulsi- oni proxima, successfuli foetus a vi externa. Menorrhagia in abortu mediocrius est, cum solo foetu liberatur uterus; alii copiosa, cum placentam ex abortu superstitem expellit. Sæpe placentam in hoc casu foras ducere impossibile est prop-

ter funiculi debilitatem, torminum uteri tarditatem, orificii uteri angustiam; hæc si undique adhaereat utero, nullam; si hifcat, copiosam; si omnino evulsa uteri confidionem permittat, exigam ciet menorrhagiam; ea fors amandata vi naturæ, vel artis menorrhagia fiftitur; verum cum non potest avelli, atque cessat hæmorrhagia & dyftocia, relinquenda est in utero ubi putrefcet, & frustillatione dein effluet.

Menorrhagia quæ a dyftocia falsi germinis dependet, licet quandoque uberrima fit, & terribilis, rarissime lethalis est: hæc nec phlebotomia, nec adstringentia minuunt, necessum est ut orificium uteri excidat, vel quod melius, ut ex utero gemen emittatur; vires cibo convenienti sustinendæ, opus naturæ potissimum est committendum; si vero attingi queat saluum gemen, fors extrahendum est.

Menorrhagiæ, quæ sub graviditatis finem accedunt, pendente a debilitate placenæ; cum hæc menorrhagia est stipata doloribus, debilitate, syncopica, & simul uteri hiatus, partus proritandus est, imo invertendus fœtus, & a pedibus extrahendus, ut docet *Mauriceau*, quod tamen summo vitæ matris periculo rartum fit.

Si vero minus urgeat menorrhagia, fortisque debitum situm obtineat, maxime vero si non hiet uterum, ad parvum coactum properandum non est, sed phlebotomia est adhibenda, alimentis eupeptis parca copia utendum, lectulo constanter est incumbendum, clysmata injicienda, si alvus ægre laxetur; si menorrhagia revertatur, vel his auxiliis non cedat, grumique sanguinis hysteralgias, syncopesve accedant, dira partus provocandi urget necessitas, nec soli naturæ res est committenda; & quoniam tormina languent, ea proritanda sunt, digitis intra orificium immisiss & diductis, identidem opus remittendo, & conatus naturæ expectando; paulo quidem tardius accidet partus ea methodo, sed non invertitur fœtus, nec tandem post partum permanet menorrhagia, ac in partu coacto, seu fœtus extractione; quippe uterus ea ratione contrahitur qua fœtus extroscum procedit; ruptis etiam digitæ membranæ, imminuitur volumen, uterum sensum coarctatur, quod non accidet juxta *Pauz* cum subito fœtus extrahitur. Felices gravidæ quæ peritum in his obstericium virum habent.

In menorrhagia vulgo datur pulsus uterinus, id est irregularibus ac subsaltantibus pulsationibus notatus, initio fortior & magis renitens, quam alii pulsus critici, accedens ad pulsum ex quo hæmorrhagia narium designatur, seu dictorum. Hæc *Blasius de Borden*; mihi vero hæc pulsuum differentias in hoc morbo distinguere non datum est.

7. Menorrhagia decolor; *Menfes visiosi* Sennert. de morbis mulier. cap. 8.; *Humida intemperies uteri* Sennert. de morb. mulier. Menorrhagia ex emarissis; *Gæmorrhoides uteri* Sennert. l. 4. p. 1. cap. 7. C.

7. Menorrhagia lochialis; *Lochia cathartica* Grauv. *Sauvages Nosologia Methodica*. Tom. II.

cis; *Puerperla* Latinis; *Lochia* Sennert. *Nimius sanguinis post partum effluxus* Sennert. de morb. puerperarum, *Mauriceau* capitul. 5. *Vuldanget* Gallis.

Statim a partu hæmorrhagia uterina est copiosior quam decet, live quia crassiores fœtum mulier perierit, unde partus difficilior, vasa uteri magis potula, conatus vehementiores fuerunt, vel quia mulier nimis plethorica; vel quia frustra placenæ in utero remanserunt; hæmorrhagia identidem remittitur, quæ cruor in utero colligitur, congruatur, & serum tantum dimittit; verum dein tormina ad excernendos grumos eo diutiora sunt, & purus putulque cruor iterum cum grumis evacuat.

Periculum est præsens, si ea sit menorrhagia quæ vires infringat; tunc autem si placenæ frustra remanserint in utero, ea sunt manu obstericis quantocius educenda, puerpera iusculis, oviv, panacellis vescatur; supina jaceat, calorem lumborum avertat, stramini, vel corio incumbat *marochino* dicto, si pulsus vegetus sit, sanguis e brachio mittatur, ejus fervor pitam, emulsionibus temperetur, subacidis potibus utatur, lumbi linteo oxycrato frigido intincto involvantur, necnon foliis centinodæ; profuit cum facies & status abdomen distendebant clysmata laxante esse evacuaræ; quies animi & corporis omnino servanda; demum si fluxus persistat, injectiones & potus adstringentes usurpare convenit.

Illico a partu purus putus cruor effluit ex utero, qui statim fluxilis nulla tormina creat; mox congruatur in ipso uteri ostio, tormina excitat per tres primos dies sæpius perseverantia, primiparis multo minora; tertio, vel quarto die febris lactea accedit, & hysteralgia lochialis pari passu recedit; interea uteri textus lacteo cruore liberatur, unde fit ut subsequen- tibus diebus lochia odore subacido nates feriant; & diluitoria sensim evadant; ea in rusticis septimana una, vel altera, apud nobiles tribus vel quatuor terminantur.

9. Menorrhagia ulcrosa, III. van Svioten Aphor. 499. *Traites de Opio* cap. 1. pag. 54. C.

Ea est quæ ex uteri ulcere scirrhoso, carcinomate, cum leucorrhœa ulcerosa, quandoque supervenit, antecedentibus non raro dolore fixo pubis, lumbagine, hysteralgia & effluxu ichoris saniosi ex pudendis. Confert spiritus vitrioli vel aqua Rabel ad gratam aciditatem a- quæ inmixta.

VII. ABORTUS; Græcis *Amblisimos*, *Amblasis*, *Eðresmos*, *Phora*. *Apophora*; Latinis *Abortus*, *Effluxio*, *Depeditio*; Gallis *Blessure*, *faux germe*, *accouchement prématuré*, *Avortement*.

Est fœtus nondum vitalis ex utero exclusio. Immatrus, sed nondum vitalis est fœtus qui sepe- minum saltem vitæ suæ conceptione mensem non attingit; aut si attingit, debilior est quam ut eo tempore exclusus extra uterum vivere queat.

Quicumque valent placenta ab utero delere, aut foetum eiaculare, ea omnia naturam stimulant ad foetum, tanquam ponderis inutilis; vel noxii & cito putrescentis, eliminationem; ea autem sunt interna, externave, vitia matris, aut foetus ipsius.

Symptomata abortus sunt menorrhagia abortiva, rigor & horror cum aestu volapico, inappetentia, nausea; accedit lassitudo, lumbago, palpitatio, leiporhymia, syncope, mæstitia continua, hyfteralgia gravativa ad inguina, frigus genitalium, tenesmus, uteri nonatus, conspicuus quandoque ejus tumor in hypogastrio, mammae tum subita extenuatio, flacciditas, cum galactirrea serosa; accedunt proxime hyfteralgia spasmodica, tenesmus acrior; menorrhagia crescit cum leiporhymia, ac syncope, extremorum frigus, mentis dejectione, æstus & rigor alternant, cephalalgia, hypogastrii delapsus, demum aquarum amnii, & foetus ipsius dudum immobilis exclusio.

Ut præcavatur abortus, vitanda sunt principia ejus quæ ideo cognoscenda; scilicet t. violentia quævis aut animi, ut ex terrore, ira; hinc frequenter accidit a terzæ moru, in obsessis urtribus, &c. aut corporis, ut saltus, conatus, vomitus, epilepsis insultus, diarrhoea, dysenteria, tenesmus, coitus frequens: hinc abortus primis graviditatis mensibus non infrequens recens nuptis veneris avidioribus. 2. Venena, sive *ermenagoga*, ut adhatoda quæ Zellæenses, sabina quæ cortia apud Europæos utuntur; semen aqueile; myrrhæ, absinthium, castoreum; sive *embarica* & emetica, quæ succutiendo uterum, aut foetum pabulo suo frustrantia, eam eicant. Plethora quæ catamenia promovet, & cognoscitur ex capiepleno, faciei rubore, dyspnæa; plures autem mulieres ab hoc principio abortiunt, nisi identidem phlebotomiam admittant, maxime quæ durante graviditate voraciores & otiosiores, sunt Plethora commota in febribus acutis & pyrexiiis, necnon in usu hydrargyroseos fortioris etiam abortum excitat; unde Hippocrates dixit mulierem gravidam acuto morbo corripri lethale. 4. Foetus vitio sit abortus, si foetus moriatur, sive pabulo defraudatus, sive funiculo circa collum ligatus, demum quovis modo mortem obeat; mortuo autem foetu, nullus motus saltem spontaneus in utero præstetur, sed moles ponderis proprio versus decliviores locum inclinat. Vide signa foetus mortui apud Auctores 3. Vitio matris abortus accidit, si uterus sit scirrhusosus, ulcerosus; si mater syphilitide laboret, quod etiam suspicamus ex repetito abortu, foetus circa ultimos menses tunc eduntur in lucem luridi, patres; hæc causa non rara est, acque hydrargyrosi curatur; deinceps enim graviditates feliciter succedunt, cum virus syphiliticum ablatum est.

1. Abortus effluxio: *blasse*; *faux germe*.

Est exclusio foetus intra primum a conceptione mensem; vulgo illi abortus sine notabi-

li dolore, & cum modica menorrhagia sunt; sæpius diversis vicibus nunc embryonem, dein membranas, alias vero placenta natura expellit; quandoque tamen oviforme corpus pellucidum, foetum verisimiliter includens, simul emittitur.

a Abortus subtrimestris, *Avortement*. A.

Proprie dicitur abortus, si a primo ad quartum graviditatis mensem accidat foetus exclusio; quo serior est & quadrimestri proximior, eo pejor. Principia ejus sunt interna, vel externa. Interna sunt mors foetus, vel vitiosa crasis sanguis materni, ut syphilis. Externa sunt placenta hians ob ictus, lapsus, vehementes conatus matris.

Cum mors foetus a principiis internis dependet, abortum antecedunt menorrhagie interpollatæ, iu quarum intervallis datur leucorrhœa serosa, nigrescens: hos effluxus nec quies, nec phlebotomie exhauriunt; gravis hyfteralgia periodicas patietur, cum anorexia & æsthenia, quæ symptomata mensem & ultra ante abortum permanent; tunc dolores partus incrementum, menorrhagia redintegratur, aque amni elabuntur, & postea foetus mortuus lividus, inodorus facile eliminatur; si placenta non eliminetur, illa nec funiculo debiliore tuto extrahi, nec digitis in uterum parum huiusmodi immitti potest; expectandum est donec cum expellatur natura, excitatis aliquando torminibus vividis cum menorrhagia; aliquando vero putredine, demum excitata, tabis specie evacuat placenta.

Si tormina & menorrhagia, quæ placenta separationem ab utero incitant, non sufficiant ad liberandum mulierem, obstrictrix digitis duobus immittitur potest eam abripere & extrahere, matre suos conatus sustinente. Si vero embryone elapso, nec gravis menorrhagia, nec dolores succedant, sed sequatur leucorrhœa serosa, brunnea, dein cadaverosi odoris, tunc placenta iam frustula putrida delapsa est. Hic effluxus quandoque mensem transgreditur cum febre irregulari; anorexia & anxietate puerperæ, cui succurimus usu amarorum, juscultorum ex plantis vulnerariis, imo kinkin, si erraticæ febres accesserit; de cætero sugienda ammenagoga, opus naturæ committendum, quod tuto fati, licet sero, exequetur; quo facto cessat leucorrhœa sætida & uteri os clauditur.

b Abortus subtrimestris; *accouchement prématuré*. A.

Est ille qui a quarto graviditatis mense ad septimum accidit.

Hic excitatur a matris debilitate nativa, vel uteri laxitate, non raro determinatur ab ictu, casu, terrore, febre, morbo acuto, vel etiam syphilitide; foetus minime vitalis sunt, adeoque solius matris ratio habenda est; funiculus satis resistit, ut hujus ope extrahi possit placenta, & os uteri satis hiat, ut obstrictrix manum admittat.

c Abortus octimestris; *Couches précoces*. A.

Est

Est exclusio fœtus sex septimanis, vel mense ante consuetum terminum.

Recens natus languet & non crescit, nisi cum ætatem, qua nasci debuerat, attigit, imo in ætatem ea die moritur, qua nasci debuisset. Summa horum fœtum cura habenda est, lin- teis gossypio munitis obvolvendi, sunt, non vero fasciis; nutritrix ab octo, decemve diebus cuncta eligenda est.

2. *Abortus ab uteri laxitate* Boerhaave Consult. 15. A.

Cognoscitur ex debilitate constitutionis generalis, & ex violentiis, quas uterus sæpe perpeffus est, a partu multiplici, ab obstericis imperitia, a plethora prægressa, quæ vasa uteri debilitavit, a juventibus & lædentibus.

Mulier 35. annos nata, quæ duodecies intra octo annos abortierat, fœtus successively magis immaturos excludens, incassum tentatis Balaionisbibus balneis, balnea frigida per sesquiannum adhibuit, exiguo cum successu; huic Boerhaave sequentia remedia præcepit dum gravida non esset: 1. purgans adstringens; lene ex infuso myrobalanorum & rhei, cum pauxillo manne & syrapi de cichorio compoſito per quinque dies successivos; vespere vero cardiacum ex aqua stillatitia corticis citri unc. duabus, spiritus vini Mattheoli drach. 1. tincturæ opii gutt. x. fuccini gutt. xv: victus interea sit ex vegetantibus, jura carniæ, ex lacte; sexto die hora ante jentaculum, prandium & cenam, sumat pilulas tres, scilicet catechu, drach. 11., cortic. granat. drach. 1.; mastiche drach. 1. & sem. fuccini præpar. drach. 1.; terebinth. gutt. vi. olei stillatit. cinnamom. gutt. viii., misce, fiant pilule singulæ granor. 111.

Superbibatur vero vinum medicatum ex infuso cortic. cappar. cinnamom. tamarisci, ligni agallochi, fœneci: cistini, lapid. hæmatit. simaturæ matris, mæceris, nucis moschatæ, radic. lapathi acuti, semin. quatuor, calidum minorum; pulvis tenuis infundatur in vini rhenani libris sex.

In his perseverandum toto gestationis tempore, corpus moderate exercendum, victus sit ex iis quæ arident.

ORDO SECUNDUS.

ALVIFLUXUS.

Rhodus Hippocratis; Fluxus ventris Celsi: Profluvia alvi Foresti.

Primæ via dicuntur apud Medicos canales continui, qui ab ore ad anum extenduntur; œsophagus scilicet stomacho terminatus intestinum tenue ileon olim dictum, cæco terminatum, quasi exiguo ventriculo & intestinum crassum Longano *Calic Aureliani*, & Colon Græc. dictum, quod *Marsupio* extremi recti terminatur.

Ille canalis ita est dispositus, ut alimenta possit ingerere & dirigere, verum etiam vitiosa ingesta aut excrementa commodiori via egerere, & sanguinem ab omnibus recrementis huc affluentibus, si vitiosa evaserint, expurgare; maxima proinde sensibilitate & mobilitate præditus est, ut sensu consulo, quæ displicent, vel nocitura sunt percipiunt, ea tum ano, id est sursum per os, tum cato, id est deorsum per pedicem eliminat. Sic in ore contenta quæ placent deglutimus, mastucamus, gustamus, quæ displicent nauseamus, expuimus, excreamus velut injiti & infici.

Hinc alvifluxum alij sunt *anacretes*, ut vomitus, nausææ alij *cæterlei Galeo* dicti, quibus per inferiora alvus expurgatur, ut diarrhœa; pulsus intermittens præfigit alvifluxus per inferiora; intermissiones sunt omnino inordinatæ, post duas treves pulsationes satis æquales & pleniusculas, succedunt totidem minores, promptiores, quasi subintrantes.

Nullum corpus e loco movetur, nisi excessu virium ipsum urgentium, supra vires quibus resistit, & in loco retinetur; si cum Veteribus vires quibus contenta in sua sede retinentur, & suæ expulsionis resistunt, vocemus *retentrices*, & eas quibus exteriorum urgentur *expultrices*, evidens est quod ad evacuationem absolute necessarium sit, ut vires retentrices superentur ab expultricibus quo posito impossibile est non fieri evacuationem, & quo sublata ea nequaquam fieri possit; ille exitum virium est itaque evacuationis cuiusvis causæ pathologica.

Resistunt vero contenta in alvo 1. mole sua; sic major ventriculi conatus requiritur ad tres libras alimentorum evacuandas quam ad libram. 2. Resistunt adhesionem suam seu viscositatem qua solidis agglutinantur, sic phlegmata amygdalis adherentia difficilius excreamus quam salivam. 3. Resistunt gravitate sua, seu directione gravitatis; sic stante corpore vomitus difficilior est quam eo procumbente; et contra mictus & parvus faciliores sunt. 4. Resistunt receptacula & spincteres si contentorum corporum diametere sit minor diametro nativa orificiorum, nec nisi adhibitis viribus contenta in minores molculas possint dividi; sic scybala quæ paulo majora sunt diametro pedicis resistunt dejectioni alvi, in ratione virium quæ debent adhiberi, ut spincteres fibræ elongentur, & ut scybala dividantur seu defringantur. 5. Resistunt fluidorum quæ diversis viribus propellantur, crescent in ratione earum virium; sic quadruplo magis resistit urina quæ duplo majori velocitate expellitur e vesica, quam quæ solita velocitate mingitur.

Hinc patet vires retentrices crescere 1. ex parte contentorum, ratione inertitæ, seu molis inmovendæ, ratione adhesionis, & ratione gravitatis, etiam si contenta sint fluida; eas vero, alterius crescere 2. ratione duriciæ si distinguantur ab hoc ut excreantur, ratione positæ,

se fecit transversum orificio uteri oblatum magis resistit quam si caput directe huic orificio offerat: denum receptacula resistere si angustiora sint, tum ratione roboris quo spiritus clauduntur, convelluntur, tum ratione elasticitatis & duritiei fibrarum, quae sola elasticitate veniuntur.

Vires vero expultrices solum resident in musculis receptacula ambientibus aut constitutis; omnis enim motus animalis per vires musculorum exercetur; sic intestinum componit partim tunica musculari, quae ex fibris annularibus confecta tubum illum coarctat, & contenta sursum, deorsumve expimit, & tunica musculari quae ex longitudinalibus fibris composita, eam tubum decurtat, ejusque cavum tantundem minuit; his viribus conjunctis materies contentae comprimuntur, & qua data porta exprimuntur; hisce viribus auxiliantur musculi abdominales & diaphragma, quae pressionem intendunt, & sub prelo viscera alvina costringunt quoque versum aequaliter: illae vero vires pressivae sunt, non expulsiuae, nisi determinata accedat directio; sic si annuli musculares intestini successive contrahantur a pyloro versus podicem, si musculi abdominales deorsum urgeant, materies per inferiorem trahuntur; si vero contraria sit visum directio, ad superiorem pelluntur; ad vires itaque expultrices requiritur pressio & determinata directio. Nomen itaque illud non est superfluum nec ridiculum, ut praemature iudicio praenuntiaverant Neoterici, Veterum contemptores.

Si morbos iuste ordinis universum respiciamus, eorum causa est conatus naturae ad eliminandas materias a primis viis. Conatus est applicatio virium eo fine, ut superetur quaedam resistencia, adeoque conatus involvit virium directionem & majorem impensam; impensa tamen virium non est semper absolute major, ad hoc ut conatus si morbosus, & virium potentia motricis imminutionem, adeoque lassitudinem inserat.

Conatus sunt vel violenti vel spontanei; in statu sano conatus non plus impendunt virium quam passus & somno quotidiano possunt reficiri; illique sunt vel parvi vel magni: in statu morbooso viribus potentia motricis majorem partem absorbunt, quam quae passus & somno quotidiano reparari queat. In agone mortis conatus violenti quidem sunt, sed tamen debiles.

Difficilis dicitur motus ille ad quem exerendum majores superandae sunt resistenciae, & motor minoribus viribus praeditus est. Difficultas itaque actionis est in ratione resistenciae superandae, & debilitatis ejus qui eam superare contendit; ita ut eadem actio quae sano & robusto facilis est, aegro debilitato sit difficilis.

Alii, alvifluxus magnam, alii vero parvam difficultatem involvant; parva est difficultas ejusmodi in diarrhoea serosa, ita ut nulla videatur magna in dysenteria & teneismo; unde dysenteria a Veneribus difficultas intestinorum vocatur.

Magnitudo morbi hujusce ordinis estimanda est non solum a solito majore egestorum copia, sed etiam a difficultate egestionis, quae virium exsolutionem & molestiam difficultati ac debilitati proportionalem excitat.

Principia alvifluxuum sunt quaecumque vim expultricem irritant, ut omnes antiqui Medici pronuntiantur; falsi vero sunt tum Mechanicorum, tum Chymicorum hac de re conceptus plurimi. Sola obvia cuique observantia sufficit ad haec principia intelligenda; quidquid molestum in ore perferuntur, illud naturaliter expellimus, quidquid gratum retinemus vel deglutimus.

Eadem saliva quae silenti molesta non est, loquelam incutiens molesta est, unde qui sermonem adoriuntur eam prius expuunt, ut organa loquelae sint expeditiora; nec tamen opus est ut eum finem clare intelligant ad hoc ut expuant. Sputatores melancholici ob pravam morem susceptum salivam velint, nolint, & non cogitantes excreant, licet ea nec acrior sit, nec quantitate peccet, nec organa male se habeant. Errant itaque illi Mechanici qui ex actione gravitatis salivae, vel ex ejus acrimonia vellens ejus expulsiorem mechanice, ut ajunt, deducere, cum molestia seu averfatio ex quadam perceptione confusa oriunda sit. Supermechanica molestia non semper secum involvit dolorem, nisi hoc nomine pruritus & ipsa voluptas intelligatur; in sagriasi semen, in teneismo mucus alvi cum sensu molestia, simul & voluptatis ejicitur, in nausea cum sensu abdominationis; aut si quando dolor conatus excretorios comitetur, jucundus quidam sensus sacram evacuationem sequitur, & quaedam cupiditas comitatur; cupiditas dico, non voluntas; nec enim in teneismo voluntas est, sed deijcendi dira cupiditas, eaque insatiabilis.

Quidquid irritat, illud monet vel sollicitat ad agendum; non solum pondere, acrimonia, punctura, potest irritari ventriculus ad vomendum, sed & sola memoriae objecti abdominationis, ut cadaveris putridi, ejusmodi mentio facta fuerit apud delicatulas mulieres; a diversis pathematibus diversae evacuationes excitari notum est omnibus. Qui prima vice concionaturi sunt, paulo ante alvum exonerare coguntur; sunt quibus terror diarrhoeam incutit; ex ira plures mulieres copiosam urinae limpidae fluxum patiuntur; ex metu summo sudor frigidus; ex commiseratione lachrymarum proventus cietur; initio magnorum morborum, ut fracturae cranii, febris putrida, natura gravi pathemate commota alvum ano vel ceto exonerat, ut tempestate ingruente nave nimis onustam navem scissis in mare projectis liberant; horum causam mechanicam inquirent Mechanices peritiores, finalem praevivisse nobis sufficit.

Praxis. Causam nisi quae auserat, is frustra morbum debellare voluerit, adeoque scopus principis est vires expultrices irritatas sedare, retentrices reparare, ac potentiam seu facultatem.

tatem vialem interea sustinere; sic enim restituetur debita intra illarum virium actiones æquilibrium.

Verum distinguendum est prius an principium morbi sit irritatio vis expultricis, an retentrix, quod rursum est, debilius.

Vires expultrices esse irritatas & adauscas, cognoscimus ex conatibus, doloribusque evacuationem concomitantibus, & ex indole materie morbosæ, ac subjecti ægritantis robore, ætate, sensibilitate, & constitutione; sic in dysenteria, tenesmo, sunt conatus ad egerendum; sunt dolores, calores, tensiones partium; sunt acrimonia excretorum, quæ indicant intestina esse valde irritata, phlogosi affecta, spasmodice exagitata, continuo vellicata a pravis, corrosivis aut acerbis humoribus, quos vel alimenta, venenæ ingestæ suppeditant, vel quos sanguis in intestina tanquam in colatorium exonerat; cum itaque vires expultrices admodum esse adauscas & irritatas in hoc morbo manifestum sit, evidens est præcipuum esse medentis scopum, s. ut naturæ noxiæ vitiosas materias ejicienti ferat auxilium potu diluenti, oleoso, blando, refrigerante, ut aqua pulli, sero lactis, infuso florum aduæ, decocto osyris, usquequo materiam morbosam sufficienter evacuant, & vires vitales nullo in periculo versari cognoverit; 2. ut materiam morbosam e venericulo per vomiticia lenia auferat, ex intestinalis simul, & semel intra biduum per cathartica blanda eliminet; minus enim defatigatur homo per defectionem uberem intra aliquot horas a cathartico excitatum quam per repetitam quavis hora noctu & interdiu licet paucam ejectionem, vi materie morbosæ proriam; 3. ut faciliorem reddat evacuationem, adeoque conatus inutiles imminuat, quod non solum laxantia; diluentia potu sumpta præstant, sed etiam clysmata emollientia, quæ materias acres obtundunt, viscidas diluunt, vias lubricant, & fomenti ad instar intestinorum, phlogosim, tensionem, spasmos temperant; 4. Cum autem inutilis est morbi medela, nisi vires naturæ sustineantur, atque non possint sustineri si conatus immodici, assidui non intermittant, si dolore & tormina sæpius ægrum etiam noctu discurrunt, si evacuationes uberiores eum exhauriant, necessum est conatus, dolores & evacuationes saltem nocte quavis sustinere, compescere, quod miraculum præstat narcotica, quæ sensum intestinorum, adeoque inde oriundos conatus excretorios compescunt per aliquod tempus; hoc enim laudandum præstat, ut enormes evacuationes alvinas quavis non minus suspendat, quam dolores & conatus, unde præmissis evacuantibus laudanum liquidum ad guttas circiter viginti, solidum ad granum unum, discordium ad drachmam, pilule de cynoglossa ad grana sex, vel similia; debent, saltem horis nocturnis, adhiberi. 5. Demum quoniam diuturnitate morbi superata sphincterum & valvularum resistentia, laxatis excretoriis, osculis, dissolutis etiam humoribus,

ac læsa vi digestiva stomachi, facile in consuetudinem abiret morbus evacuatorius, opera præstium est, ut eliminata satis materia quæ motum initio fovebat, eaque specificis si dentur medicaminibus correctæ, vires retentrices restituantur, augeantur, adeoque fluidi debita viscositas restituatur; in hunc finem stomachica, absorbentia, tonica, imo adstringentia sub his cautela feliciter adhibentur, quæ initio morbi, materiam febrilem retinendo, nocuissent; sic data tempore profunt, & data non apto tempore quæque nocent. Si vero morbus non tam ab irritata vi expultrice quam a retentrice debilitatus oritur, ut accidit in diarrhæa serosa, tunc quem scopum sibi præfigere debet Medicus clarius exponam dum de scrofis fluxibus erit questio, quippe horum maxima pars pro passivis effluxibus debet haberi.

Alvifluxuum alii sunt sanguinei, ut hepaticæ, diarrhæa, dysenteria, &c.: alii vero mere feculentici, ut diarrhæa, lienteria; quidam sunt anoterici seu superiores, ut vomitus, ileus; alii inferiores, ut tenesmus, ipsa diarrhæa; demum dantur qui ano & cæco materies evacuant, ut cholera, & quandoque melæna, &c.

Dejectio saluberrima est mollis & figurata, assueti sanis tempore facta, & quoad copiam ingestorum copie respondens; sub his conditionibus abdomen bene se habet. Quod si liquida sit dejectio, bonum est saltem; nec cum stridore, nec crebro & paucum secedere. Dejectiones enim similes, seu tenesmodum multum defatigant, & somnum abigunt. Si vero frequens sit dejectio, erit leipothymizæ periculum, sani semel in die; vel in biduo, idque vel diluculo, vel quod præstat post prandium alvum deponunt. Morbo acuto declinante feces alvinæ debent esse crassiores, ruffæ, neque multum graveolentes, pulchiores, nec malum est tunc temporis lumbriques excerni. In quovis morbo mollem & mediocriter humidum ventrem esse oportet; si vero dejectionibus præliquis, albidis, aut prærubris vel spumantibus alvum ferri, hæc omnia sunt calamitosa; sed illud calamitosius est multo, parcum, & lentum, & album; & sublarum, & æquale excerni, ac adhuc funestius nigra aut pinguis, aut livida, aut ærugino-fa, aut graveolentia excerni. *Hippocrates Prognostice.*

In curandis alvifluxibus auxilia dietetica & gymnastica non minoris sunt utilitatis quam pharmaceutica; & si quidem ab exercitio alvus movetur, ergo quieti maxime indulgendum est; & si necessario æger e loco in locum transferendus sit, is quam lenissime navi, lecticave gestandus non curra succussandus; ea vero canela corroboratus servanda quo æger magis est debilitatus, aut dolore simul vexatus, ut in dysenteria, diarrhæa torminosa, vomica, &c.

Dixit quod attinet vulgus omnem alvifluxum.

rum stomachi frigida & laxitati tribuit, unde vinum, liquores spirituosos, aromata, panem totum in vino cum cinnamomo, saccharo, ambra coctum lubenter usurpat; verum in diarrhoeis biliosis, cum calor, sitis, pyrexia, oris amarus urgent, ea sunt valde noxia, quae tantum in convalescentibus, a diarrhoea pituitosa aut a longo morbo exhaustis competunt.

Frigore, maxime vero si pedes huic & humiditati opponantur, diarrhoea & alvi tormina facile excitantur, adeoque in omni alvifluxu pedes calide pannis laneis siccis sunt fovendi; perspiratione equidem retenta & in intestinale colum vergente, irritantur intestina, & materies aeri hoc humore dilute alvifluxui succinunt apertissimae sunt; quae diuresi & nephresi potissimum alio sunt amandandae; nam: ut ait Hippocrates, cutis, laxata alvi siccitatem inducit, & curis siccitas alvum laxat.

Sunt qui alvifluxus biliosus, dysentericos, sub finem aetatis obvios, fructuumvisui tribuunt, unde fructus etiam maturos sanis prohibent, cum tamen nil sit utilius fructibus refrigerantibus, acidulis, etiam ad bilis fervorem contemperandum humorum, acrimoniam alescentem retundendam, unde in biliosis alvifluxibus, diarrhoea, cholera, vomitus, dysenteria aetivis, biliosis, limonata, emulsiones affatim hauriendas suademus; nec tamen diffiteor, quin certis tempestatibus fructus rubigine, rore vitiosi infecti possint his morbi ansam praebere; verum id potius accidit cum penuria frigoris adest, ita ut pauperes vitiosis; crudis, dyspeptis utantur, quam cum annus fructibus succulentis maturis abundat; imo fructus alvifluxibus inducendis aptissimi sunt, non horae, dulces & aquosi, sed adstringentive praediti, qui bilem in corpore figunt, ejusque salubrem excretionem impediunt, ut fructus corni, sorbi, mespili &c.

Multum nocet in alvifluxibus cibus copiosior & digestu eo difficilior quo vires stomachi ab his morbis magis labefaciuntur: vires fractas cito reparare contendunt aegri, sed illae tuto jusculis resciumur, a quibus non residuae sunt materies fibrosae, crudae, quae intestina lacerant; licet autem succi fructuum & herbarum oleracearum utiles sint in diarrhoeis biliosis praeventendis, fructus horae & herbae oleraceae in vulgaribus alvifluxibus nocent, tum parte fibrosa quae difficiliter digeritur, tum parte aquosa, quae alvi laxitatem adauget, ubi tamen alvus usu panis cocti, ovis forbilibus, rheo, rhapontico & myrobalanis potius rescicanda & adstringenda est.

VIII. HEPATITRŌEA; *Hepatitis atonia Gordonii & Dysenteria hepatica Tralliani Lib. VIII. cap. 42. Gilberti; Dysenteria hepatica Reusner de Scorbutu Hepatitis Varandae Diss. Almatara Diss. Univ. Fluxus hepaticus Neoterico-rum, Fluxu hepaticae Gallis.*

Nomine fluxus hepatici intellexeret Veteres quaecumque diarrhoeam, lienteriam, coeliacam, ex hepatis vitio oriundam, ut notat Gordonius, Lilium, folio 257. Neoterici vero hoc nomine indolentem sanguinis, ut plurimum diluti & loturæ carniū similis, defectionem significant, undecumque materia fluxus procedat.

1. *Hepatitroea vera; Dysenteria hepatica Gordonii Lib. Med. Jordanii de peltis phœnom. cap. 19. Ballon. Conf. Lib. I. Consult. 53. Shore Philos. Trans. n. 420, ex abscissu hepatis Amati Cent. III. cur. 5. C.*

Est fluxus alvi seroso cruentus, simulque bilioso-purulentus, cum signis vitii in hepate, ut abscissus, aut putredinose dissolutionis, qualem observantur Lamoni de fluxu dysenterico cap. 1. & plures Auctores in Sepulchreto Boneti cap. de dysenteria enumerati.

Miles Anglus hepatitridem passus erat, frustra tentatis remediis tumor quidem hypochondrii dextri remisit, sed delin in malum fluxum hepaticum, quo per sex menses confectus & exlicatus obijt; aperto corpore invenimus loco hepatis solam membranam ipsius investientem, satis crassam, instar sacci, cui adhuc portio saniei loturæ carniū similis inerat, qualem tam longo tempore excreverat; Bonet, Med. Indurum lib. 3. observ. 7. 9. Similem observavi ipse Mantæ ad Sequanam; anno 1730.

2. *Hepatitroea intestinalis Neoterico-rum, Cæliaci abscissus Tralliani lib. 8. Merum non ens Eremulleri; Fluxus a dysenteria Riv. obs. C.*

Est fluxus alvi loturæ carniū similis, doloris expertus, cuius materia, per intestinorum vasta secretoria anastomosim passa & dilata, in intestina effunditur.

Coeliaci ex Tralliano liquidas, non bene coctas, nec non cruentas feces, velut ex vase destillantes, per alvum excernunt, unde longo tempore ventris resolutio cum assidua defectione perdurat; hinc extenuatio, vigiliæ, inappetentia, cruditas, &c. Rarissimus morbus, si existat unquam.

3. *Hepatitroea a vulnere Bonet. Sepulchret. p. 178. A.*

In hac specie superveniunt vomitus & defectiones cruentæ, etiam si vulnus hepar tantum, non vero ventriculum attigisset, & ea differt a dysenteria per absentiam torminum, ab hepatitroea legitima per colorem tutillum ejectionum.

4. *Hepatitroea Mesenterica, Fluxus vari menterit abscissum secutus Jo. Rhodii centur. 3. obs. 95. C.*

Castellus biliosis temperamenti senex Patavinus, de.

Æterem menses fluxu hepatico laboraverat, iterum saniosa, deinde biliosa & pituitosa sine pure, sine urina mutatione reddidit. Medicus Caius putabat principium morbi esse jecoris atoniam, Joannes Prævotius credidit miferentii abscissum esse: nulla febris, nulla tormina; recte divinasse Prævotium docuit eventus fide apertura cadaveris. *Bonæ Sepulchretæ. Tom. 2.*

5. *Hepatitis hæmorrhagica* Reufneri de Dysenteria p. 414. *Hæmorrhagia intestinum senium* Barbeyrac M. S. C.

Similem nuper observavi sine ulla febre, sine torminibus & statim sine alvi fluxu in puero Nosotomii generalis qui purum putumque cœvorem cum fecibus per aliquot dies sine alvi fluore, dein vero cum alvi fluore excrevit; similem in febrilibus observant plures, ut *D. Lazæus* sine ullo hæmorrhoidum signo, sine torminibus.

6. *Hepatitis cruenta*; *Dysenteria hamatodes* Heurnii in aphor., *Fluxus alvi hepaticus* Bontii Med. Indor. cap. IV.

Differt ab hepatitis hæmorrhagica vulgari quod non humor sanguinolentus, & loturæ carniū similis, sed purus purus sanguis sine torminibus effluat ob distenta vasa sanguifera, vel ea erosa ab acrimonia; hæc species facilius curatur quam Europæa vulgaris.

Cura. Ubi acrimonia in causa est, emulsiones adhibeantur, cucurbitæ cum scarificatione lumbis & natibus applicandæ; cibi saccharo condendi. Si vero plethora incutetur, vena secanda est illico; quod tamen raro in Java insula prospere succedit, nisi apud Lusitanos & Indos; Balgæ enim sunt debilissimi, velut effœminati a calore inasueti; dein ad extraxum troci & oppii ceu ad sacram anchoram est confugiendum, adque circa noctem.

7. *Hepatitis hæmorrhagica intermittens*; *subermenta febris* Torti. p. 182.; *Febris hepatica* Torti de febr. p. 125. A.

Est species quæ febris intermittens perniciose accessum comitatur, cum illo terminatur, dein revertitur, citiusque virium exsolutionem infert, ac si etiam die intermissionis perseveret sequenti accessu in magnum periculum conjicit.

In illa vel initio vel in declinatione morbi loturæ carniū similis materies copiosa excremitur ad magnum pondus, unde summa virium imbecillitas, pulsus minutus, extremorum frigus, vox debilis, oculi concamerati, proclivitas in hypochondriam, maxime si æger e lecto vellet surgere. Illa hepatitis nullum dolorem, nullam animæ turbam asserit, crescente febre crescit & intra secundum tertiumve accessum mortem minatur.

Periculum majus est si loco feri sanguinolenti effluat sanguis ater, vel atra bilis. Notandum, ut in morbo nigro Hippocratis seu cholericæ Morbi. Curatio eadem quæ dolere intermittente.

IX. HÆMORROIS; *Alimorrhæ* Gal. lib. de atrabile. *Fluxus hæmorrhoidalis* Neoteritorum; *Flux hæmorrhoidal.* *Ægri hæmorrhoidali.*

A Græco *alma*, cruor, & *rho*, fluo; ita ut fluxus hæmorrhoidalis sit nomen ineptum & pleonasma; hæmorrhoides vero nihil aliud sunt quam *mariscæ* gæzæ apud *Aristotelen*.

Apud scholasticos & plebem hæmorrhoidis nomine intelligitur tumor varicosus in podicis margine, sæpe sanguine turgidus, aut sanguinem fundens; verum tunc sæpe sint similes tumores sine ullo sanguinis effluxu, & in hoc casu sit vitium simplex, non morbus, res hæc diversæ diverso nomine sunt indigendæ: tumores illi *mariscæ* tunc *Martialis* vocari debent; & fluxus cruoris *hæmorrhæ* multo aptius vocatur.

Hæmorrhæ sit fluxus cruoris ex podice, præsentibus tuberculis rubris, duris, dolorificis, aut iisdem in recto latentibus; vel in sanguinibus ex mariscis podicis. Distinguitur ab *hepatitis hæmorrhagica* cruenta, in qua purus cruor etiam ejicitur, ex eo quod sint signa designantia originem mali esse in podice vel in recto, scilicet tubercula hæmorrhoidalia; ea signa sunt, quod dolor in dejectionem referatur tantum ad podicem, quod tubercula illa vel videantur, vel ab ægro perferantur tanquam nuclei pericorum intra anum. A dysenteria & teneismo discrepat quod nulla sint in abdomine tormina dejectione præcedentia, quod nullus teneismus, nulla mucositas, & maxime quod purus & purus cruor. febribus induratis ut plurimum supersaffus sit, non vero cum illis dissolutus, ut in dysenteria.

1. *Hæmorrhæ moderata*; *Hæmorrhæ catamentialis* Hippocr. lib. de morb. mulier. Galen. lib. 5. aphor. 33.; *Fluxus hæmorrhoidalis* Auctorum. B. P.

Illæ est ex qua æger aptior evadit ad sua munia, vel per quam a majoribus morbis liberatur, ut a morbis hæmorrhagicis, convulsivis, febrilibus, dolorificis; sublevarur nsu panis fecalini, pomorum, uvarum quæ alvum laxam fervant, clysmatum ex aqua, potu acidularum, balneis domestitis; abstinentum a curis, studio, vigilia, venere, aliisque alvum exsiccantibus.

2. *Hæmorrhæ immodica*; *Fluxus hæmorrhoidalis immoderatus*. A. P.

Supponit tonatum naturæ ad plethoram minuendam, sed nimium propter stimulum ortum ab acrimonia sanguinis, a phlogosi podicis, a materia febrili. Scopus Medici debet esse ut tractum sanguinis ex vena hæmorrhoidali interna per veam portam faciliorem reddat per diluentia, exercitium moderatum, & impetum ejus in mæstentericam inferiorem & hypogastricam imminuat sicut horizontali, phlebotomis ex brachio; ut omnem stimulum ex podice detrahat per clysmata emollientia, cathartum ex castæ pulpa, usum feri lactis, atque anodyna intus & extus adhibita; demum si metus sit nimis

miz debilitatis debent ipsa adstringentia parti admovei, ut vinum rubrum, in quo solutum sit alumen, vel ex pills leporinis bolo amena & albamine ovorum fiat cataplasma; verum intus succus plantaginis, aqua rosarum, decoctum millefolii, geranii, seminum urticae, debent usurpari, & aeger abstinere a victu calido, ab equitatione, cursu & exercitio actuali, maxime a vigiliis, studiis & sollicitudinibus. Vidi ex longo usu lactis pro omni cibo & linctu catellicis maricis applicati, atque lacte affuso allecatis, curatum hemorroidarium jam febre lenta exhaustum. Novi plures homines curatos admodum radice cataplasmae instar confusa verbalci seu thapsi harbari.

In pulso hemorroidali si fide Clariss. de Borden post tres quatuorve pulsationes contractas, vividas, rigidaeque subsuales, succedunt duae trevae pulsationes paulo ampliores, minus aequales, quas excipiunt tres quatuorve pulsationes dicrotae: ast in omnibus adest quid tremuli & magis frequentis ac contracti quam in aliis pulsibus inferioribus.

3. *Hemorrhoidis polyposa*, Lieutaud Chirur. Jour. de Med. Nov. 1761. p. 57. C.

Adolescens a quatuor annis alvi fluxu cruento emaciatus, demum ejecit ano polypum pyri magnitudine cum transitorio sanguinis profluvio, quo facto brevi convaleuit.

4. *Hemorrhoidis ab exania*.

Hemorroidarii rupto, vel laxato tabulato ligamento quod fundum pelvis sustinet, id infortunium accidit: tunc inter descendendum foras elabitur fasciculus maricarum cum exania, & inde sanguinis profluvium & acris dysuria; reposito vero recto ea symptomata sedantur; hic morbus periculosus est & sanatu difficilissimus.

X. DYSENTERIA; Latinis *difficulus intestinum & vermina*; Caesio Aureliano *Rheumatismus cum ulcere*; Paracelso *verbus dissolutus*; Italis *Caquasangue*; Anglis *Dysentery*, *bloody flux*; Gallis *Dysenterie*, *flux de sang*.

Charact. Frequens torminosa mucosa cruenta alvi dejectio.

Theoria. Arteria quae tenue intestinum irrigat est arteria mesenterica superior: quae vero crassum, vel longanem, est mesenterica inferior venae quae ex ambabus sanguinem revehens sunt magna mesaraica VVinslovvi, quae ex tenui, & parva mesaraica seu hemorroidalis interna, quae ex crasso intestino sanguinem revehit in venam portam deferendum: vena porta ex his duabus venis & ex splenica coalescentibus oriunda subit hepatis, in quo dividitur in ramos successive minores, ex quorum ultimis venae hepaticae sanguinem ad cavam refertur trahunt originem, sicque sanguis huic verticem sine circulo absolvens bis arteriosus & bis venosus evadit.

Circumferentia & capacitates relativae horum vasorum inventae sunt in sene.

Laminae.

Aortae	37. Linearum	136. 9.
Venae portae	19.	36. 1.
splenicæ	15.	22. 5.
mesaraicae	12. 6.	15. 8.
arteriae mesent. super. 9.	8.	8. 1.
inferior	4. 2.	1. 6.

Hinc sequitur quod capacitates venae portae sit minor respectu arteriarum ex quibus sanguinem accipit, quam capacitates venae caevae respectu aortae, adeoque quod minori facilitate sanguis transeat ex arteriis mesentericis in suas venas ac in aliis partibus.

Sanguinolenta tamen aqua infusa in aortam multo copiosius & citius transfundat in intestinorum & ventriculi cavum, quam in alias partes, ut expertus sum in canibus vivis & in cadaveribus humanis: ergo facilius est sanguini impulsu per arterias mesentericas, maxime si difficillius hepar permeet, super ferum cruentum in intestina dimittere quam in aliis partibus ab aorta irrigatis. Quantitas sanguinis per arteriam mesentericam superiorem transmissi est circiter 16. pars ejus qui transmittitur per truncum aortae, ut sequitur ex ratione luminis & ex hydraulici experimentis; ast qui transmittitur per inferiorem mesentericam est quinquies minor quam qui per superiorem, unde pronum est concludere intestinum tenue esse circiter quinquies ponderosius crasso aut saltem longius.

Et facilius serum sanguinis per secretoria intestinorum elabitur quo fortius praeferat ab arteriis & quo magis ipsi resistunt a venis; hinc patet cur in dysenteria, etiam si liberum sit hepar, modo febris addit, eruo debeat secretoria intestinorum vasa diducere, & per ea effundi, ut in hepaticis, si hepar obstructum fuerit sub male affectum, etiam si nulla febris adfuerit serum sanguinolentum poterit facile in intestina delabi: non potest sanguis fortius trahi in ultimas arteriolas quin illarum ramulos lymphaticos diducat & inflammet, unde phlogosis intestinorum & simul effluxus cruoris, in cavum, hinc symptomata essentialia dysenteriae subsequuntur: verum alia de causa possunt etiam inflammari intestina, scilicet ab acrimonia corrosiva tum mucin in intestinis secreti, tum alterius fluidi peregrini fistulam intestinalem permeantis; inde enim similia subsequuntur symptomata. Intestina motu peristaltico propellunt reliquias alimentorum a pyloro versus podicem, nec ille motus peristalticus potest fieri in partibus inflammatis extra redintegrationem doloris; cum itaque buli crassiores materiae expellendae ad locum inflammationum pervenire, aut fluida mucosa ejus loci contractionem sollicitabunt, vi stimuli fiet illa tum intestini, tum musculorum epigastricorum contractio expulsiua, quae doloris vehementiam augebit cum sensu tormionis intestini, unde dolor torminosus in umbilicali circiter regione, si ibi sit sedes inflammationis; inde vero ad dejectionem eo majus labetur tempus quo magis distat locus inflammatus a podice, ita ut inter tormina

na

na & dejectionem nulla mora fere interponatur, si intestinum crassum laboret phlogosi; aut major, si ileum vel jejunium: continuata adeit in dysentericis molestia, pressione abdominis deegenda, sed non continua tormina excretionem quamlibet antecedentia: tormina itaque non a phlogosi, sed a contractione intestini dependent, adeoque erant illi qui alio modo rem se habere leviter determinant.

1. *Dysenteria benigna spontanea* VVallzi; *cruenta dejectio critica* Hæcsteri Decad. 2. obs. 1. Zacuti de princip. med. histor. lib. 2. obs. 15. D.

Illæ sunt quæ redundant tantummodo sanguinis copiam arguunt sine febre, & sine obstructione hepatis: talis observatur in pueris per plures menses persistere; in mutilis qui laetius vivunt & phlebotomiam omittunt, in desideribus succi plenis; in laetentibus infantibus recti prolapsus fere comitatur dysenteriam.

2. *Dysenteria catamenialis* Horstii, p. 2. lib. 1. obs. 27. & Gal. 5. de loc. affect. *Dejectio sanguinis copiosa tempore mensesum*, & *periodicus recursus a suppressa narium hæmorrhagia*, For. lib. 1. obs. D. P.

3. *Dysenteria Parisiaca* Junckeri; *Mal de Paris*, D. Ea est quæ advenas ab aquarium insuetarum usu dixerat; oritur quidem statim a diarrhæa torminosa, sed successu temporis dysentericus evadit effluxus cum tenebris, & sanguinolentis dejectionibus; exigua est virium prostratio, febris parva vel nulla, inappetentia non est notabilis, unde a maligna discrepat. Non solum Parisi, sed etiam Londini, Amstelodami, & maxime in Indiis Orientalibus peregrinos discruciat hic morbus; abstinendum ab aqua Sequanæ, a carnisbus; vino Alicantino indulgendum.

Parisiis advenæ potius diarrhææ quam dysentericæ sunt obnoxii; verum inquirendum restat num, præter usum aquæ, ad hanc concurrant fontes cuprei, sianno non accurate obditi, in quibus aqua Sequana percolanda servatur, num abstinencia a vino, utpote cariis, multasque esus carnis bovis lætiam conferant. Vide *Dictionnaire de santé* sub titulo *Mal de Paris*, ubi suadetur Elixirium Garus, & pistana ex floribus lamii albi, matricariæ, chamomillæ; post aliquot dies æger purgetur ex manna & catholico; si febris accedat dentur cremores oryæ, juscula, clysmata; dein elixirium & pistana memorata in usum advocantur.

4. *Dysenteria Gravidarum* Foresti; Hecquet in Aphor. Hippocr.

Non pauca sunt recens nuptæ quæ per aliquot dies dysenteriam hanc experiuntur, an a suppressis catameniiis, an a turbato circuitu per viscera pelvis; si sub finem graviditatis, ea a partu sponte sanatur.

Curatur clysmatis laxantibus & potu ex decocto geranii Robertiani præmissis emollientibus oleosis, imo si nulla graviditas, phlebotomia ac leni catharsi.

Benigna est quæ initio graviditatis, potissimum

ob plethoram, accedit; cathartica & emetica non conveniunt, nisi mitia, ecoprotica, demulcentia; phlebotomia præstat.

5. *Dysenteria atrabilaria*, A.

Dysenteria quæ ab atra bile incipit, lethalis ex Hippocrate.

Illam præcedunt rigor, calor, nausea, vomitus biliosus; comitatur febris synochus biliosa, vel amphetera putris, quotidie exacerbans, cum siti, virium prostratione, oris amarore, cardialgia, pervigiliis, colore pallido faciei.

Accedunt præter tormina, & tenebrum, dejectiones brunneæ, v. rescentes, vel atræ, fætidissimæ, deinceps urinæ coloris cæse in sedimento, cæterum viridescentes atque putridæ, fætidissimæ, totum corpus cito extenuatur; in vigore morbi adeit dysuria, accedit singultus, sudor viscidus. Lethalis est ut plurimum hæc species, atrabilarios, fuscis acribus, viscidis in sanguine & hepate congestis onustus aggrediens.

Videtur pendere a febre mali moris cum atra bile in sanguine copiosa.

6. *Dysenteria epidemica*, Sydenham pag. 108. *Dysenteria febrilis* Amati cent. 5. A.

Ita frequentior est priori, cum synocha putri juncta, lingua sordida, tumore, vel meteorismo abdominis, calore, siti, urinæ ardore aut identidem suppressione; sed differt quod excreta & urinæ non sint coloris obscuri, fuscis nec tanti factoris.

Videtur naturæ conatus quo a sanguine acrimoniam quandam per colatiora intestinorum excernere nititur, repetitis cordis sibus in aream mesentericam superiorem porissimum conversis; intestina seriatim percurrunt phlogosis & tandem in recto sedem figit.

7. *Dysenteria castrensis* Romazzini de morbis castrensis pag. 647; *Fluxus virulentus* Saxoniæ; *Dysenteria Indica* Bontii Medic. Indor; *Dysenteria Pestilentialis* Amati centur. 3. cur. 90, Schenkii fol. 86t. A.

Ita epidemice grassatur, symptomata pejora habet ac graviora, & si plures auferat quam sanatos dimittat, pestilentialis audit; magnus excrementorum factor, veluti cadaverosus, diversifque color, pulsus febrilis, sed parvus, mollis; vires prostratæ ab initio: his adiungunt se delirium, angina, tenebris ulcerosus.

Circa finem æstatis frequentius accidit communi latrina utentibus; suspicio est ne contagiosa sit per halitus putres ore & podice exceptos.

Hoc morbo laborant soli milites sui noctu tentorii suis excedunt & frigori exponuntur; nulla febris, initio diarrhæa est, succedunt tormina, vires prosteruntur, purus cruor excernitur.

8. *Dysenteria simulata* Polyii lib. 6. Strazg. Amphiratus a pyratæ in Lemno detentus a cibo abstinens & rubricam cum aqua marina dilutam bibens dysenteriam simulavit. Piratæ metuentes ne moreretur atque sic ejus redemptionis pretia frustrarentur, cum dimiserunt.

9. *Dysenteria Pecorum*; *Malis humida* Lancisi de Pelle Bovilla; *Pessis Bovilla* Ramazzini; *Lues vaccaeum* Tubingenfis. A.

Morbus hic totam successively Europam & demum nuper Galliam devastavit, atque boves eripuit. Hanc observavi apud Helvios Comitiorum jussui ut obtinuerem; boves ibi, in Occitania capræ, & vervecines infestabantur: oriebatur ab inappetentia, ruminationis cessatione, languore, boves passim in campis tristi & denisso capite vagabantur, interdum ejulantes, salivantes, dein frigebant auribus, fremebant toto corpore, alvi fluxum successively cruentum & torminolum patiebantur, hinc colliguntur, feces oleosæ & mucosæ, cruentæ: paucissimi sanabantur abortis ad nares & caput pustulis crustaceis, & alopecia subsequente, alii quorum palearia setaceo pertusa in molam magnam intumescita multum puris & saniei effundebant.

Inveni cadavera exsanguia, penultimum stomachum phlogosi tentatum, primos effucos & alimenti solitis siccis ipsarum, tumores statuosos, prius dolorificos in panniculo adiposo, sæpius juxta lumbos, emphysemata in pulmonibus; carnes albissimæ impune ab hominibus manducabantur.

10. *Dysenteria alba* Sennert. t. 3. Etmull. Sydenham pag. 109. VVillisi. tom. 2. p. 70. *VVeiss-Ruhr* Germanis. *Gripping of the guts* Anglis. *Dysenteria incruenta* Javanensium obs. curios. A.

Omnia habet dysentericæ vulgaris symptomata, tormina scilicet, frequentem alvi dejectionem mucosam; tenesum, eo solo discrimine quod nullæ sint striz sanguineæ, vel paucissimæ; febris adeo exacerbans, sicut VVillisi addit dejectiones esse fetidas & limpidas, asinis est dysentericæ rheumaticæ Al. Tralliani.

11. *Dysenteria a misenterii vomica* Joan. Rhodii; *Abcessus misenterii* Sanctorii. Method. vitand. error. lib. 1. cap. 23. Bartholin. Vide Hepatirrhæam mesentericam.

12. *Dysenteria cathartica* Sennerti. A.

Oritur ab abusu colocynthidis, laureolæ, neri, antimoniatorum, a litu mercurialis; ea species transitoria est, & non difficile sanatur; huc referantur fructus austeri, necnon horari quidam largius assumpti, ut mala persica, armeniaca; juvant in hoc casu, narcotica, ut ludanum, pilule de cynoglossio, discordium, præmissa aqua pulli, oleo amygdalarum, &c.

13. *Dysenteria symplicitica* Boyle de medicam simpl. C.

Adolescens dysenteria dudum exhaustus a vulgaribus remediis nullum perceperat auxilium; syphilitidis latentis signa in suspicionem adducta sunt tanquam morbi principium; tum vero in desperato rerum statu, athiops mineralis parve doli, opiatæ stomachis & adstringentibus fuit mixtus, ex quo intra paucos dies melius habuit, ac demum convalescit: Hæc D. Gibert. *Alsiens. Medica*. mihi post cineres colendus.

14. *Dysenteria aquinodialis*; *Dysenteria vera* Bontii.

Non est species diversa ab Europæa vulgari, sed meretur singulares attentiones ob climatis differentiam; clima est calidum & humidum, ita ut semestri a pluvii etiam immuni ferrum citius contrahat rubiginem quam in Belgio; calidum dico, ita ut per noctes ventus frigidus flare consuetus plura incommoda afferat quam aquilo hieme apud Septentrionales; hoc calore diurno Europæ apud Indos laxantur, debilitantur, phlebotomia vix fuerunt, male digerunt; dysenteriam itaque potenter perspiratio recens, fructus horarii sine pane comesti, vinum oryzae holothuriis confectum, vulgo *Arac*, quod Belgicæ bibunt avide.

Curæ præcipua apud Indos est infusio thei in decocto tamarindorum; verum Europæi ab hoc quandoque in certam perniciem tonjiciuntur; cum in hoc morbo corroborantibus potius indigeant quam cathartici, ut in cholera: Bonitas in hoc casu suadet decoctum oryzae cum endivia & cicchorio, atque placentia cervina; a levisimis cathartici cruciatus intenditur; unde optimum & verissimum hujus morbi antidotum est narcoticum ex opio, croco, sanguine draconis, benzoino anaricis partibus paratum, & ambræ nigrae tertia parte, aceto insundantur ad supermentiam trium digitorum, ad soleni æstivum vas clausum exponantur, colatura eodem sole ad extractum inspissetur, cujus dosis a granis vi. ad ix.

15. *Dysenteria verminosa* Vandermonde 1757. Mal. Le Nicolais du Saufay Bito hanc epidemiam observavit.

Dolores atroces abdominis subiti, viscerum ardor, nauseae frequentes, vomitus muci, ut spermatis ranarum, dejectiones cruentæ & mucosæ cum multo cruore, febris insignis; tertia vel quinta die singultus, pulsus decrefcent, sæpe intermittens, cutis arida, viscosa, extrema frigida, vultus emaciatus, oculi languidi, depressi, abdomen indolens, hiis suspicio sphaceli intestinorum, mors a quinta die ad decimam quantam.

Duravit epidemia ab Augusto ad Novembrem, quartam partem rusticorum aggrediens, & plures et medio tollens.

Suba. Præmissis duabus, tribusve phlebotomiis, clysmatis emollientibus, pitana anthelmintica & hypnotica, præscribitur ipecacuanha a granis decem ad viginti quatuor in cyatho potionis anthelminticæ & catharticæ; dein sero. & mane anthelmintica, ut radix filicis, rheum; folia tanacetii, cortex mori, corallina, athiops mercurialis, quorum ope agri lumbricos multos, rarius ascarides, dejecerunt, & multi evaserunt.

Aliam ejusdem morbi varietatem refert Ill. *Boyer libello de Epidemicis* p. 32., in qua non parum sanguinis deiciebant, agri, sed dejectiones erant doloris expertes, & sanguis ejectiones erant dilutus. Inter verminosa eminebat in hac epidemia fructum panis alio confectum; butyro dein illitum.

16. *Dysenteria carnosa* Jacob VVagneti Coll.

Academ. tom. 3. pag. 633. observ. 187., & Luc Schroeckii ibid. Huc refer diarrheam carnosam.

Multiplici observatione compertum est deijci quandoque in hac specie, tum materias carnosas quæ lymphæ & sanguini coagulatis intra intestina concretis tribui debent, ut in eâ f. relato *Collect. Academ. pag. 588.* ; tum materias splenis aut hepatis fragmentis similes ; tum denique vera corpora glandulosa per multos dies ejici solita.

17. *Dysenteria intermittens* Torri de febr. lib. 3. cap. 1. p. 125. ; vel *Dysenteria febrilis* VVet. lib. de Febribus. P.

Est ea dysenteria cholericæ quæ paroxysmum febris, sæpius tertianæ, quandoque triplex duplicis, comitatur, quæ humores acres, bilioli, & deinde mucus cruentus uno & eâto ejiciuntur cum torminibus, tenesmo, stomachi dolore, peritine ac si illius membranae divellerentur, ac excoriarentur, ac revera œsophagus excoriat inuenitur ab illa acris materie. Ea tamen dysenteria febrilis minus periculi portendit quam cholera intermittens, hæc in illa febris videatur intensior, quia pulsus magis expansus, nec secum ea fert illam extremorum perfrigerationem, angorem & sudationem, quæ in cholera observantur ; admittit tamen singulum, jactationem inquietam, urinarum croceam rubedinem, linguæ scabritiem, &c., unde facile in continuam migrat, aut inflammationem aliquam minatur. *Curatur* ut cholera intermittens.

18. *Dysenteria scorbutica* Cirigli Consult. 79. t. 2. p. 135. C.

Charactèr desideratur, nisi signa vulgaris scorbuti velis substituere, & puri cruoris ex ano feculentum indolentem, quales sæpe observavi in infantibus scorbuticis sine alvi fluxu liquido.

Curatio. Ciriglius suadet 1. aquam ex albo albi, seu basium ex aquæ graminis canini uncis quatuor, & ovorum albuminibus duobus, misce ; 2. lac ipsum, si stomachus id digerit ; 3. serum lactis caprini cum succo sumariæ, nasturtii aquatici, &c., destillatum ; hujus uncias quatuor quoties mane, additis si lubet spiritibus cochlearis guttulis quatuor ; 4. ante coenam aquæ Spadanæ, vel aquæ de Picejattelli, vel alterius sulphureæ uncie duæ bibantur. Adde decoctum tamarindorum, vel myrobalanorum, cæteris remediis præmittendum.

19. *Dysenteria Polonica*, Stabel Hist. 11. Obs. 8. 10. *Dysenteria miliaris*, Gruberi.

Febris exanthematico-dysenterica, Tiguri Epidemica, 1747.

Praxis. Causa dysentericæ est conatus naturæ ad expellendas aut materias acres & venenatas ; five sanguini commixtas, five intestina erodentes, adacta vi expulsiua intestinorum per motum peristalticum, ruptisque, vel erosis, aut ductis vasibus sanguiferis.

Indicatur, itaque id omne genus auxilii, quod 1. materias irritantes valet avertere, evacuare, aliorum revellere, necnon costringere & mitiga-

te ; 2. quod conatus dolorificos effrægens valet sedare, imminuendo phlogosim ; sensum obtundendo, intestina mitigando, compescendo ; denique evacuata materia morifica, quæ robur intestinis, vasisque ruptis cicatricem reddere valet. Materiei irritantis, aeris, venenatæ expulsiō, si sit in ventriculo, quod docent cardialgia, nauſeæ, otis amaro, linguæ sordities, assumptorum indoles, debet tentari per emetica lenia, tubum intestinalē non subcutanea, simulque aliis indicationibus satisfaciētia, præmissa una, vel altera phlebotomia ; talia sunt radix ipecacuanhæ, tartarum stibiatum, gilla vitrioli, sed ipecacuanha cæteris præstat parva dosi, ut ad grana sex, duodecim, cum syrupo cydoniorum, vel mica panis. Angli utuntur ejus infuso in aqua vitæ ad cochlear unum.

Debet dein intestinalis fistula identidem expurgari decocto pulpæ calisæ, tamarindorum, rhei, rhapontici, myrobalanorum, addita manna, oleo amygdalarum, & similibus, atque si nulla sit febris, tutius eluitur potu aquarum acidularum, quæ Glauberiano sale satent, modo tepida & parva dosi per aliquot dies sumantur, quo solo auxilio plures sanatos vidi, aquis Alembicis assumptis.

Corrigitur materies morifica, præmissis evacuantibus alvinis, per potum ex sero lactis, decocto oryze lotæ, aquis aciculis pro potu, unde ad vias urinarias ducitur serum acce lixiviosum sanguinis ; si veto rite expurgatis primis viis dysenteria chronica evadeat, lac ipsum vaccinum coctum addita drachma eretæ albæ in fundo relinquendæ, vel præmisso bolo ex creta, corallis, oculis canerorum, catechu, cum conferva rosarum, mane & sero usurpandum.

Videtur sit ex jussulis, aut quod satius est, si seant & acres sint multum materias excretæ, cremores ex oryza, avena, loco jussulorum sunt adhibendi ; potius vero vel decoctum oryze, vel serum lactis, injectis frustis lactum, vel silicum, vel elavis igne prius candentibus, vel aqua pane tosto, floribus rosarum infusis parata ; tormina, conatusque & profluvium a vi, ex quo vires infinguntur, sedant optime narcotica, quæ in emulsione, julapio, oleo amygdalarum, vel cum pulvere absorbente, forma boli, opiatis videntur ; huc laudanum liquidum, vel solidum : hoc pertinent pulvis corallorum anodynus D. Helvetii, vel dialcordium Fracastorii, modo larga dosi sumatur, ut ad scrupulos quatuor, drachmas duas, vel pilulæ de cynoglossa ad grana quinque, octo ; horum alterutro, vel emulsione cum syrupo de papavere vix caret potest æger horis nocturnis ; verum & ipsa intestina debent mitigari, tenesmusque sedari elysimatis tepidis ad semilibram injectis cum cautela, cannula pulji intestinalino involuta ; sunt elysmata ex intestinorum, vel omatorum, vel capitis vervecini decocto, vel lacte, vel oleo & aqua cum ovi vitelli, saccharo, vel malvæ foliis, althææ radicibus aquæ incoctis ; adde in pertinaci dysenteria theriacæ drachmas ali-

aliquot. Si tormina valida, dolor atrox, stis, febres vigeant, iteretur phlebotomia, potus sit aqua pulli, feminibus frigidis farcti, vel cum capite papaveris cocti; iteretur sero & mane laudanum liquidum sufficienti copia, oleum amygdalarum ore & ano fumendum est.

Denique inveterascente morbo, aut citius, modo expurgatus sit sanguis & edulcoratus, adstringentia roborantia advocanda, uberius allumendæ aquæ acidulæ, opiæ ex catechu, rheo pulverato maxime tolto, decoctum ex nyrobalanis, rhapontico, syrupus de cicorio compositus, simarubæ corticis drachmæ duæ in tribus aquæ cyathi coctæ, & intra diem assumpræ, ino grana duo vel tria ipecacuanhæ intra pulpam vel opiatam, decoctum codagæ-palæ, aliaque conveniunt; sed febre absente offæ, panatellæ, ova mollia, panis possunt usurpari, cavendo semper a carnisbus, ut a fructibus recentibus.

In epidemicis, malignisque dysenteris vires sunt levandæ, & diaphoretis juvanda cardiæcis absorbentibus, sudoriferis blandis, semperque phlogosi, & imminenti intestinorum sphacelo per phlebotomiam consulendum, infusum scordii, diafcoridum, theriaca recens, decoctum album Sydenhami cæteris præstant.

In Castrensi dysenteria quæ æstiva est, & ab aura nocturna frigida ortum ducit, serum lactis optimum pro potu, ipecacuanha raro convenit, sæpius cathartica profunt, ut expertus est D. Vandell *D. Med. Veleria*.

Flores lyri salicariæ, ad manipulum unum si recentes, ad drachmam unam si sicci sint, bulliant in aquæ uncis octo, & ex hoc decocto puro, vel cum lacte si febris addit hæstica, utatur æger in dysenteria inveterata, tanquam tónico adstringente & expertissimo medicamine: pulvis etiam florum horumce ad scrupulum unum valet.

XI. MELÆNA; *Malaina* noviss Hippocratis; *Fluxus splenicus* Gordonii; *Nigra dejectione*. Schenckii Lib. III.; *Dysenteria splenica* Ballo, nil Conf. 53. Lib. 1. *Cholirica* Guarinonii; Moroni &c.; *Morbus niger* Fr. Hoffmanni *Maladie noire*.

Est alvi fluxus materiæ nigricantis, atro-rubæ, dejectione, aut vomitione frequenti notatus.

1. *Malaina splenica;* *Cholirica* Guarinonii fol. 719. *Maladie noire* Vandermonde Journ. de Med. Mars & Juill. 1758. obs. 1. & 2. Navier 1756. Vanie Journ. de Med. Janv. 1757. A. P.

Ea est quæ melancholicis accidit post febres putridas, peripneumonias, ante plenam convalescentiam; pulsus est debilis, intermittens, non febrilis, facies plumbea, vires prostratæ; materies rejectæ sunt nigre, unguinolæ, sæpe foetidissimæ: syncopes frequentes a dejectione.

Impugnatur hic morbus cardiæcis, antisepticis, & acidis, ut aqua Rabel, succo limonum, decocto levissimo serpentariæ Virginianæ, gela-

tina cornu cervi acidulata, infuso florum chamæmeli, &c.

Vidi in Moniali septuagenaria per aliquot dies has materies bis vel ter in die ano & caro rejectas, viscosas; unguenti digestivi similes quoad colorem, vix foetidas, cum debilitate, agrypnia & pulsu febrili.

Vidi Nemausi in Mercatore similem morbum cum cardinalis, facie plumbea, tumore antiquo ad epigastrium; materies rejectæ copiosissimæ per anum erant initio atramentosæ, dein bili atræ & decocto cassæ similes.

In senibus Nosocomii generalis similis morbus ter, vel quater fuit observatus, & ut plurimum hac ætate lethalis.

Si alvi fluxus contingat in morbis acutis, & materiaeducta non sit aerabilis, sed vere melancholicus humor, qui est fæx sanguinis; illæ evacuationes quodcumque eveniant, omni carent discrimine, & ad bonum terminantur, exonerata per has a gravi materie natura ipsa; sin vitium accedat viscerum, ipsaque eorum substantia labefactetur, perniciosæ sunt huiusmodi dejectiones. *Perr. Salius Diversus*.

Defideratur hujus generis divisio in species, quarum signa sint magis distincta; nuper tantum modo Medici monuerunt hunc morbum non ita rarum esse, ut ante hoc sæculum existimabant.

Nigredo dejectionum sine torainibus ejus characterem constituit, sed vel dejectiones aqua dilutæ ad luteum vergunt, vel ad atramentum; vel afficitur primario hepar vel lien. *Coll. Acad. T. 3. p. 14.*

Cholirica est nomen a cholera parum diversum; *melaina* est nomen vetus & Hippocraticum, adeoque anteponeendum.

2. *Malaina scorbutica.* *Maladie noire*, *Obs. 4.* Journal de Medicine 1758. pag. 235. par M. Bonte, D. Med. a Coutance; Vandermonde ib. 1757. p. 337. quæ atabilaria non sanguinea est. A. P.

Vir mæstus, siccus, niacilentus, vertigine & æsthenia ac lassitudine tibiarum affectus, gingivis rubris, mollibus, ore foetidus; maculas habebat in tibiis circulares vel ovales; a minimo motu syncopem metuebat; is pluries dejecit fæces nigras, foetidissimas, amaræ vini similes; quoties fluxus niger instabat, maculæ ex purpureis nigre evadebant, febris nulla, pulsus intermittentens, accesserunt palpitationes, pulsatio temporum, labia, palatum, lingua ex nigro virescebant; harum partium epidermis separabatur; mors.

Indicabantur acida roborantia, maxime aqua Rabel, vel spiritus vitrioli, syrupus limonum, aceti, tinctura serpentariæ virginianæ, aliaque antiseptica acidis juncta.

2. *Malaina atrabilis.* *Atrabile*. A.

An ea species est quæ in acutis cum gravi viscerum labe accidit, in qua bilis nigra sustum vel deorsum ejicitur, de qua dicit *Hippocrates: Dysenteriam, ab atrabile incipere lethale*.

An ab hepate hic humor profluat? quænam sunt signa huius speciei quibus a prioribus discrepat.

Marteries carnosas cum atra bile rejeetas, vidit *D. Geoffroy Jauru. de Medec. Mars 1758. pag. 260.* viderat *Ballonius*. Vide *Boneti Sepulchretum, Tom. 2. pag. 289.* Ex liene cadaveris humani clo- to ipse eduxi aquæ nigerrimæ decem fere libras, novam aquam affundendo per arteriam splenicam.

4. *Melana hæmorrhagica.* Vide *Chomel Mater. Med. pag. 474. A. P.*

Est alvi fluxus cruentus, niger, a rupto quodam vase sanguifero in primis viis, sine mariscarum signis. Duos operarios qui ex valido nisu in attollendis ponderibus, vas quoddam sanguineum in intestinis verosimiliter sibi tuperant, vidit *Chomel*: his supervenit dejectio cruenta quatuor & ultra librarum. Hos sanavit *Chomel* præscripsit succi millefolii & urticæ ana uncis sex, & forti decoctione harum plantarum in anum injecta.

Qui hæmorrhagias in primis viis patiuntur, per aliquot dies sanguinem nigrum botellorum instar deiciunt, ut vidit; hinc morbus melænæ videtur ascribendus, vel hepaticæ cruentæ, a qua differt ex eo quod non per diarrhoeam fiat, sed per rixim.

5. *Melaina prima Hippocratis de morbis, lib. 2. A.*

Bilem atram tamquam facem vomit, interdum velut sanguinem, aut vini amurcam, aut polypii aramentum, quandoque acidum ut acetum, & cum nigrum quatuor vomuerit, cædem odore videtur: fauces & os ex vomitu indurcuntur, dentes obdurefcunt, & rejectum terram attollit; a vomitione sublevarur, cibos appetit, a copiosioribus ægre habet; si jejuniis sit, viscera spreunt, & saliva accescit. Cura abolvitur crebris purgantibus, dein sero & lacte, &c. *Hippocratis.*

In specie splenetica hodie satis frequenti, nec acidum olent rejecta, nec cathartica ferunt vires ægri.

6. *Melaina febrilis*, Torti de Febris Lib. IV. cap. 1. histor. 3. A. P.

Est species que typo tertianæ progreditur cum dejectionibus æro rubris.

7. *Melaina hepaticæ Torti, & Ill. S...* de abscondita febrium natura. A.

Differt hæc species a priori quod dejectiones sint carniæ loturæ similes. Notionem distinctam & praxim optimam melænæ debet orbis medicus *Clarissimo Medecina Doctori Monspiliensi D. Vernier.*

XII. NAUSEA; Nausea & Nauseosis, cacophoria, cibi fastidium; Grecis *Nausia*; Latinis *Vomituratio*; Gallis *Nausée, envie de vomir.* *Ægri Nausiodes, nauseabundi.* Provenit a *nausis*, seu navi quam qui conscendunt, nausent maxime.

Est vomendi cupiditas & conatus frustraneus, seu qui respectu ad effectum spectatum maxime *Sauvages Nosologia Methodica. Tom. II.*

mus est; ita ut cum summis nisibus nil nisi flatus, aut quid paucum vomitum rejiciatur, & omnia assumenda fastidiuntur. Phænomena nauseam comitantia sunt cardialgia, sensus ingratus ventriculi, averfatio seu abominatio intima ex hoc sensu oriunda, proteritio capieis ad anteriora, oris diductio, motus ossis hyoidis ad superiora, sonitus singularis expiratorius, depressio simulanea epigastrii, sæpe salivæ proventus, labii inferioris tremor; & cum vehemens est morbus, virium imminutio, brachiorum ad posteriora proteritio, corporis totius ad anteriora inclinatio, &c. omnis potus & cibi oblatus averfatio, & deglutendi impossibilitas.

Definitur a *Sorras* per causam, scilicet depravatus motus facultatis expultricis, quo nittitur per os excernere quæ ventriculo sunt molesta; quod est tenesmus respectu dejectionis, tussis respectu amacatharisis, sternutatio respectu coryzæ, id tussis erga vomitum est, & dysuria respectu enuresis, & dysoxia respectu partus.

Differt hic morbus a vomitu, quod in vomitu uber sit materierum rejeccio contumax, in nausea vero minima. Differt a vomitione, quæ vomitum, allosque morbos comitatur, quia in nausea pro morbo essentiali spectatur, inanis vomendi conatus sit constans & præcipuum symptoma, non ita in alia syndrome; ex principis collationibus diversæque medelam exigentibus deducuntur nausæ species seu varietates.

1. *Nausea a rania* Hildani, cent. 2. obser. 70. Mulier adolescentis nausæ, eructationibus & cibi fastidio, sæpe doloribus ventris, torminibus & imbecillitate ventriculi vexabatur; Sumpsit tandem pulverem ex rheo, senna, turbiti, agarico cum syrupo rosato & teniam viginti spitham longam per anum ejecit, hac rejecta convaleuit.

2. *Nausea gravidarum* Rod. 2 Castro de morbis mulierum, lib. 3. c. 17. Hippocratis Aphor. 61. sect. 5. Nenteris, Tab. 185. cap. 2. L.

Ea nausæ sine prævio horrore aut febre recens prægnantibus sæpius accidit, tum cibi fastidio & pica, nec non phlegmatum rejectione per os, sæpius ante quintum mensem evanescit. Intra certos limites nullum periculum involvit, sed, si violentior evaserit, etiam abortum minatur; abstineant mulieres a pravis cibis quos pica suadet.

3. *Nausea a pancreatis scirrhus* Jo. Rhodii cent. 2. obser. 95. ex ejus summo prædialiso Barbet. prax. lib. 4. cap. 2. C.

Vetula quædam vomitum quotidianum post prandium & cenam patiens, in atrophiam incidens tandem mortua est. Secto cadavere pancreas duritie lapidem æmulabarur; cum autem illud sit ventriculi pulvis, ventriculus concoctionem celebrare non poterat hac duritie lassus, sed indignatus omnia ingesta rejiciebat. *Paxar. obs. 14.*

4. *Nausea ex gastræole* Boneti Sepulchret. de nausæ, obser. 27. C.

Ventriculum rupto diaphragmate in pectoris cavitatem

tatem prolapsum sequitur hæc nausea. Hoc factum vidi Alesia citra causam evidentem. Hoc observavit, per vulnus diaphragmatis, Sennert. *Instit. lib. 2. pag. 2. cap. 13. post emeticum violentum Bonerus Sepulchret. Tom. 2. pag. 103. paragr. 2. obstructionibus ventriculi & epiploï Th. Bartholin. centur. 6. observ. 45.*

5. Nausea ex compresso ventriculo Bonet. Sepulchret. lib. 3. sect. 8. observ. 28. 29. Factum vidit ab enormi renis abscessu totam fere abdominis cavitate replente, Carol. Piso. de morbis a colluvie serosa, sect. 3. p. 2. cap. 37. C.

6. Nausea biliosa. VVillis. Pharm. ration. cap. 1. Bonet. Sepulchret. Tom. 2. p. 107. obs. 36.

Cognoscitur ex aurigine suppressa, ex amarore & flavedine eorum quæ vomitu sunt rejecta, & jam suppressa, ex eo quod a palatu sedatur nausea & jejuno stomacho recurrant.

In homine sæpius nauseante secto cadavere invenit Cabrellius ductum chodolochum pyloro in scutum; *Observat. Anotom. 6.*

Cum bilis regurgitat in ventriculo, ejusque parietes intus vel extus afficit, inde nausea & anorexia sæpe fit.

7. Nausea nephritica Boneti Sepulchret. Tom. 2. pag. 116. observ. 60. A.

Renibus calculo infarctis sæpius supervenit nausea, natura erroneo conatu, ventriculi alternis agitationibus, calculum quo molestat expellere conante, vel urina sanguini remixta ventriculum vellicante, vel nervis ventriculi sympathice irritatis.

Hujus speciei observationes octo vel novem videtis apud Bonetum cadaverum sectione confirmatas. Idem a cochlea putamine intra ream invento, observavit D. Peierce, *Act. Lips. Tom. 5.*

8. Nausea a semine corrupto Boneti Sepulchret. de Nausea, obs. 69.

Quidam veneri addictissimus tandem castimonie addictus, post sex menses nausea corripitur, tandem epiphora extinguitur.

Nullum vitium ullibi invenimus est præter semen viridescens in cavo canalis deferentis cumulatam.

9. Nausea ab apostemate circa cardiacam Caron. Zodiac. Medic. Gallici, pag. 128. C.

Hominis nausea diuturna consumpti cadaver exhibuit apostema albi poris libram continens, cum calculis albis inter cor, & ventriculi orificium sinistram, quo ventriculus irritabatur, nec tamen retrum odorem fundebat illud pus, nulla febris adfuert.

10. Nausea ex gastritis. Vide Gastritidem.

11. Nausea ex cacochylia Sennerti.

Ea est omnium frequentissima, quam comitatur pondus in epigastrio, sensus cujusdam boli cardiacam ingredientis, capitis vertiginosa gravitas, oris amaror, & cibi fastidium, sine febre; ea saburram pravam, biliosam, acrem, viscidam, ventriculo hærentem, designat, & vomitoris post diluentem tepidum potum frustra tentatum assumptis curatur.

Cave ante emeticorum usum ne ventriculus phlogosi laboret. Illa species febres malignas quandoque declinat.

12. Nausea marina. Vide Vomitus marinum.

XIII. VOMITUS; Græcis Emetos; Anastropha Gilberti Angli; Vomiffemens. Ebris Evemeti Hoffmani.

Vomitio est eorum quæ in ventriculo, vel oesophago saltem continebantur, facta per os rejectio; & vomitus est vomitio constans & frequens, adeoque morbosa & ut plurimum celer & violenta.

Ad vomitiones tamen pertinent alimentorum regurgitatio, & quibusdam hominibus superveniens & assuetudum natio, licet nec inde celeres nec violentæ sint rejectiones; secus multiplicanda forent in vanum morborum genera.

Matriæ vomitu rejectæ sunt recrementa vel alimentorum reliquæ, si vero cruore rejectatur, tunc datur hæmætemesis; illa ut plurimum erant in ventriculo contentæ, sive illuc ex tenuibus intestinis affluerint, ut in ileo; sive ex ejus colatoris secreta fuerint; sive deglutita prius fuerint forma medicamenti, veneni, alimenti; dantur tamen species raræ quidem, in quibus ex oesophago tantum rejectantur, quæ vomendo excluduntur.

Causa vomitionis est antiperistaltica ventriculi contractio, concurrente, si violenta fuerit, simultanea diaphragmatis & musculationum abdominalium pressione, nec non simultanea expiratione; ita ut duo in vomitione tempora distinguantur; in primo liquidum inspirando diaphragma ventriculum comprimit, orificium ejus arctat; in secundo materies oesophagum per vim subeunt, & motus antiperistalticus ventriculi ac oesophagi urget ascensum, simulque ac velociter expiratus impedit ne materies intra glottidem delebantur, sed saltu extra os, imo intra nates ejiciantur.

Ventriculum, in cane post assumptum arsenicum exenterato, vidi antiperistaltico motu vomitionem aliqualem, debilem tamen, producere, licet aeri expositus, & a pressione immixti esset ventriculus. Idem viderat VVesserus de clementia aquatica, pag. 68.

Causa vomitus est naturæ conatus ad expellendam per os quæ ventriculum molestant, quæque resistentiis oblati est superior, secus daretur tantum nausea.

Differt vomitus a cholera ex eo quod diarrhoea terminatur, aut tenebro simul non spectatur; ab ileo quod atroci abdominis dolore & alvi perniciæ constitutione non insignitur vomitus; a vomitione per constantiam, frequentiam & gravitatem, cum vomitio levis, fugax, arte excitata morbus non sit, sed symptomata plurium morborum, ut gastrodynia, gastritis, nephritis, cephalalgia, cacochylia, cardiacæ, &c.

Species vomitus ab eorum principibus constantior.

floribus erutæ sunt, vel succi alimentares bilioli, pituitosi, lactei, aerabilarii, urinoli, verminosi; vel vitia ventriculi, hepatis, coli, pancreatis, aliarumque partium.

Pulsus in vomitu critico est omnium maxime contractus & minus inæqualis; arteria sub digito rigescit, & fremere videtur.

1. *Vomitus a crapula* Frid. Hoffman. Spec. t. B. Ille est qui ob nimiam alimentorum aut potulentorum copiam assumptam supervenit; in eo si ante coctionem evomantur, colorem & saporem ingestorum referunt egesta; si præcessit aliquis coctio, acidum olens; accedunt capitis gravitas, vertigo, titubatio, cardialgia, ructus, nausea, pondus ventriculi, labii infimi tremor, copiosa muci exspatio, gutturi irritatio, levamen a vomitu, quo cruda ejiciuntur.

2. *Vomitus a febri* Frid. Hoffman. Spec. 2. B. Si carnes ingesta putuerint, ex illis reliquiis irritatus ventriculus etiam ingesta respuit, & fœtore saburæ ultimæ vomitiones inficiuntur; adest nausea frequens cardialgia, horror jeculorum & carniū, litis refrigerantium & acidorum, fœtor oris, lingue sordities, febricula, capitis vertiginosa gravitas, pondus, non vero dolor acutus in epigastrio; ea mania indicant emetico-rum, & dein cathartico-rum utilitatem, nisi vomitus uber sit & facilis, aut potu tepido expeditus & sufficiens evadat.

3. *Vomitus lactis* Kerckring, obs. an. 40. L. Lactentes uplurimum lacte insurgitati, illud regurgitant. Hoc debent alumni sui nutritricibus, quæ ut lactis sui copiam ostentent, infantes lacte continuo insarcire amant, unde debilitatur eorum ventriculus, vel statim a concepto gravipathemate lac præbent, alumnis vitiosum, quod in ventriculo non digeritur; hinc vel coagulatur, vel putrescit, inde vomitus excitatur, salutaris quidem, sed a principio morbofo, & sæpe puerulis funesto oriundus. Apri palustris succi potus cum vomitu sanæ; dosi drachmæ vi.

3. *Vomitus a detentione*. A.

Pueris, circa septimum mensem ætatis suæ, dum primores perpullant dentes, distracta tunica, quæ ab ore ad ventriculum protenditur, accidunt vigilæ, anxietates, gingivarum pruritus, oris ferror, papillæ mordendæ, aut cumulvis oblati corporis mordendi cupiditas; febris alvi constipatio, frequens vomitio lactis aut ingestorum, & si atroces dolores fuerint, febris acuta, motus convulsi, quibus se committit adiungunt symptomata vermes etiam indicantia; minus male se habent, quibus diarrhæa supervenit, non vero vomitus; hisce vero post aliquot dies sedatis, raro accidit ut dens operatus prorumpat, sed tantum, ut aint nutritricæ, gingivæ reduplicantur; subsequenti autem mensis dentes, ne adveniente quidem nutritricæ, prorumpunt.

Tot vana & noxia laudantur in hoc morbo auxilia, ut ea enumerare pigeat. Videantur Auctor, ut Sydenham. D. Lozerus, &c.

Vomitus verminosus Amat. Lusitan. cent. 1. cur. 5. Frid. Hoffmann. §. 24.

Quandiu solo lacte utuntur infantes, tandiu a verminibus immunes sunt; ablatatos, vel carniū esui indulgentes infestant sæpius, quod indicant odor singularis, quem acidum dicunt omnes, & tamen ab acido diversissimus est: anxietates & morsus tum ventriculi, tum abdominis transitorii, vomitus cum vermium per nars, œsophagum, anumve eruptione; quandoque reptantes per œsophagum vermes ipsi pueri suffocati digitis extrahunt; nars continuo prurunt, tussis gutturalis vexat, facies in horas rubet & pallat alternatim, sopor eos detinet cum febricula, dejectiones liquidæ, griseæ, odor sudoris verminosus, proprius; vomitus pituitæ pellucidæ, diarrhæa quandoque in ipso sopore convulsiones brachiorum, capitis, oris; demum oculis sursum rigidis, ita ut album tantum appareat, ad parietem suam cœlestem relicta hæc inferiarum vale, puræ eorum transigunt animæ.

Si credamus Veteribus, materies acido dulcis sanguinem coagulans, horumque vermium pabulum, est omnium symptomatum principium; Gualtero Harris fides adhibeatur, ab acido omnia pendunt quæ absorbentibus copiose assumptis debent curari. Omnes sere Medici dulcariis assumptis vermium exclusionem tribuunt; solus Valisnerius, sagax observator, contendit a dulcibus, bellariisq; vermes mellestari, & hinc comotos: suas strages rependo, confricando edere, si lumbrici fuerint, de quibus hic tantum est questio; nulla ætemus firma est theoria; in praxi vero venæ sectio quadrim's & proventriculis instituitur cum febris acuta est, licet non consentiant mulieres, sed parce & raro mittitur sanguis; dein lacte solo lactentes aut jusculis nutrantur infantes, cathartica vermifuga ex fenna, floribus persicorum; manna cum infuso seminis santonici iterantur vel emetica, ut tatarum subiatum ad granum unum, vel paulo ultra, aut syrupus glauberiani guttæ sex circiter propinantur, ea vero die raro vermes per inferiora excluduntur, sed diebus a catharsi vacuis offrunetur succus limonum cum oleo, vel potus ex aqua portulacæ, naphæ, confusione hyacinthina, semine santonici, corallina, nec non injiciuntur clysmata ex uvis passis, ficibus, melle, similibusq; parata, & tunc lumbrici quandoque plures ejiciuntur. A millepedibus vomitum pertinacem vidit Auctor nuperus Observ. Medico-Pract. pag. 89. Duobus onicis rejectis sanatus est æger.

7. *Vomitus ruminatio*.

Sunt homines qui una aut altera a pastu horra picide ingesta alimenta ex ventriculo ad os usque regurgitant, & globatim expunt cum aliquali masticatione; imo qui iterum ea deglutiunt, ut boves & capræ; unde merito ruminari dicuntur, quod incommodum & adstantibus nauseosum est; post lautiores dapes hoc tantum accidit.

Rusticus Cadomenis, forte premens manibus abdomen, sensit alimenta recens ingesta ad os ascendere, atque ea cum voluptate gustata iterum declavit; cum per aliquot dies hoc experimentum voluntario iterasset, hæc ruminatio in consuetudinem abiit, & sine voluntatis jussu per triennium quotidie hora una & semelle post pastum perescebat, inde robur minime incrementum, sed sudor & urina copiosior, dejectio vero alvina rarior; nullum de cætero detrimentum; hoc demum recessit Confessarius ac crimini vertit, quod voluptatis causa initio hæc ruminatio fuisse instituta; proindeque jussit ut alimenta vel in os reversa subito expueret, vel in stomacho retineret; ultimum non potuit, unde ruminata expuere cepit, inde vero intra quindecim dies debilius evasit, a labore confectio defatigatus, pallidus emaciabatur; hinc alvus adstricta, pedum phlegmazia, sonus inquietus, insomnia ægrifica: Medicus consultus præscripsit ut alimenta in os reversa subito degluteret, ruminatorem pro vitibus impeditret, masticatis post pastum jucundis stomachicis, ut conserva angelica, fero lactis copioso alvum laxavit, & post decem dies æger a ruminatioe & aliis incommoda immunis vixit: Hæc scribit D. Du Saulsay Medicus Cadomenis.

7. Vomitus a veneno Frider. Hoffmann. Spec. 4. Journ. de Medec. Avr. 1757. Cl. Majoult & hypomemphis Tralles de opio p. 5. A.

Sumpto arsenico vomitus brevis lethalis legitur in *Salmuthi* centur. 1. observ. 10. Erosio fundi ventriculi & inflammatio inventa est, dorsum & scrotum lividum; sumpto decocto *ellebert albi* seu veratri, convulsiones & vomitus immanes, cito lethales. Inventa sunt intestina statu distenta, in ventriculo corrosio & macula nigricans magna, pulmones spumæ nigricantes; *Boneti Sepulchret. Tom. 2. pag. 91. observ. 6.* Similem casum a gilla *virgilio* male præparata, *Henr. ab Heers*. In Chymici cadavere observavit *Boneti. ibidem*. A fungus venenatis vide *Hildan. centur. 4. observ. 34. Lemonier, Hist. de l'Acad. R. des Sc. 1740.*

8. Vomitus a pyloro callosio Frider. Hoffmann. §. 22. VVilf. Tom. 2. pag. 24. Bonet. de vomitu observ. 17. ubi casus plures, observ. 18. 19. 20. Cl. Razoux Journ. de Med. Dec. 1756. Novemb. 1759. pag. 409.

Tes illam speciem in ægris observavi, & in eorum cadaveribus principium tetigi; accidit vomitio tribus circiter a pastu horis, adeoque cum pasta chymacea proxime in pylorum immittenda est; frustra omnia auxilia tentantur, quotidie post pastus vomitio revertebat, unde sensim ægri contabescunt, debilitantur, alvus fere causa est, aut raro deponitur; jejuno ventriculo, si supinus & genibus flexis exploraret æger, quando durities in regione pylori, quandoque in fine duodeni, & aliis in locis sentitur, post mortem intestina mire coarctata, indurata, quandoque duodenum a tumoribus

scirrhis compressum, plura viscera indurata reperiuntur; post annum circiter moriuntur; usu lactis pro omni cibo satum procrastinatur, a numo deglutito pylorum obturante casum vidit *Kerekring observ. an. 2.*

9. Vomitus hypocondriacus. Vide Colicam hystericam Frid. Hoffmann. Spec. 4. C.

Scorbucis, quartanarum, lienosis, cachecticis communis est; prasini, eruginosi, virides, biliosi sunt vomitus: Vide *Alb. Academ. Bononiens. Tom. 2.*

10. Vomitus ab ulcere ventriculi Bonet. Sepulchret. Tom. 2. pag. 89. Hildan. centur. 5. observ. 36. C.

Illum præcedit dolor ventriculi acerbior, constans, sive phlegmone spontanea accesserit, sive a deglutitis aciculis, ossiculis punctus sit ventriculus; rupto abscessu, dolor minuitur; sed vomitus in longum tempus perseverat, ita ut veneno quandoque tribuatur; pus tam paucum vix in rejectis cognoscitur: apertura cadaverum principium morbi declarat.

Similem casum in quo pituita ad aliquot libras evomebatur cum alvi constipatione, observavit *Marcell. Donat. hist. lib. 4. cap. 3.* Volutica intercell erat exela, unde chymi irritantis transitum denegabat.

In ventriculo hominis vomitus habituali defuncti ulcus filulosum invenit *Schneiderus, de Cataractis pag. 439.* Æstus lenius, vomitus pertinacia, ægri extenuatio, febricula hanc speciem producit.

11. Vomitus ab stentomate ventriculi J. Rhodii, observ. 63. centur. 2. Boneti Sepulchret. de vomitu observ. 15. C.

Vomitur alimentorum semicostorum, alvi constipatio sensim crescens, morbus habitualis, abscessus, vel stentoma nunc in pyloro, nunc in cardia, nunc in fundo ventriculi; juvenem ab infestis in aqua tepida.

Ab scirrhis in suprema parte ventriculi & omenti ortum vidit *Rivierus centur. 2. observ. 48.* Ab abscessu, *Rislan. lib. 2. Anrop. cap. 20.*

12. Vomitus gravidarum.

2. Idem febriofus, *Vandermonde Jour. de Medec. Mars 1757. pag. 198.*

Eum scilicet singulis diebus eadem hora revertemem observavit *Vandermonde*, cumque vulgaribus remediis resistentem sanavit solo extracto kinkinae.

Uspurimum vel biliosus est, vel alimentarius. Biliosus mane jejunis accidit, & laboriosior est, ac gravior, fere convulsivus: ille sedandus est ope phlebotomizæ quandoque repetendæ, potu vel accecente ut limonæ, vel diluente ut theæ, infuso croci, unde juvatur bilis excretio, rejectio: vel stomachico, ut infuso horum chamæmeli, summizatum centaurei minoris, abfinethii, coctæ, vel aquæ naphæ, vel coccolatæ, vel quiete in lecto curatur, aut prævertitur.

Vomitur ciborum statim a pastu minus laboriosus est, verum inanitionem inducit & debilitat.

vatem: huic etiam conferre phlebotomia; alias juvat aquæ potus; alias vero vini, imo elixirii proprietatis ad paucas guttas; alias theriaca. Interea vomitus quandoque salubris est, inde felicitis parvicio; hoc suppreſſio ægrus habent plurimæ, minusque appetunt cibos, in quo casu vomitus est naturæ committendus. Vomitus in gravidis abortum prævertit. *Langrish.*

13. *Vomitus hexæuricus* J. Breynii, Philosoph. Transact. num. 459. 1741. G. Lonig. Trans. Philof. 1678. num. 3. C.

M. Læver 21. annos nata per biennium idem emovebat lapideas concretiones, quarum strepitus, etiam palpando, in ejus epigastrio percipiebatur; mirum quidem quod per quatuor menses sine cibo & potu viveret; quod clyſmata plurima vomitione rejecerit, quod urinas virides & arenosas pluries minxerit: *Collect. Acad. Tom. 4. p. 429.*

Quidam laborans pyroſi magnam copiam abſorbentium, testaceorum ingessit; demum supervenit vomitus cum sensu ponderis in diaphragmate, & post longum cruciatum obiit. Secto cadavere inventi sunt in stomacho pluriſimi calculi, quorum alii corallia, alii globulos referebant; quorum icones vide volum. 9. *Philosoph. Transact. Abridged. pag. 171.*

14. *Vomitus rabioſus* Anton. de Ulloa Voyage en Amerique, vulgo *la Chappenaude*; Hispanis *Vomito prieto*.

Chappenaude ibi vocatur qui fortunam experitur, & quæſtum, & victumve apud Carthagenſes industria ſua querunt; inopia facit tum ut parva, villique alimenta hauriant, tum ut frigori nocturno se exponant, quo nihil periculofius in regione ſervida. Succedit vomitus lethalis, ſapius ſtipatus delirio ita furibundo, ut niſi vinculis coerceretur æger, iſe fe ungibes, dentibusque miſere dilaniet; in mediis hiſce tormentis rabioſus expirat.

Hic morbus eos tantum aggreditur qui has regiones ab aliquo tempore inhabitare cœperunt, nec erat cognitus ante annum 1730.

15. *Vomitus arrabilaris* Bonet. Sepulch. obſerv. 23. de vomitu; *Morbus niger* Hippocratis. A.

Quidam nigricantia, aut æruginofa vomituaſſiduo rejiciunt; inventum eſt duodenum ubi arcum, ſeu angulum conſtituit, omnino obrutum, unde bilis in ventriculum reſſuebat, mora nigricabat.

In vehementibus naufeis, inteſtini duodeni finis, a duplicatura tranſverſa meſocoli arcatus, bilis uberior tunc affluentis tranſitum denegat; unde bilis poſt prima vomitiones ſere ſemper accedit in ventriculum. Vomitus atræ bilis hepate obſtruſto, ſcirrhoſo obſervavit *Car. Piſo, de morbis a ſero, S. 4. cap. 1. Bonet. Sepulchret. obſerv. 43. ubi plures caſus recenſentur.*

16. *Vomitus ab hepate obſtruſto* Bonet. Sepulch. obſerv. 36. Frid. Hoffmann. §. 26.

Eam ſpeciem conſtante obſervatione aliquot a Boneto relatæ, quibus verofimile evadit, bilem

in hepate obſtruſto retentam per vâſa ſanguifera in colatoria ventriculi reſſuere, ibique externi & bilioſum vomitum excitare, ſive hepar ſcirrhoſum, ſive bilis in lapillos coagulata ſit in cſtide; ſive abſceſſus in hepate ductus biliferos premit: hanc ſpeciem obſervo a quinque menſibus in muliere, quæ pluries aurigenæ experta erat, quæque averſatione alimentorum, maxime vero e carnis deſumptorum laborat; ſublevatur aquis thermalibus hieme, & acidulis Vallentibus æſtate.

17. *Vomitus a pancreate* Bonet. Sepulch. obſerv. 53. 54. 55. Vide Nauſeam obſerv. 58.

Hujus pulvini durities, vel ex pancreate putri ulcerofa emanans per ventriculum ad vomendum ſollicitat, maxime cum plenus eſt alimentis.

18. *Vomitus gaſtræcicus*, D. P.

Eſt vomitus habitus, quem excitat hernia ſtomachi intra muſculos abdominis inruſi, vel in thoracem trans diaphragmatis ſciſſuram adacti; iſtam varietatem, apud equos ſatis obviam, vidiſimus in muliere, quæ poſt vehementes naufæas in hunc morbum incidit. Secto cadavere, ventriculus totus in thorace latebat; a quovis partu hæc miſera mulier ſere ſuſſocabatur, uſque quo aſſumptum evomuiſſet. In cane ſimilem morbum obſervant & referunt *Mém. de l'Acad. R. des Sc. nec Sannerio* hic affectus fuiſignotus: vide *Novæ velles Claſſes ve Maladies* p. 152.

Prima varietas eſt frequentior, ejuſque ſigna vide in *Claffe I. de Gaſtræcæ*, & auxilia apud *Garengeot, Gænzium, &c.*

19. *Vomitus gaſtræcicus*. Vide Gaſtridem.

Epigaſtrium tumet, & ita acute dolet, ut nec ſtragulorum leviſſimum atactum ſuſtineat, ut in colica hyſterica; pulſus eſt debilis, frequens cardinalgia, mens quandoque ſtupet, vomitus frequens eſt, febris veluti maligna, viribus omnino proſtratis: *Vide Gaſtridem.*

Ab hæpate ventriculi vomitum habitualem obſervavit Panazol. obſerv. 43. A puſſilis rubris lividis, Vide Bonet. Sepulchret. obſerv. 56.

A carbunculo peſſilenti Diemerbroeck de peſte lib. 4. hiſtor. 15.

20. *Vomitus nephriticus* Bonet. obſerv. 60. Vide Nauſeam. *Vomitus a calculo* Frid. Hoffmann. pag. 27. A. Hæc ſpecies doloribus nephralgicæ caluſoſæ, ut etiam nephritidis ſtipatur; hujus caſus octo in *Bonet. Sepulchretis* videlicet.

Si arteria renalis cani vivo ligetur, conſueto vulnere poſt aliquot horas rejici materiæ urinam redolentes teſtatur *Chiræacius*; verum non ſemper ſuccedit experimentum.

21. *Vomitus ab æſophago obſtruſto* Frid. Hoffmann. §. 21. Villiſ. Pharmac. pag. 17. Fernel. Pathol. cap. 1. Colteri obſerv. pag. 121. Lierre Hiſtor. de l'Acad. R. des Sc. Villiſ. Tom. 2. pag. 25. Cochi Horti Florentini præſat. Halleri Diſput. Tom. III. p. 33. C. P.

Vomitum habituale ſtatim a paſtu obſervavit *Lierre æſophago* in maſcupium dilatato propterea ſcirrhum intus enatum, quo obturabatur. Similem obturationem glandula Vercelloni intumefacta

Et potest inducere in canibus. Celebris Florentiæ Aesculapius D. Cachi bis observavit hunc morbum a glandula dorsali schirrosa, & semel a venteris salmonis deglutitis ortum, ut docuit Anatome i ægri famæ perierunt.

22. *Vomitus a cartilagine xiphoides*, vulgo *la palette démise*. C.

Prolapsa (vel intus inflexa, ut vidit D. La-fosse) cartilago ventriculi molestat, qui ut obicem removeat convulsivè contrahitur, alternatimque dilatur. Similem vomitum observat Frid. Hoffmann. a ligneis illis, vel balznaceis chlamy-dibus, *Ausquieres* dictis, quibus epigastrium arctant puellæ, ut elegantioris stature videantur. Vide *Heisterum* de luxatione hujus cartilaginis. Hic morbus, si rusticis audiamus, frequens est, reapse rarissimus.

23. *Vomitus cephalalgicus* Hippocr. aphorif. 50. lib. 6. Frid. Hoffmann. §. 28.

Sed vomitus est potius quam vomitus; oritur vel a percussio cranio, & post alimenta bilis ipsa rejicitur, vel a cephalæa.

24. *Vomitus iliacus*. Vide Ileum. *Vomitus ab hernia* Frid. Hoffmann. §. 24. A.

Non semper sculeus est, nec cum ileo, ac bubonocle conjunctus: sed tantum a refluxu humorum ex intestinis in ventriculum procedit, ut in ileo.

25. *Vomitus marinus*. *Mal de mer*. VVater-Galle nautis. B.

Est ille qui navigantes discruciat cum cardial-giis, nausis, virium prostratione.

Ille minime pendet a sœtore cloacæ, licet ille sœtor quandoque concurrat; qui autem vomitu marino defatigari solent, illi etiam in fluminibus navigare nequeunt, navigis minime sœctis quin evomant aut nauseant, itaque nec a cloacæ, nec ab aquæ marinæ odore præcise pendet hic vomitus. Ille vomitus urgentior est cum mare procellosum est, & potissimum cum motus navis est a puppi ad proram: qui motus vulgo *Tangage* dicitur, atque accidit cum ventus a posticis fiat, vulgo *vent arrière*; minime vero accidit aut minus cum a vento laterali navigium versus latus inclinatur; minima enim est navis successio in hoc situ. Ad hunc vomitum arcendum t. supra pontem degendum est: 2. In loco a puppi & prora æquidistanti, ubi scilicet minor est navis agitatio. 3. Laute manducandum est, ventriculus enim satius minus laborat, quam vacuus; 4. Decumbendum est potius quam standum: hæc experti dicunt. 5. Sunt qui usum narcoticorum septima quavis hora suadent, & aliquot horis antequam navem conscendant paucis alimentis onerari stomachum jubent. De *Meysey* 76. nu. 5.

In vomitum quem rheda aliave vectura ciet, perniciosum est spiritus, liquores, elixiriaingere; inde excitatur pyrosis: plures facilius evomunt si in anteriori vecturæ parte sedeant, & ea præpostere procedat.

Illo vomitu ostendunt digestionem non rite fieri, si ventriculus exagitur, sed quorum stoma-

chus satur rectius digerit; an quia saburra gravatus minus mobilis est? Ægri qui navigantes multum initio vomunt, a priori morbo convalescunt. *Langrish*.

Plures vomitu marino rite expurgati, cum portum appulerint, multo melius se habent & voraciores evadunt quamante navigationem; & ad anorexiæ præstans est quandoque remedium.

26. *Vomitus pleurostus*.

Scenes quorum ventri-ulus in vacuum uberem fecerint: qui tamen belluones sunt, interdum evomunt uberem mucii viscosi, subpellucidi, inspidi copiam mane jejuno ventriculo, post cardialgiam multæque pituitæ expuitionem: laxitatem & inertiam ventriculi incusamus, & tunc ipsecuanhæ ad vomendum & reborandum, catharticum ex rheo, senna, nec non aquas Bellilucanas, dein absinthium, catechu, aloem, similiaque stomachicæ præscribimus. Hunc observabam in D. Lebrun Occitaniz Prætor. Evacuato stomacho ossa Hippocratica juvat; sit ex pane tosto, in aqua cocto ad siccitatem, dein vino veteri irrigato, cocto & addito saccharo; juvat etiam vinum cinnamomo, saccharo, ambra aromatizatum.

27. *Vomitus urinosus* Haller Physiol. Tom. 2. pag. 371. A.

Is procedit a suppressa urinz secretionem in nephralgia, ut accidit Lanfranco ipsi vel ab erectione retenta ob isehuriam vesicalem in atretis, *Hist. de l'Acad. R. des Sc. Observ. 3.*

28. *Vomitus hæmorrhagicus* Observ. D. de Fontefrede Medici Podio-Velauni.

In febri synochi decursu, cum hæmorrhagia narium, pulsu dicto prænuñciata, parum levasset ægotantem, revertebat illo pulsu, nec hæmorrhagia revertente superveniente nausea repetita, quam brevi secuta est hæmorrhagia, sed hæc non sufficiebat; die sequenti idem pulsus, eadem vomitum cum hæmorrhagia subsequente; tertia vice idem effectus, & æger convalescebat: nullus vero fuit parvus in ore sapor aut color, nullum signum indicabat vomitum a saburra excitari, verum hoc vomitorio conatu naturam usum esse ad hæmorrhagiam criticam narium promovendam verissimum est.

29. *Vomitus febriculus*, Ricard. Journ. de Medec. 1761. p. 39. A.

XVI. ILEUS, Græcis; Hipp. III. de Morbis *Ileus*, ab *ano ileitis*, revolvit one intestini sursum facta, vel ab *ileitis* intestini convulsione, vel ab *ileo* intestino aliis; Vox *ilei* est æquivoca, adeoque *chordash* postponenda; rectius ergo *Chordashus*; *Chordaphes* Celsi, vel *tenus intestini morbus* id. Liv. IV. cap. 13. Cælio Aureliano *acutum tormentum*; Pythagoricis *Prægnan* quasi septimentum; Latinis *ilica passio*, *volvulus*, *convolvulus*; *Copriemesis* Bonet. Sepulchret. pag. 234. vulgo *Miserere*, *Passion iliaque*; Ægri *ilici*.

Chordash. Morbus est acutus dolore abdominis,

nis, borborygmis, alvi confipatione, & vomitione sub finem stercoracea, stipatus.

Differt a vomitu per atrociam abdominis: circa umbilicum tormina, cum ructibus, nausea, rugitu alvique pertinaci clausura. A Colica per vomitionem frequentem, demum facientiam, cum singultu, virium prostratione & sensu exagitationis & volurationis intestinorum. Ab Ileco Galeni discrepat ileus Neutericorum, ut a colica.

Causa est facultatis expultricis intestinorum motus inversus, nec obstant experimenta ab *H. Luftr. D. Hagenot* instituta; ligato scilicet in felle intestino tenui, illud post 26. horas sphæroidem figuram adeptum esse docet, atque si icones non fallant, sexdecies majorem diametrum juxta ligaturam acquisivisse, nec tamen in exenterato animali vidit motum antiperistalticum: inde enim non sequitur quod in ileo ab alio principio orto deficiat hic motus, maxime cum intestini in abdomine calida & abdominis musculis sustentata illum exsequi possunt: in hoc vero casu, vel levissima & vix oculis conspicua facci dilatati confictio sufficiebat ad refluxum materiei in stomachum obtinendum, ut in solle hydrostatico depressio utris oculis conspicua sufficere ad aquam velociter e tubulo projiciendam. Gratis supponit Auctor mechanica necessitate contrahi fibras annulares intestini successive a pyloro versus podicem, cum natura non difficiat hunc motum invertat, quam libertas motum digitorum argillam amplexantium & exprimentium potest pro lubitu mutare, ut quidam pro lubitu vomendo. directionem motus peristaltici: œsophagi & ventriculi invertunt; fateor quidem hunc motum in distenso prætermotum tubo non ita expedite fieri posse; ut in sensus incurrat, nec hoc necessum est ad succum exprimendas materies, quæ mora & miscela superiorum cum infimis saporem & odorem stercoraceum adipiscuntur, qualem in tenui intestino possunt adipisci. *Morgagni Epist. Anatom. XXXIV. 30.*

Principia sunt ea omnia quæ facultatem expultricem ad hanc consuetam expressionis directionem mutant, determinant, ut difficultas transmittendi faeces per inferiora, sive ob acriorem dolorem in ulcerata vel inflammata parte, sive ob spasmodicum quæ pars inferior coardatur, obumbricorum, nucleorum, scybalorum resistentiam, vel denum ob ligaturam, compressionem, aut intus susceptionem, ac herniam, intestinorum; angustia vero canalisi minime pro causa vomitus potest haberi, cum omnis motus vix metrice pro causa supponat; angustia itaque intestinorum est æquum frequentius illic principium. Nullum servatum videt *Galenus* ex his quæ sæculentum vomitus passi sunt.

1. *Ileus Inflammatorius*, Sennert. 1^a Species. *Chordassus*; vide Sepulchret. Bonet, Foresti Obs. p. 336. *Colica Inflammatoria* Brendel. MS. A.

Ileus frequentissimus ab inflammatione intestinali tenuis oriundus. Cognoscitur 1. ex mali

acutie seu celeritatis progressus: 2. ex febre & vehementissimis doloribus: 3. Virium prostratio magna est: 4. nec cibui nec potus contineri potest: 5. graves singultus cum sudore: 6. quandoque convulsio: 7. in loco dolente tumor quandoque apparere renitens, oblongus, chordæ tensæ adinstar: 8. Urina supprimitur: 9. Abdomen inflatur: 10. Respiratio anhelosa, velox. Præcesserunt: causæ internæ, vel externæ inflammantis intestinis aptæ. Species hæc ut plurimum lethalis est intra quadratum. *Ballon.*

Cura enteritidis & dysentericæ inflammatoricæ convenit, non Sydenhamiana. Hinc speciem observant *VVillis de anima*. *Brutorum*, *Hildanus de gangrana*; invenere collum gangrenosum *Balleminius*, *Henricus ab Heer*, *Blasius*.

Larga phlebotomia instituitur, dein clystare emolliente alvus proluatur, potus emulsionatus, parca dosi sed repetita, offeratur; vomitio narcoticis identidem sedetur, semicupium tepidum dein usurpetur bis in die; vespere, si dolor, tensio abdominis exigat & pulsus permittat, phlebotomia iteretur; alvus pertinacissime resistens sumo tabaci syringe ope injecto sollicitetur. Syringem *Steph. Hales* verticaliter erectam, ano inditam, aqua tepida continuo plenam, nuperi in hoc morbo laudant.

2. *Ileus a fecibus induratis*, Sennert. spec. 3^a. *A cydomato obsturnate* Fernel. Pathol. lib. 1. Fontan. p. 84. Hippol. Bosci S. 2. p. 24. D.

Præcessit diuturna alvi adstrictio, sine acuto dolore, accessit abdominis gravitas, tensio crescens, tactu intestina stercore turgida, apparent; flatus eructantur, febris ferme abest, vomitio biliosa & puerilis accessit, crescente morbo stercorosa evadit. Hæc species multo minus acuta & periculosa est quam prior. Flatum ope solis in rectum immitti suadet *Hippocrates* & *Sennertus*; oleosa, diluentia, fomenta, clysmata profunt.

3. *Ileus spasmodicus*. *Ileus ab humorum anarthopia* Sennerti. A.

Novam illic speciem testatur *Sennertus*, in eo humores ex hypochondriis sursum vergebant, ut non solum epilepticus & cæcus fieret, verum etiam ut clysterem vomitu rejiceret æger: ab eo observatus. Similes clysterum imo pessariorum per os rejections observavit *Marthaus de Gradibus de vomitu*, *Guainerius* & *Jac. Oesthaus*. Similes anarthopias videmus in insulto apoplexiæ, capite & oculis cruore turgentibus, rubris, dum extrema pallent & frigescent. Similes spasmodici motus ventriculi & intestinorum observantur in colica hysterica, cujus curatio in hac specie maxime convenit.

4. *Ileus ab intestino compresso*, Bonet. Sepulchret. C.

A pancreate scirrhuso tumido colum premens inflammans, Kerckring. observat. anatomic. 45.

A scirbo tumore officulis factis colum premens inflammans, Hippol. Bosci de facul. anat. lib. 2.

A cancro exulcerante in erico constricto. *O. Ileum* inter-

intestinum subingressu, Fabric. Hildan. centur. 1. Observat. 61. P. Salii Diversi, cap. 14.

Ab intestino sub costis spurilis in hypochondrio dextro compresso Henr. Lavater *Thes. inaugur.* 5. C.

Rumpi aliquoties intestina in hoc morbo docet observari, ut Colum. *Barbette prax. lib. 4. cap. 7. Beniv. de additiis cap. 76. Rivet. centur. 3. observ. 26. D. Martin. Hist. de l'Acad. R. des Scienc. Ann. 1706.*

A Mola subali relictum premento, Hippol. Boscus de Facult. Anat. lib. 2. pag. 23.

A Scirrho mesenterii intestina premento. Riolan. method. med.

A Reito per membraneum anulum constricto Bonet. Sepulchret. observ. 24. cas. 9.

A tenui intestino per filum ferrum ab aegypto ligato, Henric. ab Heers obs. 32. pag. 191.

Ab intestini abscissu Bonet. Sepulchr. observat. 24. cas. 10.

Hæc ultima varietas ad ileum inflammatorum attine videtur: cæteræ vero ileum chronichum constituunt, qualem observavi nuper in adolescentula moniali, quæ tumores scirrhosos in mesenterio gerebat; hæc per tres menses ileo laboravit sine pyrexia & fere sine dolore, ac non nisi ultimo mense materies vomitione rejecta levem fecum odorem semel aut bis retulere; ea initio non nisi semel in septimana vomebat, sed intra minutum plures fluidi brunnei chymo griseo onusti libras, & quidquid fere in intervallo ingesserat vomitione rejiciebat, & hic et ille chronici character; vires ejus sensim imminuere sunt nutritionis defectu, mors fuit placidissima, lecto ob summam debilitatem diu addicta; virgo sub finem levi delirio visusque obscuracione affecta fuit; in decursu morbi bis vel ter alvum exoneravit, rejecta hydrargyri assumpti magna copia; non nisi sub finem morbi, exenato abdomine, tumorem mesenterii palpo distinguere licuit.

5. *Ileus a colo-pituita infarctio*. Boneti Sepulchr. observ. 25. ex Fernellio & Salio Diverso. Corpus semper frigit, febris nulla, dolores vehementes, dein vomitus biliosi & pituitosi, demum faeculent, colum pituita oppletum & obstructum inventum est.

6. *Ileus herniosus*, Foresti Observ. 20. 21. 22. Lib. XXI. A.

A prolapsu intestinorum in scrotum, Ballonii Conf. 24. Lib. II. Foresti. Obs. 7. Lib. XXI.

A bubonocle qui frequentissimus, Ballon. Conf. 31. Lib. I. Mangeti in Boneti Sepulchr. Obs. 26. pag. 237. *Colique provenant d'un boyau pince*, Puzos Traité des Accouchemens pag. 81.

Ab exemplulo Foresti. Obs. Lib. XXI.

Ab hernia vesica, Petit Mem. de l'Acad. R. des Sc. 1707.

Ab hernia Listeriana, Histor. de l'Acad. R. des Scienc.

Est Bubonocle frequens ilei principium; sunt bene multi russici, qui de colica & nausea conqueruntur, nec Bubonoclem se pati movent Medicum, hujus infirmitatis dedere timentes;

unde cavendum semper est ne emetica aut cathartica præstiterint in hoc casu, nisi prius exploratis ægri inguinibus.

Cura exigit phlebotomiam, situm supinum crucibus inflexis, fomenta ex omalis animalis, intestinis calidis, litus ex oleo, clysmata laxantia, arastificiosam a Chirurgo institutam pressioem & succussionem & demum his irritis operationem.

Nunquam herniosi debent brachierum deponere maxime cum cathartica sumunt, cum rursus.

Si intestinum tenue, quod gravidæ accidit, perstringatur in annulis musculorum transversorum, vel in umbilici foramine, sine ullo tumore extus sensibili nec indicio parietis affectu, morbus exurgit atrox, cujus symptomata colicam biliosam, flatulentiam, simulque hepatalgiam, & nephralgiam referunt. Similem morbum vomitu, pervigilio, febrim mediocri stipatam septem phlebotomiæ, clysmata plura, potiones oleosæ, narcotica ne minimum sedebant in gravis septemsetr; abortum proficitis *Fucus*, & sæctum vium extravit; mater vero post biduum obiit. Inventa est post mortem intestini ilei pars livida in annulo dextro vellicata.

Cura generica ilei. Naturæ conatus vergunt ad obicem, si adfuerit, torminosi intestinorum nistibus superandum & materias vomitorias conatibus qua data vi expellendas, quæ mora longiori gangram inducunt.

Vena pro viribus bis vel ter est secanda, ubi inflammatio sedetur, gangrana avertatur, intestina artius convulsa & contracta laxentur; iusculis & aqua pulli quarta quavis hora nutriatur æger. Oleum amygdalarum recens ad uncias plures bis vel ter in die hauriatur; vel decoctum radices althææ, soliorum malvæ, feminum lini substituitur; abdomen oleo tepido illinitur, vel decocto emollienti foveatur; clysmata oleosa & demulcentia injiciantur. Noctu narcotica cum oleo blando offerantur. Imminuto dolore cassæ pulpa recens ad uncias duas bulliat in aquæ pulli libra, fiant duo cyathi, cuilibet addatur oleum amygdalarum ad uncias duas & cathartica fortiora. ab Auctoribus præscripta sugienda sunt.

Si a vermibus, faecibus induratis, volvulo, foverit morbum suspicio sit, globulos plumbæ duos vel tres successivis diebus hauriat æger, vel hydrargyri semi libram, nec non balneum ex oleo parsum ingredietur. Vena & talo, si vires finant, deinceps aperiantur, linimenta, clysmata repetantur; una salus ægri alvum referant, flatus fortidos, faeces hac via ejici.

7. *Ileus volutus*. Bonet. Sepulchr. observ. 20. Cas. 21. ubi vagiti tres. A.

Ille est qui a mutuo intestinorum subingressu vel inæu susceptione dependet; millena sunt hujus exempla; vide Boneti-Sepulchret. observ. 20. ubi casus 15. recensentur. Ego in puerulis, cum & sine ileo, similes vidi intestini invaginationes & contriciones spasmodicas in caie-

vere perseverantes; ubi enim vermes sunt, intestina eos arte amplexantur atque intra & supra ita constringuntur, ut in pervia evadant, tunc constrictam partem a laxa superiori invaginari facillimum, superveniente hac occasione, vi expultrice inverfa supervenit inflammatio, dolor, nausea, ileus.

Si huius darentur signa, indicarentur in hac specie globi plumbei, hydrargyri magna dosi, possimum ut lumbrici incutantur.

Curam videlicet in *Riverril observ.* 26. *centur.* 3. Huc pertinet ileus phlyodes Rolsnii: intestina enim saepe flatu distenta & portentofo intumescit observantur *Plater, obs. lib. 3. p. 657. Beniv.*

Gastrographia eo sine facta, ut digitis evolvantur intestina, qua curatum ajunt Boronissam de Landi, apud me fidem nullam inveniet. Vide iu *Boneri Sepulchret. novam Mangesi pag. 228. To. 2.* Eam tamen suadet *Cl. de Mearyn n. 423.*

8. *Ileus Indicus; Mordazin Frider. Hoffmann. Tom. 6. pag. 207. Gallis Fer chaud; Mor-dschin Mem. de la Chine. A.*

Eam speciem Gox familiarem, & Sinenfibus communem, comitantur signa saburrae erudæ, vomitiones violentæ, tormina atrocita, sensuum obscuratio. Alit cholerae eodem nomine designant.

Cura. Obtenitur abstinencia ab omni potu, & ferro candenti pedibus applicato.

9. *Ileus phlyodes Rolsnii observ. 18. lib. 21. Tormentum Cælii Aureliani. A.*

Stipatur borborygmis, alvi constipatione, torminibus, & loco vomitionis datur flatuum frequentis eructatio, dolor supra umbilicum est, flatuus etiam, sed non feces alvo excluduntur; species a *Fæsslo* observata, curata fuit, ut ileus inflammatorius; mulieres tabulam ligneam calidam ventri applicabant inausste.

10. *Ileus calculeus D. Chaptal. D. Med. M. Clarissimi. A.*

15. Maii 1753. mulier post dolores abdominis & alvi constipationem in ileum incidit, sæculentæ materies per triduum vomuit; multo oleo olivarum propinato, & clysmatis forma injecto; nec non potata decoctione foliorum violæ, deum deiecit calculum pollice longiorem, semipollice crassorem, ovatum, subalbium, levem; quo excreto, alvus uberitè profluxit; hydrargyri semi-libram etiam hauserat, siquæ sanata est.

11. *Ileus a callosa coli stricture D. Gauteron, Societ. Reg. Nonip. Secretarius. A.*

In illico defuncto invenit ile sagax Medicus eolum callosum archissime angustatum; ut vix calamus scriptorium admitteret; hæc constrictio vetus erat, inflammationis experta. Similis casus est apud *Bonum in Sepulchreto*, ubi observatur rectum coarctum. Idem observavit *Vaubrenus in obs. Aët. N. C. Tom. III. Observat. 132. & apud Morgagni Epist. XXXIV. 34. nec non Illust. Hageni in homine qui inde enterocolicus evaserat.*

Qui imperforati nascuntur, eundem morbum incursunt.

12. *Ileus imperforatorum, Jous. de Med. Novembre. 1757. pag. 59. Illeus a reit. intestini coarctatu Bonet. Sepulchret. C.*

Infantes recens nati meconio suo non vacuantur; anus examinatur; si obturatio sit altior in recto, candela ceræ, vel specillo mucoso exploretur, & membrana obturans se prodet; quæ cito paryngotomo, vel cuspidè *troisseries* est caute, duce digito indice, aperienda.

Hæc operatione neglecta abdomen intumescit, tenditur, dolet, vomitio, cum torminibus acutis accedit, febris inflammatoria, sphecelus, mors intra hebdomadam.

Nemaui puella puer ano & genitalibus externis ab potu deliruita, de extero sana, imo pulchra, quolibet triduo vel biduo oborto circa umbilicum dolore, excrementa alvina per os rejiciebat ab annis quatuordecim, urina vero ex papillis mammarum aliquoties in die stillabat, narravit autopta *Illust. D. Eaux, Medicinam cum laude summa faciens Nemaus, Regiaque Scientiarum Societatis Montpeliensis Alumnus moritissimus.*

13. *Ileus verminosus. Illeus. passio a vermibus Gordon pag. 263. A.*

Hanc speciem vidit ipse in adolescentula, quæ per os omnia rejiciebat, cum materiæ acidis, verminosis, vivido dolore ad umbilicum, borborygmis, ita ut ad ileum magis quam ad aliud quodvis genus hic morbus accederet; interea alvus liberat erat, non pertinaciter adstricta; hæc species multo minus est periculosa ileo vulgari, seu volvulo, & cathartici vermifugis cedit.

13. *Ileus a veneno. Vide a cathartico, ut venato, colocythide.*

Santor Montpeliensis arsenici albi drachmam unam loco cineris tartari in potu cathartico hausit; 1. statim sensit se comburi, suffocari; vomitu continuo, ardore ventriculi, oris excruciabatur; 2. Extrema frigescere, facies plumbea, pallida, sudore frigido persusa; 3. Singultus frequens, sapor in ore horrendus; 4. Pulsus parvus, rarus, tardus, intermitrens; 5. Sitis inexhausta, anxietas horrenda; 6. Constrictio pectoris ineffabilis; 7. Per octo primas dies nulla urina, nullus sudor, nisi in facie, lingua sicca; 8. Per septem primos dies vomitus assiduus, biliosus, brunneus, abdomen molle, per quatuor dies alvus omnino elusa, reliquis diebus liquida, brunnea dejectio; 9. Circa quartam diem efcharam nigra, crassa, ex ore, æsiophago rejecta est, subsequente hæmorrhagia; 10. Circa sextam diem æger efcharam ventriculi evomit, pulsus nullus die septima priapismus cum rigiditate, erectione, dolore penis, balano livido per 24. horas; octava die anxietas aucta, febris cum pulsu pleno, intermittente, accedant convulsionem, delirium obscuro, vespere mors.

Cadaver aperiendum iussit Magistratus; adfuerunt dentes caribus denudati, linguz papillæ nudæ, totum os membrana sua spoliatum, villosa tunica ventriculi nulla; ventriculus liquore atro cum sedimento quasi carbonum tritorum plenus, intestina

atro rubra, valvulae integræ, gangrana in pyloro, in amygdalis, & foramine linguæ.

Cura. Hæriantur quæ prælo sunt ex oleis, iusculis pinguibus, lacte, dein gummi arabicum in aqua solutum, mucilago seminum lini, hiant similia clysmata, gargariata.

Clysmata sequens pluries feliciter successit in ileo vulgari; in decocto florum malvæ, chamæmeli & melliloti infunde per bichorium soliorum rutæ recentis manip. j, in colatura libra & semisse dissolve salis ammoniaci, drachmas iv; adde olei nucum & mellis mercurialis, ana, uncias j; divide in duo clysmata intra bichorium injicienda ut alvus exoneretur. *Journ. de Medec. Nov. 1761.*

XV. CHOLERA; *Cholera morbus, Troussellant D. Tissot. A. cholæ, bile, dicta fuit, vel ob cholades, seu intestina, ex Tralliano.*

Qui metuunt ne cholera cum iracundia Gallice dicta confundantur, vocant *cholera morbum, ac cholericam passionem*. Aegri cholericæ Aureliano dicuntur. Græcis *cholériques*.

Character. Morbus acutissimus vomitione biliosa aut acris assidua, & diarrhœa simul violenta, saltem nausea & tenesmo stipatus, cum dolore abdominis, virium prostratione, & non raro furarum crampis.

Sub finem ætatis frequentissima est quæ spontanea.

Causa est juxta Galenum conatus facultatis expultricis ventriculi & simul intestinorum ad evacuandam sursum & deorsum materiam acrem, biliosam, putridamve, quæ sua mora veneni ad instar viscera corrumpit.

Materies vomitu rejecta ab intestinis etiam procedere probat non solum bilis, sed etiam stercoreæ smegmatis vomitio ab Hippocrate & Lemnio notata in cholera.

1. *Cholera spontanea*, Hippocr. Epidem. lib. 5. Foet. pag. 1144. ubi curatio pessima ex veraturo & balneo. Idem, pag. 1159. de Eutichide, descriptio optima. *Cholera morbus*, anni 1669. Sydenhami.

Illa est species quæ sine procursu sine occasione evidenti sponte circa mensem Septembrem, etiam illis quæ nullo fructu utuntur, subito supervenit. Vomitiones enormes, biliosæ, pures per plures horas, dejectiones difficiles & tenesmodæ simul vel paulo post succedentes, quandoque & utplurimum cessante vomitione unam aut alteram diem perseverantes. Tormina ventriculi & intestinorum, cardialgia syncopen. minantur; prostratio virium subita summa cum pulsu parvo, dein nullo, vel celeri, frequenti, exili; in extremo facies cadaverosa, livida, extrema gelida, ætus, sitis inexhausta, frigidorum, aversatio carniæ, anxietas continua, furarum & aliorum artuum contractio spasmodica, crampus dicta.

Morbus ille terrificus, si subito, accersatur

Medicus, felicissime sæpissime sanatur; aut male curatus, aut neglectus, brevissimo tempore agrum & medio tollit.

Cura Sydenhamiana est omnium optima, ut vigetis & ultra expertus sum; nam in Nosocomio generali quotannis quatuor circiter cholera autumnales dantur.

Ægro adhuc vigenti offeratur aqua tepida, aqua pulli, imo si pulsus valet & dolor intensus sit, vena secetur e brachio. Juscula. vel cremores flexiles. quarta quavis hora offerantur, sed vix retineri possunt, adeoque post sufficientem evacuationem offeratur antiemeticum Riverii, scilicet unum aut alterum succi vel syrupi limonium cochlear, cum salis abinthii gravis viginti; si dolor, debilitas urgeant quavis diei hora, huic julapio adduntur laudani. liquidi guttæ viginti, vel pro re nata aqua menthæ; aqua cinnamomi olcum amygdalarum. dulcium; datis hoc modo induciis, juscula retinentur; tunc clysmata ex decocto intestinorum. vervecum tepida injiciuntur, parva dosi, maxime si tenesmus dolor exigat; quod rarius accidit. Reducunt vomitione recto ad antiemeticum, & vespere ad laudanum, potentissimum in hoc casu cardiacum & fluxum mire cohibens; si viri urgente limonata pro potu adhibetur. Post tres dies a cessatione vomitus & diarrhœæ, æger ex decocto rhapontici, mirobalani & syrupi de cichorea composita, vel ad summum manna superaddita repurgatur, & sic optime convalescit.

2. *Cholera sacra* Sydenham. Sect. 4. c. 2. Balionii, Cunsli. 77. lib. 1. *A flatibus* Galen. de caus. morbor. 4. *Fluulenta*. Menjotii; *Cholera suppressa* Riverii; *Cholera hypochondriaca* Langii; *Cholera Xera*. Hippocr. de victus ratione 103. Galeni. A.

Ab arida cholera venter inflatur, strepitus sunt, & dolor tum lacerum, tum lumborum; nihilque alvus deiecit, sed adstringitur; ita affectus ne vomat caveto, clysterem ex calidis & pinguibus adhibebis, perunctumque in balneum calidum immittes, calida irrigabis, ut calefiat Hippocr.

2. *Cholera anigmosa a fungis venenatis* D. Lemonnier Mem. de l'Acad. R. des Sc. 1749.

Historia diaria. Puella vorax feracem in quærat frigus fungus medix magnitudinis, torus albus. Viallant. Hoc in prandio. 1. Hora quarta pomeridiana cardialgia; noctu, dolores acuti, nausæ, vomitiones, dejectiones biliosæ, vires prosteruntur, cholera perseverat. 2. Mane pulsus frequens exiguus, vix distinguitur, epigastrium tumet, pulsus quasi a cordis mucrone. (duodeno distenso, aortæ pulsationes transmittentes) præscribitur aqua pulli, decoctum radicis althææ & seminum lini, clysmata iteratum & foras ex plantis emollientibus, pau xillum theriacis. Dejectiones sex, cum frustis fungi, vomitio nulla. 3. Mane diarrhœa sedata, cardialgia, debilitas persistant, meteorismus epigastrii & pulsatio crescunt; dejectio biliosa

um fructi fungi. 4. Nox pacata, cutis humida, pulsus melior, urinx fluentes, sumitur manna & catholicum; aqua pulli copiosa, fungos deiecit, sedantur symptomata, dormit. 5. Die accedit delirium, pectoris oppressio, suspirat, oscitat, anxia est, pulsus evanescit, omnia auxilia recusat, facies pallor, frigit, catamenia sistuntur: paratur balneum; substituitur pediluvium, inde redeunt catamenia sed parca; saphana fecatur, dispncea crescit, convelluntur maxillæ, iteratur phlebotomia & pede: aurigo supervenit, 6. Die mane expiravit, cutis flavedo evanuit, macula viridis in utroque oculi cantho accessit.

Cadavere aperto, phlogosis parva ventriculi; duodenum statim valde distensum; inferius strangulatum, hepatis tenum, rubrum, ductus choledochus in medio strangulatus, superne turpidus, inferne vacuus, unde aurigo post mortem, bilis in vesica fellea atro-viridis; intestina vacua illibata.

b. *Cholera dysenteria auriginosa* Mem. de l'Acad. R. des Sc. 1749. Lemonnier.

1^a. Die ejusdem puellæ mater, quadraginta quinque annos nata, robusta, parcius hos fungos voravit in plandio, vespere cenavit more solito. 2^a. Summo mane, colicæ, biliosæ vomitiones, meteorismus, pulsus debilis, virium prostratio, lingua sicca, fordida, dejectiones biliosæ: 3^a. Ipsi succurritur, vespere melius habet: 4^a. Purgatur, dejectiones sunt fortidæ, liquidæ; vespere laudani gutta quindecim: 5^a. Dejectiones fuscæ, fortidæ, ramenta dysenterica, dejectiones cruentatæ, pulsus exilis, extrema frigent, nullus dolor, nec motus in abdomine; tenio tamen in epigastrio, noctu ex narcotico dormit. 6^a. Dysentericus fluxus crescit, sopor altus, facies tumet, oculi flavescent, dejectiones mucrosæ, cruentæ, grumosæ, cardialgia assidua, surditas, oculi aperti fixi nil vident distincte; delirium obscurum, fugax, datur litium: 7^a. Ipecacuanha præbetur ad scrupulum, nil vomit, fecesit, dejectio inde minus fortida, datur tinctura rosarum, spiritu viroli acidulata, dysenteria sedatur, datur tinctura rheii cum lixivio: 8^a. Cessat sanguinis dejectio, pulsus major, sopor discutitur, redeunt sensus, nocte sedat, dormit: 9^a. Dejectiones biliosæ, utitur tinctura rosarum & rheii: 10^a. Fluit alvus, facies tumescit, aurigo persistit; datur peisana ex cicthorio, suncho, scorzonera; febricula accedit, somno & madore levi terminatur. Intra decimum quintum diem urinx fluunt ubertim, aurigo evanescit, ægra convalescit.

4. *Cholera a venenis fossilibus*. V. Neum a veneno A viriolo Anaxi Cent. V. Observ. 84.

Ab antimoniilibus.

Ab arsenicalibus Frid. Hoffm. de cholera obs. 3.

A mercurialibus.

5. *Cholera a veneno animal*. A Lucii ovis Gesner. de piscibus; Schenckii de venenis: A barbi ovis Gesner. de piscibus; Ab arramento sepia Plin. Histor. natur. A.

Historia. Mulier quinquagenaria, & filius ejus

ova friza barbi piscis ad eam edunt; hora prima matutina ambo expergunt cum nausea & cardialgia atroci, inde vomitus biliosi, acres, fortidi; hausta aqua pulli, fecesius frequentes, torminosi; injiciuntur clysmata ex aqua pulli, perseverant vomitiones & dejectiones usque ad vesperam, & convalescunt ambo; interea adolescentulus multos in annos debilitatus est.

6. *Cholera intermittens* Morton. Pyretologia pag. 16. 33. 81. Tertianæ cholericæ Torti de febr. lib. 3. cap. 1. pag. 124. De Myserrey art. 499. & c. 2. num. 214. A.

Hæc species quæ accessum febris tertianæ, raro quartanæ, sæpius triphosphæ paroxysmum comitatur.

Initio scilicet accessus vomitio biliosa, præstina, copiosa, acris, simulque dejectio frequens supervenit; non raro cum singultu, voce clausa, aut rauca, oculorum concavitate, angore stomachi, sudantia uncula minuta circa frontem, pulsus exili, extremorum perfrigeratione, aut livore, uno verbo cum symptomatibus cholericæ regularem stare solent, a quo distincta est ista, quia febris est symptoma ipsius periodos concomitant.

Hæc cholera mortem minatur in eo febris accessu, qui morbi incrementum, aut statum constituit.

Curatæ promptæ & largæ kinkina exhibitione, statim a paroxysmo incipiendo, usquequo drachmæ minimum sex ingellæ fuerint ante quatuor horas quæ subsecuturum præcedunt.

In cholera pulsus est qualis in vomitu simul & in diarrhæa contractus, & per intervalla intermittens.

7. *Cholera Indica* Delloni Voyage aut Indes Orient. Amstelod. 1689. Mardechi vulgo. A.

Symptomata. Sitis ardens, cephalalgia, inquietudo, febris, delirium, alvi fluxus, & vomitus, pulsus fortis, & inæqualis, urinx rubræ & albæ, sed semper limpidæ.

Terapia. Primum & præcipuum remedium quod huic morbo opponitur, est combustio pedis, ad motu veru terreo & latere ad tali partem magis callosam, usquequo æget dolore sensibile significet, quo facto statim veru tollitur, & paucis ipsis pars ambusta impetitur calce molli, eo sine ut phlyctenæ præcaveantur; hæc ambustio dolorem exiguum infert, & non impeditet quominus æger statim incederet, si cholera permitteret: nihilominus cholera violentiam retundit, & si febris non evanuerit, ea auxiliis ordinatis est impugnanda: æger nutritur decocto & cremore oryze, in quo etiam, si febris adsit, multum piperis additur; idem piper pulverarum capici inspergitur; a phlebotomia abstinet, & cathartica mitiora tantum sedato morbo, & dimissa febre adhibent.

Hæc methodos ita empirica videbatur Dionisio Medico, ut eam initio contemneret; verum multiplici eaque funesta experientia didicisse non alia methodo curari hunc morbum, adeoque in semet-

femetipso, & aliis ægris eam deinceps felicitè adhibuit.

8. *Cholera inflammatoria*, Amati Cent. V. Cur. 28. De Meyserey Malad. des armées art. 496.

Ea est quæ enteritico, ut in casu Amati, seu tumore phlegmonoso intestinorum seu gastritide stipatur; in hac quantocius phlebotomia institui debet, non neglectis fomentis emollientibus, aqua pulli, emulsionibus.

9. *Cholera verminosa*. A.

Est ea quæ a materie verminosa in primis viis latitante excitatur. Hujus exempla aliquot observavi in puerulis, apud quos materies illa verminosa eisdem ac venenum effectus edebat.

10. *Cholera arthritica*. *Cholera ab arthritide repressa*, ex qua mortuus est Sydenham. A.

Ea est quæ a materie arthritica repressa per artem, aut ob naturæ debilitatem retente exoritur.

11. *Cholera a crapula*, de Meyserey Art. 498. Est ea quæ a nimia ciborum & potentiorum ingurgitatione, vini potissimum nimia potatione procedit, natura hanc farinam supra & infra cum impetu eliminante; hic vero affectus fugax est & salubris.

XVI. DIARRHOEA; *Cacatoria* Galeni Lib. IV. pag. 790. *Rheuma gastris* Galeni in I. Prognost. *Rheumatismus* Tralliani Lib. VIII. cap. 7. *Afsclepiadis*, ex Aureliano, *Defluxio* Celsi Aureliani Lib. III. de morb. ac. cap. 22. *Catastrophæ*, *Diarrhæa* Gilberti Angli; *Alvi fluxus*; *venæis profusivum*. *Diarrhæa*; *conus de ventre*; *bénéfice de ventre*; *flux de ventre*; *dévoiement*. *Ægri Diarrhoici*, *Foixeux*.

Character. Recrementorum & excrementorum ut plurimum fluxiliorum frequens per annum defectio morbofa, id est, constans & notabilis.

Differt a cæliaca & lienteria ex eo quod non excernantur cibaria, aut cruda, aut in chylum mutata, ut in quibusdam lientericæ & cæliacæ spicibus, sed excrementitiz materies. A teneismo, quod nifus ad egerendum non sint inanes. Ab hepatirrhæa & dysenteria, quod ejecta non sint cruentata. A melana, quod non sint nigra.

Causa defectionis cuiusvis sufficiens est nifus facultatis expultricis major resistentiis oblati ex parte sæcum & sphincteris, valvulorum, &c. sed quod hocce conatus excretorios determinat, est molestia quam materies mole, mora, acedine, pondere, vel quomodocumque in intestinis excitans; raro facultas a terrore ad agendum commoveatur.

Materies morbofa est vel peregrina, ut venenum, medicamentum, vel humor in sanguine genitus ad intestinale colum delatus, ejusque tunicas molestant, ut in diarrhæis criticis, serosis, adipolis; seu colligativis; vel succus biliosus, pancreaticus, similisve in cavum intestinorum delapsus; vel demum fæces corruptæ, vitiosæ, acres; in omni specie primo ingestorum reliquæ

egerunt, deinde pro victus ratione ejectiones cum hisce reliquis commixtæ, vel puriores apparent, & prout bilis, serum, vel alter humor prædominium tenet, diarrhæa biliosa vel serosa nuncupatur; pulsus intermittens, observante Solano Doctore Medico, diarrhæam criticam præfaget.

1. *Diarrhæa stercorosa* River. *Diarrhæa a ventriculo & cibus corruptis* Sennerti; *Diarrhæa stomachalis* Gaspar. Hoffmanni. *Fluxus cibalis* Sennerti; *Bénéfice de nature*.

Illà est quæ a crapula, vel indigestis alimentis ut plurimum a voracitate orta, sine febre, & cum euphoria unam aut alteram perseverat, ex qua nedum viris imminuantur, functiones reparantur, famés prostrata resurgit; & cum ob copiam chymi, vel chyli cæterum cocti, sed in venas lacteas non transmissi, excitetur, fluxus cibalis aut chylosus audit, licet excreta sint nequaquam alba, sed non stercoracea, liquidiora; qui voracius cibos digerunt, non satis masticant, aut qui sunt edentuli, imo etiam balbi, notante Hippocrate, huic morbo sunt obnoxii. Rheum, rhaiponticum, syrupus de c. chorio compositus in cura primas tenent.

2. *Diarrhæa vulgaris*; *Diarrhæa a toto corpore sine febre* Sennerti. B.

Ea differt a stercorosa quod diuturnior, graviorque sit, atque cum ab ingestis non possit suppeditari tota quantà evacuat materies, ea ab intestinorum colatorio magnam partem excerni verosimile est, adeoque a toto corpore suppeditatur, id est, a sanguine qui per hanc viam depuratur; hujus itaque principium est uberior putridi serosique humoris excretio ex colatorio intestinali, unde cum fecibus ea ratione dilutis evacuat diarrhææ forma. Diæta tenuis, potus ex crusta panis tostii in aqua infusa, & cathartica lenia, sed adstringentia præmittantur; dein diaecordium, vel thierica præscribantur.

3. *Diarrhæa febrilis* Boerhaave aphor. 719. Sydenhami const. epid. cap. 4. pag. 31. Stahl. de febrib. pag. 64. *Diarrhæa a toto cum febre* Sennerti. A.

Ea est quæ synochum versus hñem comitatur; in febris quippe processu, ubi malignum in ventriculo humorum nonnihil subegerit natura, & ad intestina amandaverit, illa ab acri humore ex hoc fonte, perpetim scauriente, usque adeo corruentur, ut non possit non insequi diarrhæa.

Cognoscitur hac species quod initio febris æger in vomitum propensus fuerit, nec tamen emeticum fuit præscriptum.

Ab hac diarrhæa æger, jam febre debilitatus, ulterius emetatur, eo tempore quo natura suis viribus magis indiget ad fibrilam materiam, quæ sanguinem inficit, corrigendam, & alià forte viā evacuandam, unde periculum.

Hanc speciem non raro comitantur, aut præcedunt nausea, cardialgia, anxietas, jastratio, suspi-

suspiria luctuosa, linguae fordities, nigredo, &c. Curatur, praescripto quantocius emetico, si vires linant, & vespere sequenti paregorico leviter cardiaco; adstringentia vero porum profunt.

6. *Diarrhoea pituitosa; & album alvi profusum* Guill. Pison. cap. 9. D.

Perspirationi impeditae, adeoque crudo & pituitoso humori in intestinis excreto tributum apud Indos; ægrum magno dolore paulatim languescere facit, sine febre est; omnia ætati, hiberno id est pluvio potius quam æstivo tempore, ad mensis, nonnunquam ad annos durat.

Curatio a clysteribus abstergentibus incipiat, ut ex melle paratis; corpus præparetur syrupis similibus; dein ad ipecacuanham confugiendum, scilicet hujus radices drachmæ duæ cum vel sine oxymelle coquantur in aquæ unciiis quatuor; per noctem maceretur decoctum, & fumarur manes sequenti; postridie semel atque iterum pro re nata, die secunda, imo tertia, ejusdem ipecacuanham jam cocto decoctio sumenda, tum quod ægri debiliores eam facilius ferant. Hæc Guill. Piso.

7. *Diarrhoea carnea* VVolfgang. VVedelii Collect. Acad. Tom. 3. pag. 488. Peyer de glandul. intestin. exercit. 1. p. 2. C.

Ad dysenteriam accedit hic morbus, aut potius ejus est sequela.

8. *Diarrhoea variolosa* Sydenhami pag. 97. 94. 83. *A. miliari* Roncalli Medic. p. 151. 153. *Rubrolas subsæquens* Sydenham. p. 122. Morton. p. 28. A.

Ue pyralismus adultis in variola confluenta salutarius est & necessarius, ita in confluenta variola apud infantes, seu impuberes diarrhoea salutariis est, licet non æque constanter accedat, & in discretis variolis fit insalubris; in confluentibus ægrem hac via apud infantes natura se viru varioloso partim exonerat; alii in discreta non exsuperat illud virus, & tunc tantum supervenit diarrhoea cum a frigore suscepio repercutiuntur pulsulæ, & materia morbosica retrocedit.

Mal locata imprudenter mulcularum opera in sistenda diarrhoea, quæ infansibus variola confluenti affectus accidit, multa infantum millia letho dedit; secus feliciter perseverat ad finem morbi; e contra in discreta variola diarrhoea superveniens accidit, vel a repercutiione per frigus externum, vel ob evacuationes indebite factas, atque illis usu cardiacorum, & regimine conformi opitulandum est, quæ tamen ultra non sunt continuanda, quam symptomata quæ ex hac repercutiione processerunt; aquæ itaque stillatitiæ & diascordium indicantur.

Diarrhoea autem non solet ita mature infantes invadere, ac adultos pyralismus. Quocumque autem temporis morbo ingruerit, nisi ante histatur per artem, ea solet singula morbi stadia decurrere: diarrhoea rubeolam non raro excipit vel etiam ad plures septimanas excurrit, post morbi omniumque ejus symptomatum sugam, Sydenham. pag. 121. maxime si regimine calido ori morbosillo usi fuerint; hæc autem diarrhoea vix fritione non minus sanatur quam perip-

neumonia, quæ ab eodem calido regimine quandoque infantes in rubeolæ ipsius decursu aggreditur, cum pulsularum retropressione periculossima. Sydenham. pag. 122.

Si in variola discreta ante eruptionem superveniat diarrhoea, illa a saburra primarum viarum dependet atque cathartici, ut theco, myrobalanis, dein vero absorbentibus est impugnanda.

Facta eruptione in discreta variola, diarrhoea est insalubris, atque ope diascordii, theriacæ & absorbentium est reprimenda, secus collaberentur pulsulæ, parce tamen apud infantes narcotica sunt præscribenda.

9. *Diarrhoea æræsa, incontinens du ventre*. L. Incontinentia alvi est non frequens, sed intempestiva & involuntaria alvi depositio, qualis accidit pueris dormientibus vel etiam vigilantibus sed invitis, aut sui nimium negligentibus; hic parvus mor corrigitur minis, verberibus, curando ut alvum exonerent antequam lectum petant, cavendo ne nimium cibis se ingurgitent, ne cibis dyspepsis utantur.

10. *Diarrhoea biliosa* Alex. Tralliani, Frider. Hoffmanni Tom. 2. pag. 66. *Cephæa* Cælii Aureliani non Neotericoorum. A.

Cognoscitur ex flavedine biliosa excretorum, torminibus & calore viscerum, siti & siccitate oris, febre sæpius adjuncta, oris simulamarore, linguae flavedine, caulis calcascentibus prægressis, temperamento bilioso, tempestate calida prægressa.

Solvitur sæpe tertiana, triphopham aliaque febres biliosas, nequon amphimerinam catharrhalem benignam; potus optimus ex sale prunelle, ex nitro, aquis acidulis, sedata febre; affinis est valde diarrhoeæ cholerioidi, sed non est inflammatoria.

11. *Diarrhoea arthritica* Musgrave de arthritide anomala c. 4. Sydenh. p. 485. Baglivi p. 429. D.

Est illa quæ sponte arthriticis dolentibus superveniens dolores & tumores pedum supprimit; vel quæ materiem arthriticam ad intestina divertens solitum arthritidis paroxysmum prævertit; vel quæ demum in veteri arthritide, ob cruditates labefactæ ventriculo, accidit. Hæc ultima est pessima, vino & stomachicis debellanda, quæ a cathartici oritur, ut hypercatharsis curanda, prior vero naturæ sæpius committenda est.

12. *Diarrhoea serosa*, Carol. Pison. de colluv. serof. *Diarrhoea cerebralis* Gordonii; *Diarrhoea aquosa* Frider. Hoffmanni Tom. 2. p. 117. *lymphatica* Lambina. C.

Illæ species cognoscitur ex quantitate serosi laticis excreti, non oleosi & pinguis, ut in synchætica; est autem vel critica vel morbosæ: critica fit morbis cerebri, ut apoplexiæ serosæ, paralyti serosæ, aliique similibus superveniens, si leucophlegmatæ, alci si se adjungat, & priores morbos immunat, modo tamen vires ægri adhuc sint vegetæ; insalubris est, si a materie acri intestina sollicitante & serum sanguinis solvente fa- veatur, qualem suppeditant cathartica hydra- goga.

a. *Diarrhoea urinoſa*, Haller Phyſiol. Tom. II. pag. 370.

Ea Ichtuſe ſupervenit: Vide *Tranſact. Phil. num. 337. Pechlini Obſerv. II. 51. Rhodii Cent. II. Obſerv. 90. & 84. Groenveldi de tuſto cantharidum uſu* pag. 171.

11. *Diarrhoea purulenta* Benediſt. Sylvar. cent. 2. obſerv. 85. Friſder. Hoffmanni Tom. 2. p. 174. obſerv. 3. C.

Illa ſequitur ſuppurationem in meſenterio, pe-
rodice recurrit, ſaniem purulentam, quandoque
languinolentam fundit a qua æger levatur.

12. *Diarrhoea Chilienſis*, Feuillée, obſ. vol. 2. Illa ſpecies ſedem habet poſtiſſimum in inteſti-
no recto; Chilienſibus eſt endemica; principium
ejus eſt recti inflammatio: ſigna ſunt febris acu-
ta, tenſio podicis, deſectio frequens.

Curatur clyſmatis ex decocto ſolani, quod of-
ſicinali noſtro aſſine eſt, ſcilicet ſolanum cheno-
podii folio, acinis luteis.

13. *Diarrhoea colligativa* Riverii; *Syntheſis*
Dodon. pag. 102. *Fluxus colligativus* Sennerti;
Diarrhoea atrophica Junkeri; *Diarrhoea ſynthe-
tica* Græcis: *Ægri Synthetici*, C.

Duplex eſt hujus varietas; vel enim exacer-
bantes malignas febres comitatur, ut amphime-
rimam malignam, & cum ſumma virium pro-
ſtratione, liquidiffimus, nigricantes, ſcuſas &
foetidiffimas, putres, oleoſas, materies elimi-
nat; unde cito emaciatur æger & exhauritur.
Vel amphimerinam heſticam purulentamve ut
phthiſicam ſibi habet adjunctam, & excrementa
pinguedine ſuſa, putri, liquida diluuntur ob
ſummam acrimoniæ ex qua liquatur totius cor-
poris pinguedo, unde emaciatio, proſtratio vi-
rium & mors inevitabilis. In dyſenteria epi-
demica boum vidi ſæpe materies ejectas velut oleo
ſupra aſſuſo obvolutas: unde hæc animalia cito
emaciabantur.

14. *Diarrhoea vermiſoſa*; *Diarrhoea a vermibus*
Sennerti; *Larva conica in febribus*, Journ. de
Med. Juin 1751. pag. 340. *Vermiculæ hexapodes*,
ibid. Janv. pag. 33. a D. Bonte: non ſunt ver-
mes qui hanc diarrhœam excitant.

Cognoscitur ex ſignis vermium, lumbricorum,
aliunde repetendis, poſtiſſimum odore proprio an-
helitus in infantibus ablactatis, ex vermium de-
ſectione, ex ſecibus grifeis, moribus inteſti-
norum; curatur carthartico pro ætate diverſis,
modo vires ſinant, ſecus abſorbentibus & anhel-
minticis.

15. *Diarrhoea a dentitione* Sennerti. Vide vo-
mitum a dentitione. A.

Qui in dentitione diarrhœa laborat infantes,
ii minus convelli ſolent quam quibus alvus eſt
adſtriſta; huic autem diarrhœæ ſæpe junguntur
ſigna lumbricis designantia.

16. *Diarrhoea ab hypercatharſi*. Sennerti. A.
Ea eſt quam venenum cartharticumve inop-
portune aſſumptum excitat: Cathartica fortiora
ſunt vel per ſe, ut colocynthis, ſcammonium,
veratrum, eſula &c. vel reſpectu ad eos quo-

rum viſcera ſunt tenſa, ſicca, irritata, non ſuf-
ficienter remollita, etiam bene conſtitutus con-
veniant, ut jalappa, ſenna; æque lic inopportu-
ne præſcripta in venenum abeunt.

Illa præcepta & torminoſa diarrhœa curatur aqua
pulli, oleo amygdalarum, fomentis, & cum vi-
res ſunt nimis proſtratae laudano, diaſcordio,
non ſecus ac cholera curari diximus. Zeilanen-
ſes ab uſu ſchini, cujus fructu *diavall* dicitur,
huic ſpeciei ſunt obnoxii. *Flora Zeilan.*

17. *Diarrhoea choleriſta* Junkeri Tab. 135.
Nenteri pag. 401. A.

Hanc magna tormina, dolores, & febris inflam-
matoria comitantur: huic anſam præbent apud
puerperas iracundia, lochiorum ſuppreſſio, unde
puerperæ huic obnoxie ſunt; potus vero frigi-
dus, in his circumſtantiis lochia ſiſtens, morbo
anſam præbet.

Curatur phlebotomia, clyſmatis laxantibus,
potu oleoſo, diluente & anodynus.

18. *Diarrhoea adipoſa*. *Graufondure* Gallis.
Molecreaſe Anglis. Haller Phyſiol. T. I. p. 42. A.

Ex ſynocha ab equitatione violenta funditur
adeps, & partim in venas reſorbetur, ubi copio-
ſus cum ſanguine mixtus ipſi viſcoſitate magnam
concilians, partim in inteſtinorum cavum deſcendit,
& ſæpe quali butyro ſuſo involvit; differt a col-
liquativa quod ſit hec ſiccior.

Cuidam poſt ſectas marifas ſuperſevenit fluxus
materie ſpermatice ranarum ſimilimæ, quæ ad de-
cem libras aſcendebat referente *Græſſio*; *Colle-
ctio Academ.* pag. 15. Tom. 3.

19. *Diarrhoea latentium*. *Devolement des en-
fans de lait*. L.

Eſt deſectio pluris, in die repetita & liqui-
dior quam ſolenne eſt latentibus, ut quin-
quies, ſexies, octies in die; procedit ab ape-
pſia, ſi excrementa ſint fructus alimentorum
mixta, ut pulvis, carnis, fructus, cupediarum
&c. ſi ſint chyloſa, grifea, caſeoſa, lactea,
grumoſa; maxime ſi nutrit lactis inopiam pul-
tibus ſolidiſſe, cibis maturius exhibitis, vino-
dict.

Quomodo differt a diarrhœa dentitionis, ſignis
propriis dentitionis definiendum eſt: maxime ſæ-
cunt virore, gingivarum pruritus, calore; dolore
hæc ultima ſpecies dignoſcitur.

Curatur ſublatis principiis, ſuppreſſis pultibus,
cupediis, cibis ſolidis: clyſmata ex aqua præmi-
tantur: purgetur infans ſyrupo de cicorio cum
rheo alternis diebus, huius ſyrupi uncia una pro
doſis eſt, dein abſorbentia & ſtomachica adhi-
beantur, nec conſectio hyacinthina, oculi cancro-
rum, corallia præparata.

20. *Diarrhoea febricofa* Morſoni Pyretol. pag. 75.
Bo. 135. A.

Eſt ſpecies pendens a veneno. febrim inter-
mittentium latente quæ ideo ope kinkinz curan-
da eſt.

21. *Diarrhoea pleuritica*. Sydenham. pag. 99.
Baglivi pag. 37. A.

Fluxus alvi in picuritie ſunt pernicioſi, quo-
rum

in casu bolum sequentem præscribit *Baglivus*, scilicet requiet Nicolai & stibii diaphoretici scrupulum unum; fluxuque sedato, si opus fit phlebotomia impetratur; ideo diarrhoea noce pleuritici, quia tum sudoris, tum anacatharticos materiem ad intestina divertit & sic naturæ coactus criticos turbat.

XVII. COELIACA; *Cæliacos pathos Aretæi;* *Ventriculosa passio Cæli Aureliani Lib. IV., Passio cæliaca Recentiorum; Passio cæliaca; Cæliacos afflicti* Celsi videtur colica periodynia ventriculi; adeoque a cæliaca recentiorum distinctissimis; *Ægri cæliaci Grecis.*

Hujus character obscurus est, nisi cum neoterici ex albedine dejectionum desumatur, quod indicavit *Aretæus*.

1. *Cæliaca chylosa Aretæi; Diarrhoea chymosa, Tralles de opio.*

Est profluvium liquidi alimenti inconcocti chronicum, cæliacos morbos dictum; in hoc propter debilitatem virtutis digestivæ, alimentum semicoctum relinquitur, in pravum mutatur & colore & odore, & consistentia; albus est enim bile privatus color; olida excrementa & lurulenta, strident intestina, flatus erumpunt asperi, dolor ventriculi gravis est, punctiones refrens, debilis & macilentus æger redditur; longissimum, periodicum & difficulter curabile vitium. *Aretæus.*

Nullus est inter Neotericos qui hunc morbum rite observasse videatur; bile deficiente excrementa quidem albescunt, sed alvus adstringitur, ut in aurigine.

2. *Cæliaca purulenta, puris profluvium Lambinus flux. ventris cap. 7. Hemorrhoids alba Reiffelli Collect. Acad. Tom. III. pa. 15. C.*

Coxæ apostema neglectum tribus alvi dejectionibus una nocte evanuit. *Miscell. Natur. Curios. Decad. 2. pag. 82.* Abcessus cubiti pus jam maturum fluxum ventris effudit: *van Swieten commun. tom. 1. pag. 706.*

Differt a diarrhoea colliquativa colore & periculo, cæliaca enim purulenta salubris est sapius, diarrhoea colliquativa lethalis. Pus quandoque ex pectoris abscessibus, alias ex abscessu ventriculi, mesenterii, intestinorum; uteri procedit. *Vide Maubonium de abscessibus.*

Pleuritis pus per alvum expurgari vidit *Bartholinus Epist. cap. 4. epistol. 87. Sepalins animadv. lib. 6. p. 127. Valerius lib. 4. observ. 10.* idque non infelicitur; vix autem nisi a prægressis dignoscitur pus alvo excrementa a mucos puriformi: Sanatur cerebenthine usu.

3. *Cæliaca mucosa; Fluxus alvi puriformis, Lamolina fluxus ventris cap. 7. pag. 87. Mucosa dejectionis pro pura habita, Fernel. Parhol. 6. cap. 10. Mucosa diarrhoea puriformis & torminosa Freind Hist. Med. febre etiam comitæ, van Swieten commun. tom. 1. pag. 707. C.*

4. *Cæliaca lactea, Hoffmann. disqui. anat. pathol. pag. 212. Smellie Mydviser pag. 430. Jul.*

Offray Esai de pratique num. 28. de lacte colialis.

XVIII. LIENTERIA; *Lienteria Græcis, Laxitas intestinorum Celsi lib. 4. Lienteria, Ægri Lienterici.*

Character. Alimenta parum aut vix mutata per alvum ejiciuntur & simul statim a deglutione vel parva interposita mora dejectio excutitur.

Lienteria videtur diarrhoeæ species, vel gradus, non vero genus distinctum, aut ad summum, ut notat *Paulus Ægineta*, cæliaca non nisi gradu differt. Mirum est Antiquos nullam aliam ejus causam agnovisse quam lubricam & laxam intestinorum superficiem, quasi alimenta proprio pondere intestinorum anfractibus possent superare, nec vi trivisa indigerent ut foras pellerentur.

Sublimatum corrosivum ad drachmam unam assumptum ab homine escharam nigram abfudit ab intestinis, nec valvula delevit: scitatum esse hanc in Lienteria deletionem puto, ut & cicatricem orificia secretiorum obturantem, quam dysentericæ succedere quidam putant: ut manus & digiti nucleum argillamve lubricam exprimunt, ita massam excrementariam amollitam ejiciunt intestina, velocius quidem in ratione lubricitatis & fluxilitatis massæ, nec non velocitatis contractionis, adeoque eorum irritabilitatis.

1. *Lienteria ex ulcere ventriculi, Foresti lib. 22. observ. 30. C.*

In hac ventriculus ab ingestis irritatus ea continuo per pylorum in intestina expellit, hæc vero facile irritabilia propellunt ulterius. Hæc species fuit curata abstergendo ulcus per aquam mulsam, decoctum hordei, dein consolidando cum decocto radici symphyti, terra Lemnia, &c.

2. *Lienteria spontanea; Lienteria primaria; Lienteria ex irritatione stomachi. Gabelchoveri Centur. 2. observ. 41.*

Similem vidi in puerulo primo, qui excrementa liquida omnino summa cum celeritate post assumptum juseculum ejiciebat; ex siri, calore & sensibilitate ventriculi inducebat ad præscribendas aquas acidulas Alstenses, quibus sanatus est. *Gabelchoverum* per serum lactis aliaque temperantia ægrum suum sanavit coqueus vero in casu narcotica ut theriacam recentem præscribit.

3. *Lienteria scorbutica Bärbeite Praxis, Batmuller. de expulsiõe læsa. C.*

Hanc inducit irritatio facta stomacho a succo gingivarum sanioso, fetido, ventriculum molestante, concurrente laxitate pylori, & dilutione pastæ chymicæ, ubique seri intestinali secretion: præmissis levibus catharticis ex cassia, tamarindis, lacticiis cum absorbentibus ut creta, terra Lemnia, conveiunt.

4. *Lienteria aphthosa; Diarrhoea ab aphthis, Tralles de opio. C.*

Ab aphthis non solum os, sed etiam ventriculum

culum inficientibus & ad expulsionem sollicitantibus oritur.

5. *Lienteria secundaria* Hippocratis. C.

Est quæ longam dysenteriam, diarrhoeamve subsequitur; alimenta cum deglutiuntur borborygum edunt, quasi, ut ajunt ægri, in puteum delaberentur; cito vero post excrementa liquida serosa foras eijciuntur; ægræ transientes materies non percipiunt, sive debilitate obruti non attendant, sive sphinctere ani laxato, non advertant.

XIX. TENESMUS; *Tenesmus* Græcis, a *teno*, tendo; *Tenesmus* Gordonii & Gilberti; *Tenesmus* & *tenesmus* Nicol. Pisonis; *Dendripleed* Batavis; *Perse* Indis; Gallis *croute d'aller*, *epreinte*, *tenesme*.

Character. Ejectio mucosa pauca, cum magna egerendi, eaque assidua cupiditate, constatque ipsi proportionali.

Principium est irritatio continua intestini recti.

1. *Tenesmus spontaneus* Hippocrat. de affectibus; *Tenesmus biliosus* Bianchi hist. hepatis; *A pituita salsa* Rondeletii; *Ab acida* Ettmuller. B.

Pendit a materia acri, biliosa, vel in podicis glandulis a sanguine secreta, vel a canali intestinali huc delata, podicemque irritante, inflammante.

Hoc symptoma dysentericæ fere constanter assidet, imo post usum catharticoꝝ cum fortium, tum aquarum mineralium quæ frequentem dejectionem proritant, inducitur.

Stipatur autem ineffabili & molestissima descendendi cupiditate; quid paucum, mucosum, biliosum, quandoque subcruentum summa vi excernitur, quo claspso dolor cupiditatem sequitur, ea tamen multo tolerabilior. Hic, ait *Hippocrates*, alvum madefacere, pinguibus illinire ac lavigare convenit, quæ intus sunt lenibus catharticis subducere, calida corpus lavare, &c.

Profundæ clysmata ex oleis, decoctis omasorum, lacte, butyro insulso; intus diluentia, lactantia, cassia, tamarindi, & noctu narcotica.

2. *Tenesmus a calculo vesicæ* Bonet. *A dysuria* Bonet. Sepulch. observ. 30. *A vesicularum seminalium phlegmone* Carol. Pison. C.

Inflammato vesicæ collo, sphincter ani phlogosi afficitur, inde tenesmus calculosus molestans usquequo calculus extrahendus sit. Sedatur semicupius, sapone intus somno singulis diebus ad drachmas duas, narcoticis.

3. *Tenesmus Indicus* La Mettrie, Instit. Medic. num. 109. *Perse* vulgo. An bicho Brasiliensium? Tenesmus ille chronicus est, Indis familiaris.

4. *Tenesmus ab ascaridibus* Sennerti. L. Ascaris est reptile teres fusiforme seu utrimque acuminatum, anum habens in medio ventre, annulis distinctum, album, habitas in extremo podice. Numerosæ ascarides cum faecesbus saepe cæcæantur, Tenesmus ille pruritigem

inducit in podice horis potissimum vespertinis in lecto, flatibus & facibus emissis sedatur, sed singulis diebus revertitur.

Curatur oleo rutæ, unguento mercuriali in anum inunxis. Intus vero profunt anthelmintica, cathartica, decoctum radiis siliis maris. Equi in podice gerunt alterum etiam infectum, sed diæpterum, quod est æstrus ani equorum Faun. Suetum. 1024. illa infecta ano insident instar hæmorrhoidum cæcarum.

5. *Tenesmus hæmorrhoidalibus* Nenter. Tab. tit. 4. T.

A mariscis quandoque irritatur podex, potissimum si intentæ sint, & datur sensus molestus quasi nuclei perficæ ano intrusi. Hic est tenesmus quem experiuntur quandoque gravidæ, qui ipsis sanestus est, si veniens, nam abortum inducit. Curatur auxiliis generalibus, phlebotomia, diluentibus; topica vero sunt fomentum ex lacte, vitellis ovorum, decocto florum melliloti, sambuci, chamæmeli, croco.

6. *Tenesmus ulcerosus* Boneti Polyalthæ; *Tenesmus legitimus* Nicol. Pisonis de morbis cognoscendis lib. 3. C.

Veteres contendunt verum tenesmus fieri ab exulceratione podicis, externos nothos appellant, verum non satis adhucdum constat ab ulcere quæquam excitari tenesmus. Vidi pluries fistulas ani sine tenesmo; mucus expressus pro pure forsan imposuit. Vide curam apud Pisonem.

7. *Tenesmus a carcinomate* Bonet. Sepulchret. observ. 30. tit. 4. C.

Carcinoma inter vesicam & rectum hanc speciem excitavit ab acri ichore rectum vellicante.

8. *Tenesmus dysentericus* Sennerti, Boneti Sepulchr. observ. 30. tom. 2.

Ille ætneus est symptoma dysentericæ assiduus & præterea sine dysenteria conitens habet ejus principium, scilicet intestinorum tenuium phlogosim, ut notat Bonet. observ. 30.

9. *Tenesmus a Scybalis; Constipatio; la constipation.* L.

Qui lacte pro omni alimento vescuntur, crassa, albida, & dura quandoque scybala in recti marisupio colligunt, ad quæ ejicienda superveniunt conatus tenesmodi cum cupiditate ita argenti ut nisi cito feratur auxilium, in syncope delabantur. Chirurgus digitos oleo unctos intrudit in podicem, imo quandoque forscip quibus dura hæc scybala distringat, & foras extrahat; parturitioni similis est hæc defectio; cæterum alvi constipatio quæ non nocet, nec molestat, inter morbos non est magis referenda quam suppressio sudoris aut muci narium, seu mundities.

Ægra quædam per quatuor menses nec mingebat, nec alvum exonerabat, nec sudabat; frustra præscriptis fero lactis, jusculis diluentibus, oleo tis, denum ea sanata est balneo frigido per octidies iterato ex consilio Clariss. D. Chapal D. M. M. qui eas suppressiones auctæ nimium diaphoresi insensibili tribuebat.

10. *Tenesmus orientalis; ulcus & inflammatio* ani Gujll. Pison. cap. 14. Telco araba Brasil. Bilio

ties Angolensium; Doenza de Richo live Bicho do calulo Lusitanis.

In Angola alijque fervidis plagis antiquitus viguit, deinceps in Brasiliam serpsit. Vel dysenteriam male curatam sequitur, vel est primarius; iste incipit a dolore quandoque pruriente, dein intenso, atroci, cum conspicatione ita ut fæces injurata non nisi cum funisio cruciatu egredientur, imo non egerunt; hinc febres, vigilæ, lassitudines, nausæ, capitis imprimis dolor & ardor. Quandoque vero initio laet sub spontanea lassitudine, capitis & membrorum doloribus, insomniis, inappetentia, caliditate corporis, pulsus celeri & inæquali & tantum aliquo pruritu aut inani alvum exonerandi desiderio; hinc sicut in omni intolteriorum affectu Medici de ani statu percunctentur, & Empirici visu & tactu, imo limonum astriclu has partes tentant & explorant. Dissert a mariscis gravi capitis dolore, nec non quod ani ostium late hiet, & quod fæpermortem & quidem consilium adferat. Anus late diductus cloacæ instar livido & plumbeo colore squalens, dein sanguis, pus egerunt, quandoque cum vermiculis. Demum est incendium & corruptio ani cum ulcere depascente sine vel cum sanguinis fluxu dolorifico, tempore imprimis æstivo grassante.

Prævenitur refrigerantibus, antisepticis, clysmatis, inunctionibus, lavacris, balneis, subfumigis perpetuo insistendum; phlebotomix non negligantur; si vires non finant, tunc curbitulæ infra dorsum affigantur, clysteres consolidantes adstringentes qui narcotica recipient; dein usuperetur dilutum ex cerusa, aqua rosarum, saccharo rubro, ovi albumine, lacte & opio concinnandum, quod ope lintei in anum profunde immittatur; si vero pars atactum reformidet, suffumens emollientia & secantia instillantur; victus sit refrigerans & roborans; irritantia cane & angue pejus declinanda; si vermiculi a putredine orti appareant in parte affecta, ii oppugnandi unguento quod pulverem amarum & cinerem tabaci admittat.

Nihil autem frequentius est vermibus apud Brasilienses; illi ob calorem in ulceribus omnibus generantur; illi non solum ano & intestinis sunt familiares, sed in venterulo, folliculo fellis, utero, quin in ipso corde eos invenit *Piso*; qui cardiacas, deliquia animi, palpiationes, dentium stitiores & horrores nocturnos inferunt, illi medentur vermifuga, potissimum syrupus tabaci, citrea, & aurantia; &c.

Apud Angolenses viget idem fere tenesmus, eo discrimine, ut ferunt, quod stiperet alto mœrore, magna cephalalgia, æsthesia crurum cum acris doloribus, oculorum tanta intumescencia ut exorbitare videantur; huic morbo sæpe succedit Beriberia.

Frequens est apud Lusitanos Brasiliæ incolæ tenesmus magna podicis, recticæ inflammatione stipatus, cum cephalalgia, torminibus & cupiditate decidendi, magno podicis ardore & sæpius febre,

inde si negligatur morbus, ulcera podicis vermicibus scatentia formantur. Prophylaxis exigit ut podex sæpius aqua eluatur.

Therapia. Pluries in die vapor decocti limonium cum pauxillo sat. marini est podice excipendus, pessaria ex frustulis limonium in anum immittendi; initio hoc remedium sæpius sufficit.

Si ulcus adsit, pulvis pyrius in aqua rosarum vel plantaginis diluatur, & linctum hac aqua madidum podici applicetur, præmissis vapore ex decocto limonium.

A phlebotomia abstinendum est, licet febris adsit, sufficit clysmata initio anodyna & in fine detensiva adhibere. Vide Cellonium Voyage aux Indes Orientales.

ORDO TERTIUS.

SERIE FLUXUS.

Hoc nomine comprehensos volo fluxus quosvis nec cruentos nec alvinos, sed vel mucosos, vel quinosos, purulentos, lacteos, aquosos, lymphaticos; horum alij ex cutaneo, colo ut ephidrosi; alij ex naribus, ut coryza, phlegmorrhagia; alij ex oculis, ut epiphora; quidam ex ore, ut pyralismus; ex pectore, ut anacatharsis; ex genitalibus, ut leucorrhœa, gonorrhœa, enurelis, diabetes oriuntur, quem ordinem sequimini visum est.

Horum maxima pars vi retentrici imminuta debet adscribi, puipe ad hos fluxus producendos vis expultrix consueta major non requiritur, sed tantum respectiva major ob resistentiæ immutationem absolutam. In hoc vero minus recte sentiebant Methodici, & errant etiam plures Neoterici qui omnes effluxus laxitati spîsterum vel vasorum ruptioni, debilitati adscribunt, cum plurimi sint ad quos conatus veluti tenesmodos requirantur, adeoque vis expellens consueta intensior.

Nec minus a vero aberrant qui pro horum morborum principio semper colluviem serosam, lympham exundantem assignant, cum tamen ex seri effluxu ad ejus in sanguine exundantiam non valeat consequentia: senes mucum, pituitam frequenter a faucibus, naribusve eiciunt; eos phlegmaticos esse, seu humido scatere si concludas, alter pari jure eos fere expurgatos & exsiccatos esse pronuntiabit: certe in causa morborum generica ratiocinii severitatis est observanda, cum error in classe admissus toties multiplicetur quot sunt genera, species, & individua. Si quot pro causa fluxus in genere vasorum solutionem v. g. admittat, cum nihil possit esse sine sua causa, nec possit deesse posita sua causa, necessario sequitur nullum posse dari effluxum per vasa integra, scilicet per oscula excretoria vasorum; neganda sunt saltem talia dari in vasorum systemate oscula, quod quantum repugnet quotidianæ autopsiæ nemo non videt. Si laxitati sphincteris ani, valvularum intestinalium, superficiæ levitatis tribuendus sit

N

tan-

tantum causæ suæ omnis alvi fluxus, ut credebant plurimi, sequeretur in omni alvi fluxu curando convenire adstringentia: & roborantia, quod quam periculosum foret in dysentericis, inflammatoriis, teneosmodis quique paululum cordatus perficit.

Sint duæ vesicæ, una major, altera vero minor, sed sibi similes quoad figuram, elasticitatem, eodemque fluido repletæ, ita constructæ ut fluidum suum per ureteres admittant & per urethram emittant: si utraq; compressa vel contracta fuerit, quantitas effluxura ex una respectu alterius erit necessario in ratione amplitudinis orificii emissarii & velocitatis fluidi intra emissarium conjunctum, quandiu sufficiens erit admissio liquidi ad fluxum continuandum.

Quantitas itaque ex minori effluens potest esse æqualis quantitati effluenti e majori, etiam si emissarium duplo, triplo minus fuerit, tum quia velocitas, tum quia duratio effluxus tantumdem major est, ergo a quantitate effluxus ad orificiorum magnitudinem nulla datur consequentia, nisi velocitatum respectus habeatur.

Velocitas cuiusvis liquidi est ut radix facultatis seu potentie illud prementis, aut quovis modo exprimentis, norunt aquilegæ; quæcumque sit potentia vesicam comprimens, contrahens, sive muscularis vesicæ inbarena, sive gravitatis ipsius fluidi, sive expansiva, sive a pondere ambiente, ut dupla, triplæ velocitas fluido imperitatur quadruplo noncuplo major requiritur potentia, nulla habita orificii emissarii ratione, ita ut si pondere quadruplo prematur vesica, sive majus, sive minus fuerit ejus emissarium, velocitas effluxus sit duplo major, ergo a velocitate fluidi ad magnitudinem emissarii non valet consequentia contra quam sentiunt hydraulici ignari.

Quoniam possibile est ut vesica quæ duplo, triplo majorem continet fluidi molem, nec emissarium majus, nec potentiam comprimentem majorem habeat, adeoque non majorem in fluido exeunte velocitatem; fieri potest ut major sit quantitas seu plethora fluidi, & tamen non major sit, imo minor effluxus, ergo a plethora ad effluxum majorem non valet consequentia: errant ergo qui plethoram pro causa cuiusvis effluxus in genere assignant.

In fluxibus intermittendis, quantitas effluens intra datum tempus est proportionalis & numero recursum effluxus, & durationi singulorum recursum, si cætera sint paria, adeoque exiguis licet sit effluxus intra minutum, si tamen pluries in die, vel in mense recurrat, & per plura minuta vel per plures horas quilibet recursum perseveret, major fieri potest fluidi jactura quam per uberiorem qui rarius revertitur & minori tempore definit.

Facultas vitalis docente experientia collabitur, cum vasa eo usque deplentur ut eorum patietes flaccescant, ita ut cum necessaria ad sanitatem & robur detrahatur sanguinis copia, quo

plus detrahatur sanguinis, eo majus vitæ imminet periculum.

Ex uberiori sive lymphæ sive cruoris effluxu vasa flaccescere certum est; adeoque facultatem vitalem minorem evadere consequens est, hinc sit ut ex hæmorrhagiis, diarrhoeis aliisque effluxibus, in homine non plethorico accidentibus, robur omnium facultatum a vi vitali penditum imminuat.

Rubet facies quatenus cruor sufficiens vi pellitur a corde in cutanea vasa, superatis eorum vasculorum resistentiis, superata earum vi elastica, qua continuo constringerentur, ni oblatet vis immixti cruoris: ergo imminuta a sanguinis aut feri effluxibus immo dicis facultate contractiva cordis, pallore suffundetur facies.

Calor respondet particularum ignearum exertioni & actioni, illæ vero extricantur & agunt a vi circulationem promovente & vasorum cum fluidis attritum excitante, si itaque a fluxibus immo dicis vis cordis imminuat, calor in partibus potissimum extremis debet decrecere, seu frigescent extrema.

Cum robur seu potentia motrix in homine imminuit, mutatur consuetudo virium distributio, & ad organa vitæ minus necessaria, minor, ad cor vero & pulmones movendos major distribuitur virium quantitas, urgentiori etenim est occurrendum; hoc cernimus fieri in febrilibus morbis, artus enim multo magis debilitantur quam organa vitalia.

Simile quid in profusis sanguinis fluxibus observamus, in quibus cum ad eam debilitatem artus deveniunt ut e loco vix moveri queant, interea non tanto gradu debilitatur, pulsus imo pulsationes paulo frequentiores evadunt aliquando, & sic quod ipsis deficit ex parte plenitudinis, aliquatenus ex parte velocitatis compensatur.

Pulsus itaque in longis effluxibus minorem, mollioremque evadere, simulque solito frequentior, malum est signum; quippe quod indicat facultatem vitalem in angusto esse & vitæ periculum imminere.

Qui robore gaudent nec moraliis periculis perturbantur, illi omnes suas actiones constantius, & æquabiliter exercent; qui vero debiles sunt, aut in periculo versantes animo perturbantur non nisi tremulis & inæquales morus exerunt; hinc patet ratio cur hominibus, quorum facultas vitalis a profusis fluxibus est valde imminuta, & mens terrore perculsa, pulsationes sint inæquales, intermittentes, pejor est si mente non consent.

A morore digestionem languere, vitari ingesta non satis cito digesta, omnibus notum est: verum in longis ægitudinibus moror mentem occupat, cum vires vitales fatiscunt, & periculum vitæ imminet, maxime si elasticitas solidorum labascit; non mirum est itaque si in morbis evacuatoriis, potissimum chronicis, digestionis vicentur & stomachi functiones, ut famæ, langueant, unde mala plurima subsequuntur.

Omnia

Omnis effluxus pendet a vi fluidum exprimentem majorem quam est fluidi & sphincterem illud retinentium resistit; quam propositionem mechanice principis adeo congruam noverant veteres Medicinæ Patres & contemnunt Neoterici. In effluxibus activis, quales sunt plurimi; vis expellens solito major est, nec potest diutius exerceri, quin sphincteres elongentur, seu quin fibræ circulares vasorum diutius elongatæ & distensæ retineantur: atqui docet experientia chordas fidium quæ diutius extensæ retinentur, non ita cito, nec unquam deinceps etiam sibi reliquæ pristina brevitate recuperare, quod accidisset si brevi tempore tantum distrahæ fuissent, ergo in longis fluxibus vires retentrices & contractivas sphincterum, fibrarumque circularium imminui consequens est.

Imminuto fibrarum circularium robore, orificia ab eadem vi applicata magis hære debent, adeoque eadem vi expultrice applicata major debet, cæteris paribus, aut facilius fieri effluxus: hinc fit ut post longas dysenterias, alvus laxa evadat, ut post longas dysurias vix possit contineri urina, ut post multos partus diducta vagina uterus prolabitur, post longam diarrhœam rectum intestinum puerilis procidat &c. Non mirum itaque si superatis morbis evacuatores acutis, roborantia, tonica, adstringentia, quæ tonum augeant, resistunt, sunt necessaria, licet in acuti morbi vigore fuissent noxia.

In morbis evacuatores acutis vis expultrix est ut plurimum absolute major quam in sanitate, quia facultas est irritata a mole aut acrimonia materia morbosicæ, adeoque requirunt laxantia, lenientia, anodyna & evacuantia, quæ vires nimis auctas minuunt, & materiem morbosicam eliminant: verum in chronicis & passivis fluxibus vis retentrix seu solidorum elasticitas est imminuta, robur vitale deficit, adeoque tonica, adstringentia, roborantia indicantur, & quoniam facultas vitalis periclitantur ante omnia succurrendum est, analeptica, restaurantia, cardiaca sunt in usum vocanda, fluidis effortis, vappidis, nimium aquosis suis activis, spirituscentia, ut aiunt, nativæque restituenda viscositas, & semper ea sunt eligenda quæ cæteris paribus vim digestivam minorem exiguunt, ut digerantur, seu quæ sunt coctæ faciliore, gustui & ventriculo gratiore, atque materię morbosicæ corrigendæ simul aptiore.

Si homo v. g. diarrhœa serosa exhaustus, ea debent eligi cathartica quæ minori virium dispendio intestina expurgant, ut micia; sed simul ea anteferri quæ ventriculo & intestinis robur conciliant, ut subadstringentia, quæque ventriculum non subvertant, sed ipsi quæ minime fieri possit displicant, aut eorum sapor ingratus, admixtis stomachicis jucundis debet emendari, & eorum finita operatione sedantia, cardiaca, absorbentia & stomachia debent in usum advocari.

Rheum v. g. rhaponticum, myrobalani sunt materia simul & adstringentia, nec non ventricu-

lum roborant, serum aere absorbent; aquæ thermales sulphureæ fibras laxas roborant, serum vitiosum eluunt, expurgant, & vires corporis non infringunt.

Diaesordium, pilulæ de cynoglossio fluxus compescunt, adstringunt; terra catechu, cinnamomum, cassia lignea, nux moschata tosta, conservæ rosarum, syrupo cydoniorum admixta palato arident, stomachum roborant & simul adstringunt, adeoque cæteris paribus sunt aliis anteposenda.

Decoctum cornu cervi, gelatinæ aromatibus conditæ; decoctum album Sydenhami, succum nutritum, purum, viscidulum, sine labore stomachi sanguini suppeditant, ergo exhaustis conveniunt.

Lacticia, præmissis catharticis, & diluentibus, acrimoniam fluidorum temperant, coctæ facilia sunt, siccitati medentur, visciditatem fluidis dissolutis restitunt; ergo ubi dissolutio alkalescens, siccitas, amphimerina hectica, purulenta, lues scorbutica; fluxum solvent, ea cæteris præstant.

XX. EPHIDROSIS; *Tdros; Ephidrosis* Hippocrati; *Sudar morbosus*, aut. *rectus Sudatio morbosus; Suenr*.

Consultus est alio nomine indigere evacuationem, aut actionem sanam; alio vero morbosam, quam sub eodem confundere.

Sudor est fluidum cuius epidrosi est vacuatio; ephidrosis est sudorem quod diarrhœa ad fæces, & sudatio ad epidrosim, quod dejectio ad diarrhœam.

Character. Ephidrosis est sudatio tum quantitate, tum qualitate, tum interpestivitate notabilis, seu morbosus sudoris evacuatio.

Eandem esse perspirabilis halitus, & sudoris materiem verosimilimum est; sudor ab halitu illo discrepat, ex eo quod conspicui fluidi, non vaporis forma, eliminetur e cute; halitus vero perspirabilis quantitas est singulis diebus intra sanitatem dimidia fere assumptorum alimentorum pars; vitæ mediæ staturæ & ætatis 146 libras ponderans, in cibo vel potu intra viginti quatuor horas assumens circiter quinquaginta sex uncias, duplo uberius prandens quam cœnans, intra id tempus circiter viginti octo uncias perspirat, scilicet duodecim circiter per trientem qui somno impenditur, & sexdecim per duos trientes, qui vigilat; a sudore magis imminuit pondus corporis quam a sola perspiratione. certum est ex experimentis Gorteriensis.

Sudatio est proportionalis quantitati materię perspirabilis in sanguine contentæ, *velocitati* quæ secretur, & *cutanei colli calori*, aut laxitati, quæ a velocitate sanguinis adacta crescit: ephidrosis, est activa; quæ a cutis laxitate & seri abundantia fit, est passiva; visa sunt eadavera per aliquod tempus sudorem fundere, cumque frigidum.

Sudor frigidus ubertatem seri perspirabilis, cutis.

cutis quæ laxitatem designat; calidus, sanguinis velocitatem & ferocitatem simul.

1. *Ephidrosis spontanea*; Sudor apyretos sponte perferens.

Ter vel quater observavi homines qui sine causa evidenti, sine febre, sudoribus, potissimum nocturnis, per menses disfluere, unde macies, debilitas, inappetentia. Curatur eantharticus, acidulis, lacte; sed diu resistere consuevit apud pueros.

2. *Ephidrosis scorbutica* Senner. de signis scorbuti.

Sudor copiosus scorbuticus etiam media hieme sub levissimis tegumentis erumpit; & cum anxietates simul eos affligere soleant, non cessant illæ, nisi vapores illi pravi per sudores discedant; sequitur autem plerumque hos copiosos sudores atrophia.

3. *Ephidrosis febrilis* Boerhaave aphorism. 715. *Sudor febrilis*; *crista* Hippocr. Sect. IV. aph. 36. ad 62.

Sudor vel est insalubris, vel salubris. Salubris peracta materię febrilis coctione supervenit cum euphoria & virium redintegratione; is nunquam initio febris accidit, ne paucus est, nec profusissimus, aut diutius repletus.

Insalubris est tunc qui calidus initio accidit, tum qui in decursu morbi partialis tantum est, ut circa caput, pectus, tum quocumque tempore superveniens, si frigidus fuerit.

Post febres exacerbantes malignas quandoque æger in sudores delabitur, a quibus debilitatur, & illi cohibentur, momente *Sydenham*, si æger lecto non continuo affixus manet, sed identidem lecto insideat, vel exsurgat; ast si vires & fames vigeant, hi sudores optimi sunt, licet fetidi; memini me sudorem moschatum per mensem exhalasse post amphimerinam malignam; simulque salubri boulimio degentium intra hoc tempus vires & corporulentiam amissam recuperasse.

Utilius nihil est ad prohibendos sudores quam tegumenta detrudere, e lecto surgere, aerem frigidiusculum admittere, potu nitrato, emulsionato, frigido amissum reparare.

Vide *Ephemeram sudatoriam* 1a. Classe. *Hemiteisum*, *ibidem*, &c.

Sudor criticus ex pulsu inciduo præfigitur, ut docet D. Solano.

4. *Ephidrosis syncopica*. Sudor diaphoreticus, seu syncopicus Nicol. Pisonis de morbis cognoscend. pag. 212.

Is sudor stipatur frigiditate, & vel partialis est, vel universalis.

Is evenit, ait *Piso*, quoniam ea quæ corpora nostra regit natura, quæ Hippocrati est calor naturalis, vel omnino extinguitur, vel proxima est extinctioni, unde laxantur solida, adeoque cutis ofensa secretoria; intereadum a errore frigido & veluti coagulato serum uberim separatur, & sic per cutem frigidam exsudat, facultate retentrice illud continere non valente. "Hunc sudorem comitatur pulsus parvus, rarus, fortisane, faciei color, qualis est mortui, sedus, pallens, desperatio, animi angor,

jastratio. Videtis an sineope sit, an vero cardinalia quæ sudore foveat. De sudore consulatur *Sennerii Semelotica*.

5. *Ephidrosis hætica*.

Est symptoma phthisos, tabis, hæticæ amphimeriæ in phthisi sæpe partialis est, & a collo, capite, thorace potissimum premanat, noctu post paroxysmum.

6. *Ephidrosis exanthematum* Frid. Hoffmann. T. 2.

Est sudatio quæ rubellam, purpuram, miliarrem, similisque exanthematicos morbos comitatur; acidum redolet in miliari; in nullo morbo est subito aeris frigidi intervenitu cohibenda; si diebus eriticis accidat, modo vires non exolvatur, salutaris est.

7. *Ephidrosis febricosa*; *Trisaphyna elodes* Græcis. *Febris sudatoria*, vel *diaphoretica* Torti de febribus lib. 3. pag. 126. & 187.

Fraudulenter est ea febris intermittens, vel remittens, quæ nullo præcedente præviatis indicio, ægrum invadit more solito cum frigore & horrore, cui succedit calor, & statim sudor aliquantulum præcox, qui equidem febrem videtur primo aspectu alleviare, sed revera post illum porius intenditur febris quam remittitur, imo confortior videtur, quo copiosior est sudor.

Hinc potius longitudo morbi significatur vulgo quam mors, sed in hoc morbo paulatim frigit sudor, & in diaphoreticum sensim degenerat, sudat perpetuo ægrotans, & dissiuit undequaque frigidum sudore perfluus. sicque perpetuo algens & sudans, sicut cera liquatur, diffusivius & deficit, pulsus celox est, minutus ac debilis, respiratio hæ anhelosa & frequens, dissipantur vires, mens sola lucidissima est, & sentit homo se paulatim mori; nisi autem illa ipsa accessione succedat, in proxime futuram tantum protrahitur; rarius accidit ægrum algidum sudando fieri, circa tempus declinationis proximum tenui, frigido & viscoso sudore profundum cum frigore mortuo, unde cum tantum metuebatur longitudo morbi, in declinatione succedat mors, quam facies Hippocratica illico scita præmonstrat. Præmissis catharticus & dextra tenui ad kinkinam est confugiendum.

8. *Ephidrosis lateralis* Franci & Schmidii Col. lect. Acad. vol. 3. pag. 577.

Ille observavit mulierem quæ per totam vitam, excepto graviditatis tempore, quoties sudabat vel arte, vel sponte, nunquam nisi a sinistro latere sudorem profundeabat.

9. *Ephidrosis lactea* Ephemer. German. Dec. 2. anno 5. append. pag. 67.

10. *Ephidrosis mellia* Rhodii; *Oleagiosa* Moltenbroeckii.

Sudor colore & consistentia mellia.

11. *Ephidrosis vinosa* Bartolini.

Sudor colore vini rubri.

12. *Ephidrosis viridis* Borelli Cent. 2. Obs. 56. Sudor colore viridi in axilla.

13. *Ephidrosis nigra* Zacuti, Joel. Langelox. Collect. Acad. Tom. 3. pag. 255.

A scer

A scrupulo auri fulminantis sumpto oriebatur, observante Langelorio.

14. *Ephidrosis lucra* Hildani, Joel. Langelot. Collect. Acad. Tom. 3. pag. 357.

Ab usu auri fulminantis, in hemiplegia scorbutica vidit Langelotius.

Ab usu Rhei *Christi Menzelii*, Collect. Acad. Tom. 3. pag. 255.

15. *Ephidrosis urinsae*. Salmuth. L. 1. Obs. 82. Haller physiol. Tom. II. p. 471.

16. *Ephidrosis cruenta* Joel. Langelot. Collect. Acad. Tom. 3. pag. 255. Schwencke Hæmat. 130.

In scorbutica sanguinem sudorem vidit Langelotius.

In adolescente sudor axillarum colorem cinabazinum referebat: Hoffmann.

17. *Ephidrosis carulea* VVincler. Collect. Acad. Tom. 3. pag. 263.

In Epilepsia paroxysmo faber lignarius sudorem caruleum ex hypochondrio dextro fundere visus est a D. VVinclero & a Mogio.

18. *Ephidrosis a saburra*.

Est sudatio quæ a nimio cibo sumpto, potissimum a cœna lautiori & somno citius eam subsequente, procedit, & hic est sudor a saburra cruda. Altera est ephidrosis a saburra putri; sudor multus in somno factus absque causa manifestæ corpus uti nimio cibo significat, ait Hippocrates; si vero cibum non accipienti id accidet, corpus evacuatione indiget: Aphor. 41. Sect. IV. portentosam ephidrosim, quæ intra diem ad 40. libras assurgebat, a saburra verminosa productam observavit Ill. Marten de Grandvilliers Journ. de Med. Juill. 1762. p. 29. hæc ultima cardiacis cessit.

19. *Ephidrosis acida*.

Symptoma miliaris, tachialgia vegetalis, ephemeræ lactæ, & amphimeræ verminosæ.

20. *Ephidrosis aronæa*, Haller Physiol. L. 12. pag. 40. a sale crystallisato Tronchin de Colica Pictonum; Leeuwenhoek Trans. Philof.

Hydronosis Foresti, vulgo *suette*, ad hanc Classem attinet, si sudor in hoc morbo sit præcipuum symptoma, non vero febris, ut in *ephemera sudatoria*, vel eruptio miliaris, ut in *miliari sudatoria*, quibus nomen *suette* etiam vulgo tribuunt Neoterici. Sudorem esse potissimum symptoma in morbo quem sub eodem nomine descripsit Clariss. de Myssere verosimile est, cum pyrexiam fere nullam observavit, sed clarior & magis distincta huius morbi requiritur notio ad genus hydronosis stabilendum, si a prioribus morbis discrepet.

XXI. EPIPHORA a Delachrymatio plinii; *Rheuma ophthalmicum* Galeni 4. de locis cap. 5. Tralliani Lib. 2. cap. 1. Pauli lib. 3. cap. 12. &c. *Oculi lachrymosi*, *Illachrymatio*; *Lachryma morbose* Gorræi; *Lippitudo serosa* Etmullei pag. 297. *Larmoyement*.

Character. Humoris ut plurimum serosi ubet & constants ex oculis effluxus. Fons potissimum est *Sauvages Nosologia Methodica*. Tom. II.

glandula lachrymalis superæ externe sita, cujus ductus excretorii ad limbum internum palpebræ superioris hiant; ille humor per spatium trigonum a tarsis & cornea relictum, vi adhesionis fluit, & veluti fugitur a punctis lachrymalibus quasi a tubulis capillaribus, inde fertur per ductum nasalem a nares.

Toties vero nulla est lachrymatio, quoties quantitas a glandula suppeditata non major est ea quæ transmittitur a punctis lachrymalibus, verum major evadit 1. vel uberiori secretionem, 2. vel parciore resorptionem; uberior est secretio, dum mæior mentem afficit, dum vapore acris, aut pulvere illapso, aut phlogosi irritatur hæc glandula; parciore est transmissio, dum vel puncta lachrymalia, vel ductus nasalis quoquomodo angustantur, obstruuntur, comprimuntur; hinc variz species.

1. *Epiphora a pathemato*.

Vel hysteriam comitatur, qui fletus cito risu excipitur; vel merorem, commiserationem a morbo extincto sequitur; vel in morbis gravissimis, ut febribus acutis, accidit ciera causam evidentem. Vidi autem in hoc casu unam aut alteram tantum lachrymulam, & illa lachrymatio, si cum aliis signis pessimum iungatur, prævi est omnis ex aphor. 80. *Epidem.* 1. Si reliqua non sint exitalia signa, hæmorrhagiam tantum significant & narius imminet.

2. *Epiphora ex rhyæ* Avicennæ, *Algarab* Acabibus.

Hujus existentia valde dubia mihi videtur, nisi Rhyas fiat ab erosione caruncule lachrymalis, adistatque ideo irritatio, rubor, dolor, cujus ratione ductuli lachrymas a punctis lachrymalibus ad ductum nasalem devectentes sint constricti; nec enim, ut putans plurimi cum Veteribus, gravitate fluunt lachrymæ in statu sano, adeoque deficient hæc caruncula non ideo desuunt, cum etiam prone decumbens non lachrymetur.

3. *Epiphora ophthalmica* Sennetti; *Epiphora* Galen. introductione. *Lippitudo sanguinea* Etmullei, pag. 297. *Ophthalmia humida* Sennetti; *Chasie*. L. Vide Ophthalmiam.

Epiphora ex variolis Etmullei. L.

Ulla illachrymatio sequitur variolam, cujus pustulæ forsan intra tubum nasalem suppuratæ hujus coactum, vel a pure spissiori infarctum producere; ea vero quandoque fistulam lachrymalem accerit, an vero semper? dubium & inquirendum superest. Infantes plurimi crescente ætate ab hac epiphora liberantur.

4. *Epiphora ex agillæ* Sennetti; *Fistula lachrymalis* Auctor. L. *Fistula lachrymale*. L.

Agilops nomine intelligo exacerationem, aut abscessum in magno oculi cautho, qua ductus nasalis, vel partim, vel omnino obstruitur, ita ut lachrymæ purulentæ tum per nares effluant, tum per puncta lachrymalia, cum per fistulam in vicinia causam resuant.

Inde vero subdividitur fistula in completam & incompletam; imo datur species in qua pus non ex in-

teriori hujus ductus, sed ex abscessu proximo demum superne rupto refuit. *Vide Peitum loco citato & Heisteri Chirurgiam.*

In hac fistula lachrymalis, quam sola fovet ductus nasalis obturatio, feliciter succedit operatio olim ab *Anello* indicata, nuper perfectius adhibita a *dexterrimo Montpelienfi Chirurgo D. Majan*, filum scilicet argenteum extremo altero acus instar perforatum immittitur per alterum punctum lachrymale usque ad nares; hinc vero foras abductum trajicitur uno, vel altero bombycino filo, quod ope filii argentei sursum per oculos retrahitur; in ductu nasali instar setacei relinquatur per mensem, unguento deterfivo, si opus sit, illinitur; & sic via patula fit lachrymis, & fistula sanatur.

6. Epiphora ab estrapio. L.

Estrapium est palpebræ alterutrius extravertio, *Reversio* enim palpebræ intravertio, *Eraillament*. Palpebra inferior evectitur a carne luxuriante, quæ ulceribus membrana internæ vi perveniunt, in quo casu lapide infernali absumenda excrescentia, usquequo palpebræ sui tactu elatere se resistunt. Vel evectitur propter ambulationem externam, quæ cutis corrugatur; ea si vetus, immedicabilis; si recens, curatur emollientibus, ut lacte, butyro, unguento de althæa, cerato Galeni, compressisq; decentibus. Vel aversitur a laxitate, ut apud senes, observante *Heistero*, eaque insanabilis. Remedia exsiccantia conveniunt, calor siccus, spiritus soti, vapore adhibita; lutum ex aqua thermalibus, palpebra inferior invertitur ab operatione fistulae lachrymalis scito tendine musculi orbitari, quod immedicabile est; vel a vulnere tarsum secant, unde in acum bibulum intro vel extro vertitur (*eraillament Salutaris*); hoc malum conveniens futura conjunctivæ & cutis in tacto tarso præverit, si ulcus recens sit; si vetus, inaleum est immedicabile.

Extravertitur etiam palpebra inferior ab exophthalmia aut globi tumore, tum aquoso, tum cancroso; prior vocatur hydrophthalmia, & ambobus oculis afficit, & curatur diureticis catharticis; posterior canceri indolem & curam sequitur.

7. Epiphora ab anchilope. L.

Anchilope, quævis angularis, est tumor cysticus, vel purulentus, vel lachrymoso mucosus canthi temporalis, cum epiphora.

Anchilope purulenta est, vel spuria, ab apostemate subcutaneo, vel ab apostemate inter musculum orbiculare & secum nasalem; prior est nullius momenti, posterior epiphora quandoque stipatur, & aglopem potest ducere.

Anchilope lachrymoso-mucosus compressione recedit, & tunc lachrymæ vel tantum per puncta lachrymalia, vel per poros Gunzii refuit, vel etiam in nares dimanat; extrahitur ab obstructione ductus nasalis, vel a muco spisso, viscido, vel ab infarctu ipsius sacci spongiosi, vel per fluxionem intumescit. In priori casu injectio per syringem Anelli sufficit; secus compressio ope fasciæ & splenii iteratæ per diem

continua; per noctem ope emplastri, superius sanatur, addito spirituosio vel vinoso liquore, quo splenia mædant; tonusque sacco restituitur. In posteriori specillum argenti unum per puncta lachrymalia immisum obstructionis reterat, addito etiam filo uno, aliove gossypino, premisis præmittend.

Anchilope purulenta incipit a tumore talido, rubro, lincianente, vel pulsante, cum febre, ophthalmia, epiphora; pendet a vera inflammatione sacci lachrymalis quæ abig in suppuratum; unde dignoscitur ab anchilope lachrymoso, vel hydrope sacci nasalis. Lachrymalia puncta fundunt verum pus, non vero mucum puriformem, qui a pure vix distinguitur, nisi per antecedentia; naris ejusdem lateris sicca est, nisi per noctem quid effluit; quod sæpe fit. In illa specie, vel viget inflammatio, vel recessit; si viget, instituitur dieta tenuis, refrigerans, phlebotomia celebretur, jussula refrigerantia usurpentur, cathartici antiphlogistica non negligatur. Si resolutio non succedat, applicetur tumori cataplasma ex medulla pomi coti cum albumine ovi mixta, vel cum pulpa cassiæ, ut suppuratio procedat, quæ facta apostuma lanceola aperitur, injectione hordei dergatur, turanda tenui saccus lachrymalis aperitus servetur, cicatrix inducatur.

8. Epiphora frigida Sennerti cap. 46.

Est effluxus involuntarius lachrymarum serosarum, sine pruritu, dolore & calore saltem notabilibus; ea sequitur diurnas ophthalmias etiam sanatas, studium immoedica, ut accidit possimum circa annum ætatis quinquagesimum, cum visus imminuitur, & objecta non nisi paululum distita, distincte vidiri possunt; accedente hyeme ingravescit, & difficulter curatur; interea si æger ab studio, vento, fumo, cibis salis, vinoque abstinat, si simul noctu oculum fovet infuso quatuor caryophyllorum in aqua vitæ uncis duabus, hæc effectus immittit; si vero ob tam levidente incommodum æger velit cathartica & vesicatoria nuchæ usum vocare, ut suadent Auctores, alle de horum successu judicabit.

9. Epiphora calida Sennerti ibid.

Ea est seroli laticis ex oculis destillatio, quæ stipatur calore mordaci, pruritu, rubore, & dolore oculorum, adeoque diversas ophthalmias species, potissimum ulcerosam fistulosamque, comitatur, quas vide suo loco. In hac præter remedia generalia, ut phlebotomiam & cathartism, conveniunt bolus, jussula refrigerantia, serum lactis, nec non colliria leviter adstringentia ex rosis, plantagine, acia, gallis, vino rubro, vitrioli, &c.

Lachrymæ quæ a nullo animi pathemate procedunt, in morbis acutis hæmorrhagiam narum, & si sint cum signis exitialibus, merem præsumunt.

1. Epidem. 2. Aphor. 80. & 4. Aph. 51.

10. Epiphora cruenta; Lachryma sanguinea Sennerti ibid. & fuisse Schenck. libr. observ. Larmes de sang. Vide Memoriam erroneam. P. Borell. Cent. II. Obf. 56. L.

11. *Epiphora sebacea* Haller. Stud. Medic. pag. 782. ex Rudolpho Vchrens; *Leaca* Hippocratis; *Lemia* Celso; *Oculi granulosi* Lucilio; & *Gramia* Nonnio; *Lippitudo* Auctorum; & *La chassie*.

In palpebrarum marginibus sunt glandulae sebaceae, quae separant paucum in statu sano sebum, quo forte praepeditur lachrymarum effluxus & deviatio; ast ubi & copiosissimus est hujus sebi quandoque proventus. Illa lippitudo saepius ophthalmiam humidam seu pituitam Horarii committat, ea visum perturbat, palpebras noctu, scilicet hora octava vespertina usque ad diem sequentem, agglutinat: tunc vero apertis per vim oculis, lachrymae ferose effluunt.

Curatur tutius pulvere vespere adperso, vel aqua rosarum, cujus unciae octo vitrioli viridis vel albi grana viginti excipiunt; vel aliis ophthalmicis deterfis & subadstringentibus.

12. *Epiphora arthritica* Musgrave de arthritide, cap. 18. & 21. l.

Est ea quae ab humo & acris arthritico a pedibus retro pulso accidit, & cum arthriticis doloribus alternat, ac quandoque cum illachrymatione odontalgiam excitat. Affectus hic quandoque diutinus est; & saepe incommodus.

Exigit phlebotomiam, & vesicatorium nuchae applicandum, nec non collyria mitissima, ut lac oculis instillatum, mucilaginem seminum psylli & cydoniorum, aquam rosarum, trochiscos albi Rhafis, aquam plantaginis, &c.

13. *Epiphora lactea*, Ephem. Germ. Dec. II. Ann. VII. Obs. 98. in infante recens nato.

XXII. CORYZA, Hippocratis, Gorrzi Definit. Med. aliis *Catarrhismus*; *Gravado* Latinis, *Deffillatio*, *catarrhis ad nates*; *Rhume du cer-veau*; *Coryza*.

Character. est humoris pellucidi aut mucosi, viscosi & narium stillicidium. Membrana pituitaria, quae sinus frontales, sphænoideales, maxillares obvestit, est amplissima; duplicem vero humorem suppeditat, tunc scilicet, & paucum qui in nares posticas, inde in oesophagum cum lachrymis infunditur, & mucum viscidum, qui membranam, ut odoratus sit idonea, continuo lubricat, oblinique. Duplex est itaque fons humoris qui in coryza per nares effluit.

1. *Coryza catarrhalis*, vulgo *gravado*. *Coryza humida* Nenterii. *Enchiffement*. *Rhume du cer-veau*. B.

Illā ab aeris vicissitudinibus, potissimum a frigore suscepto calente corpore, oritur; dolore gravativo frontis, sternutatione, anosmia, voce nasali, dyspnoea; tussis stipatur, dein vero procedente morbo destillatio humoris, qui prius erat limpidus, & narium qualis in summo frigore sit, qui *respie* vocatur, jam ab it mucosum, viscidum, copiosumque effluxum, a quo zeger suble- vatur, reddit odoratus, respiratio juvatur, &c.

Phlogosis membranae pituitariae, est hujus morbi principium.

Curatur dixta tenui, potu theiformi, calido, diluente, inspiratu lactis tepidi, aquae vaporis; aere tepido, vapore seminum nigellae in aqua co- ctorum; vide *Schneider. lib. 3. de catarrhis*, pag. 503. Cum nares posticas occupat saevior est quam cum altius assurgit.

2. *Coryza phlegmatologica* Salmuth. ob. 37. cent. 1. Bonet. Sepulchret. T. 1. p. 410. *Phlegmatorrhagia* Junckeri; Morgagni Ep. XIV. 20. Hippiatri. *Morfondura*. Furetiere Dict. on. B.

Differt a precedenti quod, sine fatellitio catarrhi, illico sponte accidat profusum jube humoris limpidi, lymphatici, copiosi, non mere aquosi, qualis est qui a frigore acris maxime apud senes extillat; hanc coryzam bis noctu expertus sum, sine alio incommodo: similem per plures menses perseverasse memorat Morgagni; uberrimum aliud narrat Bidloo, quod *stillicidium narium* vocat.

3. *Coryza virulenta*; *Oena* Bonet. Sepulchret. T. 1. p. 406. Hippiatri *Morve*.

Est putulenta materiae effluxus & narium cum ozæna. Hic morbus ob foetorem & acrimoniam puris diu in narium conclusi, & foetum inquinantis ab equo ad equum propagatur, seu contagio- sus evadit: Vide Hippocrates, ut *Solessel & Bourgelat*, *Elementa Hippiatrica*.

4. *Coryza variolosa* Huxham.

Illud symptoma stipatur sternutatione, difficultate deglutendi, tussis, epiphora, & saepius rubecolam quan- doque variolam inentem comitatur, ac designat.

5. *Coryza purulenta* Boneti Sepulchret. T. 1. Obs. 10. Append. t. Morgagni Ep. XIV. 22. ex Fernelio, Falisno, Nicolai, &c. vide *Cacodiam ozænam*.

Si sinus frontales ulcere laborant, injectiones instilui possunt deterfivae, imo horum sinuum te- rebratio institui; si vero sinus maxillaris alteruter pure turgat, dente cæmo avulso puri via para- ri debet, *Meebom & Coeuper* ducibus.

6. *Coryza febricosa* Vandermonde Journ. de Med. Mars 1751. p. 197.

Viro catarrhoso fluxus mucī periodicus vespe- re quovis revertens, meridie sequenti evanescens, stipatur erat capitis intumescencia, dolore, si- nuum infarctu: mucus narium copiosus erat, limpidus, acris; pyrexia nulla; diaphoretica fru- stranea suere, soli kinkinx usus cum catharticus morbus cessit.

XXIII. PTYALISMUS, *Ptyalismus* Hippocratis. in Coac. a *ptuelon*, sputum; & *Anabasis* Gale- ni; *Anacremphus* Helychio; & *Carthasis* diapho- rygos; *excreatus* Salvastio; *frequens exspu- itio* Latinis. *Bave*, *salivation*; *expuition*, *crachotement*. *Aegri Salivantes* Latinis, *Gallis Bavenx*; *Anglis Drivellers*.

Character. Est salivæ vel mucī sine expectora- tione ac vomitione ex ore effluxus, tum emissio.

In os confluent. t. saliva ex ductu potissimum Scenoniano a parotidibus delata, nec non ea quam omnes glandulae sublinguales, buccales, &c. suppeditant: s. præterea liquor tum lim- pidus, ..

pidus, tum mucosus, qui ex naribus in fauces delabitur, tum per nares posticas, tum per ductum sphenopalatinum: §. Mucus viscidus, qui ex tonsillis & glandulis faucium sebaceis exprimitur: Mitto quæ vomendo vel expectorando conflunt.

Quidquid exit ex ore, illud vel vomitu vel ructu ejcitur, vel expectoratur cum tussi, vel excreatur cum sono rauco, quem Arabes *Rascatum* vocant; vel expulitur ex lingua & labris, vel sine impetu elabatur, quod Galli *hava* nominant.

1. *Ptyalismus nauseosus*. *Ptyalismus a saburra nidosa*. B.

Illæ est species quæ a saburra ortum ducit, quatenus irritatur inde pharynx, & liquor ac mucus ex faucium eryptis ubertim profluit, cum nausea, angore ventriculi; tanta quandoque copia expulitur & exillat hic liquor, ut ex stomacho suppeditari quis crederet; talem ptyalismum excitat etiam emeticum assumptum, etiam antequam vomitio accedat. Talem excitat etiam acnionum, si vel masticatum fuerit, hinc enim oris sapor putris per duos vel tres dies cum salivatione, ut observavi, & cardialgia cum lancinante dolore in medio linguae.

2. *Ptyalismus a pyroxi*. Vide Sodem Junckeri. I. Differt ille a priori, quia sensus ultionis & acidi erodentis extenditur a ventriculo ad os, atque quasi acidum saporem præ se fert saliva; in hoc affectu ubertim effluens; hanc excitant frustus acidum vel empyreumaticum saburram generantes, calianæ, nuces, pisces conditi, frigida omnia ex sartagine cum oleo vel butyro cocta, nec tamen paucæ excitatur ut plurimum.

3. *Ptyalismus Lapponeus* D. Linnæi; *Ulim* vel *Horme* Laponibus. C.

Est symptoma colica Laponicæ. Vide *Floram Laponicam*, pag. 69. Differt a prioribus per dolores atroces abdominis juxta umbilicum qui hoc ptyalismo terminantur.

4. *Ptyalismus a laxitate* Chymei de sanit. pag. 366. cap. 3. *Ptyalismus symptomaticus* Zvingeri de saliva Dissert. *Agri Driveller* Anglis vocantur. L.

Illi sunt, qui stupidi, febris laxis & pendulis; oculisque demissis, nequidem salivam ore continere possunt; ita ut continuo ex ore effluat; simile vitium in paralyticis observatur; idem accidit laxata mandibula.

5. *Ptyalismus mercurialis* Nicol. Heiensii; Christ. Roperi Diss. de Salivatione cap. 2. *ab oris ulcusculis* Stenon. *Ptyalismus artificialis* Zvingeri de saliva, D. Hert. 8. *Salivatio ab hydrargyri* D. Astruc. de lue venerea B.

Vulgo post quinque vel sex litus mercuriales, vel assumptis intus preparatis mercurialibus, præsertim non satis diluto sanguine & laxis valis, supervenit calor in ore, sapor æruginis, glandulæ sublinguales, & quæ utriusque linguam cingunt, rument, ut aphthas pariuntur, dein ulcuscula quæ multum salivæ, fortissimè sum-

dunt; crescente actione hydrargyri tumet lingua, exierit foras, fauces angina aut cynanche corripuntur, cum febre, pervigilio, assiduo expiendi necessitate.

In cura morborum syphiliticorum vitari debet ptyalismus, secus syphilis per aliquot tantum menses supprimitur, aut etiam minime minuitur. Vitatur vero, longo usu balnearum præmissio, dicta lactea in hydrargyrosi utriusque, remotis ad duas tresve dies inunctionibus, illarum dosi, quæ vulgo semunciam attingit, immutata, si vero invitis his cautelis accedat, quod vulgo post quartam, sextamve inunctionem accidit, suppressa omnimode inunctione, expectandum donec desierit; os sæpe decocto hordei abluendum; si vero ex abrupto auctus ægrum in periculum cynanche conjecerit, lingua tumet, & in ore vix possit contineri, phlebotomia, linteorum depositione, catharticis, uno balneo tunc huic occurrendum. De ulcusculorum oris ditione, ceterisque ad hoc spectantibus videatur *Ill. Astrucius*.

Ex cinguli mercurialis adversus pediculos constitutione, ex hydrargyri etiam contractione solemnè aurifabris, speculorum confectoribus, ex una drachma unguenti Neapolitani citra cautelam illita, ptyalismus quandoque supervenit.

6. *Ptyalismus variolosus* Sydenhami pag. 83. 103. 93. 593. *Salivatio à la petite verole confluente*.

Apud adulescentes variola confluente laborantes, salivatio sub primæ eruptionis tempore, aut biduo post, perpetuus comes accedit, sæpius multo quam infantibus diarrhœa; materia prima tenuis excernitur, ægro multa linea ipsam nocte conspurcante. Hic ptyalismus mercurialis non minor est, sed non foret; die vero undecima saliva viscidior ægerime excreatur; siticulosus est æger, tussis subinde inter bibendum, & potus per nares revertitur; atque hoc die cessat ut plurimum salivatio, licet aliquando biduo post revertatur; dicto autem die undecimo scilicet tumor faciei, una cum salivatione imminui incipit, ac tunc primum ejus loco manus intumescere solent ac debent.

Non solum autem in variolis, sed & in febre variolosa Sydenhami, seu synocha variolosa, in qua nulla est eruptio, per ptyalismum accidit, & ad salutem necessarius est.

Indicationes sunt 1. ut ptyalismus ille sustinetur, quod maxime præstat, *pitui tenuis*, qui diluat; nec refrigeret nimis, aut calefaciat qualis est cerevisia tenuis, imò serum lactis, nec non paregoricum seu anodynum vespere exhibitum, sic docente experientia, 2. Cavendum ne ptyalismus supprimatur, quod intempestiva catharsis aut phlebotomia, maxime vero calidiorum regime, efficitur. Si vero ptyalismus non interveniat, aut citius quam par est evanescat, nec in ipsis locum manus tumeant, facie tamen detumescente, tunc in summo periculo versatur æger; si enim hoc accedat interfectura.

sextam & undecimam diem postula deprimuntur, delirium invadit, febris deficit; postula pallida, circulo etiam pallescente; in hoc unico casu ad cardiaca deveniendum est, ut ad scrupulum theriaci, cum eadem dosi pulveris & chelis cancerorum, semi scrupulo radiis contrayerva & syrudo caryophyllorum; si vero hoc infortunium accidat circa aut post undecimam diem, quo tempore pustula faciei rufescent sunt, praemissa yena pedis sectione, vix ad emeticum, ut nosstrates faciunt, aut ad lena catharticum, ut Angli solent, propendendum est; sed quoniam vires non vegetae sunt, earum ratio habenda est, & semper de summo periculo affantes admonendi.

Montpelii rarissime observatur ptyalismus, in variolis etiam confluentibus adultorum, raro etiam diarrhoea apud infantes hac specie laborantes, sed apud Septentrionales is est frequentissimus & salubris, atque hoc ptyalismus circa undecimam diem decretescente necessarium est ut facies, & manusque intumescant oedemate varioloso, quod ptyalismi vires impleat.

7. *Ptyalismus scorbuticus* Roper. Diss. citata & Lind. de scorbuto, &c. Jour. de Med. M.D. 1755, p. 327. C.

Cognoscitur ex stomachacis signis, scilicet facili gingivarum haemorrhagia, mollitie, fetore, dentium lapsu, nigredine, maculis titiatis, faciei pallore, &c.

Profusus vires exhaurit, adeoque sistendus quantocius; suadet vero Lind revellentia epispastica, sinapismos suis admoveandos; alvus clysmatis solvenda; lenia cathartica usurpanda; laxandis cutis spasmus, qui fluxum illum determinat; profunt in eum scopuli diaphoretici, theriaci, camphora, flores sulphuris ter vel quater in die, adde etiam diuretica. His salivatio arcetur, & suffocatio praevetitur. Sistitur etiam collutoris ex gummi Arabico, ichthyocola, alumine, cortice quercus; laudat Roper gargarismata ex vino rubro, viride aëris, aqua plantaginis & salviae, saepius ope penicilli gingivis applicanda.

Intus vescitur ager lacte vel vegetabilibus, sumat kinkinau, elixirum vitrioli, dum lacte non uritur.

8. *Ptyalismus hypochondriacus* Ballonii, lib. 2. consil. 49. Sylvii, Prax. Medic. *Ptyalismus melancholicus* Sennert. de scorbuti signis; *hypericus* Morton. Curationem vide apud Ballonium, lib. 2. consil. 25. Roper. Diss. de ptyalismo, L.

Est ille qui hypochondriacus, melancholicusque familiaris est; is vires immittit, stomachum labefactat, stipatur borboeugmis, constipatione, ructu, praecordiorum angustia, somno turbulento; sovetur saepe a corna copiosiori, & tunc horis matutinis augetur.

9. *Ptyalismus arthriticus* Musgrave, cap. 11. hist. 3.; *Sputatio arthritica*.

10. *Ptyalismus phthisicus* Morton. cap. 2., n. 10. & 11. Phthisiologia, p. 29. C.

Ipse signa phthisim praesagientia merito re-

feretur matutina & diurna phlegmatis falfi & aeris, quandoque viscoli, excretio, quod universum sanguinis serum parili gradu salium efficit atque acre significat; proclives sunt illi ad copiosum salivae fluxum per ductus salivares & conillas, quod diathesim sanguinis colligativam indicat; hoc symptoma multis annis phthisim antecedere observavi. In ultimo phthisico gradu idem ptyalismus recrudescit, ab anacatharsi purulenta valde distinctus. Oritur enim fluidi ejacti copia ab ipsis oris glandulis, nec sudoribus profusus imminuitur, ac fatum accelerat. Roper. Diss. de ptyalismo.

11. *Ptyalismus viridis* D. Huxham Philosoph. Trans. n. 382. anno 1724,

Fox quadraguaris ab aurigine & colica liberatus est ptyalismo uberrimo ad sextrios circiter duos; salivae statim vividissimae porraces, sed tenuis; usus autem fuerat pomaceo quod bilem hoc colore viridi inficere poterat; hic ptyalismus quadraginta horas duravit, deinde pellucida evasit saliva; ope vero ptyalismi ferosi sponte erumpentis ab aurigine, prius bis terve liberatus fuerat.

12. *Ptyalismus purulentus* Petr. Hardisvay, Philosoph. trans. n. 400., 1726. L.

Hic ptyalismus purulentus ultra triennium perseveravit, pure sanioso suppeditato a sinibus maxillaribus in oris cavum apertis & cariolis; puero satis benevalente, quoad cetera.

13. *Ptyalismus aphthosus*. *Chancre a la bouche*. B.

Adolescens corripitur synocha cum cephalalgia, angina, linguae forditie alba, glandularum tonsillarum & maxillarum tumore; praemissa plebotomia purgatus est addito emetico, bilem ano & caro copiose rejecta, & difficultas deglutiendi evanuit; alii eadem die levis exulceratio interiora oris & linguae ambitum detinuit, ita ut crusta in utraque labiorum commissura oris apertionem impediret, lingua tamen superne abscedens, lateraliter exorata, intense rubra, videbatur, & tantus erat viscosusque ptyalismus, ut noctu, inceditque insonnem continuo exspuam agrum per aliquot dies detineret, Praescripto altero cathartico, & gargarismate ex uncia mellis roseae, cum drachma spiritus salis in aqua hordii melius habuit, dein convaleuit.

Ptyalismus cujus factor cadaverosus est iunctas dysphagiae, est signum cynanches ulcerosae seu gangrenosae, quae nuper apud Pifeneates & Bitriticea. maximam infantum stragem edidit.

14. *Ptyalismus gravidarum*. *Crachottement & aigreurs des femmes grosses* Puzos. L.

Racens gravidae per tres quatuorve menses vel salivam viscidam, vel fatum pituitum matutinis horis excreandam habent, cum sensu acoris intercurrente, aut cardialgia, aut nausea.

His opitulamur, vel bolorum, vel aquae cyatho, vel coccolata, feminibus cumini, aut cardamomi m-

ficatis, infuso theæ, veronica, chameli, melissæ. Si ex inutilia fuerint, phlebotomia adhibenda; mane rhei pulverati vel huius extracti dosis ad purgandum sufficiens sumenda, vel clystima vespere injiciendum, aut stomachus roborandus theriaca, confectio hyacinthina, alkermes, opuscula Salamonis. Confert quandoque pituita pectoralis emulsionata, & aqua cinnamomi aromatizata.

15. *Ptyalismus catarrhalis*. Salivatio anginea Roper. Dissertat. *Rhume d'estomac*, De Meyley T. 2. n. 303.

Est ille qui in odontalgia, angina catarrhalibus supervenit, eademque auxilia excoiscit. Os exundat saliva mucosa: accendunt status, gravitas ventriculi, nausea, vomito phlegmatis, vel diarrhoea, quæ omnia ægrum sublevant.

16. *Ptyalismus a carie* Quelmalz. Diss. de ptyalismo febrili. P.

In maxillæ ossibus cariosis & carie dentium protrahitur quandoque ptyalismus ad hecticam consumptionem, ut pluries vidi. Autor citatus: hocce etiam phenomenon accidit cum carie perforatus antrum Hygromori, seu sinus maxillaris. Eundem ptyalismum observavi in trismo, qui odontalgia arthritica est.

17. *Ptyalismus a calculo* Christoph. Scherer, de calculo ex ductu salivari excreto. Diss. Argentorati 1757. Journ. de Med. Juill. 1756. Laurentaud.

Initio levem inducit dysphagiam, deinde vero ptyalismum calculum sub lingua genitus, quod licet rarum sit: interea a *Covuper*, *VVallerio* & *Salzmanno* fuit observatum. In casu *Cl. Leusaud* aderat dolor sub lingua vehemens, pyrexia ardens, quæ omnia extracto calculo gypseo sub lingua latente, evanuerunt. Vide Arthritidem D. Du-Bouchet qui arenulas copiosas excreans a doloribus arthriticis se liberabat.

18. *Ptyalismus febrilis* Quelmalz. Diss. Lipsiæ 1748; Sydenham. pag. 99. de febre variolosa.

Est ptyalismus triacophyæ epidemicæ Lipsiensi superveniens, per septimanas perseverans, abundans, morbum non perfecte solvens, & quem tamen reprimere periculosum erat. Hunc stipabant erosiones circa linguam, fortior tumor gingivarum; salivæ limpidae, dein viscida æque uber excretio, ac si hydrargyrosis plena fuisset adhibita.

19. *Ptyalismus syphiliticus*.

Est ille qui citra ullum hydrargyri usum accidit illis qui ulcuscula venerea gerunt in faucibus, uvula, velo palatino, quæ quidem ex macula grisea serpente, ex sordore & ex salivatione facile se produunt.

Huic speciei ipsamet hydrargyrosis caute & parca dosi administrari debet, non neglectis tergentibus sub finem hydrargyrosos, scilicet levi attractu ulcusculorum bis in die iterato ex penicillo intra collyrium Lanfranci tincto; collyrium vero aqua rosarum dulcorandum est, ut lactis est usurpandum.

20. *Ptyalismus urinosus* VValler. Act. Upsal. p. 156. Vid. Tuphi Lib. III. Hist. 12. Helvetius Oecon. Anim. p. 156. L.

XXIV. ANACATHARSIS Hippocratis, Galeni in Aph. 8. lib. 5; *Anaptysis* Hippocr. *Tussis humida*. *Expectoration*.

Character est muci, lymphæ, vel cuiuscunque humoris facta cum tussi expectoratio: constans & notabilis.

Differt ab excretionem ptyalismum comitante quod tussis in anacatharsi sit pectoralis, non vero simpliciter gutturalis. A rheumate quod sit anacatharsis sine raucedine. Anacatharsis raro est morbus essentialis, sæpius est symptoma phthi- seos, asthmatis humidi, catarrhi.

1. *Anacatharsis biliosa*; a *spite of unusual color*. Philosoph. Transact. n. 382. by Huxham. anno 1724; *Coleptysis* D. Coste, Med. Prof. in Acad. Peripinianiensi.

Observavit scilicet in ancilla tussim guttula- rem, quæ primo cruorem excrebat, deinde vero per viginti circiter dies expectorabat bilem, seu humorem intense flavum & amarum, & fæces ano redditæ erant griseæ.

Præscripsit apozematam amara diluentia, dein vero saponem venetum singulis diebus ad grana viginti, triginta, sumendum: parabat saponem ex sale tartari & oleo olivarum optime mixtis ad consistentiam pomati flavi, quibus adhibitis remediis intra quinque dies sanata est.

Vidi ego dudum mulierem quæ ex rheumate neglecto incidit in anacatharsim materia viscida ex flavo viridescens, quæ cum amphimerina catarrhali perseveravit multos dies, sed ea expectorata materies non amarescebat, idem iterum in adolescente vidi: cathartica vero morbum sustulerunt, & febrem simul.

Similem luteo viridem observavit excretionem D. Huxham Trans. Phil. Anacatharsim rurearum observavit Clariss. Fousfride.

2. *Anacatharsis phthisica*: *Tussis purulenta*. Vidi de phthisi humidam.

3. *Anacatharsis a vomica*; *Vomica pulmonis*; *La Vomique*.

Vomica est apostema materiam puriformem, vel sabaceam, aut putrescentem continens ut plurimum tunica obvolutum; verosimile est vel glandulam lymphaticam sebacea materie sensim distensam, vel hydatidem pingui & crasso humore sensim turgidam esse huius morbi principium. Similes hydatides humore puriformi quandoque gypseo factas in ovarii & ascite hydatidoso observantur Academiæ Parisiæ. Gypseos, tophiaceosque tumores sæpe inveni in pulmonibus, sine ulla inflammatione prævia, parva quoadque, eaque acuta comitante febre, atque ex hac anacatharsi, nec per menses perseverante, ægri non raro convalescunt, maxime si tunicam oviformem, seu cystidem expectorent.

Hic morbus sæpe cum phthisi confunditur in præ-

4. *Anacatharsis puriformis*; *Tussis purulenta* Stahl. Sacyr. Harvey. vulgo *Suppuration*, *lymphaticus du puermon*.

Duplex est hujus varietas.

1. Post peripneumoniam & pleuritidem, in qua non omnino per phlebotomias resoluti potuit congestio inflammatoria, supervenit puriformis grisea, blanda, viscidula materiam expectoratis sine febre notabili, quæ per mensem & ultra perseverat, nec tamen phthisis est, atque ex ea, adhibita diæta lactea, cum balsamo Canadensi, ægri convalescunt.

2. Post febres putridas ac malignas, corpore satis jam superque purgato, accidit interdum, maxime in senibus, ægri valde debilem esse, & quandoque tussis, interdum etiam excreatu magnam glutinosi, viscolique phlegmatis copiam expectorare, quod symptoma non tantum ægro terrorem inicit, sed & ipsi Medico prælestimum minus cauto, imposuit pro phthisicos prodromo.

Hoc in casu ægri jubeo vinum de Malaga, vel mulsatum cum pane tosto ei immixto bibere, quod vires reparat; & symptoma illud intra paucos dies abigit. Sydenham p. 38. cap. 4. S. 1.

5. *Anacatharsis asthmatica*. Vide *Asthma humidum*.

XXV. DIABETES; a diabete Hydraulico-
rum, seu syphone aquas transmittente. *Diarrhea urinosa* Galen. lib. de crilib. *Diarrhea ex ore*; *Diapacus* Galen. lib. 6. de loc. aff. *Hydrops ad matulam* Galen. de loc. affect. lib. 6. & lib. 1. de calibus; *Profluvium urinae* Latin. *Diabetes*.

Character. Subita potus omnis per urinas cum magna siti profusus, *Gorral*, cum corporis colligatione, (*Aræta*) febricula, anorexia, polydipsia, urina copiosa viola redolente, oleo supernatante persufa *Dover. Legacy*, quales suntur tinx scorbuticis.

1. *Diabetes legitimus* Aræti; *Deidier* Consul. §8. T. 2.

Indefinens moiendi necessitas quam nihil cohiberi potest. Mictio copiosior est quam potus, unde adipis colligatio, sitis urgens cum saliva spumosa, viscida, fastidium, animus dubius, præcordia gravia; a retenta urina tumor abdominis, testium, crescente morbo calor mordax in visceribus; tabes; varius morbus, *Galeno* bis observatus, curatu difficillimus.

2. *Diabetes Anglicus* Pechey promptuar. med. præst. Mead. of poisons edit. 4. C.

Character. Urina odoris, coloris, & saporis mellis. *Mead Monita*.

Affectus ille differt a diabete *Aræti*, quod urinae sint dulces & mellisæ, vel limpidx, ut referunt Angli, vel subrubidæ ut apud nos, necnon quod hodie apud Anglos & Batavos vini meracioris ingurgitationem, & sitis; urina intra viginti quatuor

quandoque ad libras decem, quindecim ex observatis *Pechey*. Sitis est immanis, febris hectica, insignis asthenia, languor, & emaciatio.

Æger læte vel crudo, vel aqua hordei diluto vescitur, & aquam calcis secundam ter in die ad uncias quinque vel sex sumat. Juvant etiam gummi Arabicum, tragacantha, cinnamomum, cymæ cupressi, rheum, noctu narcotica; aquas vitriolicas suadet *Jurinus*.

Similem diabete observavit in duobus rusticis Gebennensibus media hieme cum urina saccharata & subarbita, eodem mense & anno, *D. Priuar*, *D. M. Alesensis clarissimus*.

Lactis serum aluminatum laudat *Diabetes*, juxta quem remedium id nunquam fallit.

3. *Diabetes hystericus* Sydenham. Diss. ep. de hysteria, Cheynzi de sanit. 177. L.

Hanc speciem observavi in Marchionissa St. Victor hysterica, quæ serum insipidum, aqueum, copiosissimum, fundebat per aliquot dies, hoc cessante, leucophlegmatica evadebat; redeunte sic per vices diabete solvebatur phlegmatica; hysterica & mulieribus ira percitis magnum urinae limpidx postuvium est familiare.

Serum aluminatum Mead fit ex lactis paululum cocti libris quatuor, & aluminis drachmistribus; hujus seri (possetum vocant) saltem uncie quatuor ter in die bibantur; est aptissimum diabetes remedium. *Mead Monita* p. 165.

Desidiosos aggreditur quæ luxuria diffuentes, cum mero sanguinem accedent, frigidis portibus sitim resingunt; morbum esse hepatis & humidum aeris in eo attracti contendit *Mead* Lac muhelie est vete saccharatum; chylum itaque dulcem patum mutatum diabeticum fluxum dulcedinem præbere putaverim.

4. *Diabetes artificialis* Malpigh. de liene.

Ligatis in cane vasis lienis, canis solito frequentius mingit.

5. *Diabetes a vino* Collect. Academ. Tom. 3. obl. 122.

Quadragesarius robustus, bilioso-sanguineus, vino & aronaticis abusus, in diabete incidit, tunc vero quam bibebat alam, seu tenuem cerevisiam urina omnino referebat, & potus assumpti molem multum sperabat; vigeat fames, sitis urgebat, omnia siccitas, renum dolor, ardor viscerum; macies summa.

Usus est tintura martis, catechu, corallorum, vespere bolum ex ebore nistro, anthicthico Poterii, croco martis cum uno, vel altero laudani grano; post mensem his utitur valuit.

6. *Diabetes* *Jeus* Sydenhami *adagrag*, p. 463.

Est symptoma idis in... ed ex...
et... xoxys... bus e... sit pau...
... col... tra... ando-que...
... o... o... de, quod...
... a... sit... stimique...
... a... a... perspira...
... sit... a via...
... a... yanda est

magna urine copia, quæ in diabete vulgari effunditur. Quantitas urine infans est circiter dimidia pars alimptorium tum efulentorum, tum potulentorum, æque ætæ altera pars perferendo avolat. Si itaque in statu sano quadraginta urine uncie emittantur, ut in me expertus sum: si sitis potum tertio parte uberiores impetavit, & simul tertia pars perspirationis solite suppressa: in urinam versa fuerit, inde sexaginta sex uncie urine quotidie emittentur, quæ cum cruda sit, & repetitis mictionibus amandetur, diabete ethicit.

7. *Diabetes fabriciosus* Sydenhami ep. responf. 5. pag. 192.

In ætiana & quotidiana nonnunquam accidit, eò perquam raro, ut senes qui diu hac febre antea laborant, ac interea phlebotomis & catharticis imperite fuerint multati, in diabete incidant, etiam febre jam perfecte fugata; cæterum cum sanguis eorum adhuc debilitatus assimilandi succis citi illaris proflus impar reddatur, iidem per vias urinarias crudi adhuc & incocci exitum sibi querunt, proinde quæ præ ingenti urine copia, quoties eam reddunt, excreta, sensim labefactantur, & quasi substantia corporis per hanc cloacam exinanitur; curativæ indicationes ad sanguinem invigorandam, & fluxum urine minuendum omnino dirigendæ sunt.

4. *Theriaca unciam & semissem, conserva flavædinis aurantiorum unciam; discordii unciam semissem; singulis canditi, & muci moschata condita ana drachmas tres; pulveris & chelis cancerum, cardui granatorum, radicis angelicæ, coralliorum, terra lemnia, boli armæa, gummi arabici, ana drachmam unam, cum syrupo de rosi, facis facilestuarium; sumas drachmam ter in die per mensem; utatur vino hispanico, cibis eupetis, abstineat a crudis, oleibus, &c.*

XXVI. ENURESIS; *Petirrhæa* Hippocratis; *Paresis* Aretæi; *Seranguria* Galeni; *Stilleidum* urine, *Incontinentia* urine Seunetti, &c. *Incontinentia d' urine; flux d' urine.*

Est mictio involuntaria & inopportuna, quam nullus vesicæ stimulus sollicitat, quæque sæpius inscisi accidit.

Dicitur a diabete quod non major sit urine copia, nec diversus a sano color; a dysuria quod sine ardore & stimulo fiat.

1. *Enuresis infantum* Junckeri Tabul. 98.

Est mictio quæ tum interdiu ob negligentiam, tum noctu inter dormiendum accidit junioribus; plurimi ideo lectum urina conspurcant, quia somniant se in loco comodo mingere; alii ita negligentes sunt etiam octonnes & decennes, ut in seipis tum v. gilando, tum dormiendo mingant.

Prævus hic mos .i. virgis & minis est coercendus apud eos qui quartum annum ætæ attingere; 2. Curandum est ut horis pomeridianis parum bibant; 3. utque antequam lectum perant, vesicam evacuent. Si vero atonia sphincteris vesicæ adfuerit, ad tonica deveniendum est, ut in specie sequenti.

2. *Enuresis paralyticorum* Junckeri Tab. 98. L. Incontinentia urine a paralyti sphincteris vesicæ procedens accidit apoplecticis, hemiplegicis, & sæpius paraplecticis, ubi nervi ossis sacri, lumborumve tuerunt compressi, contusi, lesi, aut in cerebro ipso affecti; in illa specie adeit continuum urine illucidum sine sensu, unde differt ab aliis speciebus in quibus per intervalla tantum urina emittitur.

Incommodus est hic morbus ægro & adstantibus; ob fortorem urine quæ imbuntur vesicæ, maxime apud feminas quæ non ita valent in urinatorio portatili urinam excipere, ut v. r.

Curatur hic morbus eodem modo, ac paraplegia; sed viæ unquam sanatur, nisi levis sit effectus, aut quædam atonia, quam superant infusos aromatici, spirituosæ fomenta, theriæ Belilucanæ, ammoniacæ.

3. *Enuresis herniosorum*. L.

Est ea quæ exocystem, hysteroptosum, cystocellem, simileque ectopias comitatur, quibus ita distrahitur sphincter vesicæ, in viris podici, in feminis vaginæ adhaerens, ut distracto vel intestino, vel vagina, sphincter contrahi nequeat pro libitu. Sanatur ablato principio.

4. *Enuresis gravidarum* Mauriceau, lib. 1. cap. 14. de l' incontinence d' urine. L.

Non est ea frequens mictio, seu dysuriz species; quæ ob vesicæ ab utero factam compressionem gravidis accidit; cum enim parum urine continere possit vesica, accessum est ut frequentius vesica distendatur, & ad mictionem sollicitetur; verum eo est quæ ipsis accidit non solum gravidis verius ultimis menses, sed etiam mulieribus plures partus experitis; illæ enim ad minimam corporis inflexionem, ad minimum risum, aut tussidem constant, illic urinam sine stimulo, quandoque sine sensu emittunt. Hoc etiam recens puerperis familiare est, observant *Rodericus Castro* lib. 4. cap. 2. de factu matris, & hoc utitur profluvium alvi acratia sæpe stipitur educto, aut ille, infante, urina aut alvi faeces, quod frequenter accidit, involuntarie fluunt, quod curatur ut paralytis earundem partium: laudatur infusus in decocto aromatico chamæmeli, rois marini, salivæ & litus ex oleo ejusdem virtutis.

Quod enuresim quæ sub finem graviditatis oritur a mole uterique prementis, ea sublevarum mappa quæ ita collocata sit, ut abdomen proindeque uterum sustineat.

5. *Enuresis puerperum*. *Perforatio de la vessie*. *Incontinentia d' urine après les couches*, Puzos pag. 137. L.

Cum fortius diutius in transitu per os uteri retineatur, collum vesicæ, inde fetus capite, alilinc osse pubis, compressum inflammatur, contunditur, & post quinque, vel octo dies urine incontinentia accedit, perforata ibi loci vesicæ: hæc enuresis insanabilis est; sublevarum incommodum ope utræ ex corio sabrefacti penduli, & spongiz appositæ; pessaria vix ullius utilitatis suæ, nisi ad præcavendam obstructionem va-

sinz, quæ a succrescentibus ex hac fistula carnis, fibrisque ramosis oritur; ibi calculi successu temporis generantur. Vide *Hysteralgiam calculosam*. De hac specie fufe egit *Hirschfeldius in dissertatione Argentoratensi aſſita anno 1759. de incontinentia urina poſt partum diſſicilum*; hanc etiam obſervavit *Clariff. Med. Doct. Prius Alſenſis* in primipara, quæ dyſtociam per quinque dies experta, deinceps per quadraginta dies dyſuria laboraverat, qua ſanata ſupervenit enureſis conſtans, urina ſcilicet ea ſtante, vel erecta fluebat, ſedente vero retinebatur, immiſſo per urethram ſilo ferro, & ſimul in vaginam digito, inventum eſt foramen miniſtri digiti diametro non procul ab uterino orificio, urethram cum vagina coniungens.

6. *Enureſis catamenialis*, ſeu menſe quovis revertens. L.

Virgo ſanguinea, pinguis, 18. annos nata, enureſis ab ortu ad pubertatem uſque conſiſtente, omni ſemihora noctu & interdiu mingebat; cum menſtrua acceſſiſſent per triennium, ab enureſi ſuit immunis; ſuppreſſis ab hoc tempore catamenis ob pediluvium frigidum, ſingulis menſibus patitur per triduum horis nocturnis enureſim cum pervigilio; ſed octo diebus ante & poſt illam catamenialem urinae incontinentiam, cephalalgia, hypocondriorum tumore, pedum edemate, vel etiam hæmoptyſi afflicta; alii ſi deſiciat, ut quandoque accidit, urinae fluxus ille frequens, tunc ſymptomata numerata creſcunt & perſeuerant uſquequo enureſis acceſſerit.

Mater ejus ad vigefimum ætatis annum hoc conſiſtente inito tunc matrimonio convaluit; illa virgo potaſis aquis Barregianis, vomica expectoravit; foror ejus enureſi laborans phthiſi periit.

Cura. Præmiſſa venæ ſeſſione & brachio, purgetur cum manna in infuſo ſennæ; dein juſcula ex collo vervecis, cichorio, rubix drachmis duabus, præzice drachma una per novem dies bibat; dein ſerum lactis in quo clavi ferrei extincti, millepedes decem, flores chæri ad pugill. 1. ante hauſtum ſumat boracis grana ſex in cochleari aquæ naphæ.

Poſt viginti dies purgata ſumat lac aliumum, & alternis diebus ante ejus hauſtum ſumat bolum ex croci martis, terræ catechæ, & coralli rubri ana grani octo in pauxillo ſyrupi; continuet uſque ad finem Junii menſis; hiſ irritis, nubat.

Œtiologia. Videtur hic morbus pendere ab irritabilitate veſicæ, ob ſanguinis menſtrui retenti inſluxum uberiorem in ipſam; hinc frequens mingendi neceſſitas; ex eadem ſanguinis congeſtione in pulmone ſanguinis ſputum, in viſceribus abdominis meteorismus, in pedibus edema; ſanguis autem ſpiffitudine obſtat catamenis, acrimonia etiam irritat veſicam & pulmones. Hiſtoriam morbi retulit D. *Richard D. Med. Monſ. a Villeneuve de Marſan*.

Mictiones involuntariæ agonifantium, necnon ex quæ in paraphroſyne febrili accidunt, ſunt ſymptomata fugacia, non morbi; non ſecus ac quæ epileptiæ & eclampſiæ paroxyſmos quandoque comitantur.

7. *Enureſis calculoſa* Collect. Acad. Tom. 31 p. 570.; *Cyrolli Conf. 23. Cent. IV. L.*

Puer Metenſis per totam vitam incontinentia urinae laboraverat ſæpe cum dolore, continua cum ſiti; excrevit calculum; alterum in collo veſicæ gerebat; in cadavere repetitæ duæ veſicæ loco renani, ureteres ampliſſimi conici; veſicæ cævitas fibris tranſverſis ejus collum diducentibus diſtincta.

Huc fere pertinet enureſis quæ lithotomiam ſequi conſuevit; nam ſectio, vel maxime debilitato ſphinctere veſicæ collum ardeant, non mirum ſi urina deinceps ſponte eſſuat, maxime vero cuta ut fieri ſolet, veſica calculo irritata, occalluit, & veluti capsula coriacea contractionis etiam in collo incapax evaſit; hæc autem ſpecies tolerari debet, minime vero ſanatur.

8. *Enureſis a fiſtula Junckeri* Tab. 98. L.

Fiſtulæ quæ veſicam, ejuſve ſphincterem attingunt, oriuntur 1. vel a marſcis ſuppuratis; 2. vel a gonorrhœis virulentis; 3. vel a calculis veſicæ; 4. vel ab iſtibus & operationibus Chirurgicalis in dyſtociâ, fiſtula ani, calculove adhibitis.

Hæc autem ſpecies eodem modo curatur quo hæc fiſtulæ.

9. *Enureſis a ſparganeſi*, Hæzon Journ. de Med. Aout 1767. p. 145. L.

Ea eſt quæ a lacte ſuppreſſo puerperis accidit. Sanatur eatharticis, ſucceſſive magis hydragogis, ex manna, ſale polychreſto, ſyrupo de rhanno, &c.

XXVII. DYSURIA; *Stranguria* Pauli Æginetæ, non Galeni; *Ardor urinae* Sennertii; *Subſtillum* vel *ſtillicidium urinae*; *Dyſuria*, *Ardor à urine*.

Character. Difficilis vel dolorifica, & ſæpius ardoris ſenſu moleſta miſtio; *Gorrai deſinit. Galen. in aphor. 37. lib. 7.* Miſtio eſt non puris aut ſeminis, ſed urinae ejectione, unde diſcrepat dyſuria ab ardenti miſtio gonorrhœam ſtipante; ſi non pleno ductu, ſed guttatim ſuat urina cum dolore, *Stranguria* dicitur a Græco *Strangos*, gutta.

t. *Dyſuria hyſterica* Sydenham. de hyſterica paſſione pag. 132. B.

Dyſuria hyſterica ita calculum mentitur quandoque, ut Lithotomiſtæ iis ſymptomatis deluſi operationem neceſſariam judicent, ut obſervavi in Marchioniſta St. Viſtor, quæ per menſem hoc morbo laboravit; ſymptomata ſubito acceſſerant poſt vertiginem hyſtericam; ea vertigine redeunte, ſubito evanuerunt, & Lithotomiſtam ſupentem diſmiferunt. A ſpaſmo hyſterico ſphincteris veſicæ pendet hic morbus. Obſervata hujus varietas in muliere hyſterica hoc habuit ſingulare, quod ægra hyſterica ſtatim a paſſu mingere coacta foret, ut in lienteria ſtatim a paſſu alvum deponere cogatur: urina autem illa erat cruda, aquoſa; ægra emaciabatur, cum pyrexia nocturna, nec ſolito fre-

frequentius mingebat, nec siccabat; observante D. Coular.

2. *Dysuria herpetica: Ab herpete vesicae.*

Cognoscitur 2. ex herpetibus cutaneis repressis, aut vaginam etiam instantibus; 2. ex muco urinae sursuraceo. Hæc species est pertinacissima, valde doloifica. Curatur aquis acidulis, balneis, lacte, præmissis præmittendis.

3. *Dysuria nephralgia: Dysuria deceptiva a renibus* Stahlii ars curandi morbos per expectationem; *Dysuria ab ulcere renum* Sydenham. p. 680. Vide Pyuria renalis.

Ea est quæ a nephralgia calculosa, aut ab urinae acrimonia renes stimulantem dependet, in qua ob dolores renum, ureteres, & ipsemet spincter vesicæ dolent & irritabiles sunt.

Curatur ut nephralgia phlebotomiis, balneis mucilaginosus intus sumptis, nec non narcoticis.

4. *Dysuria venerea* Riverii obs. 25. p. 138. *Dysuria syphilitica* Nicol. Heinii; *A caruncula* P. Borelli. obs. 79. *Ab urethra per clearicæ gonorrhæa angustata* Saviard. obs. *A phlogosi urethra sine ulcere* Nicol. Andre de morbis urethrae 1756. B.

Hæc species est omnium apud adultos & senes longe frequentissima. Stipatur sæpe mictu bifurcato; præcessere semper gonorrhæa virulenta male curatæ, accedunt scirrhi, ulcera, fungi, calculi muco involuto, fistulæ, calli in urethra.

Curatur litu mercuriali & candelulis cereis D. Coular, Daran &c.

Gonorrhæa sicca Astrucii & *Dysuria venerea sicca* ejusdem, est vel phlegmone in prostaticis ac vesiculis seminariis, ubi tumor, calor, dolor, stranguria, ardor vividus inter mingendum, qui morbus, si intra aliquot dies non resolvatur abscessum pericini excitat. Vel est erysipelas in toto urethrae tractu cum gravi dysuria, dolore urenti totius urethrae, sine ullo puris aut seminis effluxu, & utraque varietas a concubitu impuro, ac a viru acri & volatili dependet. Ultima varietas atrocior est, & si non resolvatur tumor, facile in sphacelum terminatur.

Quandoque vero a gonorrhæa virulenta adstringentibus suppressa oritur. Prior vero non raro hanc gonorrhæam præcedit & fluente semine paulento sedatur, utraque varietas exigit initio repetitas phlebotomias, immersionem penis in lacte tepido, fumenta emollientia ex decocto radicum althææ, seminum lini, injectiones in urethram similes, noctu narcotica, potum emulsionatum, nitratum.

2. *Dysuria a caruncula. Virga Caruncula* Riverii obs. 22. comm. *Carnositas de Uretra* L.

Vulgo apud senes qui olim gonorrhæas passi sunt supervenit dysuria pertinax, & quæ quandoque plures annos perseverat, in qua fluentis urinae inter mingendum est bifidum (*l'urine fourchue*) cum aliqui ischuria; atque incurari solent excrescentie carnosæ in urethra quæ deprensi gratia stylos plumbeos a Rivierio ad nostra usque tempora in urethram sensim

inbnuari solemne est. Vide D. Lapi diff. de stranguria.

Ait Saviliardus & Cl. Chirurgus Monspaliensis J. Serres dilecto pene aliquot ægrorum, qui de eo morbo conquiesci erant, pil simile invenerunt, & tantummodo urethram phlogosi alicubi tentant; non dudum candelæ cereæ in locum plumbeorum suffectæ sunt a D. Daran, Coular, Andre &c., sæculo elapso a Gerónimo Lapi Italico primum usurpatæ, quarum usu gonorrhæa mucofa excitatur, via urinæ liberior patitur, lapilli siqui sint educuntur, nictæque detergantur.

5. *Dysuria primaria. L.*

Ea est quæ a victu acriore, falso, abusu liquorum fermentatorum, diureticorum, ab ætatis fervore, ab exercitiis immodicis, similibusque causis urinæ acridinem inducentibus oritur; urina in illa specie falsa est solito magis, fervidiorque simul. Hanc excitant sæpe vina alba, cerevisia, usus cantharidum. Curatur phlebotomiis, clysmatibus emollientibus, pitana ex floribus malvæ, violæ, radicibus althææ, seminibus lini, gummi tragacantha, fomentis, semicupis refrigerantibus.

6. *Dysuria hamorrhoidalis* Frider. Hoffmanni. L. P.

Ea est quæ a mariscis tumidis, potissimumque luxatis fovetur. Luxantur mariscæ seu tumores hamorrhoidales quoties *diaphragma hypogastricum* descriptum ab illustr. Lecar in libro de lithotomia, quod ano & recto. sustinendis dicatur, suo officio non fungitur & hiat; tunc mariscæ foras protuberant ex. ano, & nervi ad urethram pertingentes doloifice distrahuntur, atque urina cum ardore incredibili excernitur, ita ut calculus in vesicæ latere, & hos atroces per multos annos dolores procreare videatur; æger quidem a fluxu hamorrhoidali sublevatur, sed non sanatur; quoties alvum deponere tentat, toties mariscis excidentibus dysuria recrudescit. In nobili ægroto sic laborante frustra applicata sunt: suspensoria podicis, æger fere semper manibus suis hanc molem hamorrhoidalem sustinere cogitur, ac post alvi depositionem restituere, inaudis prius cerato Galeni mariscis.

7. *Dysuria arsuræ; Arsuræ* Joan. Andern; *Incidendum virga; Burning & Brening* Anglorum. Vide Astrucium de morbis veneris, lib. 1. cap. 7. n. 5.

Est dysuria ardens quæ olim maxime apud Anglos circa seculum decimum quarum eos affligebat, qui cum leprosa, aut cum muliere quæ leprosum virum prius adnucebat, concubebant, sine ullo seminis aut paris effluxu inde subsequente.

Morbus erat a syphilitica dysuria diversus, atque curabatur injecto vel lacte vel oleo amygdalarum in urethram.

8. *Dysuria a cystocèle* Saltzmanni diff. de Hernia vetricæ urinariæ. L.

Cognoscitur hæc species ex tumore molli in a

vicida viscerum, ut in scroto, perineo, &c. qui pressus cogit urinam eamque per urethram exprimit; vide *Mem. de l'Acad. R. des Sc. Ann. 1713. p. 146. a D. Mery.*

9. *Dysuria ab hysteritis*, vide *Hysteritidem A.* Si phlogosis tantum sit in collo uteri, aut; ut aiebant Veteres, ejus adit intemperies calida & sicca, nulla quidem adest notabilis pyrexia, adeoque nulla vera hysteritis, interea explorato ore uteri, digito immisso, calor, sensibilitas, siccitas, percipitur.

10. *Dysuria ab hysterolaxia*, Ruysch *Obs. Chir. 88.* Morgagni *Ep. XLVIII. 39. L.*

Hæc species stupor continuo mingendi & alvum deponendi desiderio, sed constans non est.

11. *Dysuria rachialgica*. *Stranguria colicem popularem concomitans* Cistellii de signis diagnostici colici popularis p. 6.

In populari colico, ait ille, urina biliosa, & acris, eaque sæpius cum stranguria emittitur, ut plerisque imponat existimantibus se non colico dolore, sed calculo cruciari. His adde Rachialgicæ cætera signa, pallorem, extremorum frigus, virium languorem, animum inquietum, corpus anxium, vigilias assiduas, leipothymias, anorexiæ, nauseæ, ructuum, vomitionum biliosam, qua deficiente singultus, sitis accedit, sæpiusque febris lenta, & quod totius caput est, acutissimus ventriculi intestinorum lumborum, ilium, & inguinum dolor excruciat. *Cistellius cap. 6.*

In colica vulgari accedit non raro dysuria cum penis rigiditate & condensatione, nulla vero erectione, quod cessante doloris vehementia evanescit; at in rachialgia dysuria ita vehemens & pertinax observatur, ut calculosa videatur.

Cura vero hujus speciei eadem est ac rachialgicæ, adeoque a cura cæterarum diversissima, cum juxta ipsum *Cistellium* cathartica, drastica, & emetica oleosis interpolata conveniant; sed de ratione apud nos morbo nil pronuntiare amsim.

12. *Dysuria calculosa. Calculus vesicæ*. *Sennerti, Cyrolli. Consult. Tom. I. p. 46. ita. 128. 146. L.*

Cognoscitur 1. *Dysuria* frequenti periodica, vel continua, seu frequenti & dolorifica mingendi cupiditate: 2. *Dolore* acutissimo extremi glandis, in viris a missione recrudescente: 3. *Frequenti* penis eaque injuncta tentigine, seu duritie, in qua nec erigitur penis, nec erassior evadit: 4. *Pondere* assiduo in perineo: 5. *Subitanea* quæ quandoque accidit inter mingendum urinae suppressione: 6. *Facilitate* mingendi, si crura depressentur, aut corpus resupinetur: 7. *Tactus*, digito in anum immisso, si de pueris agatur, aut interventu catheteris in vesicam immisso, quod altimum signum, alias certissimum, deficit cum calculus inter laminæ internæ cellularum aut vesicæ biveris & coarctatæ sinus delinquit. 8. *Exasperatio* dolorum ab exercitio, potissimum vestura in curra super stratum lapidosum.

Alii sunt calculi murarii durissimi, rufi, qui omne dissolvens elidunt, alii gypsei, alii gypso murarii, seu ex lapillis invicem gypso coagulentis efformati, qui tandem dissolventibus vel in toto frustillatim divisi cedunt.

Duplex est methodus curativa, una *chirurgica*, quæ in extractione calculi consistit, eaque instituitur hodie per apparatus lateralem; altera *lithonotriptica*, quæ in usu lithonotripticorum medicaminum consistit.

Optima methodus lithonotriptica ea est quam *D. Rob. VVitt* expertus est, scilicet t. ostreorum vel aliorum testaceorum conchæ vehementi igne per bideum urgentur usquequo totæ albescant & nil coloris subterculei retineant; octupla aquæ fontanæ copia supersuffunditur, & sit vehemens ebullitio; aqua illa per duodecim horas cum ostreis calcinatis insula colatur & servatur ad usum, & est *aqua calcis ostreorum*. a. Hujus aquæ cyathum unum aut alterum quovis die horis Medicis bibat æger, ita ut sensim hujus dosim augeat ad pintam singulis diebus potandam, & ultra: Simulque saponis albi in pilulis redacti, vel in aqua dissoluti drachmas duas, dein tres, demum quinque, vel sex, singulis diebus deglutiat, maxime si alvus ab aqua calcis constipetur; & persistet in illorum usu quam diutissime, ut per sex menses, imo per annos. Hujus aquæ & saponis ope calculus obducitur mucro quodam albedo leni, quo fit ut vesica ab ejus irritatione immunis evadat; dolor sedatur, mictus cruentus compescitur, & successu temporis calculus deterritur & dissolvitur, vel in frustula divisus foras excernitur.

Alteræ est methodus *Montpellier* aliquoties usitata, sed minus tuta; scilicet t. coiliquntur folia *arbusci una usi* victi, quæ arbuscula in monte *Esperou*, necnon in *Pyrenæis* adolescit, & *Buxerola* vocatur: Illorum foliorum vel pulvis ad grana quindécim, vel insuffusus drachmæ unius pro duobus, vel tribus aq. cyathis quotidie deglutitur per mensem, atque cum ab ejus usu vesicæ mucus abraditur, & dysuria potest rectudescere, jusculum ex herbis emollientibus, refrigerantibus, pullo, ranis paratum usurpatur, maxime si pulvis buxerolæ adhibeatur, aut insuffusum debilius sumitur; hujus medicaminis ope calculi teneriores dissolvuntur, aut in frustula minora dividuntur.

Quoad lithotomiam, ea raro felicem sortitur eventum, maxime si æger jam provectus ætatis sit, quia apud eos vesica est callosa, valde circa calculum coarctata, quandoque ulcerosa; ea non impedit quominus novi calculi generentur, & vidi puerum qui hanc operationem ter passus intra aliquot annos, iterum calculo laborat; præter peritissimum Chirurgum requirit operatio, ex qua, si male successerit, intra breve tempus inflammata vesica æger & medio tollitur; secus non raro insanibilis perineæ fistula supervenit; undique periculum, undique angustia.

13. *Dysuria gravidarum* *Nordmanni Dissert. de*

de ischuria gravidarum, Argentinx an. 1758. Merz Hist. de l'Académie des Sciences an. 1613. B.

Illa accedit vel toto graviditatis decursu, ut vidit Mery, vel ultimo tantum mense; 1. ob uteri molem expansam qua vesica premitur, & distrahitur, dolet, in quo casu sirus supinus, decubitus in lecto solatium præbent; vel 2. ab hysteroprosi, incompleto scilicet uteri prolapsu, in quo casu potissimum est ischuria, & juvat decubitus supinus, sustentatio molis abdominis ope nappæ, repolitio uteri & usus pessarii; 3. vel a cystocele, seu hernia vesicæ urinariæ, de cuius curatione vide Auliores.

In his omnibus casibus plus valet ars obstetrica quam pharmacia. Quoad ischuriam que sub finem graviditatis accedit, vide Ischuriam Claf. X.

De dysuria a cystocele fuse egit Saltzmannus in dissertatione de Hernia vesica urinaria. Dysuria ab hysteroprosi etiam non gravidis accidit. Vide Hysteroprosim in Cl. I.

14. Dysuria Neomympharum Delii Amœnit. Acad. p. 188. B.

Est ea quæ recens nuptas forti viro junctas adortitur cum vulvæ, nympharumque phlogosi; a contusione, a coitu repetito & æstreni ortum ducit, & intra aliquot dies cessat, modo a coitu abstant, & fomentis emollientibus utantur nympha; sic olim vocabantur recens nuptæ.

Post coitum etiam viros afficit dysuria, sed fugax, de qua Ephemer. Nat. Curios. Decad. 2.

15. Dysuria ab infestis, Ephemer. Nat. Curios. passim; A teredinebus, Delii Amœnit. p. 54. t. 1.; A lumbicis, Philosophica I. Transact. p. 202. D.

Teredines illi Delii erant vere ascarides vermiculis casci similes; cum urina copiosa excreti, qui prius fovere videbantur stillicidium urinæ dolorificum. Vidi ipse similem ascaridem cum urinæ emissum a viro, qui dysuriam, & dein ischuriam patiebatur, antequam hic vermiculus ejiceretur.

Suasit illi Delius diversa anthelmintica, & erinaceum ulum cum essentia cascariæ, sed omnia incassum.

16. Dysuria atroxarum. L.

Vidi & curavi duas puellas, quæ ab aliquot annis quovis mense post pubertatem atroces in pudendis dolores cum mitione ardenti patiebantur; altera vero cum urina pauxillum sanguinis mingebat; utraque erat imperforata, & cæcamentorum expertis, licet altera vigesimum nonum annum attigisset; illa autem cum dysuria tumorem quemdam & vaginam tunc temporis prominentem gerebat; ope scalpelli hymenis sectio verticalis facta est, & prærupte magna quantitas cruoris viscosi, nigri, picci, inodori, quo facto convalescere ambo, & haurum junior viro juncta dein feliciter peperit.

17. Dysuria diabetica.

Ea est species in qua post quemlibet passum, illico non aucta urinæ copia, nec frequentia, sed necessitate incoercibili, & cum levi irritatione vesicæ, mingitur urina aquosa, cruda,

quod per plures menses in hysteria sine fiti, æst cum macie, & cum febricula nocturna perseverasse vidit clariss. Doctor Causas. Hic affectus est vellicam quod linteria ad alvum; videtur potum illico transfluere, ut per diabetem hydraulicum aquæ citissime transfluunt.

Indicantur in hac specie læsicia emollientia, antihysterica.

XXVIII. PYURIA; Cæcæmatis species D. Cusson. Pissement de pus.

Est purulentæ, albæ, flavæ, vel viscido-mucosæ, lutulentæ materiæ cum urinæ ejectio.

Differt a gonorrhœa quod materiæ hæc puriformis mingitur, non vero simpliciter ex urethra exillit, ut exillat guttatim in gonorrhœa.

In pyuria materies puriformis, vel mucosa pelliculosa non ex urethra oritur, sed continuo stillaret; sed vel ex vesica, vel ex ureteribus, aut renibus effluit.

1. Pyuria renalis; Ulcus renum Sennert. cap. 11. lib. 3. pag. 7.; Ulcus ureterum Sennert. cap. 12. Pissement de pus. Journ. de Med. Avril 1761. p. 353. C.

Cognoscitur 1. urinæ colore griseo, flavescente, consistentia crassa, odore fetido ad putridum cadaverosum vergente. 2. Præcellere signa nephritidis suppuratæ, dolor scilicet renis alterutrius cum pyrexia acuta, quæ deinceps in amphimeriam hecticam abiit; vel præcessit nephralgia calculosa; interdum vero dolor renis, dum suppuratur, exiguus est.

Differt a pyuria vesicali ex eo quod dysuria nulla sit in renali; quod etiam in renali substantia ipsius renis carnea, atro-rubra, veluti dissoluta cum urina quandoque rfluat, & cum filamentis viscosis; (aphor. Hipp. 76. lib. 4.) illa vero pyuria peior est, si ulcus renum pendeat a calculis reni impactis, aut ab acrimonia sanguinis, quam si a causis mechanicis, ut vulnere, contusione orta fuerit, nephritis sine sanguinis dyscrasia.

2. Pyuria vesicallis Boneti Sepulchret. obs. 20. t. 2. p. 695. Vrière à la vessie. C.

Vel est exulceratio in collo vesicæ, vel in corpore ipso. Si in collo vesicæ præcessit gravis dysuria, stranguria, dolor atrox circa perineum, ibi etiam tumor, calor; pus inde prodians copiosum cum mucos viscido, tenaci. Si in reliqua vesica, dolor ad hypogastrium, præcessit cystitis, cum urina fluant materiæ crassæ, furfuracæ, foliaceæ, unde Hippocrates scabiem vesicæ adesse contendebat, cruentæ & purulentæ ac fetidæ sunt urinæ, ex quo facilius intolerabili potissimum dignoscitur pyuria vera a gonorrhœa nec non ex eo quod in gonorrhœa pus non mingitur, sed exillat; æst in pyuria urina turbida, grisea, fetida mingitur.

Pus a mucos dignoscitur, quod pus sit friabile, mucus vero in longa filamenta ducatur; pus griseum est & fetidum, mucus pelliculosus.

Pest gonorrhœam virulentam in fundo matulæ datur paucus mucus viscidus, qui pyuriam non con-

SERIFLUXUS. DYSURIA.

tonfuit veram, seu purulentam, & sponse evanesce.

In curanda pyuria aquæ Euzetenses, Aleſienses longo uſu, ſerum lactis, diæta lactea mortecomprobatant.

Si adit ſarcoma fungoſum in veſica adnatum, dolores ſunt diſtiores; inſectiones in veſicam fieri non poſſunt ſine catheteris interventu, quod ob dyſuriam difficileſt inſtitui poſſet.

3. *Pyuria a corde* Boneti Sepulchret. obſ. 12. & 13.

Conſtat his obſervationibus poſt longam puris miſtionem cum nephralgia, quæ Medicis ulcerofa cenſebatur, nullum viciu in cadavere inventum fuiſſe præter abſceſſus & ulcera cordis, cum multis in eo calculis, *Hollerius Commentar. ad aphor. 75. 54.*

4. *Pyuria a thorace* Boneti Sepulchret. lib. 3. f. 28. obſ. 24. 25. ex Diemerbroeckio Anat. lib. 1. cap. 17. & Dulaurerio Anat. lib. 9. 12. B. vide duodecim obſervationes apud Schenckium. p. 266. L. I.

Eſt purulenta miſtio quæ cum aliquali nephralgia empyiciſ accidit, & plures quandoque libras attingit intra paucos dies, eoſque a morbo prioris liberat. Vidi adoleſcentem empyicum in urbe *Clermonte de Lodov.* cum D. Med. D. Bertomieu, qui me conſuluit, ille poſt aliquot dies pus copioſum minxit, ſicque convaleſcit.

5. *Pyuria viſcida.* Vid. Conſultation D. Deidier, tom. 1. pag. 84. *Ecoulement par le canal de l'utero, etu vâgèrien par le malade. Glaire de reins. L.*

Aggredietur ætate provecſtus qui olim gonorrhæam paſſi ſunt; inter pollutiones nocturnas titillatio, imo dolor identidem acutior perſentitur ad veſicæ collum; urinæ acres ſunt, cum eſt diſpoſitio nephritica, aut arthritica in ſanguine, quod ex nephralgia, ex pruritu cutis, libidinoſa conſtitutione judicatur, maxime veto ex dyſuria ſequenti; inſumil urinæ quandoque turbidæ, rubræ, ſubcruentæ; ſed conſtanter deponunt in macula viſcidum quid griſco-pellucidum, urtnæ fundum petens, quod maculæ agglutinatur, quodque eſſum longiſſima ſila præ lentore eſſormat. Dum urina craſſa mingenda eſt, dolet collum veſicæ, balanſque, necnon hæret aliquandiu, & alvus ad dejectionem ſtimulatur; mingendi cupiditas, durante alimentorum digeſtione, frequenter eſt.

Hunc morbum ſyphilitico viru ſoveri putarunt optimi Medici, & rite inſtituta hydrargyri ſine pyraliſmo æger non melius habuit, licet ſubſecuta forent lacticia, balnea, aquæ ſulphureæ Euzetenses; morbum exaſperaverant candelæ unguento ſuppuratorio emiſe in urethram ſæpius immiſiſe. D. Deidier dubitavit an ulcus circa proſtatas, aut in collo veſicæ morbum ſoveret; ſed pus prunis injeſtum valde ſortet, non vilcoſa materiis; ſi viſcoſum quid e renibus, urecribus, aut ipſa veſica excremat, ut veſicoſiſe viſum eſt, ſuadet priſanam ex foliis parietariæ, ſeminibus lini, glycyrrhizæ; dein parietariæ pulveris ſemidra

Sauvages Noſologia Methodica. Tom. II.

chmam, vel tantundem coticis radicis calcitræ per triduum, priſana ſuperbaſuit. Id autem remedium aliquoties in menſe tentandum, & utriori inſiſtendum putat. Si poſ mingi videatur, balſamum copaivæ ad guttas xx vel plures ex cochleari ſyrupi cujuſdam hauriendus, ſuperbibendo lac aſinum per quattiduum, dein lac purum per menſem continuandum addito identidem balſamo. Accedente Julio aut Auguſto acidulæ potandæ ſunt per novem dies, dein balnea domeſtica per octiduum ſemel & bis ſumenda, & aqua pulli exeuendo e balneo eſt propinanda. Demum ope candelæ plumbeæ vel cereæ explorandus urethræ & veſicæ ſtatus, ut principium morbi melius cognoscatur.

6. *Pyuria mucoſa* Pæthol. method. *Rarus veſica morbus* Frider. Hoffmanni & *Casartini veſica* D. Lieuraud Maladie du bas ventre. *Glaire de reins* Gen. Morb. 199. *Glaire de la veſſie.*

In adoleſcente arthritico incepit a dolore veſicæ, forte cyſtitide vel ſimplici dyſuria; urinæ exinde craſſæ, ſedimentum albidum & viſcoſum, quod ſenſim copioſius, dolore etiam præterito quartam rinæ partem componebat; febris poſt duodecimam diem recedens multam mutationem in pyuria induxit, quæ ultra ad quadrageſimum diem proceſſit, cum aſthenia & maraſmoſe macilentia. Phiebotomiz, diluentia, temperantia; ſedantia, laxantia durante febre uſurpabantur, natæ ſola pyuriam deinceps ſanavit: large cæparum uſu hunc morbum ſublatus vidit *Ill. Linnaeus.*

Diſſert a pyuria veſicali, vel quæ ab ulcere veſicæ dependet, quod in mucoſa mucus a veſicæ cryptis abundanter exſtillans, qualis in catarrho ex naribus exſtillat; non vero pus; unde ſequetur pyuria veſicalis foetido ſluxu inſignita nec ſponte ſanabilis.

Mucus ille quandoque ita copioſus eſt, ut dimidiam maculam impleat referente *Hoffmanno*, & juxta ipſum provenit a veſica ureteribus quaſi coryza affectis, juxta *Sennertum* a cacochylia viſcida primarum viarum in ſanguinem tranſmiſſa ſuppeditatur; ita quandoque aſinis eſt pyuriz legitime, ut non niſi a magna excretionis copia diſtinguatur juxta ipſos. *Vide Boneti Sepulchret. de urinis decoloribus, obſ. 22. 18.*

7. *Pyuria lactea* Diemerbroeckii Anat. lib. 1. cap. 17. B.

Eſt lactis vel chyloſæ materiæ effluxus per vias urinarias. *Nicol. Florentinus* vidit juvenem, qui quotidie ſine ullo incommodo mingebat lactis quantitatē mediæ urinariæ, præter urinam multam. *Capellus* Medicus vidit mulierem quæ diutius cyathum lactis e veſica excrevit. *Laurentius* nonnullas vidit puerperas plurimam lactis copiam per uterum & veſicam excreviſſe.

8. *Pyuria chyloſa. Urias blanchâtres & troubles.* Vieuſſens Exper. anatomiq. 26. obſervat.

Pueri ſexennes circiter non raro urinas turbidas & albeſcentes fundunt, ſine dolore renum aut veſicæ, & ſucceſſu temporis ſine ullo

O

me-

teriori hujus ductus, sed ex abscessu proximo demum superne rupto refluit. *Vide Patium loco citato & Heisteri Chirurgiam.*

In hac fistula lachrymali, quam sola fovet ductus nasalis obturatus, feliciter succedit operatio olim ab *Anello* indicata, nuper perfectius adhibita a *dexterrimo Montpelienſi Chirurgo D. Marjano*, filum scilicet argenteum extremo altero acus influm perforatum immittitur per alterum punctum lachrymale usque ad nares; hinc vero foras abductum trajicitur uno, vel altero bombycino filo, quod ope filii argentei sursum per oculos retrahitur; in ductu nasali instat setacea relinquatur per mensem, unguento deterſivo, si opus sit, illinitur; & sic via patula sit lachrymis, & fistula sanatur.

6. Epiphora ab *ectropio*. L.

Ectropium est palpebræ alterutrius extraversionem, *Reversum* est palpebræ intraversionem, *Eraillemans*. Palpebra inferior evertitur a carne luxuriante, quæ ulceribus membranz internæ supervenit, in quo casu lapide infernali absumenda excrescentia, usquequo palpebræ sui tarsi elatere se resistunt. Vel evertitur propter ambulationem externam, quæ cutis corrugatur; ea si vetus, immedicabilis; si recens, curatur emollientibus, ut lacte, butyro, unguento de althea, ceræto Galeni, compressisque decedentibus. Vel avertitur a laxitate, ut apud senes, observante *Heistero*, eaque insanabilis. Remedia excisicantia conveniunt, calor siccus, spiritusofa sota, vapore adhibita; lutum ex aqua thermalibus, palpebra inferior invertitur ab operatione fistulæ lachrymalis scito tendine musculi orbitari, quod immedicabile est; vel a vulnere tarsum secante, unde in acum bifidum intro vel extro vertitur (*eraillemans Salmey*;) hoc malum conveniens futura conjunctivæ & cutis in tacto tarso prævertit, si ulcus recens sit; si vetus, malum est immedicabile.

Extroritur etiam palpebra inferior ab exophthalmia aut globi tumore, tum aquoso, tum cancroso; prior vocantur hydrophthalmia, & ambobus oculis afficit, & curatur diureticis catharticis; posterior canceri indolem & curam sequitur.

7. Epiphora ab *anchilope*. L.

Anchorops, quasi vitus angularis, est tumor cycticus, vel purulentus, vel lachrymosus mucosus canthi temporalis, cum epiphora.

Anchorops purulentus est, vel spurius, ab apostemate subcutaneo, vel ab apostemate inter musculum orbiculare & saccum nasalem; prior est nullius momenti, posterior epiphora quandoque stipatur, & agilopem potest ducere.

Anchorops lachrymoso-mucosus compressione recedit, & tunc lachrymæ vel tantum per puncta lachrymalia, vel per poros Gunzii refluit, vel etiam in nares dimanat; exeat ut ab obstructione ductus nasalis, vel a muco spisso, viscido, vel ab infarctu ipsius saci spongiosi, vel per fluxionem intrumescit. In priori casu injectio per syringem Anelli sufficit; secus compressio ope fasciæ & splenii iterata per diem

continua; per noctem ope emplastri, superius sanatur, addito spirituosulo vel vinolo liquore, quo splenia madedant; & tonusque sacco restituitur. In posteriori specillum argenti unum per puncta lachrymalia immisso obstructionis reſerat, addito etiam filo uno, alterove gossypino, premittendis.

Anchorops purulentus incipit a tumore valido, rubro, lacinante, vel pulsante, cum febre, ophthalmia, epiphora; pendet a vera inflammatione faciei lachrymalis quæ abigit suppuratum; unde dignoscitur ab anchilope lachrymoso, vel hydrope faciei nasalis. Lachrymalia puncta fundunt verum pus, non vero mucum puriformem, qui a pure viſu distinguitur, nisi per antecedentia; & nares ejusdem lateris sicca est, nisi per noctem quid effluat; quod sæpe fit. In illa specie, vel viget inflammatio, vel recessit; si viget, instituitur dieta tenuis, refrigerans, phlebotomia celebratur, fuscule refrigerantia usurpentur, cathartici antiphlogistica non negligantur. Si resolutio non succedat, applicetur tumori cataplasma ex medulla pomi cocti cum albimine ovi mixta, vel cum pulpa cassiæ, ut suppuratio procedat, quæ facta apostema lanceola aperitur, injectione hordei detergatur, turunda tenui saccus lachrymalis aperitus servetur, cicatrix inducatur.

8. Epiphora frigida *Sennetti* cap. 46.

Est effluxus involuntarius lachrymarum serosarum, sine pruritu, dolore & calore saltem notabilibus; ea sequitur diurnas ophthalmias etiam sanatas, stulta immoedia, ut accidit potissimum circa annum ætatis quinquagesimum, cum visus immittitur, & objecta non nisi paululum distita, distincte videri possunt; accedente hyeme ingravescit, & difficulter curatur; interea si æger ab studio, vento, fumo, cibis salis, vinoque abſtineat, si simul noctu oculum fovet infuso quatuor caryophyllorum in aqua vitæ uncis duabus, hic affectus immittitur; si vero ob tam levidentem incommodum æger velit cathartica & vehiculatoria nuchæ usum vocare, ut suadent Auctores, alle de horum successu judicabit.

9. Epiphora calida *Sennetti* ibid.

Ea est serolis laticis ex oculis destillatio, quæ stipatur calore mordaci, pruritu, rubore, & dolore oculorum, adeoque diversas ophthalmias species, potissimum ulcerosam fistulosamque, comitatur, quas vide suo loco. In hac præter remedia generalia, ut phlebotomia & catharsis, conveniunt bolnea, fuscule refrigerantia, serum lactis, nec non colliria leviter adstringentia ex rosâ, plantagine, aciâ, gallis, vino rubro, vitriolo, &c.

Lachrymæ quæ a nullo animi pathemate procedunt, in morbis acutis hæmorrhagiam narum, & si sint cum signis exitialibus, mortem prænotant: 1. *Epidem.* 2. *Aphor.* 80. & 4. *Aph.* 52.

10. *Epiphora cruenta*; Lachryma sanguinea *Sennetti* ibid. & fusc Schenck. libr. observ. *Luxures de sang.* Vide Menorrhagiam erroneam. P. Borell. Cent. II. Obs. 56. L.

17. *Epiphora sebacea* Haller. Stud. Medic. pag. 782. ex Rudolpho Vehrens; *Leaa* Hippocratis; *Lemia* Celso, *Oculi gramilio* Lucilio; & *Gramia* Nonnio; *Lippitudo* Auctorum; & *La chassie*.

In palpebrarum marginibus sunt glandulae sebaceae, quae separant paucum in statu sano sebium, quo forte praepeditur lachrymarum effluxus & deviat; at ubi & copiosissimus est huiusmodi quandoque provenit. Illa lippitudo saepius ophthalmiam humidam seu pituitam Horarii comitatur, ea visum perturbat, palpebras noctu scilicet horta octava vespertina usque ad diem sequentem, agglutinat: tunc vero apertis per vim oculis, lachrymae serosae effluunt.

Curatur tuique pulvere vespere adperso, vel aqua rosarum, cujus unciae octo viterioli viridis vel albi grana viginti excipiunt; vel aliis ophthalmicis deterfivis & subadstringentibus.

12. *Epiphora arthritica* Musgrave de arthritide, cap. 18. & 21. L.

Est ea quae ab humo & acris arthritico a pedibus retropulso accidit, & cum arthriticis doloribus alternat, ac quandoque cum illachrymatione odontalgiam excitat. Affectus hic quandoque diuturnus est; & saltem incommodus.

Exigit phlebotomiam, & vesicatorium nuchae applicandum, nec non collyria mitissima, ut lac oculis instillatum, mucilaginem seminum psylli & cydoniorum, aquam rosarum, trochiscos albi Rhafis, aquam plantaginis, &c.

13. *Epiphora laeta*, Ephem. Germ. Dec. II. Ann. VII. Obs. 98. in infante recens nato.

XXII. CORYZA, Hippocratis, Gottrai Definit. Med. aliis *Catarrhus*; *Gravado* Latinis, *Deffillatio*, *catarrhus ad nari*; *Rhume du cer-*
veau; *Coryza*.

Character est humoris pellucidi aut mucosi, viscosi & naribus stillicidium. Membrana pituitaria, quae sinus frontales, sphænoideales, maxillares obvestit, est amplissima; duplicem vero humorem suppeditat, tenuem scilicet, & paucum qui in nares posticas, inde in oesophagum cum lachrymis infunditur, & mucum viscidum, qui membranam, ut odoratus sit idonea, continuo lubricat, oblinique. Duplex est itaque fons humoris qui in coryza per nares effluit.

1. *Coryza catarrhalis*, vulgo *gravado*. *Coryza humida* Nenterii. *Enchiffement*. *Rhume du cer-*
veau. B.

Illis ab aeris vicissitudinibus, potissimum a frigore suscepto calente corpore, oritur; dolore gravativo frontis, stertutatione, anosmia, voce nasali, dyspnoea; tussis stipatur, dein vero procedente morbo destillatio humoris, qui prius erat limpidus, & naribus qualis in summo frigore sit, qui *rempie* vocatur, jam abit in mucosum, viscidum, copiosumque effluxum, a quo aëter. suble-
vatur, redit odoratus, respiratio juvatur, &c.

Phlogosis membranae pituitariae, est huius morbi principium.

Curatur dixta tenui, potu theiformi, calido, diluente, inspiratu lactis tepidi, aquae, vapocis; aëre tepido, vapore seminum nigellae in aqua coctorum; vide *Schneider lib. 3. de catarrhis*, pag. 503. Cum vires posticas occupat saevior est quam cum altius assurgit.

2. *Coryza phlegmasiobagla* Salmuth. ob. 37. cent. 1. Bonet. Sepulchret. T. 1. p. 410. *Phlegmasiobagla* Junckeri; Morgagni Ep. XIV. 20. Hippictrhis *Morsondure*. Furetiere Diction. B.

Differt a praecedenti quod, sine satellitio catarrhi, illico sponte accidat profluvium iuge humoris limpidi, lymphatici, copiosi, non mere aquosi, qualis est qui a frigore acris maxime apud senes exstillat; hanc coryzam bis noctu expertus sum, sine alio incommodo: similem per plures menses perseverasse memorat Morgagni; uberrimum aliud narrat Bidoles, quod stillicidium narium vocat.

3. *Coryza virulenta*, *Onena* Bonet. Sepulchret. T. 1. p. 406. Hippictrhis *Morve*.

Est purulenta materis effluxus & naribus cum ozena. Hic morbus ob fortorem & acrimoniam puris diu in naribus concludit, & sœnum inquinantis ab equo ad equum propagatur, seu contagiosus evadit: Vide Hippictrhis, ut *Soleysel & Bourgelat*, *Elementa Hippictrhis*.

4. *Coryza variolosa* Huxham.

Illud symptoma stipatur stertutatione, difficultate deglutendi, tussis, epiphora, & saepius rubeolam quandoque variolan. incurrentem comitatur, ac designat.

5. *Coryza purulenta* Boneti Sepulchret. T. 1. Obs. 10. Append. t. Morgagni Ep. XIV. 22. ex Fernelio, Palsino, Nicolai, &c. vide Caecidiam ozenam.

Si sinus frontales ulcere laboant, iniectiones institui possunt deterfivae, imo horum sinuum terebratio institui; si vero sinus maxillares alteruter pure turgat, dente canino avulso puri via parari debet, *Meembom* & *Courpéro* ducibus.

6. *Coryza febricosa* Vandermonde Journ. de Med. Mars 1751. p. 197.

Viro catarrho fluxum mucii periodicus vespere quovi revertens, meridie sequenti evanesceens, stipatur erat, capitis intumescencia, dolore, sinuum infarctu: mucus narium copiosus erat, limpidus, aëter; pyrexia nulla; diaphoretica frustranea fuere, soli kinkinz usui cum catharticus morbus cessit.

XXIII. PTYALISMUS; *Ptyelismus* Hippocratis. in Coae. a *ptuelon*, sputum; & *Anabexis* Galeni; *Anacremphus* Helychio; *Cartharus* *diapharyngos*; *excreatus* *Salivastio*; frequens expulsi-
o Latinis. *Bave*, *salivatio*; *expulsi-
o* *crachement*. Aëri *Salivantes* Latinis, *Gallis*. *Bavens*; Anglis *Drivellers*.

Character. Est salivae vel mucii sine expectoratione ac vomitione ex ore effluxus, aut emissio.

In os confluit 1. saliva ex ductu potissimum Stenoniano a parotidibus delata, nec non ea quam omnes glandulae sublinguales, buccales, &c. suppeditant: 2. praeterea liquor tum lim-
pidus.

N. 4.

pidas, tum mucosus, qui ex naibus in fauces delabatur, tum per nares posticas, tum per dum sphæno-palatinum: 3. Mucus viscidus, qui ex tonsillis & glandulis faucium sebaceis exprimitur: Mitto quæ vomendo vel expectorando conflunt.

Quodcumque exit ex ore, illud vel vomitu vel ructu ejicitur, vel expectoratur cum tussi, vel excreatur cum sono rauco, quem Arabes *Rasfactionem* vocant; vel expuitur ex lingua & labris, vel sine impetu elabatur, quod Galli *bars* nominant.

1. *Ptyalismus nauseosus*. *Ptyalismus a saburra nidore*. B.

Illæ est species quæ a saburra ortum ducit, quatenus irritatur inde pharynx, & liquor ac mucus ex faucibus cryptis ubertim profluit, cum nausea, angore ventriculi; tanta quandoque copia expuitur & exsillat hic liquor, ut ex stomacho suppeditari quis crederet; talem ptyalismum excitat etiam emeticum assumptum, etiam antequam vomitus accedat. Talem excitat etiam aconitum, si vel malicatum fuerit, hinc enim oris sapor putris per duos vel tres dies cum salivatione, ut observavi, & cardialgia cum lancinante dolore in medio lingue.

2. *Ptyalismus a pyrosi*. Vide Sodam Junckeri. I.

Differt ille a priori, quia sensus ulationis & acidi erodentis extenditur a ventriculo ad os, atque quasi-acidum saporem præ se fert saliva; in hoc affectu ubertim efflens; hanc excitant frustula acidum vel empyreumaticam saburram generantes, castanæ, nuces, pisces conditi, frigida omnia ex sartagine cum oleo vel butyro cocta, nec tamen paucula exsistat ut plurimum.

3. *Ptyalismus Lapponicus* D. Linnæi; *Ulim* vel *Horme* Lapponibus. C.

Est symptoma colicæ Lapponicæ. Vide *Floram Lapponicam*, pag. 69. Differt a prioribus per dolores atroces abdominis juxta umbilicum qui hoc ptyalismo terminantur.

4. *Ptyalismus a laxitate* Cheynei de sanit. pag. 366. cap. 5. *Ptyalismus symptomaticus* Zvingeri. de saliva Dissert. Agri *Driveller* Anglis vocantur. L.

Illi sunt, qui stupidi, lebes laxi & penduli; oculisque demissis, nequidem salivam ore continere possunt; ita ut continuo ex ore efflueret; simile vitium in paralyticis observatur, idem accidit laxata mandibula.

5. *Ptyalismus mercurialis* Nicol. Heienfi; Christ. Roperi Diss. de Salivatione cap. 2. ab oris ut cuspulis. Stenon. *Ptyalismus articularis* Zvingeri de saliva, Dissert. & *Salivatio ab hydrargyri* D. Astruc. de lue venerea B.

Vulgo post quinque vel sex litus mercuriales, vel assumptis intus preparatis mercurialibus, præsertim non satis diluto sanguine & laxis vas, supervenit calor in ore, sapor æruginis, glandulæ sublinguales, & quæ iterum linguam cingunt, tumunt, ut aphthas patiuntur, dein ulcuscula quæ multum salivæ, feridæ sup-

dunt; crescente actione hydrargyri tumet lingua, exeritur foras, fauces angina aut cynanche corripuntur, cum febre, pervigilio, assidua expiendi necessitate.

In cura morborum syphiliticorum vitari debet ptyalismus, secus syphilis per aliquot tantum menses supprimetur, aut etiam minime minuitur. Vitatur vero, longo usu balnearum præmissio, dicta lactea in hydrargyri utriusque remotis ad duas tresve dies inunctionibus, illarum dosi, quæ vulgo semiunciam attingit, imminuta, si vero invitis his cautelis accedit, quod vulgo post quartam, sextamve inunctionem accedit, suppressa omnimodo inunctione, expectandum donec desierit; os sæpe decocto hordei abludendum; si vero ex abrupto auctus ægrum in periculum cynanches conjecerit, lingua tumerit, & in ore vis possit contineri, phlebotomia, hincorum depositio, cathartici, imo balneis tunc huic occurrendum. De ulcusculorum oris detractione, ceterisque ad hoc spectantibus videatur Ill. Astrucius.

Ex cinguli mercurialis adversus pediculos gostratione, ex hydrargyri etiam confectione solemnī aurifabris, speculorum confectoribus, ex una drachma unguenti Neapolitani citra cautellam illita, ptyalismus quandoque supervenit.

6. *Ptyalismus variolosus* Sydenhami pag. 83. 103. 93. 593. *Salivation de la petite verole confluente*.

Apud adulescentes variola confluente laborantes, salivatio sub primis eruptionis temporibus, aut biduo post, perpetuus comes accedit, sæpius multo quam infantibus diarrhæa; materia prima tenuis exeritur, ægro multa lintea ipsam nocte perspurcante. Hic ptyalismus mercuriali non minor est, sed non feret; die vero undecima saliva viscidior ægerime excreatur; fistulosus est æger, tussit subinde inter bibendum, & potus per nares revertitur; æque hoc die cessat ut plurimum salivatio, licet aliquando biduo post revertatur; dicto autem die undecimo scilicet tumor faciei, una cum salivatione imminui incipit, ac tunc primum ejus loco manus intumescere solent ac debent.

Non solum autem in variolis, sed & in febre variolosa Sydenhami, seu synocha variolode, in qua nulla est eruptio, par ptyalismus accedit, & ad salutem necessarius est.

Indicationes sunt 1. ut ptyalismus ille sustinetur, quod maxime præstat, *petus tenuis*, qui diluat, nec refrigeret nimis, aut calcasciat qualis est cerevisia tenuis, imo serum lactis, nec non pægoricum seu andycum vespere exhibitur, sic docente experientia. 2. Cavendum ne ptyalismus supprimatur, quod intermissa catharsis aut phlebotomia, maxime vero calidiori regimine, efficitur. Si vero ptyalismus non interveniant, aut citius quam par est evanescat, nec in ipsius locum manus tuncant, facie tamen detumescente, tunc in summo periculo versatur æger; si enim hac accedat inter-

sextum

sexturn & undecimum diem postula deprimentur, delirium invadit, febris, desinit; postula pallida, circulo etiam pallescente; in hoc unico casu ad cardiacam deveniendum est, ut ad scirpulum theriacum, cum eadem radici pulveris & chelis cancerorum, semi scirpulo radicis contrayerae & syrupo caryophyllorum; si vero hoc infortunium accidat circa aut post undecimum diem, quo tempore postula faciei rufescente sunt, praemissa venae pedis sectione, vix ad emeticum, ut nostrates faciunt, aut ad lene catharticum, ut Angli solent, propinquandum est; sed quoniam vires non vegetae sunt, earum ratio habenda est, & semper de summo periculo astantes admonendi.

Monspelijs rarissime observatur ptyalismus, in variolis; etiam confluentibus adultorum, raro etiam diarrhoea apud infantes hac specie laborantes, sed apud Septentrionales is est frequentissimus & salubris, atque hoc ptyalismo circa undecimum diem decretescant necedarius est ut facies, manusque intumescant oedemate varioloso, quod ptyalismi vires impleat.

7. *Ptyalismus scorbuticus* Roper. Diff. citata; Lind. de scorbuto, &c. Journ. de Med. May 1755. p. 327. C.

Cognoscitur ex stomacacis signis, scilicet facili gingivae haemorrhagia, mollitie, fetore, dentium lapsu, nigredine, maculis tibiarum, faciei pallore, &c.

Profusus vires exhaurit, adeoque sistendus quantocius; suadet vero Lind revellentia epispastica, sinapismos suris admoventes; alvus clysmatis solvenda; lenia cathartica usurpanda; laxandus curis spasmus, qui fluxum illum determinat; profunt in eum scopum diaphoretica, theriaca, camphora, flores sulphuris ter vel quater in die, adde etiam diuretica. His salivatione accret, & suffocatio praeventitur. Sistitur etiam collutoriis ex gummi Arabico, ichtyocola, alumine, cortice quercus; laudat Ropernus gargarismata ex vino rubro, vitidae uris, aqua plantaginis & salviae, saepius ope penicilli gingivis applicanda.

Intus vesicetur aeger lacte vel vegetabilibus, sumat kinkinan, elixirum vitrioli, dum lacte non uritur.

8. *Ptyalismus hypochondriacus* Ballonit, lib. 2. consil. 49. Sylvi, Prax. Medic. *Ptyalismus melancholicus* Sennert. de scorbuti signis; *hystericus* Morton. Curationem vide apud Ballonium, lib. 2. cons. 25. Roper. Diff. de ptyalismo. L.

Est ille qui hypochondriacis, melancholicisque familiaris est; is vires imminuit, stomachum labefactat, stipatur borborrygmis, constipatione, ructu, praecordiorum angustia, somno turbulento; fovetur saepe a cerna copiosiori, & tunc horis maturitinis augetur.

9. *Ptyalismus arthriticus* Musgrave, cap. 11. hist. 3. *Sturatio arthritica*.

10. *Ptyalismus phthiricus* Morton. cap. 2., n. 10. & 11. Phthisiologiae, p. 29. C.

Ipse signa phthisim praesagientia merito re-

feratur matutina & diurna phlegmatis falsi & acris, quandoque viscosi, excretio, quod universum sanguinis serum parili gradu salium esse atque acre significat; proclives sunt illi ad copiosum salivae fluxum per ductus salivares & tonsillas, quod diarrhoeam sanguinis colliquativam indicat; hoc symptomata multis annis phthisim antecedere observavi. In ultimo phthiseos gradu idem ptyalismus recrudescit, ab anacatharsi purulenta valde distinctus. Oritur enim fluidi ejectionis copia ab ipsis oris glandulis, nec sudoribus profusus imminuitur, ac satum accelerat. Roper. Diff. de ptyalismo.

11. *Ptyalismus viridis* D. Huxham Philosoph. Trans. n. 381. anno 1724,

Fox quadragenarius ab aurigine & colica liberatus est ptyalismo uberrimo ad sextarius circiter duos, salivae statim vividissimae porraxae, sed tenuis; usum autem furrat pomaceo quod bilem hoc colore viridi inficere potuerat; hic ptyalismus quadraginta horas duravit, deinde pellucida evasit saliva; ope vero ptyalismi ferosi sponte erumpentis ab aurigine, prius bis terve liberatus fuerat.

12. *Ptyalismus purulentus* Petr. Hardisvay, Philosoph. trans. n. 400., 1726. L.

Hic ptyalismus purulentus ultra triennium perseveravit, pure sanioso suppeditato a sinibus maxillaribus in oris cavum apertis & cariosis; puero satis benevalente, quoad cetera.

13. *Ptyalismus aphthosus*. *Chancres a la bouche*. B.

Adolescentis corripitur synocha cum cephalalgia, angina, linguae forditie alba, glandularum tonsillarum & maxillarum tumore; praemissa phlebotomia purgatus est addito emetico, bilem ano & caro copiosius reject, & difficultas deglutendi evanuit; alit eadem die levis exulceratio interiora oris & linguae ambitum detinuit, ita ut crusta in utraque labiorum commissura oris apertionem impediret, lingua tamen superne albescens, lateraliter excorata, intense rubra, videbatur, & tantus erat viscosusque ptyalismus, ut noctu, interduque infomnem continuo expuscatem agrum per aliquot dies detinerat. Praescripto altero cathartico & gargarismate ex uncia mellis roseae, cum drachma spiritus salis in aqua hordei melius habuit, dein convaleuit.

Ptyalismus cuius factor cadaverosus est iunctas dysphagiae, est signum cynanches ulcerosae seu gangrenosae, quae nuper apud Pisenates & Bitterfelda maximam infantum stragem edidit.

14. *Ptyalismus gravidarum*. *Crachotement & aigreurs des femmes grosses* Puzos. L.

Racens gravidae per tres quatuorve menses vel salivam viscidam, vel satum pituitum matutinis horis exscreandam habent, cum sensu acoris intercurrente, aut cardialgia, aut nausea.

His opitulatur vel bolognensis, vel aquae cyatho, vel cocolata, feminibus cumini, aut cardamomi ma-

ficatis, infuso theæ, veronicæ, chameli, mellis. Si ea inutilia fuerint, phlebotomia adhibenda; mane rheï pulverati vel huius extracti dosis ad purgandum sufficiens sumenda, vel clystma vespere injiciendum, aut stomachus roborandus theriaca, confectioe hyacinthina, alkermes, opiata Salamonis. Constat quandoque pectus pectoralis emulsionata, & aqua cinnamomi aromatizata.

15. *Ptyalismus catarrhalis*. *Salivatio anginea* Roper. Dissertat. *Rhume d'estomac*, De Meyley T. 2. n. 302.

Est ille qui in odontalgia, angina cathartibus supervenit, eademque auxilia exposcit. Os exundat saliva mucosa: accedunt flatus, gravitates ventriculi, nausea, vomitus phlegmatis, vel diarrhoea, quæ omnia ægrum sublevant.

16. *Ptyalismus a carie* Quelmalz. Diss. de ptyalismo febrili. P.

In maxillæ ossibus cariis & carie dentium protrahitur quandoque ptyalismus ad hæcticam consumptionem, ut pluries vidit Auctor citatus; hocce etiam phænomenon accidit cum carie perforatæ antrum Hygromori, seu sinus maxillaris. Eundem ptyalismum observavi in trismo, qui odontalgia arthritica est.

17. *Ptyalismus a calculo* Christoph. Seherer, de calculo ex ductu salivari excreto. Diss. Argentorat. 1757. Journ. de Med. Juill. 1756. Lautaud.

Initio levem inducit dysphagiam, deinde vero ptyalismum calculus sub lingua genitus, quod licet rarum sit: interea a *Couperus*, *Vallerio* & *Salzmanno* fuit observatum. In casu *Cl. Lemuraud* aderat dolor sub lingua vehemens, pyrexia ardens, quæ omnia extracto calculo gypseo sub lingua latente, evanuerunt. Vide Arthritidem D. Du-Bouchet qui arenulas copiosas excreans a doloribus arthriticis se liberabat.

18. *Ptyalismus febrilis* Quelmalz. Diss. Lipsiæ 1748; Sydenham. pag. 99. de febre variolosa.

Est ptyalismus tritæophyæ epidemicæ Lipsiensis. superveniens, per septimanas perseverans, abundans, morbum non perfecte solvens, & quem tamen reprimitur periculosum erat. Hunc stipabant erosiões circa linguam, fortior, tumor gingivarum; saliva limpida, dein viscida æque ubi excretio, ac si hydrargyrosis plena fuisset adhibita.

19. *Ptyalismus syphiliticus*.

Est ille qui citra ullum hydrargyri usum accidit illis qui ulcuscula, veneræ gerunt in faucibus, uvula, velo palatino, quæ quidem ex macula grisea serpente, ex fortore & ex salivatione facile se produunt.

Huic speciei ipsamet hydrargyrosis caute & parca dosi administrari debet, non neglectis de tergentibus. sub finem hydrargyroseos, scilicet levi attractu ulcusculorum: bis in die iterato ex penicillo intra collyrium Lanfranci tincto; collyrium vero aqua rosarum edulcorandum est, usus lactis est usurpandus.

20. *Ptyalismus urinosus* VValler. Ad. Upsal. p. 156. Vid. Tuphi Lib. III. Hist. 22. Helvetius Oecon. Anim. p. 156. L.

XXIV. ANACATHARSIS Hippocratis, Galeni in Aph. 8. lib. 5; *Anaptyxis* Hippocr. *Tussis humida*. *Expectoration*.

Character est mucæ, lymphæ, vel cujuscumque humoris facta cum tussi expectoratio constans & notabilis.

Differt ab excretionem ptyalismum comitante quod tussis in anacatharsi sit pectoralis, non vero simpliciter gutturalis. A rheumate quod sit anacatharsis sine rauedine. Anacatharsis raro est morbus essentialis, sæpius est symptoma phthiæ, asthmatis humidæ, catarrhi.

1. *Anacatharsis biliosa*; a *spile of unusual color*. Philosop. Transact. n. 382. by Huxham. anno 1724; *Coleptysis* D. Coste, Med. Prof. in Acad. Peripinienensi.

Observavit scilicet in ancilla tussim gutturali, qua primo cretorem excrebat, deinde vero per viginti circiter dies expectorabat bilem, seu humorem intense flavum & amarum, & faeces ano redditæ erant griseæ.

Præscriptis apozematâ amara diluentia, dein vero saponem venetum singulis diebus ad grana viginti, triginta, tumendum: parabat saponem ex sale tartari & oleo olivarum optime mixtis ad consistentiam pomati flavi, quibus adhibitis remediis intra quinque dies sanata est.

Vidi ego dudum mulierem quæ ex rheumate neglecto incidit in anacatharsim materiam viscidâ ex flavo viridescens, quæ cum amphimerina catarrhali perseveravit multos dies, sed ea expectorata materies non amarescebat, idem iterum in adolescente vidi: cathartica vero morbum sustulerunt, & febrem simul.

Similem luteo viridem observavit excretionem D. Huxham Trans. Phil. Anacatharsim azuream observavit Clariss. Fontfride.

2. *Anacatharsis phthifica*: *Tussis purulenta*. Vide phthitim humidam.

3. *Anacatharsis a vomica*; *Vomica pulmonis*; *La Vomique*.

Vomica est apostema materiam puriformem, vel sabzeam, aut pultaceam continens ut plurimum tunica obvolutum; verosimile est vel glandulam lymphaticam sebacea materie sensim distensam, vel hydatidem pingui & crasso humore sensim rigidam esse huius morbi principium. Similes hydatides humore puriformi quandoque gypseo factas in ovarii & ascite hydatidosa observarunt Academici Parisini. Gypseo, topicoque tumores sæpe inveni in pulmonibus, sine ulla inflammatione prævia, parva quandoque, eaque acuta comitante febre, atque ex hac anacatharsis, licet per menses perseverante, ægri non raro convalescunt, maxime si tunicam oviformem, seu cystidem expectorent.

Hic morbus sæpe cum phthisi confunditur in præxi.

4. *Ana*

4. *Anacatharsis puriformis* & *Tussis purulenta* Stahl. Sattyr. Harvey. vulgo *Suppuration. lymphaticæ du pounon*.

Duplex est hujus varietas.

1. Post peripneumoniam & pleuritidem, in qua non omnino per phlebotomiam resoluti potuit congestio inflammatoria, supervenit puriformis griseæ, blandæ, viscidæ materię expectoratio sine febre notabili, quæ per mensem & ultra perseverat, nec tamen phthisis est, atque ex ea, adhibita diæta lactica, cum balsamo Canadensi, ægri convalescunt.

2. Post febres putridas ac malignas, corpore fati jam superque purgato, accidit interdum, maxime in senibus, ægrum valde debilem esse, & quandoque tussis, interdum etiam excreatu magnam glutinosi, viscolique phlegmatis copiam expectorare, quod symptoma non tantum ægro terrore inijcit, sed & ipsi Medico præsertim minus cauto, imposuit pro phthisicos prodromo.

Hoc in casu ægrum jubeo vinum de Malaga, vel mulcatum cum pane tosto ei immixto bibere, quod vires reparat, & symptoma illud intra paucos dies abigit. Sydenham p. 38. cap. 4. S. 1.

5. *Anacatharsis asthmatica*. Vide *Asthma humidum*.

XXV. DIABETES; a diabete Hydraulico, seu syphone aquas transmittente. *Diarrhœa urinosa* Galen. lib. de erisib. *Diarrœa ex ore*; *Diisfacus* Galen. lib. 6. de loc. aff. *Hydrops ad matulam* Galen. de loc. aff. lib. 6. & lib. 1. de casibus; *Profluvium urinae* Latin. *Diabetes*.

Character. Subita potus omnis per urinas cum magna siti profusus, *Gerræ*, cum corporis eoliquatione, (*Aretæ*) febricula, anorexia, polydipsia, urina copiosa viola redolente, oleo supernatante perfusa *Dover. Legacy*, quales suntur scorbuticis.

1. *Diabetes legitimus* Aretæ; *Deidier* Consul. §8. T. 1.

Indefinens moiendi necessitas quæ nihil cohiberi potest. Mictio copiosior est quam potus, unde adipis colloquatio, sitis urgens cum saliva spumosa, viscida, fastidium, animus dubius, præcordia gravia; a retenta urina tumor abdominis, testium; crescente morbo calor mordax in visceribus; tabes; rarus morbus, *Galeni* bis observatus, curatu difficillimus.

2. *Diabetes Anglicus* Pechey promptuar. med. præct. Mead. of poisons edit. 4. C.

Character. Urina odoris, coloris, & saporis mellei. *Mead* *Monita*.

Affectus ille differt a diabete *Aretæ*, quod urinae sint dulces & mellitæ, vel limpide, ut refertur Angli, vel subturbidæ ut apud nos, necnon quod hodie apud Anglos & Boeavos, ob vini meracioris ingurgitationem, frequens sit; urina intra viginti quatuor horas mittitur

quandoque ad libras decem, quindecim ex observatis *Pechey*. Sitis est inanis, febris hectica, insignis æsthenia, languor, & emaciatio.

Æger lacte vel crudo, vel aqua hordei diluto vescitur, & aquam calis secundam iter in die ad uncias quinque vel sex sumat. Juvant etiam gummi Arabicum, tragacantha, cinnamomum, cymæ cupressi, rheum, noctu narcotica; aquas vitriolicas suadet *Jurinus*.

Similem diabete observavit in duobus rusticis Gebennensis media hieme cum urina saccharata & subturbida, eodem mense & anno, *D. Privat*, *D. M. Alespensi* clarissimus.

Lactis serum aluminatum laudat *Diabetes*, juxta quem remedium id nunquam fallit.

3. *Diabetes hystericus* Sydenham. Diss. ep. de hysteria, Cheynzi de Sanit. 177. L.

Hanc speciem observavi in Marchionissa Sæ. Victor hysteria, quæ serum insipidum, aqueum, copiosissimum, fundebat per aliquot dies, hoc cessante, leucophlegmatica evadente; redeunte sic per vices diabete solvebatur phlegmatia; hysteria & mulieribus ira percitis magnum urinae limpide possumum est familiare.

Serum aluminatum Mead fit ex lactis paululum cocti libris quatuor, & aluminis drachmis tribus; hujus seri (possetum vocant) saltem uncie quatuor ter in die bibantur; est aptissimum diabete remedium. *Mead* *Monita* p. 165.

Desidiosos aggreditur qui luxuria disfluens, cum mero sanguinem accedunt, frigidis potibus sitim restringunt; morbum esse hepatis & humidum aeris in eo attractum contendit Mead Lac muliebri esse vere saccharatum; chylum itaque dulcem parum mutatum diabeticæ floræ dulcedinem præbere putaverim.

4. *Diabetes artificialis* Malpigh. de liene.

Ligatis in cane vas lienis, canis solito frequentius mingit.

5. *Diabetes a vino* Collect. Academ. Tom. 3. obs. 122.

Quadragenarius robustus, bilioso-sanguineus, vino & aromaticis abusus, in diabete incidit, tunc vero quam bibebat alam, seu tenuem cerevisiam urina omnino referebat, & potus assumpti molem multum superabat; vigeat fames, sitis urgebat, ons fitutas, renum dolor, ardor viscerum & macies summa.

Ufus est tinctura martis, catechu, corallo, rum; vespere bolum ex ebore uto, antiseptico Poteri, croco martis tum uno, vel altero laudani grano; post mensem hie utens convaleuit.

6. *Diabetes arthriticus* Sydenhami de podagra, p. 463.

Est symptoma arthritidis inveteratæ, sed extra paroxysmos, in quibus etiam urina est pauca & colorata; at extra eos urina quandoque est æque copiosa & aquosa ac in diabete, quod designat a materie acri sitim excitari, simulque ita languore digestionem; & imminui perspirationem, ut potulenta illibata per urina vias emittantur; nec ab aliis principiis derivanda est

magna urinæ copia, quæ in diabete vulgari effunditur. Quantitas urinæ infans est circiter dimidia pars assumptorum tum esculentorum, tum potulentorum, atque cetera altera pars perspirando avolat. Si itaque in statu sano quadraginta urinæ uncie emittantur, ut in me expertus sum: si sitis potum tereti parte ubiorem imperavit, & simul tercia pars perspirationis solite suppressa in urinam versa fuerit, inde sexaginta sex uncie urinæ quotidie emittentur, quæ cum cruda sit, & repetitis mictionibus amandetur, diabeten efficiet.

7. *Diabetes febrilis* Sydenhami ep. respons. §. pag. 192.

In terrena & quotidiana nonnunquam accidit, et perquam raro, ut senes qui diu hac febre ante laborant, ac interea phlebotomis & catharticis imperite fuerint mulctati, in diabete incidant, etiam febre jam perfecte fugata; etenim cum sanguis eorum adhuc debilitatus assimilandis succis illi illatis profluat impar reddatur, iidem per vias urinarias crudi adhuc & incoditi exitum sibi querunt, proinde quæ præ ingenti urinæ copia, quoties eam reddunt, excreta, sensim labefactantur, & quasi substantia corporis per hanc cloacam exinanitur; curativæ indicationes ad sanguinem invigorandam, & fluxum urinæ minuendum omnino dirigendæ sunt.

4. *Theriacæ unciæ & semissim, conservæ flavæ dñis aurantiorum unciæ; dialcordis unciæ semissim; ængliberis canditi, & nucis moschata condita ana drachmas tres; pulveris & chelis cancerorum, coartels granatorum, radicis angelicæ, coralliorum, terræ lemnis, boli armensis, gummi arabici, ana drachmam unam, cum syrupo de rosi, succis fiat elixarium; sumas drachmam ter in die per mensem; utatur vino hispanico, cibis cepeis, abstineat a crudis, oleibus, &c.*

XXVI. ENURESIS; *Petirrhæa* Hippocratis; *Paresis* Aetæri; *Stranguria* Galeni; *Strictidium* urinæ, *Incontinentia* urinæ Sennerii, &c. *Incontinentia d'urine; flux d'urine.*

Est mictio involuntaria & inopportuna, quæ nullus vesicæ stimulus sollicitat, quæque sæpius inscitis accidit.

Dicitur a diabete quod non major sit urinæ copia, nec diversus a sano color; a dysuria quod sine ardore & stimulo fiat.

1. *Enuresis infantum* Junckeri Tabul. 98.

Est mictio quæ tum interdiu ob negligentiam, tum noctu inter dormiendum accidit junioribus; plurimi ideo lectum urinâ conspurcant, quia somniant se in loco comodo mingere; alii ita negligentes sunt, etiam octennes & decennes, ut in seipsis tum vigilando, tum dormiendo mingant.

Prævus hic mos .i. virginis & minis est coercendus apud eos qui quartum annum ætatis attingere. 2. Curandum est ut horis pomeridianis parum bibant. 3. urge antequam lectum petant, vesicam evacuent. Si vero atonia sphincteris vesicæ adfuerit, ad tonica deveniendum est, ut in specie sequenti.

2. *Enuresis paralytica* Junckeri Tab. 98. L.

Incontinentia urinæ a paralyti sphincteris vesicæ procedens accidit apoplecticis, hemiplegicis, & sæpius paraplecticis, ubi nervi sacri, lumborumve fuerint compressi, contusi, lesi, aut in cerebro ipso affecti; in illa specie adeit continuum urinæ illucida sine sensu, unde differt ab aliis speciebus in quibus per intervalla tantum urinâ emittitur.

Incommodus est hic morbus ægro & adstantibus; quo sæpius urinæ quæ imbuntur vesicæ, maxime apud feminas quæ non ita valent inurnatorio portatili urinam excipere, ut v. r.

Curatur hic morbus eodem modo, ac paraplegia; sed vix unquam sanatur, nisi levis sit affectus, aut quædam atonia, quam superant infusæ aromatica, spirituosæ fomenta, theriacæ Bolusianæ, anemochia.

3. *Enuresis hermafroditum* L.

Est ea quæ exocysten, hysteropsim, cystocolem, simileque ecopias comitant, quibus ita distrabitur sphincter vesicæ, in viris podici, in foemina vaginæ adherens, ut distracto vel intestino, vel vagina, sphincter contrahi nequeat pro libitu. Sanatur ablato principio.

4. *Enuresis gravidarum* Mauriceau, lib. 1. cap. 14. de l'incontinence d'urine. L.

Non est ea frequens mictio, seu dysuricæ species; quæ ob vesicæ ab utero factam compressionem gravidis accidit; cum enim parum urinæ continere possit vesica, necessum est ut frequentius vesica distendatur, & ad mictionem sollicitetur; verum ea est quæ ipsæ accidit non solum gravidis velut ultimos menses, sed etiam mulieribus plures partus experitis; illæ enim ad minimam corporis inflexionem, ad minimum risum, aut tussidum coactum, illico urinam sine stimulo, quandoque sine sensu emittunt. Hoc etiam recens puerperis familiare est, observante Roderico a Castro lib. 4. cap. 2. de factu matris, & hoc urinæ profluvium alvi acrisia sæpe stirpatur: ducto, ait ille, insente, urinâ aut alvi faeces, quod frequenter accidit, involuntarie fluunt, quod curatur ut paralytis earundem partium: laudatur infusus in decocto aromatico chamæmeli, rosis marini, salivæ & litus ex oleo ejusdem virtutis.

Quoad enuresim quæ sub finem graviditatis oritur a mole uteri vesicam prementis, ea sublevarur mappa quæ ita collocata sit, ut abdomen proindeque uterum sustineat.

5. *Enuresis puerperum. Perforatione de La vesisse.*

Incontinentia d'urine après les couches, Puzos pag. 137. L.

Cum fortis diutius in transitu per os uteri retinetur, collum vesicæ, inde fortis capite, alioque ossis pubis, compressum inflammatur, conrunditur, & post quinque, vel octo dies urinæ incontinentia accidit, perforata ibi loci vesicæ: hæc enuresis insanabilis est; sublevarur incommodum ope utræ ex corio fibrefacti penduli, & spongiz appositæ; pessaria vix ullius utilitatis sunt, nisi ad præcavendam obstruktionem va-

finz, quæ a succrescentibus ex hac fistula carnis, fibrisque ramosis oritur; ibi calculi successu temporis generantur. Vide *Hyperalgiæ calculosæ*. De hac specie fuse egit *Hirschfeldius* in dissertatione *Argentorat* edita anno 1759. de incontinentia urina post partum difficilis; hanc etiam observavit *Clariss. Med. Doct. Privat. Alsenius* in primipara, quæ dyssociam per quinque dies experta, deinceps per quadraginta dies dysuria laboraverat, quæ sanata supervenit enureti constans; urina scilicet aqua stante, vel erecta fluebat, sedente vero retinebatur, immisso per urethram ferro, & simul in vaginam digito, inventum est foramen minimi digiti diametro non procul ab uteri orificio, urethram cum vagina coniungens.

6. *Enuretis catamenialis*, seu mense quovis revertens. L.

Virgo sanguinea, pinguis, 18. annos nata, enureti ab orta ad puerbertatem usque constituta, omni semihora noctu & interdiu mingebat; cum menstrua accessissent per triennium, ab enureti fuit immunis; suppressis ab hoc tempore catamenii ob pediluvium frigidum, singulis mensibus patitur per triduum horis nocturnis enuresim cum pervigilio; sed octo diebus ante & post illam catamenialem urinae incontinentiam, cephalalgia, hypochondriorum tumore, pedum oedemate, vel etiam hamopyli afficitur; alii si deficiat, ut quandoque accidit, urinae fluxus ille frequens, tunc symptomata numerata crescunt & permanant usquequo enureti accesserit.

Mater ejus ad vigesimum ætatis annum hoc constituta inito tunc matrimonio convalescit; illa virgo potatis aquis Barregianis, vomica expectoravit; foror ejus enureti laborans phelisi perit.

Cura. Præmissa venæ sectione e brachio, purgetur cum manna in infuso sennæ; dein iuscula ex collo vervecis, cichorii, rubiæ drachmis duas, proniæ drachma una per novem dies bibat; dein serum lactis in quo clavi ferrei extincti, millepedes decem, flores cheiri ad pugill. i.; ante haurium fumat boracis grana sex in cochleari aquæ naphiæ.

Post viginti dies purgata fumat lac aluminum, & alternis diebus ante ejus haurium fumat bolum ex croci martis, terræ catechu, & coralli rubri ana granis octo in pauxillio syrupi; continuet usque ad finem Junii mensis; his irritis, nubat.

Thesia. Videtur hic morbus pendere ab irritabilitate vesicæ, ob sanguinis mensuræ retenti influxum uberiorem in ipsam; hinc frequens mingendi necessitas; ex eadem sanguinis congestione in pulmone sanguinis spurum, in visceribus abdominis meteorismus, in pedibus oedema; sanguis autem spissitudine obstat catamenii, acrimonia etiam irritat vesicam & pulmones. Historiam morbi retulit D. Richard D. Med. Monf. a Villeneuve de Marfan.

Motiones involuntariæ agonisantium, necnon ex quæ in paraphrosyne febtili accidunt, sunt symptomata fugacia, non morbi; non secus ac quæ epilepsiæ & eclampiæ paroxysmos quandoque comitantur.

7. *Enuretis calculosa* Collect. Acad. Tom. 31 p. 570. i. Cyrilli Conf. 23. Cent. IV. L.

Puer Metensis per totam vitam incontinentia urinae laboraverat sæpe cum dolore, continua cum siti; excrevit calculum; alterum in collo vesicæ gerebat; in cadavere repertæ duæ vesicæ loco renium, ureteres amplissimi conici; vesicæ cæcitas fibris transversis ejus collum diducantibus distincta.

Huc fere pertinet enuresis quæ lithotomiam sequi consuevit; nam secto, vel maxime debilitato sphinctere vesicæ collum arctante, non mirum si urina deinceps sponte effluat, maxime vero cum ut fieri solet, vesicæ calculo irritata, occalluit, & veluti capsula coriacea contractionis etiam in collo incapax evasit; hæc autem species tolerari debet, minime vero sanatur.

8. *Enuretis a fistula* Junckeri Tab. 98. L.

Fistulæ quæ vesicam, ejusve sphincterem attingunt, oriuntur 1. vel a mariscis suppuratis; 2. vel a gonorrhæis virulentis; 3. vel a calculis vesicæ; 4. vel ab icthibus & operationibus Chirurgicis in dysstocia, fistula ani, calculove adhibitis.

Hæc autem species eodem modo curatur quo hæc fistulæ.

9. *Enuretis a sparganasi*, Hæron Journ. de Med. Aout 1761. p. 145. L.

Ea tñ quæ a lacte suppresso puerperis accidit. Sanatur catharticis, successively magis hydragogis, ex manna, sale polychresto, syrupo de rhazmo, &c.

XXVII. DYSURIA; *Stranguria* Pauli Æginetæ, non Galeni; *Arder urinae* Sennerti; *Substium* vel *stillecidium urinae*, *Dysurie*, *Ardeur d'urine*.

Character. Difficilis vel dolorifica, & sæpius ardoris sensu molesta mictio; *Gorrai desinit. Galen. in aphor. 37. lib. 7.* Mictio est non puris aut feminis, sed urinae ejectione, unde discrepat dysuria ab ardenti mictu gonorrhæam stipante; si non pleno ductu, sed guttatim fluat urina cum dolore, *Stranguria* dicitur a Græco *Stranger*, gutta.

1. *Dysuria hysterica* Sydenham. de hysterica passione pag. 132. B.

Dysuria hysterica ita calculum mentitur quandoque, ut Lithotomizæ iis symptomatis delusi operationem necessariam judicent, ut observavi in Marchionissa St. Victor, quæ per mensem hoc morbo laboravit; symptomata subito accesserant post vertiginem hystericam; ea vertigine redeunte, subito evanuerunt, & Lithotomizæ stupentem dimiserunt. A spasmo hysterico sphincteris vesicæ pendet hic morbus. Observata hujus varietas in muliere hysterica hoc habuit singulare, quod ægra hysterica statim a passu mingere coacta foret, ut in lienteria statim a passu alvum deponere cogitur; urina autem illa erat cruda, aquosa; ægra emaciabatur, cum pyrexia nocturna, nec solito fre-

frequentius mingebat, nec siciebat; observante D. Goulard.

2. *Dysuria herpetica: Ab herpate vesicae.*

Cognoscitur a. ex herpeticus cutaneis repressis, aut vaginam etiam infestantibus; a. ex muco urinae fursuraceo. Hæc species est pertinacissima, valde dolorifica. Curatur aquis acidulis, balneis, lacte, præmissis præmittendis.

3. *Dysuria nephralgia: Dysuria deceptiva a renibus* Stahliani ars curandi morbos per expectationem; *Dysuria ab ulcere renum* Sydenham. p. 680. Vide Pyuria renalis.

Ea est quæ a nephralgia calculosa, aut ab urinae acrimonia renem simulante dependet, in qua ob dolores renum, ureteres, & ipsemet spincter vesicæ dolent & irritabiles sunt.

Curatur, ut nephralgia phlebotomiis, balneis mucilaginosus intus sumptis, nec non narcoticis.

4. *Dysuria venerea* Riverii obs. 25. p. 138. *Dysuria syphilitica* Nicol. Heinii; *A caruncula* P. Borelli. obs. 79. *Ab urethra per clearices gonorrhæa angustata* Savard. obs. *A phlogesi urethra sine ulcere* Nicol. Andre de morbis urethrae 1756. B.

Hæc species est omnium apud adultos & senes longe frequentissima. Stipatur sæpe mictu, bifurcato; præcellere semper gonorrhææ virulentæ male curatæ, accedunt scirrhi, ulcera, fungi, calculi muco involuto, fistulæ, calli in urethra.

Curatur litu mercuriali & candelulis cereis D. Goulard, Daran &c.

Gonorrhæa sicca Astrucii & *Dysuria venerea sicca* ejusdem, est vel phlegmone in prostaticis ac vesiculis seminaris, ubi tumor, calor, dolor, stranguria, ardor vividus inter mingendum, qui morbus si intra aliquot dies non resolvatur abscessum perineum excitat. Vel est erysipelas in toto urethrae tractu cum gravi dysuria, dolore urenti totius urethrae, sine ullo puris aut seminis effluxu, & utraque varietas a concubitu impuro, ac a viru acri & volatili dependet. Ultima varietas atrocior est, & si non resolvatur tumor, facile in sphacelum terminatur.

Quandoque vero a gonorrhæa virulenta adstringentibus suppressa oritur. Prior vero non raro hanc gonorrhæam præcedit & fluentem semine purulento sedatur, utraque varietas exigit initio repetitas phlebotomias, immersionem penis in lacte tepido, fomenta emollientia ex decocto radicum althææ, seminum lini, injectiones in urethram similes, noctu narcotica, potum emulsionatum, nitratum.

2. *Dysuria a caruncula. Virga Caruncula* Riverii obs. 22. comm. *Carnositas de l'uretre* L.

Vulgo apud senes qui olim gonorrhæas passi sunt supervenit dysuria pertinax, & quæ quandoque plures annos perseverat, in qua fluentum urinae inter mingendum est bifidum (*l'urine fourchue*) cum aliquali ichuria; atque insulari solent excrecentiæ carnosæ in urethra quæ deprensi gratia stylos plumbeos a Rivieræ ad nostra usque tempora in urethram sensim

insinuari solemne est. Vide D. Lapi diff. de stranguria.

Alit Savardus & Cl. Chirurgus Monspellensis J. Serres dilecto pene aliquot ægrorum, qui de eo morbo conquesti erant, pil simile invenerunt, & tantummodo urethram phlogos alicubi tentam; non dudum candelæ cereæ in locum plumbeorum sufficere sunt a D. Daran, Goulard, Andre &c., sæculo elapso a Gerónimo Lapi Italico primum usurpatæ, quarum usu gonorrhæa mucosa excitatur, via urinæ liberior paratur, lapilli siqui sint educuntur, ulceracæ detergantur.

5. *Dysuria primaria. L.*

Ea est quæ a victu acriore, falso, abusu liquorum fermentatorum, diureticorum, ab ætatis fervore, ab exercitiis immodicis, similibusque causis urinæ acridinem inducentibus oritur; urina in illa specie falsa est solito magis, fervidiorque simul. Hanc excitant sæpe vina alba, cerevisia, usus cantharidum. Curatur phlebotomiis, clysmatis emollientibus, pitana ex floribus malvæ, violæ, radicibus althææ, seminibus lini, gummi tragacantha, fomentis, semicupis refrigerantibus.

6. *Dysuria hamorrhoidalis* Frider. Hoffmanni L. P.

Ea est quæ a mariscis tumidis, potissimumque luxatis fovetur. Luxantur mariscæ seu tumores hamorrhoidales quoties *diaphragma hypogastricum* descriptum ab illustr. Leac in libro de lithotomia, quod ano & recto. sustulendū dicatur, suo officio non fungitur & hiat; tunc mariscæ foras protuberant ex ano, & nervi ad urethram pertingentes dolorifice distrahuntur, atque urina cum ardore incredibili excernitur, ita ut calculus in vesica latere, & hos atroces per multos annos dolores procreare videatur; æger quidem a fluxu hamorrhoidali sublevatur, sed non sanatur: quoties alvum deponere tentat, toties mariscis excidentibus dysuria recrudescit. In nobili ægroto sic laborante frustra applicata sunt suspensoria podicis, æger fere semper manibus suis hanc molestem hamorrhoidalem sustinere cogitur, ac post alvi depositionem resiliuere, inunctis prius cerato Galeni mariscis.

7. *Dysuria arsuræ; Arsuræ* Joan. Andern; *Incendium virgæ; Burning & Brening* Anglorum. Vide Astrucium de morbis venericis, lib. 1. cap. 7. n. 5.

Est dysuria ardens, quæ olim maxime apud Anglos circa sæculum decimum quartum eos affligebat, qui cum leprosa, aut cum muliere quæ leprosum virum prius adulterat, concumbabant, sine ullo seminis aut puris effluxu inde subsequente.

Morbus erat a syphilitica dysuria diversus, atque curabatur injecto vel lacte vel oleo amygdalarum in urethram.

8. *Dysuria a cystecele* Saltzmänni diff. de Hernia veticæ urinariæ. L.

Cognoscitur hæc species ex tumore molli in

videa viscerum, ut in scroto, perineo, &c. qui pressus cogit urinam eamque per urethram exprimit; vide *Mem. de l'Acad. R. des Sc. Ann. 1713. p. 146. a D. Mer.*

9. *Dysuria ab hysteritiae*, vide Hysteritidem. A. Si phlogosis tantum sit in collo uteri, aut; ut aiebant Veteres, ejus adit intemperies calida & sicca, nulla quidem adest notabilis pyrexia, adeoque nulla vera hysteritis, interea explorato ore uteri, digito immisso, calor, sensibilitas, siccitas, percipiuntur.

10. *Dysuria ab hysterolaxia*, Ruysch Obs. Chir. 88. Morgagni Ep. XLVIII. 39. L.

Hæc species fitatur continuo mingendi & alvum deponendi desiderio, sed constans non est.

11. *Dysuria rachialgia*. *Stranguria colicum popularum concomitans*. Cicerus de signis diagnosticis colici popularis p. 6.

In populari colico, ait ille, urina biliosa, & acris, eaque sæpius cum stranguria emittitur, ut plerisque imponat existimantibus se non colico dolore, sed calculo cruciari. His adde Rachialgiæ cætera signa, pallorem, extremorum frigus, virium languorem, animum inquietum, corpus anxium, vigilias assiduas, leptoehymias, anorexiam, nauseam, ructum, vomitionem biliosam, quæ deficiente singultus, sitis accedit, sæpiusque febris lenta, & quod totius caput est, acutissimus ventriculi intestinorum lumborum, ilium, & inguinem dolor excruciat. *Citofus cap. 6.*

In colica vulgari accedit non raro dysuria cum penis rigiditate & condensatione, nulla vero erectione, quod cessante doloris vehementia evanescit; aut in rachialgia dysuria ita vehemens & pertinax observatur, ut calculosa videatur.

Cura vero hujus speciei eadem est ac rachialgiæ, adeoque a cura cæterarum diversissima, cum juxta ipsum *Citofum* cathartica, drastica, & emetica oleosis interpolata conveniant; sed de rationi apud nos morbo nil pronunciaré auserim.

12. *Dysuria calcenlosa*. *Calculus vesicae*. Sennerii, Cyrilli. Consult. Tom. I. p. 46. 112. 128. 146. L.

Cognoscitur 1. Dysuria frequenti periodica, vel continua, seu frequenti & dolorifica mingendi cupiditate: 2. Dolo acutissimo extremi glandis, in viris a mictione rerudescence: 3. Frequenti penis eaque injuncta testigine, seu duritie, in qua nec erigitur penis, nec crassior evadit: 4. Pondere assiduo in perineo: 5. Subitanea quæ quandoque accidit inter mingendum urinæ suppressione: 6. Facilitate mingendi, si crura decussentur, aut corpus resupinetur: 7. Tactus, digito in anum immisso, si de pueris agatur, aut intervenit catheteris in vesicam immissi, quod ultimum signum, alias certissimum, deficit cum calculus inter laminæ internæ cellulæ aut vesicæ biventris & coarctatæ sinus delitescit. 8. Exasperatio dolorum ab exercitio, potissimum vectura in curru super stratum lapideum.

Alii sunt calculi murarii durissimi, rufi, qui omne dissolvens elidunt, alii gypsei, alii gypso murarii, seu ex lapillis invicem gypso coagmentis efformati, qui tandem dissolventibus vel in toto frustillatim divisi cedunt.

Duplex est methodus curativa, una chirurgica, quæ in extrahitione calculi consistit, eaque instituitur hodie per apparatus lateralem; altera lithonotriptica, quæ in usu lithonotripticorum medicamentum consistit.

Optima methodus lithonotriptica ea est quam D. Rob. VVirr expertus est, scilicet s. ostreorum vel aliorum testaceorum conchæ vehementi igne per bideum utentem usquequo totæ albescent & nil coloris subterulei retineant; octupla aquæ fontanæ copia superaffunditur, & fit vehemens ebullitio; aqua illa per duodecim horas cum ostreis calcinatis insula colatur & servatur ad usum, & est aqua calcis ostreorum. 2. Hujus aquæ cyatham unum aut alterum quovis die horis Medicis ebbat æger, ita ut sensum hujus dosim augeat ad pintam singulis diebus potendam, & ultra: Simulque saponis albi in pilulis redacti, vel in aqua dissoluti drachmas duas, dein tres, demum quinque, vel sex, singulis diebus deglutiat, maxime si alvus ab aqua calcis constipetur; & persistit in illorum usu quam diutissime, ut per sex menses, imo per annos. Hujus aquæ & saponis ope calculus obducitur mucro quodam albedo leni, quo fit ut vesica ab ejus irritatione immunit evadat; dolor sedatur, mictus truentus compescitur, & successu temporis calculus detegitur & dissolvitur, vel in frustula divisus foras excernitur.

Alterca est methodus Mospellii aliquoties usitata, sed minus tuta: scilicet 1. coiguuntur folia arbuti una uris vjcti, quæ arbutuscula in monte Epsari, necnon in Pyrenæis adolescit, & Buxerola vocatur: Illorum foliorum vel pulvis ad grana quindécim, vel insuflum drachmæ unius pro duobus, vel tribus aquæ cyathi quotidie deglutitur per mensem, & aquæ cum ab ejus usu vesicæ mucus abraditur, & dysuria potest recrudescere, jusculum ex herbis emollientibus, refrigerantibus, pullo, ranis paratum usurpatur, maxime si pulvis buxerolæ adhibeatur, aut insuflum debilius sumitur: hujus medicaminis ope calculi teneriores dissolvuntur, aut in frustula minora dividuntur.

Quoad lithotomiam, ea raro felicem sortitur eventum, maxime si æger jam provectæ ætatis sit, quia apud eos vesica est callosa, valde circa calculum coarctata, quandoque ulcerosa; ea non impedit quomodocumque novi calculi generentur, & vidit puerum qui hanc operationem ter passus intra aliquot annos, iterum calculo laborat; prætere peritissimum Chirurgum requirit operatio, ex qua, si male succederit, intra breve tempus inflammata vesica æger & medio tollitur; secus non raro insanabilis periaxi fistula supervenit; undique periculum, undique angustia.

13. *Dysuria gravidarum* Nordmanni Dissert. de

de ischuria gravidarum, Argentinx an. 1758. Mer-ty Hist. de l'Academie des Sciences an. 1613. B.

Illa accedit vel toto graviditatis decursu, ut vidit *Mery*, vel ultimo tantum mense; 1. ob uteri molem expansam qua vesica premitur, & distrecta dolet, in quo casu fetus supinus, decubitus in lecto solatium præbent; vel 2. ab hysteroprosi, incompleto scilicet uteri prolapsu, in quo casu potissimum est ischuria, & juvat decubitus supinus, sustentatio molis abdominis ope mappæ, repolizio uteri & usus pessarii; 3. vel a cythocele, seu hernia vesicæ urinariæ, de cujus curatione vide *Autores*.

In his omnibus casibus plus valet ars obstetrica quam pharmacia. Quoad ischuriam que sub finem graviditatis accidit. vide *Ischuriam* Clas. X.

De dysuria a cythocele fute egit *Salzmannus* in dissertatione de *Hernia vesica urinaria*. Dysuria ab hysteroprosi etiam non gravidis accidit. Vide *Hysteroprosim* in Cl. I.

14. *Dysuria Neonympharum* Delii Amoenit. Acad. p. 188. B.

Est ea que recens nuptas forti viro junctas addoritur cum vulvæ, nympharumque phlogosi; a contusione, a coitu repetito & asiduo ortum ducit, & intra aliquot dies cessat, modo a coitu absterneant, & fomentis emollientibus utantur nymphæ; sic olim vocabantur recens nuptæ.

Post coitum etiam viros afficit dysuria, sed fugax, de qua *Epheme. Nat. Curios. Decad. 2.*

15. *Dysuria ab insectis*, *Ephemer. Nat. Curios. passim*; *A teredinibus*, Delii Amoenit. p. 54. t. 3.; *A lumbricis*, Philosophica l. Transact. p. 202. D. Teredines Ill. Delii erant veri ascarides vermiculis casei similes; cum urina copiosa excreti, qui prius fovere videbantur stillicidium urinæ dolorificum. Vidi ipse similem ascaridem cum urinæ emissum a viro, qui dysuriam, & dein ischuriam patiebatur, antequam hic vermiculus ejiceretur.

Sualit Ill. Delius diversa anthelmintica, & erinaeum usum cum essentia ascarillæ, sed omnia inefficula.

16. *Dysuria atretarum*. L.

Vidi & curavi duas puellas, quæ ab aliquot annis quovis mense post pubertatem atroces in pudendis dolores cum missione ardentis patiebantur; altera vero cum urina pauxillum sanguinis mingebat; utraque erat imperforata, & catameniorum expertis, licet altera vigesimum nonum annum attingisset; illa autem cum dysuria tumorem quemdam e vagina tunc temporis prominens gerebat; ope scalpelli hymenis sectio verticalis facta est, & præterit magna quantitas cruoris viscosi, nigri, picei, inodori, quo facto convalescere ambo, & harum junior viro junctæ dein feliciter peperit.

17. *Dysuria diabetica*.

Ea est species in qua post quemlibet passum, illico non aucta urinæ copia, nec frequentia, sed necessitate incoercibili, & cum levi irritatione vesicæ, mingitur urina aquosa, cruda,

quod per plures menses in hysteria sine firi, aut cum maciæ, & cum fibrilata nocturna perseverasse vidit *Clariss. Docteur Coulas*. Hic affectus est ad vesicam quod lienteria ad alvum; videtur potum illico transfluere, ut per diabetem hydraulicum a quo citissime transluant.

Indicanrur in hac specie lactinia emollientia, antihysterica.

XXVIII. PYURIA; *Cacrematis species D.*
Cussion. Pissement de pus.

Est purulentæ, albæ, flavæ, vel viscido-mucosæ, lutulentæ materiz cum urinæ ejectio.

Differt a gonorrhœa quod materies hæc puriformis mingitur, non vero simpliciter ex urethra exillit, ut exillat guttatim in gonorrhœa.

In pyuria materies puriformis, vel mucosa pellucida non ex urethra oritur, fecus continuo stillaret; sed vel ex vesica, vel ex ureteribus, aut renibus effluit.

1. *Pyuria renalis*; *Ulcus renum* Sennert. cap. 11. lib. 3. pag. 7.; *Ulcus ureterum* Sennert. cap. 12. Pissement de pus. Journ. de Med. Avril 1761. p. 353. C.

Cognoscitur 1. urinæ colore griseo, favescente, consilientia crassa, odore fetido ad putridum cadaverosum vergente. 2. Præcessere signa neplritidis suppuratæ, dolor scilicet renis alterutrius cum pyrexia acuta, quæ deinceps in amphimeriam hecticam abiit; vel præcessit nephralgia calculosa; interdum vero dolor renis, dum suppuratur, exiguus est.

Differt a pyuria vesicali ex eo quod dysuria nulla sit in renali; quod etiam in renali substantia ipsius renis carne, atro-rubra, veluti dissoluta cum urina quandoque rursuat, & cum filamentis viscosis; (*Aphor. Hipp. 76. lib. 4.*) illa vero pyuria peior est, si ulcus renum pendeat a calculis reni impatis, aut ab acrimonia sanguinis, quam si a causis mechanicis, ut vulnere, contusione orta fuerit, nephritis sine sanguinis dyscrasia.

2. *Pyuria vesicalis* Bonetti Sepulchret. obs. 20. t. 2. p. 695. *Ulcère à la vessie*. C.

Vel est exulceratio in collo vesicæ, vel in corpore ipso. Si in collo vesicæ præcessit gravis dysuria, stranguria, dolor atrox circa perineum, ibi etiam tumor, calor; pus inde prodens copiosum cum mucro viscido, tenaci. Si in reliqua vesica, dolor ad hypogastrium, præcessit cystitis, cum urina fluunt materies crassæ, fursurææ, foliaceæ, unde *Hippocrates* scabiem vesicæ adesse contendebat; cruentæ & purulentæ ac foetidæ sunt urinæ, ex quo factore intolerabili potissimum dignoscitur pyuria vera a gonorrhœis nec non ex eo quod in gonorrhœis pus non mingitur, sed exillat; aut in pyuria urina turbida, grisea, foetida mingitur.

Pus a mucro dignoscitur, quod pus sit friabile, mucus vero in longa filamenta ducatur; pus griseum est & foetidum, mucus pellucidus.

Post gonorrhœam virulentam in fundo marulæ datur paucus mucus viscidus, qui pyuriam non con-

tonfuit veram, seu purulentam, & sponte evanescit.

In curanda pyuria aquæ Euzetenses, Alesienſes longo uſu, ſerum lactis, diæta lactea mortem procrantant.

Si adit ſarcoma fungoſum in veſica adnatum; dolores ſunt diſtiores; injectiones in veſicam fieri non poſſunt ſine catheteris interveniunt, quod ob dyſuriam diſſicultat inſtitui poſſeſt.

3. *Pyuria a cordo Boneti Sepulchret. obſ. 12. & 13.*

Conſtat his obſervationibus poſt longam puris miſtionem cum nephralgia, quæ Medicis inventoſa cenſebatur, nullum vitium in cadavere inventum fuiſſe præter abſceſſus & ulcera cordis, cum multis in eo calculis, *Hollerius Commentar. ad aphor. 75. 54.*

4. *Pyuria a thorace Boneti Sepulchret. lib. 3. f. 28. obſ. 24. 25. ex Diemerbroeckio Anat. lib. 1. cap. 17. & Dulaurentio Anat. lib. q. 12. B. vide duodecim obſervationes apud Schenckium. p. 266. L. I.*

Eſt purulenta miſtio quæ cum aliquali nephralgia empyiciſis accidit, & plures quandoque libras attingit intra paucos dies, eoſque a morbo priorè liberat. Vidi adoleſcentem empyicum in urbe *Clermonte de Lodov.* cum *D. Med. D. Bertomieu*, qui me conſultavit, ille poſt aliquot dies pus copioſum minxit, ſicque convaleſcit.

5. *Pyuria viſcida. Vid. Conſultation D. Deidier, tom. 1. pag. 84. Ecoulement par le canal de l'uretre, et le viderien par le malade. Glaire de reins. L.*

Aggreditur ætate proſectos qui olim gonorrhœam paſſi ſunt; inter pollutiones nocturnas ſtillatio, imo dolor identidem acutior perſentitur ad veſicæ collum; urinx acres ſunt, cum eſt diſpoſitio nephritica, aut arthritica in ſanguine, quod ex nephralgia, ex pruritu cutis, libidinofa conſtitutione judicatus, maxime vero ex dyſuria frequenter; inſimul urinx quandoque turbidæ, rubræ, ſubcruentæ; ſed conſtanter depenunt in matula viſcidum quid griſeo-pellucidum, urinx fundum petens, quod matulæ agglutinatur, quodque effuſum longiſſima ſila præ lentore efformat. Dum urina craſſa ſimilis eſt, dolet collum veſicæ, balanulque, necnon hæret aliquandiu, & alvus ad dejectionem ſtimulatur; mingendi cupiditas, durante alimentorum digeſtione, frequenter eſt.

Hunc morbum ſyphilitico viru ſoveri putarunt optimi Medici, & rite inſtituta hydrargyri ſine pyraliſmo æger non melius habuit, licet ſubſecuta forent lacticia, balnea, aquæ ſulphuræ Euzeteneſe; morbum exaſperaverant candelæ unguento ſuppuratorio tinctæ in urethram ſæpius immiſſæ. *D. Deidier* dubitavit an ulcus circa proſtatas, aut in collo veſicæ morbum ſoveret; ſed pus prunis inſectum valde ſæter, non viſcoſa materiis; ſi viſcoſum quid & tenuibus, ureteribus, aut ipſa veſica excernatur, ut verouſile viſum eſt, ſuadet priſanam ex foliis parietariæ, ſeminibus lini, glycyrrhiæ; dein parietariæ pulvis ſemidei-
Sauvages Noſologia Methodica. Tom. II.

chmam, vel tantundem corticis radioli calcitræ per triduum, priſana ſuperhaulla. Id autem remedium aliquoties in menſe tentandum, & utiori inſtitendum putat. Si poſt mingi videatur, balſamum copaivæ ad guttas xx vel plures ex cochleari ſyrupi cujuſdam hauriendus, ſuperbibendo lac aſinum per quadriduum, dein lac purum per menſem continuandum addito identidem balſamo. Accedente Julio aut Auguſto acidulæ potandæ ſunt per novem dies, dein balnea domeſtica per octiduum ſemel & bis ſumenda, & aqua pulli exeundo & balneo eſt propinanda. Demum ope candelæ plumbeæ vel cereæ explorandus urethræ & veſicæ ſtatus, ut principium morbi melius cognoscatur.

6. *Pyuria mucoſa Pathol. method. Berni viſica morbus Fridet. Hoffmanni; Catarrhus veſicæ D. Lieutaud Maladie du bas ventre. Glur III. Linnxi Gen. Morb. 199. Glaire de la veſſie.*

In adoleſcente arthritico incept a dolore veſicæ, forte cyſtitide vel ſimplici dyſuria; urinx exinde craſſæ, ſedimentum albidum & viſcoſum, quod ſenſim copioſius, dolore etiam præterito quartam urinx partem componebat; febris poſt duodecimam diem recedens multam mutationem in pyuria induxit, quæ ultra ad quadrageſimum diem proceſſit, cum aſthenia & maraſmoſe macilentia. Phiebotomiz, diluentia, temperantia; ſedantia, laxantia durante febre uſurpabantur, natura ſola pyuriam deinceps ſanavit: large caparum uſu hunc morbum ſublatus vidit *Ill. Zinnaus.*

Diſſert a pyuria veſicali, vel quæ ab ulcere veſicæ dependet, quod in mucoſa mucus a veſicæ cryptis abundanter exſtillans, qualis in catarrho ex naribus exſtillet; non vero pus; unde ſequetur pyuria veſicalis foetido fluxu inſignita nec ſponte ſanabilis.

Mucus ille quandoque ita copioſus eſt, ut dimidium matulam impleat referente *Hoffmanno*, & juxta ipſum provenit a veſica urteribus quali coryza affectis, juxta *Sannertum* a cacochylia viſcida primarum viarum in ſanguinem tranſmiſſa ſuppedatur; ita quandoque aſinis eſt pyurix legitime, ut non niſi a magnâ excretionis copia diſtinguatur juxta ipſos. *Vide Bonetti Sepulchret. de urinis decoloribus, obſ. 22. 18.*

7. *Pyuria lactea Diemerbroeckii Anat. lib. 1. cap. 17. B.*

Eſt lactis vel chyloſæ materiæ eſſluxus per viæ urinarias. *Nied. Florentinus* vidit juvenem, qui quotidie ſine ullo incommodo mingebat lactis quantitatem mediæ urinæ, præter urinam multam. *Capellus* Medicus vidit mulierem quæ dimidium cyathum lactis e veſica excrevit. *Laurantius*, nonnullas vidit puerperas plurimum lactis copiam per uterum & veſicam excreviſſe.

8. *Pyuria chyloſa. Urias blanchætræ & troubles. Vieuffens Exper. anatomiq. 26. obſervat.*

Pueri ſexennes circiter non raro urinas turbidas & albeſcentes fundunt, ſine dolore renum aut veſicæ, & ſucceſſu temporis ſine ullo
O me-

teriori hujus ductus, sed ex abcessu proximo demum superne rupto refuit. *Vide Petium loco citato & Heisteri Chirurgiam.*

In hac fistula lachrymali, quam sola fovet ductus nasalis obturatio, feliciter succedit operatio olim ab *Anello* indicata, nuper perfectius adhibita a *dexterrimo Montpelienſi Chirurgo D. Mejan*, filum scilicet argenteum extremo altero acut perforatum immittitur per alertrum punctum lachrymale usque ad nares; hinc vero foras abductum trajicitur uno, vel altero bombycino filo, quod filii argentei sursum per oculos retrahitur; in ductu nasali instat setacei relinquitur per mensem, unguento deterſivo, si opus sit, illinitur; & sic via patula sit lachrymis, & fistula sanatur.

6. Epiphora ab *elitropio*. L.

Elitropium est palpebræ alterutrius extraversion, *Reversio* est palpebræ intraversion, *Evaillement*. Palpebra inferior evertitur a carne luxuriante, quæ ulceribus membranæ internæ su pervenit, in quo casu lapide infernali absumenda excreſcentia, usquequo palpebræ sui tarsi elatere se resistunt. Vel evertitur propter ambulationem externam, qua cutis corrugatur; ea si vetus, immedicabilis; si recens, curatur emollientibus, ut lacte, butyro, unguento de althea, cerato Galeni, compressisque decentibus. Vel avertitur a laxitate, ut apud fenes, observante *Heistero*, eaque insanabilis. Remedia exsiccantia conveniunt, calor siccus, spirituosus fotu, vapore adhibita; lutum ex aqua thermalibus, palpebra inferior invertitur ab operatione fistulæ lachrymalis scito tendine musculi orbitari, quod immedicabile est; vel a vulnere tarsum secante, unde in acum bifidum intro vel extro vertitur (*evaillement Saint-Yves*;) hoc malum conveniens futura conjungitur & cutis in tacto tarso prævertit, si ulcus recens sit; si vetus, malum est immedicabile.

Extrovertitur etiam palpebra inferior ab exophthalmia aut globi tumore, tum aquoso, tum cancroso; prior vocatur hydrophthalmia, & ambobus oculis afficit, & curatur diureticis & rebarcticis; posteriori canceri indolem & curam sequitur.

7. Epiphora ab *anchilope*. L.

Anchoropus, quasi vitius angularis, est tumor cycticus, vel purulentus, vel lachrymoso mucosus canthi temporalis, cum epiphora.

Anchoropus purulentus est, vel spurius, ab apostemate subcutaneo, vel ab apostemate inter musculum orbiculare & secum nasalem; prior est nullius momenti, posterior epiphora quandoque stipatur & agilopem potest duere.

Anchoropus lachrymoso-mucosus compressione recedit, & tunc lachrymæ vel tantum per puncta lachrymalia, vel per poros Goniæ refuit, vel etiam in nares dimanat; exetatur ab obstructione ductus nasalis, vel a mucus spisso, viscido, vel ab infarctu ipsius saci spongiosi, vel per fluxionem intumescit. In priori casu injectio per syringem Anelli sufficit; secus compressio ope fasciæ & splenii iteratæ per diem

continuum; per noctem ope emplastri, superius sanatur, addito spirituosus vel vinoso liquore, quo splenia maddant; tonusque faciei restituitur. In posteriori specillum argenteum per puncta lachrymalia immisso obstructionis reſerat, addito etiam filo uno, alterove gossypino, premillis præmittendis.

Anchoropus purulentus incipit a tumore calido, rubro, lancinante, vel pulsante, cum febre, ophthalmia, epiphora; pendet a vera inflammatione faciei lachrymalis quæ abicit in suppuratum; unde dignoscitur ab *anchilope* lachrymoso, vel hydrope faciei nasalis. Lachrymalia puncta fundunt verum pus, non vero mucum puriformem, qui a pure vix distinguitur, nisi per antecedentia; naris ejusdem lateris sicca est, nisi per noctem quid effluat; quod sæpe fit. In illa specie, vel viget inflammatio, vel recessit; si viget, inficitur dieta tenuis, refrigerans, phlebotomia celebretur, jufcula refrigerantia surperunt, cathartici antiphlogistici non negligatur. Si resolutio non succedat, applicetur tumori cataplasma ex medulla pomæ cocta cum albumine ovi mixta, vel cum pulpa cassiæ, ut suppuratio procedat, qua facta apostema lanceola aperitur, injectione hordei detergetur, curanda tenui faccus lachrymalis aperitur fervetur, cicatrix inducitur.

8. Epiphora frigida *Sennetti* cap. 46.

Est effluxus involuntarius lachrymarum serosarum, sine pruritu, dolore & calore saltem notabilibus; ea sequitur diuturnas ophthalmias etiam sanatas, studium immodicum, ut accidit possimum circa annum ætatis quinquagesimum, cum visus imminuitur, & objecta non nisi paululum distita, distincte videri possunt; accedente hyeme ingravescit, & difficulter curatur; interea si æger ab studio, vento, fumo, cibis salis, vinoque abſtineat, si simul noctu oculum fovat infuso quatuor caryophyllorum in aqua vitæ uncias duabus, hic effectus immovetur; si vero ob tam levidens incommodum æger velit cathartica & vehicioria nuchæ usum vocare, ut suadent Auctores, ille de horum successu judicabit.

9. Epiphora calida *Sennetti* ibid.

Ea est serosa laticis ex oculis destillatio, quæ stipatur calore mordaci, pruritu, rubore, & dolore oculorum, adeoque diversas ophthalmias species, potissimum ulcerosam fistulosamque, comitatur, quæ vide suo loco. In hæ præter remedia generalia, ut phlebotomia & catharsis, conveniunt balnea, jufcula refrigerantia, serum lactis, nec non colliria leviter adstringentia ex rosæ, plantagine, aciæ, gallis, vino rubro, vitriolo, &c.

Lachrymæ quæ a nullo animi pathemate procedunt, in morbis acutis hæmorrhagiam narum, & si sint cum signis exitialibus, mortem prænuntiant: 1. *Epidem.* 2. *Aphor.* 80. & 4. *Aph.* 52.

10. *Epiphora cruenta*; *Lacryma sanguinea* *Sennetti* ibid. & fusc Schenck. libr. observ. *Larmes de sang.* Vide Menorrhagiam erroneam. P. Borell. Cent. II. Obs. 56. L.

11. *Epiphora sebacea* Haller. Stud. Medic. pag. 782. ex Rudolpho Vchrens; *Leaa* Hippocratis; *Lemia* Celso; *Oculi graffia* Lucilio; *Gramia* Nonnio; *Lippitudo* Auctorum; *La chaffie*.

In palpebrarum marginibus sunt glandulae sebaceae, quae separant paucum in statu sano sebum, quo forte praepeditur lachrymarum effluxus & deviat; aut ubi & copiosissimus est huius sebi quandoque proventus. Illa lippitudo saepius ophthalmiam humidam seu pituitam Horarii committitur, ea visum perturbat, palpebras noctu, scilicet hora octava vespertina usque ad diem sequentem, agglutinat: tunc vero apertis per vim oculis, lachrymae serosae effluunt.

Curatur tutius pulvere vespere adperso, vel aqua rosarum, cujus unciae octo vitrioli viridis vel albi grana viginti excipiunt; vel alius ophthalmici deterfus & subadstringentibus.

12. *Epiphora arthritica* Musgrave de arthritide, cap. 18. & 21. L.

Est ea quae ab humore acris arthritico a pedibus retropulso accidit, & cum arthritico doloribus alternat, ac quandoque cum illachrymatione odontalgiam excitat. Affectus hic quandoque diutinus est; & saepe incommodus.

Exigit phlebotomiam, & vesicatorium nuchae applicandum, nec non collyria mitissima, ut lac oculis instillatum, mucilaginem seminum psylli & cydoniorum, aquam rosarum, etochiscos albi Rhafis, aquam plantaginis, &c.

13. *Epiphora lactea*, Ephem. Germ. Dec. II. Ann. VII. Obs. 98. in infante recens nato.

XXII. CORYZA, Hippocratis, Gorrzi Definit. Med. aliis *Catarrhismus*; *Gravado* Latinis, *Deflillatio*; *catarrhis* ad nates; *Rhume du cerveau*; *Coryza*.

Charact. est humoris pellucidi aut mucosi, viscosi & narium stillicidium. Membrana pituitaria, quae sinus frontales, sphænoideales, maxillares obvestit, est amplissima, duplicem vero humorem suppeditat, tenuem scilicet, & paucum qui in nares posticas, inde in oesophagum cum lachrymis infunditur, & mucum viscidum, qui membranam, ut odoravi sit idonea, continuo lubricat, oblinique. Duplex est itaque fons humoris qui in coryza per nares effluit.

1. *Coryza catarrhalis*, vulgo *gravado*. *Coryza humida* Nenterii. *Enchiffement*. *Rhume du cerveau*. B.

Ulla ab aeris vicissitudinibus, potissimum a frigore suscepto calente corpore, oritur; dolore gravativo frontis, sternutatione, anosmia, voce nasali, dyspnoea; tussis stipatur, dein vero procedente morbo destillatio humoris, qui prius erat limpidus, & narium qualis in summo frigore fit, qui *respie* vocatur, iam abit in mucosum, viscidum, copiosumque effluxum, a quo aeger sublevarur, redit odoratus, respiratio juvatur, &c.

Phlogosis membranae pituitariae, est huius morbi principium.

Curatur dixta tenui, potu theiformi, calido, diluente, inspiratu lactis tepidi, aquae, vaporis; aere tepido, vapore seminum nigeliz in aqua coctum; vide *Schneider. lib. 3. de catarrhis*, pag. 503. Cum nares posticas occupat saevior est quam cum altius affurgit.

2. *Coryza phlegmatobagica* Salmuth. ob. 37. cent. 1. Bonet. Sepulchret. T. 1. p. 410. *Phlegmatorrhagia* Junckeri; Morgagni Ep. XIV. 20. Hippiastris *Morsordure*. Furetiere Diction. B.

Differt a precedenti quod, sine fastidio catarrhi, illico sponte accidit profuvium iuge humoris limpidi, lymphatici, copiosi, non mere aquosi, qualis est qui a frigore acris maxime apud senes exillat; hanc coryzam bis noctu expertus sum, sine alio incommodo: similem per plures menses perseverasse memorat Morgagni; uberrimum aliud narrat Bidloo, quod *stillicidium narium* vocat.

3. *Coryza virulenta*, Onena Bonet. Sepulchret. T. 1. p. 406. Hippiastris *Morve*.

Est purulenta materies effluxus narium cum ozæna. Hic morbus ob fortorem & acrimoniam puris diu in narium conclusi, & sanum inquinantis ab equo ad equum propagatur, seu contagiosus evadit: Vide Hippiastris, ut *Soleysel & Bourgelat*, *Elementa Hippiatrica*.

4. *Coryza variolosa* Huxham.

Illud symptoma stipatur sternutatione, difficultate deglutendi, tussis, epiphora, & saepius rubeam quandoque variolam inenitum comitatur, ac designat.

5. *Coryza purulenta* Boneti Sepulchret. T. 1. Obs. 10. Append. 1. Morgagni Ep. XIV. 22. ex Fernelio, Palsino, Nicolai, &c. vide *Cacodiam ozænam*.

Si sinus frontales ulcere laborant, iniectiones institui possunt deterrive, imo horum sinuum tebratio institui; si vero sinus maxillares alterutro pure turgat, dente canino avulso puri via parari debet, *Mebomus & Courvoisier* ducibus.

6. *Coryza febricosa* Vandermonde Journ. de Med. Mars 1751. p. 197.

Viro catarrho fluxus mucii periodicus vespere quovi revertens, meridie sequenti evanescens, stipatur erat capitis intumescencia, dolore, sinuum infarctu: mucus narium copiosus erat, limpidus, aceti, & pyrexia nulla; diaphoretica frustanea succe, soli kinkinz usus cum cathartecis morbus cessit.

XXIII. PTYALISMUS, *Pruelismus* Hippocratis in Coac. a *pruelon*, sputum; *Anabexis* Galeni; *Anacrempsis* Helychio; *Cartharis* diapharygos; *excreatus* Salivatio; frequens expectatio Latinis. *Bave*, *salivation*; *expulsion*, *eructationem*. Egri *Salivantes* Latinis, *Gallis Bavenx*; Anglis *Drivellers*.

Charact. Est salivæ vel mucii sine expectoratione ac vomitione ex ore effluxus, tum emissio.

In os confluit. 1. saliva ex ductu potissimum Stenoniano a parotidibus delata, nec non ea quam omnes glandulae sublinguales, buccales, &c. suppeditant: 2. præterea liquor tum limpidus,

pidis, tum mucosus, qui ex naibus in fauces delabitur, tum per nares posticas, tum per duam sphæno-palatinalem: 4. Mucus viscidus, qui ex tonsillis & glandulis faucium sebaceis exprimitur: Mitto quæ vomendo vel expectorando conflunt.

Quidquid exit ex ore, illud vel vomitu vel ructu eicitur, vel expectoratur cum tussi, vel excrucatur cum sono rauco, quem Arabes *Rascatorem* vocant; vel expulsiuit ex lingua & labris, vel sine impetu elabitur, quod Galli *bave* nominant.

1. *Ptyalismus nauseosus*. *Ptyalismus a. saburra nidiosa*. B.

Illā est species quæ a saburra ortum ducit, quatenus irritatur inde pharynx, & liquor ac mucus ex faucibus cypreis ubertim profluit, cum nausea, angore ventriculi; tanta quandoque copia expulsiuit & effusit hic liquor, ut ex stomacho suppeditari quis crederet; talem ptyalismum excitat etiam emeticum assumptum, etiam antequam vomitio accedat. Talem excitat etiam acitum, si vel masticatum fuerit, hinc enim oris sapor putris per duos vel tres dies cum salivatione, ut observavi, & cardialgia cum lancinante dolore in medio linguae.

2. *Ptyalismus a pyroxi*. Vide Sodam Junckeri. I.

Differt ille a priori, quia sensus ulionis & acidi erodentis extenditur a ventriculo ad os, atque quasi acidum saporem præ se fert saliva; in hoc affectu ubertim effluens; hanc excitant frigus acidum vel empyreumaticam saburram generantes, cassanea, nucleae, pisces conditi, frigida omnia ex sartagine cum oleo vel butyro cocta, nec tamen nausea excitatur vel plurimum.

3. *Ptyalismus Lapponicus* D. Linnæi, *Ulm* vel *Horne* Laponibus. C.

Est symptoma colicæ Laponicæ. Vide *Floram Laponicam*, pag. 69. Differt a prioribus per doctores atroces abdominis juxta umbilicum qui hoc ptyalismo terminantur.

4. *Ptyalismus a laxitate* Cheynei de sanit. pag. 366. cap. 4. *Ptyalismus symptomaticus* Zvingeri. de saliva Dissert. *Agri Drivelleri* Anglis vocantur. L.

Illi sunt, qui stupidi, febribus laxis & pendulis; oculisque demissis, nequidem salivam ore continere possunt; ita ut continuo ex ore effluat & simile vitium in paralyticis observatur; idem accidit laxata mandibula.

5. *Ptyalismus mercurialis* Nicol. Heiensii; Christi. Roperi Diss. de Salivatione cap. 2. *ab oris ulcusculis* Stenon. *Ptyalismus arisphalalis* Zvingeri. de saliva, Dissert. & *Salivatio ab hydrargyri* D. Astruc. de lue venerea B.

Vulgo post quinque vel sex litus mercuriales, vel assumptis intus præparatis mercurialibus, præsertim non satis diluto sanguine & laxitis valis, supervenit calor in ore, sapor æuginis, glandulæ sublinguales, & quæ utrinque linguam cingunt, tumunt, ut apheas patiuntur, dein ulcuscula quæ multum salivæ, foetidae, fun-

dunt; crescente actione hydrargyri tumet lingua, exierit foras, fauces angina aut cynanche corripuntur, cum febre, pervigilio, assidua expuendi necessitate.

In cura morborum syphiliticorum vitari debet ptyalismus, secus syphilis per aliquot tantum menses supprenitur, aut etiam minime minuitur. Vitatur vero, longo usu balneorum præmillo, dicta lactea in hydrargyri utriusque, remotis ad duas tresve dies inunctionibus, illarum dosi, quæ vulgo semiunciam attingit, imminuta, si vero invitis his cautelis accedat, quod vulgo post quartam, sextamve inunctionem accidit, suppressa omnimodo inunctione, expectandum donec desierit; os sepe decocto hordei abludendum; si vero ex abrupto auctus ægrum in periculum cynanches coniecerit, lingua tumerit, & in ore vix possit contineri, phlebotomia, linteorum depositio, cathartica, imo balnei tunc huic occurrendum. De ulcusculorum oris detractione, ceterisque ad hoc spectantibus videatur *Ill. Astrucius*.

Ex cinguli mercurialis advorsus pediculos gossatione, ex hydrargyri etiam contractione solemnī aurifabris, speculorum confectoribus, ex una drachma unguenti Neapolitani citra cautelam illita, ptyalismus quandoque supervenit.

6. *Ptyalismus variolosus* Sydenhami pag. 83. 103. 93. 593. *Salivation de la petite verole confluente*.

Apud adulescentes variola confluente laborantes, salivatio sub primum eruptionis tempus, aut biduo post, perpetuus comes accedit, sæpius multo quam infantibus diarrhœa; materia prima tenuis exierit, ægro multa lintea ipsam nocte conspurcante. Hic ptyalismus mercurialis non minor est, sed non sœpius; die vero undecima saliva viscidior ægerime excrucatur; situlosus est æger, tussie subinde inter bibendum, & potus per nares revertitur; aque hodie cessat ut plurimum salivatio, licet aliquando biduo post revertatur; dicto autem die undecimo, scilicet tumor faciei una cum salivatione imminui incipit, ac tunc primum ejus loco manus intumescere solent ac debent.

Non solum autem in variolis, sed & in febre variolosa Sydenhami, seu synocha variolode, in qua nulla est eruptio, par ptyalismus accidit, & ad salutem necessarius est.

Indicationes sunt 1. ut ptyalismus ille sustinetur, quod maxime præstat, potus tenuis, qui diluat, nec refrigeret nimis, aut calefaciat qualis est cerevisia tenuis, imo serum lactis, nec non pargoricum seu anodynum vespere exhibitum, sic docente experientia. 2. Cavendum ne ptyalismus supprimatur, quod intempestiva catharsis aut phlebotomia, maxime vero calidiori regimine, efficitur. Si vero ptyalismus non interveniat, aut citius quam par est evanescat, nec in ipsius locum manus tument, facie tamen detumescente, tunc in summo periculo versatur æger; si enim hac accedat inter-

sequens

sextam & undecimum diem postulat deprimuntur, delirium invadit, febris deficit; postulat pallidæ, circulo etiam pallescente; in hoc unico casu ad cardiaca deveniendum est, ut ad scrupulum theriacæ, cum eadem radici pulveris e chelis cancerorum, semi scrupulo radicis contrayervæ & syrudo caryophyllorum; si vero hoc infortunium accidat circa aut post undecimum diem, quo tempore pustulæ faciei rificatæ sunt, præmissa venæ pedis sectione, vix ad emeticum, ut nostrates faciunt, aut ad lenè catharticum, ut Angli solent, properandum est; sed quoniam vires non vegetæ sunt, earum ratio habenda est, & semper de summo periculo astantes admonendi.

Monspelijs rarissime observatur ptyalismus, in variolis etiam confluentibus adultorum, raro etiam diarrhæa apud infantes hac specie laborantes, sed apud Septentrionales est et frequenterissimus & salubris, æque hoc ptyalismo circa undecimum diem decretescant necessarium est ut facies, manusque intumescent edemate varioloso, quod ptyalismi vires implet.

7. *Ptyalismus scorbuticus* Roper. Diff. citata; Lind. de scorbuto, &c. Journ. de Med. May 1755. p. 327. C.

Cognoscitur ex stomacacæ signis, scilicet facili gingivarum hæmorrhagia, mollietie, fætoris, dentium lapsu, nigredine, maculis tibiarum, faciei pallore, &c.

Profusus vires exhaurit, adeoque sistendus quantocius; suadet vero Lind revententia epispastica, sinapismos furis admoveandos; alius elysmatis solvenda; lenia cathartica usurpanda; laudans cutis spasmus, qui fluxum illum determinant; profunt in eum scopum diaphoretica, theriaca, camphora, flores sulphuris ter vel quater in die, adee etiam diuretica. His salivatio arceatur, & suffocatio prævertitur. Sistitur etiam collutoriis ex gummi Arabico, ichtyocola, alumine, cortice quercus; laudat Ropertus gargarismata ex vino rubro, vitidæ æris, aqua plantaginis & salviæ, sæpius ope penicilli gingivis applicanda.

Intus vesicetur æger lacte vel vegetabilibus, sumat kinkinam, elixirum vitrioli, dum lacte non uritur.

8. *Ptyalismus hypochondriacus* Ballonii, lib. 2. consil. 49. Sylvi, Prax. Medic. *Ptyalismus melancholicus* Sennert. de scorbuti signis; *hystericus* Morton. Curationem vide apud Ballonium, lib. 2. consil. 25. Roper. Diff. de ptyalismo. L.

Est ille qui hypochondriacæ, melancholicæque familiaris est; is vires imminuit, stomachum labefactat, stipatur borborygmis, constipatione, ructu, præcordiorum angustia, somno turbulento; fovetur sæpe a cæna copiosiori, & tunc horis matutinis augeatur.

9. *Ptyalismus arthriticus* Musgrave, cap. 11. hist. 3. & Spuratio arthritica.

10. *Ptyalismus phthisicus* Morton. cap. 2., n. 10. & 11. Phthisiologia, p. 29. C.

Ipse signa phthisim præfigentia. merito re-

feretur matutina & diurna phlegmatis falsi & acris, quandoque viscoli, excretio, quod universum sanguinis serum parili gradu salium esse atque acre significat; proclives sunt illi ad copiosum salivæ fluxum per ductus salivares & tonillas, quod diathesis sanguinis colligativam indicat; hoc symptoma multis annis phthisim antecedere observavi. In ultimo phthisicos gradu idem ptyalismus recrudescit, ab anacathari purulenta valde distinctus. Oritur enim fluidi ejectionis copia ab ipsis oris glandulis, nec sudoribus profusus imminuitur, ac satum accelerat. Roper. Diff. de ptyalismo.

11. *Ptyalismus viridis* D. Huxham Philosoph. Trans. n. 382. anno 1724.

Fox quadragenarius ab aurigine & colica liberatus est ptyalismo uberrimo ad sextarius circiter duos, salivæ statim vividissimæ porracæ, sed tenuis; usus autem fuerat pomaceo quod bilem hoc colore viridi inficere potuerat; hic ptyalismus quadraginta horas duravit, deinde pellucida evasit saliva; ope vero ptyalismi serosi sponte erumpentis ab aurigine, prius his terre liberatus fuerat.

12. *Ptyalismus purulentus* Petr. Hardisvay, Philosoph. trans. n. 400., 1726. L.

Hic ptyalismus purulentus ultra triennium perseveravit, pure sanioso suppurato a sinibus maxillaribus in oris cavum apertis & cariosis; puero satis benevalente, quoad cætera.

13. *Ptyalismus aphthosus*. Chaneret a la bouche. B.

Adolescens cortipitur synochia eum cephalalgia, angina, lingue forditie alba, glandularum tonsillarum & maxillarum tumore, præmissa phlebotomia purgatus est addito emetico, bilem ano & cato copiose rejecit; & difficilis deglutiendi evanuit; alit eadem die levis exulceratio interiora oris & lingue ambitum detinuit, ita ut crusta in utraque labiorum commissura oris apertorem impediret, lingua tamen superne albescent, lateraliæ excoarata, intense rubra, videbatur, & tantum erat viscosusque ptyalismus, ut noctu, interdiuque infomnem continuo exspuerent ægum per aliquot dies detinere, Prescripto altero cathartico, & gargarismate ex uncia mellis rosacei, cum drachma spiritus salis in aqua hordei melius habuit, dein convaleuit.

Ptyalismus cujus factor cadaverosus est junctas dysphagias, est signum cynanchæ ulcerosæ seu gangrenosæ, quæ upper apud Piscenates & Biterrensis maximum infantum stragem edidit.

14. *Ptyalismus gravidarum*. Crachotement & aigreurs des femmes grosses Puzos. L.

Racens gravidæ per tres quatuorve menses vel salivam viscidam, vel satum pituitum matutinis horis exscreandam habent, cum sensu acoris intercurrente, aut cardiagia, aut nausea.

His opitulamur vel bolo panis, vel aquæ cratho, vel cocolata, seminis cumini, aut cardamomi masti-

licatis, infuso theæ, veronica, chameli, mellisse. Si ea inutilia fuerint, phlebotomia adhibenda; mane chei pulverati vel huius extracti dosis ad purgandum sufficiens sumenda, vel clystima vespere injiciendum, aut stomachus corroborandus theriaca, confectio hyacinthina, alkermes, opiata Salamonis. Confert quandoque pistana pectoralis emulsionata, & aqua cinnamomi aromatizata.

15. *Ptyalismus catarrhalis*. Salivario anginea Roper. Dissertat. *Rhume d'estomac*, De Meyley T. 2. n. 302.

Est ille qui in odontalgia, angina catharralibus supervenit, eademque auxilia exposcit. Os exundat saliva mucosa: accedunt status, gravitates venticuli, nausea, vomito phlegmatico, vel diarrhoea, quæ omnia ægrum sublevant.

16. *Ptyalismus a carie* Quelmaz. Diss. de ptyalismo febrili. P.

In maxillæ ossibus cariosis & carie dentium protrahitur quandoque ptyalismus ad hecicam consumptionem, ut pluries vidi Auctor citatus; hocce etiam phenomenon accidit cum carie, perforatur antrum Hygromori, seu sinus maxillaris. Eundem ptyalismum observavi in trismo, qui odontalgia arthritica est.

17. *Ptyalismus a calculo* Chistoph. Scherer, de calculo ex ductu salivari excreto. Diss. Accentorati 1757. Journ. de Med. Juill. 1756. Loutaud.

Initio levem inducit dysphagiam, deinde vero, ptyalismum calculus sub lingua genitus, quod licet rarum sit: interea a *Covupper*, *VValthero* & *Salzmanno* fuit observatum. In casu *Cl. Leautaud* aderat dolor sub lingua vehemens, pyrexia ardens, quæ omnia extracto calculo gypseo sub lingua latente, evanuerunt. Vide Arthritidem D. Du-Bouchet qui arenuas copiosas exsecans a doloribus arthriticis se libecabat.

18. *Ptyalismus febrilis* Quelmaz. Diss. Lipsiæ 1748; Sydenham. pag. 99. de febre variolosa.

Est ptyalismus trizophyæ epidemicæ Lipsiensis, superveniens, per septimanas. perseverans, abundans, morbum non perfecte solvens, & quem tamen cepirime periculosum erat. Hunc stipabant erosiones circa linguam, fætor, tumor gingivarum; saliva limpidæ, dein viscidæ æque uber excretio, ac si hydrargyrosis plena fuisset adhibita.

19. *Ptyalismus syphiliticus*.

Est ille qui circa ullum hydrargyri usum accidit illis qui ulcuscula, veneræ gerunt in faucibus, uvula, velo palatino, quæ quidem ex macula grisea serpente, ex fælore & ex salivatione facile se produunt.

Huic speciei ipsamet hydrargyrosis caute & parca dosi administrari debet, non neglectis deurgentibus. sub finem hydrargyrosos, scilicet levi attractu ulcusculorum bis in die iterato ex penicillo intra collyrium Lanfranci tincto; collyrium vero aqua cosatum edulcorandum est, usus lactis est usurpandus.

20. *Ptyalismus vinosus* VVallec. Aâ. Upsal. p. 156. Vid. Tuphi Lib. III. Hist. 22. Helvetius Oecon. Anim. p. 156. L.

XXIV. ANACATHARSIS Hippocratis, Galeni in Aph. 8. lib. 5; *Anaprysis* Hippocr. *Tussis humida*. *Expectoratio*.

Character est muci, lymphæ, vel cujuscumque humoris facta cum tussis expectoratio constans & notabilis.

Differt ab excretionem ptyalismum comitante quod tussis in anacatharsi sit pectoralis, non vero simpliciter gutturalis. A cheumate quod sit anacatharsi sine raucedine. Anacatharsi raro est morbus essentialis, sæpius est symptoma phthiseos, asthma humidæ, catarrhi.

1. *Anacatharsi billosa*; & *a spile of unusual color*. Philosoph. Transact. n. 382. by Huxham. anno 1724; *Colepysis* D. Coste, Med. Prof. in Acad. Peripinsinensi.

Observavit scilicet in ancilla tussim gutturali, qua primo cruorem excrebat, deinde vero per viginti circiter dies expectorabat bilem, seu humorem intense flavum & amarum, & fæces ano cedente erant griseæ.

Præscriptis apozematæ amara diluentia, dein vero saponem venetum singulis diebus ad grana viginti, triginta, sumendum: parabat saponem ex sale tartari & oleo olivarum optime mixtis ad consistentiam pomati flavi, quibus adhibitis remediis intra quinque dies sanata est.

Vidi ego dudum mulierem quæ ex cheumate neglecto incidit in anacatharsim materia viscidæ ex flavo viridescens, quæ cum amphimerina catarrhali perseveravit multos dies, sed ea expectorata materies non amaresecebat, idem iteum in adolescente vidi: cathartica vero morbum sustulerunt, & febrem simul.

Similem luteo viridem observavit excretionem D. Huxham Trans. Phil. Anacatharsim azuream observavit Clariss. Fonsfride.

2. *Anacatharsi phthisica*; *Tussis purulenta*. Vidi phthisim humidam.

3. *Anacatharsi a vomica*; *Vomica pulmonis*; *La Vomique*.

Vomica est apostema materiam puriformem, vel sabiezam, aut putaceam continens ut plurimum tunica obvoluta; verosimile est vel glandulam lymphaticam sebacea materie sensim distentam, vel hydatidem pingui & crasso humore sensim turgidam esse huius morbi principium. Similes hydatides humore puriformi quandoque gypseo factas in ovariis & ascite hydatidosa observarunt Academici Parisini. Gypseos, tophaceosque tumores sæpe inveni in pulmonibus, sine ulla inflammatione prævia, parva quoadque, eaque acuta comitante febre, atque ex hac anacatharsi, licet per menses perseverante, ægri non raro convalescunt, maxime si tunicam oviformem, seu cystidem expectorent.

Hic morbus sæpe cum phthisi confunditur in præxi.

4. Ana-

4. *Anacatharsis puriformis*; *Tussis purulenta* Stahl. Sattyr. Hatvey. vulgo *Suppuration. lymphaticæ du poumon*.

Duplex est hujus varietas.

1. Post peripneumoniam & pleuritidem, in qua non omnino per phlebotomias resolvit potuit congestio inflammatoria, supervenit puriformis griseæ, blandæ, viscidæ materię expectoratio sine febre notabilis, quæ per mensem & ultra perseverat, nec tamen phthisis est, atque ex ea, adhibita diætâ lactea, cum balsamo Canadensis, ægri convalescunt.

2. Post febres putridas ac malignas, corpore fatigato jam superque purgato, accidit interdum, maxime in senibus, ægrum valde debilem esse, & quandoque tussim, interdum etiam exsiccato magnam glutinosam, viscidam phlegmatis copiam expectorare, quod symptoma non tantum ægro terrorem inicit, sed & ipsi Medico præsertim minus cauto, imposuit pro phthiseos prodromo.

Hoc in casu ægrum jubeo vinum de Malaga, vel mustum cum pane tosto et immixto bibere, quod vires reparat, & symptoma illud intra paucos dies abigit. Sydenham p. 38. cap. 4. S. 2.

5. *Anacatharsis asthmatica*. Vide *Asthma humidum*.

XXV. DIABETES; a diabete Hydraulicorum, seu syphone aquas transmittente. *Diarrhœa urinosa* Galen. lib. de crrib. *Diarrhœa ex ore*; *Diapsac* Galen. lib. 6. de loc. aff. *Hydrops ad matulam* Galen. de loc. aff. lib. 6. & lib. 1. de casibus; *Profluvium urinae* Latin. *Diabetes*.

Character. Subita potus omnis per urinas cum magna siti profusa, *Gorral*, cum corporis colligatione, (*Aretæi*) febricula, anorexia, polydipsia, urina copiosa viola redolente, oleo supernatante persufa *Dover. Legacy*, quales sunt sinus scorbuticus.

1. *Diabetes legitimus* Aretæi; *Deidier* Consul. T. 1.

Indefinens moiendi necessitas quam nihil cohiberi potest. Mictio copiosior est quam potus, unde adipis colligatio, sitisurgens cum saliva spumosa, viscida, fastidium, animus dubius, præcordia gravia; a retenta urina tumor abdominis, testium; crescente morbo calor mordax in visceribus; tabes; rarus morbus, *Galeno* bis observatus, curatu difficillimus.

2. *Diabetes Anglicus* *Pechey* promptuar. med. præct. Mead. of poisons edit. 4. C.

Character. Urina odoris, coloris, & saporis mellei. *Mead* *Monita*.

Affectus ille differt a diabete *Aretæi*, quod urinae sint dulces & mellisæ, vel limpidae, ut referunt Angli, vel subturbidæ ut apud nos, necnon quod hodie apud Anglos & Bravos, ob vini meratoris ingurgitationem, frequens sit; urina intra viginti quatuor horas emittatur

quandoque ad libras decem, quindecim ex observatis *Pechey*. Sitis est insaniens, febris hectica, insignis æsthesia, languor, & emaciatio.

Æger lacte vel crudo, & aqua hordei diluto vescitur, & aquam calicem secundum eet in die ad uncias quinque vel sex sumat. Juvant etiam gummi Arabicum, tragacantha, cinnamomum, cymæ cupressi, rheum, noctu narcotica; aquas vitriolicas suadet *Jurinus*.

Similem diabete observavit in duobus rusticis Gebennensibus media hieme cum urina saccharata & subturbida, eodem mense & anno, *D. Privat*, *D. M. Alesius clarissimus*.

Lactis serum aluminatum laudat *Diabetes*, juxta quem remedium id nunquam fallit.

3. *Diabetes hysterica* Sydenham. Diss. ep. de hysteria, Cheynæ de sanit. 177. L.

Hanc speciem observavi in Marchionissa Se. Victor hysteria, quæ serum insipidum, æquum, copiosissimum, fundebat per aliquot dies, hoc cellente, leucophlegmatica evadente; redeunte sic per vices diabete solvebatur phlegmatia; hysteria & mulieribus ita percitis magnum urinae limpide profluvium est familiare.

Serum aluminatum Mead fit ex lactis paululum cocti libris quatuor, & aluminis drachmis tribus; hujus feri (possetum vocant) saltem uncia quatuor ter in die bibantur; est aptissimum diabete remedium. *Mead* *Monita* p. 165.

Desidiosos aggreditur qui luxuria disfluens, cum nero sanguinem accedunt, frigidis potibus sitim resingunt; morbum esse hepatis & humidum aeris in eo attracti contendit *Mead* Lac muliebri est vese saccharatum; chylum itaque dulcem parum mutatum diabetico fluxui dulcedinem præbere putaverim.

4. *Diabetes arthritidis* Malpigh. de liene.

Ligatis in cane vas lienis, canis solito frequentius mingit.

5. *Diabetes a vino* Collect. Academ. Tom. 3. obs. 122.

Quadragenarius robustus, bilioso-sanguineus, vino & aromatizans abusus, in diabete incidit, tunc vero quam bibebat alam, seu tenuem cerevisiam urina omnino referebat, & potus assumpti molem multum superabat; vigeat fumes, sitis urgebat, ons fecit, ænum dolor, ardor viscerum; macies summa.

Ufus est tinctura martis, catechu, corallorum, vespere bolum ex ebore uto, antiseptico Poterii, croco martis tum uno, vel altero laudani grano; post mensem his utens convalesce.

6. *Diabetes arthriticus* Sydenhami de podagra, p. 463.

Est symptoma arthritidis inveteratæ, sed extra paroxysmos, in quibus etenim urina est paucæ & coloratæ; at extra eos urina quandoque est æque copiosa & aquosa hoc in diabete, quod designat a materie acri sitim excitari, simulque ita languore digestionem; & imminui perspirationem, ut potulenta illibata per urina vias emittantur; nec ab aliis principiis derivanda est

magna urinæ copia, quæ in diabete vulgari effunditur. Quantitas urinæ infans est circiter dimidia pars alimptorium tum esculentorum, tum potulentorum, æque etriter altera pars perspiranda volat. Si itaque in statu sano quadragesima urinæ uncie emittantur, ut in me expertus sum: si litis potum tertio parte uberiores imperavit, & simul tertia pars perspirationis solite suppressa in urinam vera fuerit, inde sexaginta sex uncie urinæ quotidie emittuntur, quæ cum cruda sit, & repetitis mictionibus amandetur, diabete efficitur.

7. *Diabetes febriofus* Sydenhami ep. responf. 5. pag. 192.

In tertia & quotidiana nonnunquam accidit, eb perquam raro, ut fenes qui diu hæc febre antea laboravit, ac interea phlebotomiis & catharticis imperite fuerint multati, in diabete incidant, etiam febre jam perfecte fugata; ceptim cum sanguis eorum adhuc debilitatus assimilandis succis et illatis prorsus impar reddatur, iidem per vias urinarias crudi adhuc & incerti exitum sibi querunt, proindeque præ ingenti urinæ copia, quoties eam reddunt, excreta, sensim labefactantur, & quasi substantia corporis per hanc cloacam exinanitur; curatix indicationes ad sanguinem invigorandam, & fluxum urinæ minuendum omnino dirigendæ sunt.

4. *Theriacæ nuciam & semissem, conservæ flavæ dnis aurantium unciat; diaforal nuciam semissem; zingiberis candidi, & nucis moschatae condita ana drachmas tres; pulvisis & chelis cancorum, corticis granatorum, radicis angelicæ, coralliorum, terre lemnis, boli armenis, gummi arabici, ana drachmam unam, cum syrupo de rosi fisci fiat electuarium; sumat drachmam ter in diebus mensis; utatur vino hispanico, cibis exceptis, abstineat a crudis, oleosis, &c.*

XXVI. ENURESIS; *Peritæcia* Hippocratis; *Pareusis* Aretæi; *Seranguria* Galeni; *Strididum* urina, *Incontinentia* urina Sennerti, &c. *Incontinentia d'urine; flux d'urine.*

Est mictio involuntaria & inopportuna, quam nullus vesicæ stimulus sollicitat, quæque sæpius infans accidit.

Differt a diabete quod non major sit urinæ copia, nec diversus a sano color; a dysuria quod tamen ardore & stimulo fiat.

1. *Enuresis infantum* Junckeri Tabul. 98.

Est mictio quæ tum interdiu ob negligentiam, tum noctu inter dormiendum accidit junioribus; plurimi idem lectum urina conspurcant, quia solvant se in loco comodo mingere; alii ita negligentes sunt etiam octennæ & decennæ, ut in seipfis tum vigilando, tum dormiendo mingant.

Prævus hic mos .i. virgis & minis est coercendus apud eos qui quartum annum ætatis attingere 2. Curandum est ut horis pomeridianis parvi bibant; 3. utque antequam lectum petant, vesicam evacuent. Si vero atonia sphincteris vesicæ adfuerit, ad tonica deveniendum est, ut in specie sequenti.

2. *Enuresis paralyticorum* Junckeri Tab. 98. L.

Incontinentia urinæ a paralyti sphincteris vesicæ procedens accidit apoplecticis, hemiplegicis, & sæpius paralyticis, ubi nervi ossis sacri, lumborumve fuerint compressi, contusi, lesi, aut in cerebro ipso affecti; in illa specie adeit continuum urinæ stillicidium sine sensu, unde differt ab aliis speciebus in quibus per intervalla tantum urina emittitur.

Incommodus est hic morbus ægro & adstantibus; ob lætorem urinæ qua imbuntur vestes, maxime apud foeminas quæ non ita valent in urinatoio portatili urinam excipere, ut vti.

Curatur hic morbus eodem modo, ac paraplegia; sed vix unquam sanatur, nisi levis sit affectus, aut quædam atonia, quam superant infusibus aromaticis, spirituosæ somenta, theriacæ Belilucanæ, amnochasia.

3. *Enuresis herniosorum* L.

Est ea quæ exocysten, hysteroproctism, cystocellem, simileque ectopias comitatur, quibus ita distrahitur sphincter vesicæ, in visis podici, in foeminis vaginæ adhaerens, ut distracto vel intestino, vel vagina, sphincter constringi nequeat pro libitu. Sanatur ablato principio.

4. *Enuresis gravidarum* Mauriceau, lib. 1. cap. 15. de l'incontinence d'urine. L.

Non est ea frequens mictio, seu dysurie species; quæ ob vesicæ ab utero factam compressionem gravidis accidit; eam enim parum urinæ continere possit vesica, necesse est ut frequentius vesica distendatur, & ad mictionem sollicitetur; verum ea est quæ ipsis accidit non solum gravidis verius ultimis menses, sed etiam mulieribus post partum expertis; illæ enim ad minimam corporis inflexionem, ad minimum risum, aut tussionem coartatur, illico urinam sine stimulo, quandoque sine sensu emittunt. Hoc etiam recens puerperis familiare est, observante *Roderico a Castro* lib. 4. cap. 2. de factu marino, & hoc urinæ profluvium alvi acrisia sæpe stipitur: educto, aut ille, infante, urina aut alvi feces, quod frequenter accidit, involuntarie fluunt, quod curatur ut paralytis earumdem partium: laudatur infusus in decocto aromatico chamæmeli, toris marini, salivæ & litus ex oleo ejusdem virtutis.

Quoad enuresim quæ sub finem graviditatis oritur a mole uteri velicam prementis, ea sublevarur mappa quæ ita collocata sit, ut abdomen proindeque uterum sustineat.

5. *Enuresis puerperum*. *Perforation de la vessie*. *Incontinence d'urine après les couches*, Puzos pag. 137. L.

Cum fortis diutius in transitu per os uteri retinetur, collum vesicæ, inde fortis capite, illic ossæ puias, compressum inflammatur, contunditur, & post quinque, vel octo dies urinæ incontinentia accedit, perforata ibi loci vesicæ: hæc enuresis insanabilis est; sublevarur incommodum ope utræ ex corio fabrefacti penduli, & spongiz appositæ; pessaria vix ullius utilitatis sunt, nisi ad præcavendam oburationem va-

finx, quæ a succrescentibus ex hac fistula carnis, fibrisque ramosis oritur; ibi calculi succreſſu temporis generantur. Vide *Hysteralgiam calculosam*. De hac specie suse egit *Hirschfeldus* in *dissertatione Argentoratensi* edita anno 1759. de *incontinentia urina post partum difficili*; hanc etiam observavit *Clariss. Med. Doct. Privus Allessius* in primipara, quæ dysſtociam per quinque dies expecta, deinceps per quadraginta dies dysuria laboraverat, quæ sanata supervenit enureſis conſtans; urina ſcilicet æa ſtante, vel erecta fluebat, ſedente vero retinebatur, immiſſo per urethram ſilo ferreo, & ſimul in vaginam digito, inventum eſt foramen minimi digiti diametro non procul ab uteri orificio, urethram cum vagina conjungens.

6. *Enureſis catamenialis*, ſeu menſe quovis revertens. L.

Virgo ſanguinea, pinguis, 18. annos nata, enureſis ab orta ad pubertatem uſque conſiſtente, omni ſemihora noctu & interdiu mingebat; cum menſtrea acceſſiſſent per triennium, ab enureſi ſuit immuniſ; ſuppreſſis ab hoc tempore catamenis ob pediluvium frigidum, ſingulis menſibus patitur per triduum horis nocturnis enureſim cum pervigilio; ſed octo diebus ante & poſt illam catamenialem urinae incontinentiam, cephalalgia, hypocondriorum tumore, pedum redemate, vel etiam hæmoptyſi afficitur; alii ſi deficiat, ut quandoque accidit, urinae fluxus ille frequens, tunc ſymptomata numerata ereſcunt & percuant uſquequo enureſis acceſſerit.

Mater ejus ad vigefimum ætatis annum hoc conſtituta inito tunc matrimonio convaluit; iſta virgo potatis aquæ Barregianæ, vomica expectoravit; ſoror ejus enureſi laborans philis periiit.

Cura. Præmiſſa venæ ſectioe & brachio, purgetur cum manna in infuſo ſennæ; dein juſcula ex collo vervicis, cichorii, rubix drachmis duas, pzonix drachma una per novem diſtribuat; dein ſerum lactis in quo elavi ferrei extincti, millepedes decem, flores cheiri ad pugill. t.; ante hauſtum ſumat boracis grana ſex in cochleari aquæ naplæ.

Poſt viginti dies purgata ſumat lac aluſinum, & alternis diebus ante ejus hauſtum ſumat bolum ex eroci maris, terræ catechæ, & coralli rubri ana graniſ octo in pauxillo ſyrupi; continuet uſque ad finem Junii menſis; his irritis, nubat.

Liberia. Videtur hic morbus pendere ab irritabilitate veſicæ, ob ſanguinis menſtrui retenti influxum uberiorem in ipſam; hinc frequens mingendi neceſſitas; ex eadem ſanguinis congeſtione in pulmone ſanguinis ſpurum, in viſceribus abdominis metrorrhœia, in pedibus œdema; ſanguis autem ſpiſſitudine obſtat catamenis, acrimonia etiam irritat veſicam & pulmones. Hiſtoriam morbi recellit D. Richard D. Med. Monſ. a Villeneuve de Marſan.

Mictiones involuntariæ agonifantium, necnon ex quæ in parathyroſyne febrili acidunt, ſunt ſymptomata fugacia, non morbi; non ſecus ac quæ epilepſiæ & eclampſiæ paroxyſmos quandoque comitantur.

7. *Enureſis calculoſa* Collect. Acad. Tom. 31 p. 570.; Cyrilli Conf. 13. Cent. IV. L.

Puer Metenſis per totam vitam incontinentia urinae laboraverat ſæpe cum dolore, continua cum ſiti; excrevit calculum; alterum in collo veſicæ gerebat; in cadavere reperta duæ veſicæ coarctatæ, ureters ampliſſimi contici; veſicæ cavitas fibris tranſverſis ejus collum diducenſibus diſtincta.

Huc ſere pertinet enureſis quæ lithotomiam ſequi conſuevit; nam ſectio, vel maxime debilitato ſphinctere veſicæ collum arſtante, non mirum ſi urina deinceps ſponte effluat, maxime vero cum ut fieri ſolet, veſica calculo irritata, occalluit, & veluti capſula coriacea contractionis etiam in collo incapax evaſit; hæc autem ſpecies tolerari debet, minime vero ſanatur.

8. *Enureſis a fiſtula Junckii* Tab. 98. L.

Fiſtulæ quæ veſicam, ejuſve ſphincterem attingunt, oriuntur 1. vel a maricis ſuppuratis; 2. vel a gonorrhœis virulentis; 3. vel a calculis veſicæ; 4. vel ab iſtibus & operationibus Chirurgicalibus in dyſſtocia, fiſtula ani, calculove adhibitis.

Hæc autem ſpecies eodem modo curatur quo hæc fiſtula.

9. *Enureſis a ſparganoſi*, Hazon Journ. de Med. Aout 1761. p. 145. L.

Ea eſt quæ a lacte ſuppreſſo puerperis accidit. Sanatur catharticis, ſucceſſive magis hydragogis, ex manna, ſale polychreſto, ſyrupo de rhanno, &c.

XXVII. DYSURIA; *Stranguria* Pauli Æginetæ, non Galeni; *Ardor urinae* Sennerti; *Subſtillum* vel *ſtillicidium urinae*; *Dysuria*, *Ardor d'urine*.

Character. Difficilis vel dolorifica, & ſæpius ardoris ſenſu moleſta mictio; *Gorrai definit*. Galen. in aphor. 37. lib. 7. Mictio eſt non puris aut ſeminis, ſed urinae ejectionis, unde diſcrepat dyſuria ab ardenti mictu gonorrhœam ſtipante; ſi non pleno ductu, ſed guttatim fluat urina cum dolore, *Stranguria* dicitur a Græco *Strangos*, gutta.

1. *Dysuria hystericæ* Sydenham. de hystericæ paſſione pag. 132. B.

Dysuria hystericæ ita calculum mentitur quandoque, ut Lithotomiſtæ iſis ſymptomatis deluſi operationem neceſſariam judicent, ut obſervavi in Marchioniſta St. Victor, quæ per menſem hoc morbo laboravit; ſymptomata ſubito acceſſerant poſt vertiginem hystericam; ea vertigine reducente, ſubito evanuerunt, & Lithotomiſtam ſupentem dimiſerunt. A ſpaſmo hystericæ ſphincteris veſicæ pendet hic morbus. Obſervata hujus varietas in muliere hystericæ hoc habuit ſingularæ, quod ægra hystericæ ſtatim a paſtu mingere coacta foret, ut in lienteria ſtatim a paſtu alvum deponere cogatur; urina autem illa erat cruda, aquoſa; ægra emaciabatur, cum pyrexia nocturna, nec ſolito fre-

frequentius mingebat, nec sitiebat, observante D. Coular.

2. *Dysuria herpetica: Ab herpes vesica.*

Cognoscitur 1. ex herpeticus cutaneis repressis, aut vaginam etiam instantibus; 2. ex muco urinae fursuraceo. Hæc species est pertinacissima, valde dolorifica. Curatur aquis acidulis, balneis, lacte, præmissis præmittendis.

3. *Dysuria nephralgia: Dysuria deceptiva a renibus* Stahlii ars curandi morbos per expectationem; *Dysuria ab ulcere renum* Sydenham. p. 680. Vide Pyuria renalis.

Ea est quæ a nephralgia calculosa, aut ab urinae acrimonia tenes simulante dependet, in qua ob dolores renum, ureteres, & ipsemet spincter vesicæ dolent & irritabiles sunt.

Curatur ut nephralgia phlebotomiis, balneis mucilaginosus intus sumptis, nec non narcoticis.

4. *Dysuria venerea* Riverii obs. 25. p. 138.; *Dysuria syphilitica* Nicol. Heinsii; & *caruncula* P. Borelli. obs. 79. *Ab urethra per candelas gonorrhæa angustata* Savard. obs. *Ab phlogosi urethra sine ulcere* Nicol. Andre de morbis urethrae 1756. B.

Hæc species est omnium apud adultos & senes longe frequentissima, stipatur sæpe mictu bifurcato; præcellere semper gonorrhææ virulentæ male curatæ, accedunt scirrhi, ulcera, fungi, calculi muco involuti, fistulæ, calli in urethra.

Curatur litu mercuriali & candelulis cereis D. Goulard, Daran &c.

Gonorrhæa sicca Astrucii & *Dysuria venerea sicca* ejusdem, est vel phlegmona in prostatica ac vesiculæ seminaris, ubi tumor, calor, dolor, stranguria, ardor vividus inter mingendum, qui morbus si intra aliquot dies non resolvatur abscessus perineæ excitat. Vel est erysipelas in toto urethrae tractu cum gravi dysuria, dolore urenti totius urethrae, sine ullo puris aut feminis effluxu, & utraque varietas a concubitu impuro, ac a viru acri & volatili dependet. Ultima varietas atrocior est, & si non resolvatur tumor, facile in sphacelum terminatur.

Quandoque vero a gonorrhæa virulenta adstringentibus suppressa oritur. Prior vero non raro hæc gonorrhæam præcedit & fluente semine purulento sedatur, utraque varietas exigit initio repetitas phlebotomias, immerisionem penis in lacte tepido, somenta emollientia ex decocto radicum althææ, seminum lini, injectiones in urethram similes, nonnulla narcotica, porum emulsionatum, nitratum.

2. *Dysuria a caruncula. Virga Caruncula* Riverii obs. 22. comm. *Carnositas de uretre*. L.

Vulgo apud senes qui olim gonorrhæas passi sunt supervenit dysuria pertinax, & quæ quandoque plures annos perseverat, in qua fluentis urinae inter mingendum est bifidum (*l'urine fourche*) cum aliquali ichthuria; atque incurari solent, excrecentiæ carnosæ in urethra quas deprimenti gratia stylos plumbeos a Rivierio ad nostra usque tempora in urethram sensum

insinuari solemne est. Vide D. Lapi diff. de stranguria.

Aut Savardus & Cl. Chirurgus Monspelienfis J. Serres dissecto pene aliquot ægrotorum, qui de eo morbo conquesti erant, pil simile invenerunt, & tantummodo urethram phlogosi alicubi tentatam; non dudum candelulæ cereæ in locum plumbeorum sufficere sunt a D. Daran, Goulard, Andre &c., sæculo clasp a *Geranimo Lapi* Italico primum usurpatæ, quarum usus gonorrhæa mucosa excitatur, via urinae liberior paratur, lapilli siqui sine educuntur, ulceratæ detergentur.

5. *Dysuria primaria*. L.

Ea est quæ a vietu acriore, falso, abusu liquorum fermentatorum, diureticorum, & ætatis fervore, ab exercitiis immodicis, similibusque causis urinae acridinem inducentibus oritur; urina in illa specie falsa est solito magis, fervidiorque simul. Hanc excitant sæpe vina alba, cerevisia, usus cantharidum. Curatur phlebotomiis, clystmatibus emollientibus, pitana ex floribus malvæ, violæ, radicibus althææ, feminibus lini, gummi tragacantha, fomentis, semicuppiis refrigerantibus.

6. *Dysuria hamorrhoidalis* Frider. Hoffmanni. L. P.

Ea est quæ a mariscis tumidis, potissimumque luxatis fovetur. Luxantur mariscæ seu tumores hamorrhoidales quoties diaphragma hypogastricum descriptum ab Illust. Locat in libro de lithotomia, quod ano & recto sustinendis dicatur, suo officio non fungitur & hiat; tunc mariscæ foras protuberant ex ano, & nervi ad urethram pertingentes dolorificè distrahuntur, atque urina cum ardore incredibili excernitur, ita ut calculum in vesica latere, & hos atroces per multos annos dolores procreare videatur; æger quidem a fluxu hamorrhoidali sollevatur, sed non sanatur: quoties alvum deponere tenet, toties mariscis excidentibus dysuria recrudescit. In nobili ægroto sic laborante frustra applicata sunt suspensoria podicis, æger sere semper manibus suis hanc molem hamorrhoidalem sustinere cogitur, ac post alvi depositionem restituere, in undis prius cerato Galeni mariscis.

7. *Dysuria arsuræ; Arsuræ* Joan. Andern; *Incendium virgæ; Burning & Brining* Anglorum. Vide Astrucium de morbis veneris, lib. 1. cap. 7. n. 5.

Est dysuria ardens, quæ olim maxime apud Anglos circa sæculum decimum quartum eos affligebat, qui cum leprosa, aut cum muliere quæ leprosum virum prius admiserat, concubebant, sine ullo seminis aut puris effluxu inde subsequente.

Morbus erat a syphilitica dysuria diversus, atque curabatur injecto vel lacte vel oleo amygdalarum in urethram.

8. *Dysuria a cystocle* Saltzmänni diff. de Hernia vesicæ urinariæ. L.

Cognoscitur hæc species ex tumore molli in

vicida visum, ut in scroto, perinaeo, &c. qui pressus cogit urinam eamque per urethram exprimit; vide *Mém. de l'Acad. R. des Sc. Ann. 1713. p. 146. a D. Mery.*

9. *Dysuria ab hysteritis*, vide *Hysteridem A.* Si phlogosis tantum fit in collo uteri, aut, ut aiebant Veteres, ejus adit intemperies calida & sicca, nulla quidem adest notabilis pyrexia, adeoque nulla vera hysteritis, interea explorato ore uteri, digito immisso, calor, sensibilitas, siccitas, percipiuntur.

10. *Dysuria ab hysterolaxia*, Ruysch *Obs. Chir. 88.*, Morgagni *Ep. XLVIII. 39. L.*

Hæc species stipatur continuo mingendi & alvum deponendi desiderio, sed constans non est.

11. *Dysuria rachialgica*. *Stranguria calicum popularum canconitans* Cistellii de lignis diagnostici colici popularis p. 6.

In populari colico, ait ille, urina biliosa, & acris, eaque sæpius cum stranguria emittitur, ut plerique imponat existimantibus se non colico dolore, sed calculo cruciari. His adde Rachialgia cætera signa, pallorem, extremorum frigus, virium languorem, animum inquietum, corpus anxium, vigilias assiduas, leipthymias, anorexiam, nauseam, ructum, vomitionem biliosam, qua deficiente singultus, sitis accedit, sæpiusque febris lenex, & quod totius caput est, acutissimus ventriculi intestinorum lumborum, ilium, & inguinum dolor excruciat. *Cistellus cap. 6.*

In colica vulgari accedit non raro dysuria cum penis rigiditate & condensatione, nulla vero erectione, quod cessante doloris vehementia evanescit; æt in rachialgia dysuria ita vehemens & pertinax observatur, ut calculosa videatur.

Cura vero hujus speciei eadem est ac rachialgia, adeoque a cura cæterarum diversissima, cum juxta ipsam *Cistellus* cathartica dractica, & emetica oleosis interpolata conveniant; sed de rationi apud nos morbo nil pronunciare auserim.

12. *Dysuria calculosa*. *Calculus vesicæ*. *Sennerti, Cyrilli. Consult. Tom. I. p. 46. 112. 128. 146. L.*

Cognoscitur 1. *Dysuria* frequenti periodica, vel continua, seu frequenti & dolorifica mingendi cupiditate: 2. *Dolore* acutissimo extremi glandis, in viris a missione recrudescente: 3. *Frequenti* penis eaque injucunda tentigine, seu duritie, in qua nec erigitur penis, nec crassior evadit: 4. *Pondere* assiduo in perinaeo: 5. *Subitanea* quæ quandoque accidit inter mingendum urina suppressione: 6. *Facilitate* mingendi, si crura decussentur, aut corpus resupinetur: 7. *Tactus*, digito in anum immisso, si de pueris agatur, aut interventu catheteris in vesicam immisso, quod ultimum signum, alias certissimum, debet cum calculo inter laminæ internæ cellulas aut vesicæ biveris & coarctatæ sinus delitescere. 8. *Exasperatio* dolorum ab exercitio, potissimum vectura in curru super stratum lapideum.

Alii sunt calculi murarii durissimi, rassi, qui omne dissolvens elidunt, alii gypsei, alii gypso murarii, seu ex lapidulis invicem gypso coagentis efformati, qui tandem dissolventibus vel in toto frustillantur divisi cedunt.

Duplex est methodus curativa, una *chirurgica*, quæ in extractione calculi consistit, eaque instituitur hodie per apparatus lateralem; altera *linthotriptica*, quæ in usu linthotripticorum medicaminum consistit.

Optima methodus linthotriptica ea est quam *D. Rob. VVitt* expertus est, scilicet 1. *ostreorum* vel aliorum testaceorum conchæ vehementer igne per biduum effusæ usquequo totæ albescent & nil coloris subcerulei retineant; octupla aquæ fontanæ copia superaffunditur, & fit vehemens ebullitio; aqua illa per duodecim horas cum ostreis calcinatis infusa colatur & servatur ad usum, & est aqua calcis *ostreorum*. 2. Hujus aquæ cyathum unum aut alterum quovis die horis Medicis bibat æger, ita ut sensum hujus dosim augeat ad pintam singulis diebus potendam, & ultra: Simulque saponis albi in pilulis redacti, vel in aqua dissoluti drachmas duas, dein tres, demum quinque, vel sex, singulis diebus deglutiat, maxime si alvus ab aqua calcis constipetur; & persistet in illorum usu quam diutissime, ut per sex menses, imo per annos. Hujus aquæ & saponis ope calculus obducitur mucos quodam albedo leni, quo fit ut vesica ab ejus irritatione immunis evadat; dolor sedatur, mictus cruentus compescitur, & successu temporis calculus deterritur & dissolvitur, vel in frustula divisus foras excernitur.

Altera est methodus *Montpelii* aliquoties nstrata, sed minus tuta: scilicet 1. colliguntur folia *arbuti uræ arsi* victi, quæ arbutula in monte *Esperou*, necnon in *Pyrenxis* adolescit, & *Buxerola* vocatur: Illorum foliorum vel pulvis ad grana quindecim, vel insuffum drachmæ unius pro duobus, vel tribus aquæ cyathis quotidie deglutitur per mensem, atque cum ab ejus usu vesicæ mucus abraditur, & dysuria potest recrudescere, fuscum ex herbis emollientibus, refrigerantibus, pullo, ranis paratum usurpatur, maxime si pulvis buxerolæ adhibeatur, aut insuffum debilius sumitur: hujus medicaminis ope calculi teneriores dissolvuntur, aut in frustula minora dividuntur.

Quoad lithotomiam, ea raro felicem sortitur eventum, maxime si æger jam provectus ætatis sit, quia apud eos vesica est callosa, valde circa calculum coarctata, quandoque ulcerosa; ea non impedit quominus novi calculi generentur, & vidi puerum qui hanc operationem ter passus intra aliquot annos, iterum calculo laborat; præterea peritissimum *Chirurgum* requirit operatio, ex qua, si male successerit, intra breve tempus inflammata vesica æger & medio tollitur; secus non raro insanibilis perinaei fistula supervenit; undique periculum, undique angustia.

13. *Dysuria gravidarum* *Nordmanni Dissert. de*

de ischuria gravidarum, Argentinx an. 1758. Mer-
ty H. R. de l'Academie des Sciences an. 1613. B.

Illa accedit vel toto graviditatis decursu, ut
vidit *Mary*, vel ultimo tantum mense; t. ob u-
teri molem expansionem qua vesica premitur, & di-
stensa dolet, in quo casu situs supinus, decubitus
in lecto solatium præbent; vel 2. ab hysterop-
tosi, incompleto scilicet uteri prolapsu, in
quo casu potissimum est ischuria, & juvat decu-
bitus supinus, sustentatio molis abdominis ope
manus, repolitio uteri & usus pessarii; 3. vel
a cytolcele, seu hernia vesicæ urinariæ, de cu-
jus curatione vide *Autores*.

In his omnibus casibus plus valet ars obstetri-
ca quam pharmacia. Quoad ischuriam que sub
finem graviditatis accidit, vide *Ischuriam* Cl. X.

De dysuria a cytolcele fuse egit *Salzmannus*
indifferenter de *Hernia vesicæ urinariæ*. Dysu-
ria ab hysteropiosi etiam non gravidis accidit.
Vide *Hysteroposim* in Cl. I.

14. *Dysuria Nymphaeum* Delii Amoenit.
Acad. p. 188. B.

Est ea quæ recens nuptas forti viro junctas a-
doritur cum vulvæ, nympharumque phlogosi; a
contusione, a coitu repetito & æstreni ortum
ducit, & intra aliquot dies cessat, modo a coi-
tu absterneant, & fomentis emollientibus utantur
nymphæ; sic olim vocabantur recens nuptæ.

Post coitum etiam viros afficit dysuria, sed
fugax, de qua *Ephemer. Nat. Curios. Decad. 2.*

15. *Dysuria ab infestis*, *Ephemer. Nat. Curios.*
passim; *A terebinthibus*, Delii Amoenit. p. 54. t. 1.;
A lumbicis, Philosophica I. Transact. p. 202. D.

Terebinthes ill. Delii erant vere ascarides verm-
iculis easse similes; cum urina copiosa excreti,
qui prius fovere videbantur stillicidium urinæ
dolorificum. Vidi ipse similem ascaridem cum
urinæ enisum a viro, qui dysuriam, & dein
ischuriam patiebatur, antequam hic vermiculus
ejiceretur.

Suasit ill. Delius diversa anthelmintica, & eri-
nacuum usum cum essentia cascætiliæ, sed om-
nia incassum.

16. *Dysuria atretarum*. L.

Vidi & curavi duas puellas, quæ ab aliquot
annis quovis mense post pubertatem atroces in
podendis dolores cum missione ardentis patie-
bantur; altera vero cum urina pauxillum san-
guinis mingebat; utraque erat imperfectæ, &
caesamentorum expertæ, licet altera vigesimum no-
num annum attingisset; illa autem cum dysuria
torem quemdam e vagina tunc temporis pro-
minensm gerebat; ope scalpelli hymenis sectio
verticalis facta est, & prærupta magna quantitas
cruentis viscosi, nigri, picci, inodori, quo facto
convalescere ambo, & harum junior viro juncta
dein feliciter peperit.

17. *Dysuria diabetica*.

Est species in qua post quemlibet passum,
illico non aucta urinæ copia, nec frequentia,
sed necessitate incoercibili, & cum levi irrita-
tione vesicæ, mingitur utina aquosa, cruda,

quod per plures menses in hysteria sine fici, aut
cum macie, & cum febricula nocturna perseverasse
vidit *Clariss. Doct. Coular*. Hic affectus est ad ve-
sicam quod lenteria ad alvum; videtur potum il-
lico transfluere, ut per diabetem hydraulicum a-
que citissime transfluunt.

Indicantur in hac specie laetitia emollientia,
antihysterica.

XXVIII. PYURIA; *Caesamentis* species D.
Culson. *Pissement de pus*.

Est purulenta, alba, flavæ, vel viscido-muco-
sa, lutulenta materiam cum urinæ ejectione.

Differt a gonorrhœa quod materies hæc puri-
formis mingatur, non vero simpliciter ex urethra
exillit, ut exillat guttatim in gonorrhœa.

In pyuria materies puriformis, vel mucosa pel-
lucida non ex urethra oritur, fecus continuo stil-
laret; sed vel ex vesica, vel ex ureteribus, aut
renibus effluit.

1. *Pyuria renalis*; *Ulcus renum* Sennert. cap. 11.
lib. 3. pag. 7.; *Ulcus ureterum* Sennert. cap. 12.
Pissement de pus. Journ. de Med. Avril 1761. p.
353. C.

Cognoscitur 1. urinæ colore griseo, flavescen-
te, consistencia crassa, odore foetido ad putridum
cadaverosum vergente. 2. Præcessere signa nephri-
tidis suppuratæ, dolor scilicet renis alterutrius
cum pyrexia acuta, quæ deinceps in amphimeri-
am hæticam abiit; vel præcessit nephralgia cal-
culosa; interdum vero dolor renis, dum suppu-
rat, exiguus est.

Differt a pyuria vesicali ex eo quod dysuria nulla
sit in renali; quod etiam in renali substantia ipsius
renis carnea, atro-tubra, veluti dissoluta cum uri-
na quandoque effluat, & cum filamentis viscosis;
(*aphor. Hipp. 76. lib. 4.*) illa vero pyuria peior
est, si ulcus renum pendat a calculis reni impa-
ctis, aut ab acrimonia sanguinis, quam si a cau-
sis mechanice, ut vulnere, contusione orta fuerit
nephritis sine sanguinis dyscrasia.

2. *Pyuria vesicalis* Bonetti Sepulchret. obs. 10. t.
2. p. 695. *Ulcère à la vessie*. C.

Vel est ulceratio in collo vesicæ, vel in corpore
ipso. Si in collo vesicæ præcessit gravis dysu-
ria, stranguria, dolor atrox circa perinæum,
ibi etiam tumor, calor; pus inde prodens copiosum
cum mucro viscido, tenaci. Si in reliqua vesica, do-
lor ad hypogastrium, præcessit cystitis, cum urina
fluente materies crassæ, furfuraceæ, foliaceæ, unde
Hippocrates scabiem vesicæ adesse contendebat, cruen-
tæ & purulentæque foetidæ sunt urinæ, ex quo fac-
tore intolerabili potissimum dignoscitur pyuria ve-
ra a gonorrhœis nec non ex eo quod in gonor-
rhœis pus non mingitur, sed exillit; aut in pyu-
ria urina turbida, grisea, foetida mingitur.

Pusilla mucro dignoscitur, quod pus sit friabile,
mucus vero in longa filamenta ducatur; pus gri-
seum est & scætidum, mucus pellucidus.

Post gonorrhœam virulentam in fundo matris
datur paucus mucus viscidus, qui pyuriam non
con-

constituit veram, seu purulentam, & sponte evanescit.

In curanda pyuria aquæ Euzetenses, Alesiensis longo usu, serum lactis, diætæ lactea mortem procrastinant.

Si adit sarcoma fungosum in vesica adnatum, dolores sunt diutiores, iniectiones in vesicam sacri non possunt sine catheteris interventu, quod ob dysuriam difficultat institui potest.

3. *Pyuria a corde* Boneti Sepulchret. obs. 13. & 13.

Constat his observationibus post longam puris missionem cum nephralgia, quæ Medicis ulcerosa censebatur, nullum vitium in cadavere inventum fuisse præter abscessus & ulcera cordis, cum multis in eo calculis, *Hollerius Commentar. ad aphor. 75. 54.*

4. *Pyuria a thorace* Boneti Sepulchret. lib. 3. f. 28. obs. 24. 27. ex Diemerbroeckio Anat. lib. 1. cap. 17. & Dulaurentio Anat. lib. 9. 12. B. vide duodecim observationes apud Schenckium. p. 266. L. 1.

Est purulenta mictio quæ cum aliquali nephralgia empyicis accidit, & plures quandoque libras attingit intra paucos dies, eosque a morbo prioris liberat. Vidi adolescentem empyicum in urbe *Clermonte de Lodève*, cum D. Med. D. Bertonieu, qui me consuluit, ille post aliquot dies pus copiosum minxit, sicque convalescit.

5. *Pyuria viscida*. Vid. Consultation D. Deidier, tom. 1. pag. 84. *Ecoulement par le canal de l'urètre, en vénérité par le malade. Glaires de reins. L.*

Aggreditur ætate proventus qui olim gonorrhœam passi sunt; inter pollutiones nocturnas titillatio, imo dolor identidem acior perferuntur ad vesicæ collum; urinx acres sunt, cum est dispositio nephritica, aut arthritica in sanguine, quod ex nephralgia, ex pruritu cutis, libidinosa constitutione iudicatus, maxime vero ex dysuria frequent; & insimul urinx quandoque turbidæ, rubræ, subcruentæ; sed constanter deponunt in matula viscidum quid griseo-pellucidum, urinx fundum petens, quod matule agglutinatur, quodque effusum longissima fila præ lentore efformat. Dum urina crassa mingenda est, dolet collum vesicæ, balanisque, necnon hæret aliquandiu, & alvus ad dejectionem stimulat; mingendi cupiditas, durante alimentorum digestionem, frequentior est.

Hunc morbum syphilitico viru foveri putarunt optimi Medici, & rite instituta hydragryon sine pyralismo æger non melius habuit, licet subsecuta forent ladicinia, balnea, aquæ sulphuræ Euzetenses; morbum exasperaverant candellæ unguento suppuratorio tinctæ in urethram sæpius immittæ. D. Deidier dubitavit an ulceris circa prostatas, aut in collo vesicæ morbum foveret; sed pus prunis injectum valde fortet, non viscosa materiis; si viscosum quid e renibus, ureteribus, aut ipsa vesica excernatur, ut verosimile visum est, fuadet prifanam ex foliis parietariæ, feminibus lini, glycyrrhizæ; dein pareirabæ pulvis semidra-

Sauvages Nefologia Methodica. Tom. II.

chmam, vel tantundem corticis radicis calcitræ per triduum, prifana superhaufta. Id autem remedium aliquoties in mense tentandum, & utiliori insistendum putat. Si pos mingi videatur, balsamum copaivæ ad guttas xx vel plures ex cochleari syrupi cuscudam hauriendus, superbibendo lac asinum per quatrindium, dein lac purum per mensem continuandum addito identidem balsamo. Accedente Julio aut Augusto acidulæ potandæ sunt per novem dies, dein balnea domestica per octiduum semel & bis sumenda, & aqua pulli exuendo e balneo est propinanda. Demum opelandæ plumbeæ vel ceræ explorandus urethræ & vesicæ status, ut principium morbi melius cognoscatur.

6. *Pyuria mucosa* Pathol. method. *Rarus viscus morbus* Frider. Hoffmanni & *Catarrhus vesicæ* D. Lieutaud Maladie du bas ventre. *Gins* Ill. Linnæi Gen. Morb. 199. *Glaire de la vessie.*

In adolescente arthritico incepit a dolore vesicæ, forte cytitide vel simplici dysuria; urinx exinde crassæ, sedimentum albidum & viscosum, quod sensim copiosius, dolore etiam præterito quartam urinx partem componebat; febris post duodecimam diem recedens multam mutationem in pyuria induxit, quæ ultra ad quadragesimum diem processit, cum asthenia & marasmo macilentia. Phlebotomia, diluentia, temperantia; sedantia, laxantia durante febre usurpabantur, natura sola pyuriam deinceps sanavit: large caparum usu hunc morbum sublatum vidit Ill. Linnæus.

Differt a pyuria vesicali, vel quæ ab ulcere vesicæ dependet, quod in mucosa mucus a vesicæ cryptis abundanter exillans, qualis in catarrho ex naribus exillit; non vero pus; unde sequetur pyuria vesicalis foetido fluxu insignita nec sponte sanabilis.

Mucus ille quandoque ita copiosus est, ut dimidium matulam impleat referente Hoffmanno, & juxta ipsum provenit a vesica ureteribus quasi coryziæ affectis, juxta *Sennertum* a cacochylia viscida primarum viarum in sanguinem transmissa suppeditatur; ita quandoque ætius est pyurix legitime, ut non nisi a magna excretionis copia distinguatur juxta ipsos. *Vide Bonati Sepulchret. de urinis decoloribus, obs. 22. 18.*

7. *Pyuria lactea* Diemerbroeckii Anat. lib. 1. cap. 17. B.

Est lactis vel chylosæ materiæ effluxus per vias urinarias. *Nicol. Florentinus* vidit juvenem, qui quotidie sine ulla incommoda mingebat lactis quantitatem mediæ urinæ, præter urinam multam. *Capellus* Medicus vidit mulierem quæ dimidium cyathum lactis e vesica excrevit. *Laurentius*, nonnullas vidit puerperas plurimum lactis copiani per uterum & vesicam excrevisse.

8. *Pyuria chylosa*. *Uriae blanchâtres & troubles*. Vieussens Exper. anatomiq. 26. observat.

Pueri sexennes circiter non raro urinas turbidas & albescentes fundunt, sine dolore renum aut vesicæ, & successu temporis sine ulla

O

me-

medicamine jam convalescent, aut ad summum clysmatis & iusculis refrigerantibus sumptis, ab hoc affectu liberantur. Judicat Ill. *Vienfens* hunc colorem pendere a chylo qui per ductus secretorios ipsius vesicæ paululum parulos in vesicam infuit a sanguine secretus.

9. *Pyuria arthritica. Urines blanches & troubles.* Vieussens observ. anatom. 17. & v8. *Urina cretacea* Disert. Frid. Hundermark Comment. de rebus in Medic. gestis vol. X. p. 359. vol. II. pa. 195. Histoire de l'Acad. R. des Sc. 1752.

In prima *Vienfensii* observatione urinz in adulto jamdudum erant albescentes & turbida stacim a mitione, sed diu servatz parte superioris limpide, inferiori vero sedimento sublimato pellucido gaudebant; aderat autem levis dysuria.

In altero casu ab ætate puerili usque ad 45. annum æger urinis albescentes, turbidas & mucosas fundebat; adhibita hydrargyrosi similes mingere perrexit. Uterque autem suppreffa sponte pyuria arthriticus evasit, quod indicat materiem calcaream, arthritidi producendæ aptam prius emitti solitam, in sanguine retentam fuisse, unde arthritidis accessit.

10. *Pyuria a mesenterio* Boneti Sepulchret. To. 2. pag. 696. n. 7.

Virgo dolores colicis similes habuit, & marasmo consumpta interit; in mesenterio ingens copia puris quod natura per renes vacuare tentaverat urinis valde purulentis profluentibus, tamen tamen intacti integri.

11. *Pyuria nigra.*

A transfusione sanguinis vitulini in venas viri maniati. *Transf. Philos.* n. 32. D. *Denis*.

12. *Pyuria virescens*, *Transf. Philos.* n. 27. art. 6. *Stubbes*.

Ab esu testudinis marinz urinz illico luteoviridis & quasi oleosa evadit.

XXIX. LEUCORRHOEA, Castelli Lex. Bonet. Anat. Pr. Lib. 3. *Rheumatismus uteri*, Amati Cent. IV. Obs. 12. *Ulcus uteri* Sennetti; *Fluor muliebris*; *Fleurs blanches*; *Ulcere à la matrice*.

Est humoris serosi, vel flavescens effluxus ex utero aut vagina hujus morbi præcipuum symptomata.

Muco albescente continuo in statu sanitatis maderare muliebria, docet observatio: Muci illius inspissati ramenta in angulis nymphetarum observat *Puzos*. Verum si copiosior sit ille mucus, ita ut extillet etiam extra coitum; tunc leucorrhœa datur, five mucus ille pellucidus sit, five quovis colore præter sanguineum infectus, five purulentus, five spermaticus, five ichorosus fuerit, nec enim dantur limites, qui genus gonorrhœe in mulieribus a leucorrhœa discernant.

1. *Leucorrhœa ulcerosa*; *Fluxus fulvus* Hippocrat. de morbis mulier. lib. 2. *Ulcus simplex uteri* *Puzos* cap. 4. de morbis uteri. *Cyrilli Consult.* 31. Cent. II. *Ulcere à la matrice*.

Est effluxus seroso mucosus parvissimus, nullo fere dolore stipatus, qui post signa vulneris aut levis cujusdam phlegmones in utero succedit.

Ulcuscula qualia in ore apthæ dicuntur, vel exigua in utero fundo aut cervicæ vulnera, supponit hæc leucorrhœa, quæ cum simplici vulgo confunditur, & non raro sponte sanatur, nisi sanguis vitio quodam gravi simul peccaverit.

Ejus principia sunt acrimonia sanguinis, pustulæ in utero, vulnuscula in partu difficili accepta, a manu obstetricis, a violenta sæctus expulsiōe, utero jam sicco & dudum elapso annii liquore.

Curatur ut leucorrhœa simplex.

2. *Leucorrhœa fungosa*; *Ulcere fungosum à la matrice*. *Puzos* cap. 4. art. 2. C.

Cognoscitur ulcus fungosum uteri, 1. effluxu fere continuo vel lymphæ pellucidæ gummosæ, alias sanguinolentæ; 2. eum frustulis carnis adipem concretum referentibus, sed tunc pravo odore; 3. Cervix uteri digito explorata dura & inæqualis in ambitu percipitur, incrassata simul & obducta operculo fungoso, facile lacerabili, quod in alvi defectione vel mingendi conatu etiam in visum incurrit. 4. Fungus ille pedunculo suo intus utero adherens trans ejus orificium progressus capitellum in vagina fungi vegetabilis æmulum refert, ita ut digitus immisus inter pedunculum & orificium uteri libere excurrere possit. 5. Si operculum fungosum uteri cervicem obducens rescetur, novum alius brevi tempore succrescit. 6. Quoniam verò simul fistulosus est uterus, & digito ejus orificium, manu vero hypogastrium premas, figura & durities uteri supra pubem percipitur.

Dux sunt varietates hujus speciei; prima est incrustatio & adhesio fungi cum uteri cervicæ; altera vero est vegetatio fungi, cujus pedunculus in utero latet, capitellum vero liberum in vagina excrevit, nec utero adhæret. Hæc ultima varietas repetita pedunculi ligatura excidit, residuum dein putrefactum ab utero rejicitur, ut constat binis *Clariff.* *Puzos* observationibus.

Prima vero varietas si incipiens sit, etiam curatur; si vetus cum dolore uteri & fæctore mucæ excreti curari quidem potest, sed non sanari: ad sunt lumbago, gravitas uteri inter progrediendum, mingendi difficultas cum dysuria, menorrhagiæ graves identidem recurrentes.

Acrimonia sanguinis huic ulcri fungoso originem pabet; ope diætz lactis præmittendis, & potissimum lenibus cathartics quovis mense iteratis, cum victu selecto & aquarum martialium acidularum, ut Alesienium usu, quandoque sanatur, modo nulla sit syphilidis aut carcinomatis combinatio.

3. *Leucorrhœa syphilitica, fleurs blanches ou ulcère vérolé à l'utérus*. C.

Cognoscitur 1. ex subitanea invasione mali post coitum impurum, com dysuria, fluore flavescens, calore loci, ulcusculis vulvæ, porris vel condylomatibus, pustulis pruriginosis vagi-

nz.

nx. 2. Si spontanea lassitudo, angina, cephalalgia, pervigilium, eruptiones cutaneæ, seu vari subrotundi duri identidem redeuntes, dolores potissimum nocturni similia syphilidis signa concurrant. 3. Si materies effluens sit albo-flavescens non fredda, cum doloribus acutis & pruriginosis, circa menstruationis tempus.

Curatur ut syphilis; scilicet post præmissam phlebotomiam & cathartica dicta lactea usurpatur, & præmissis quadraginta aut quinquaginta balneis, hydrargyrosi parca manu adhibetur, ita ut unguenti Neapolitani tres circiter drachmæ inungantur qualibet vice usque ad quatuordecim vel plures dies, non deposita per quadraginta vel plures dies linteis unguento imbutis: possunt etiam decocta lignorum ut guayaci, falsæ parillæ, sassafras, nec non panacea, vel aquila alba usurpari si hydrargyrosi nequeat.

4. *Leucorrhœa cancerosa; fluxus niger & fulvus* Galen. definit. *Gancæ à l'uterus. Ulcera carcinomatosa de la matrice* Puzos pag. 274. Artic. 4. Tralles de Opio Cap. 1. p. 54. C.

Illam speciem præcedunt menorrhagiæ, cum dolore mediocri, apud feminas præcæritim quæ pluries perperæ; demum accedunt dolores atroces, lancinantes, continui materies non purulenta sed ichorosa, rufescens, saniosa & foetidissima diffudit, interpositis menorrhagiis anomalis; pressio abdomine dolor exacerbatur.

Hic morbus infanabilis est nisi prima ejus initia sagaci Medico innotescant, regimen edulcorans, anodyna, injectiones ex decocto hordii & melle, ex succo solani & plantaginis, dicta lactea morbum palliant.

5. *Leucorrhœa Americana.* Guill. Pisonis cap. 6.

Ex iisdem principiis oritur ac asthenia Americana. Mulieres sunt pallidæ, tristes, obstructæ, viris ingratae, & uteri profluvia alba patiuntur, ita demum debilitantur ut de corroborantibus, non minus quam de evacuantibus in illis curandis cogitandum sit.

Cura. Balneis artificialibus ex fragrantibus herbis adstringentibus & calefacientibus, nec non aperientibus, scilicet jusculis, apozematibus, maxime vero pulvere Guayaci & scoriz ferri per mensem usurpato curandæ sunt; adde syrupum tabaci & mel aromatizans mixtum; non neglectis lenibus catharticis, Syrupus autem tabaci sit ex succo tabaci recenti, sed aliquandiu digesto, qui proinde vini emeticam amittit & cathartiram, addito etiam oxymelle.

6. *Leucorrhœa Indica* Couzier Journ. de Med. Decemb. 1757. C.

In Insula Bourbon vel Mascarenbas Africæ mulieres leucorrhœa frequentissime laborant ex eo quod usus est in partu genitalia aliquatenus lacerari; adde quod in fervida hac regione mulieres balneo omni tempestate, etiam dum menstrua fluunt, uti solent, mosque a balneo domus aqua continuo aspersas subeant, ubi frigus percontant. Virgines & nuptæ steriles ab hoc morbo sunt immunes.

7. *Leucorrhœa scirrheosa.* Vide Astrucium lib. 2. de scirrhu uteri; *Flusso bianco* Nicol. Cyrilli Consult. Medic. 37. cent. 2. *Sanguituvio* Hispanis: C.

Est ea species quæ ab uteri scleromate, seu scirrheosa duritie fovetur quæque quotis mensibus occupat catameniorum intervalla in menstruatibus, quandoque ciet catamenia vaga in anæsthesia, & uberrima in junioribus, ac tunc temporis accedunt tormina uteri cum catameniiis.

Signa sunt pallor faciei, debilitas corporis, oedemata pedum, anorexia, pervigilium, tinnitus aurium, moror, sanguis catamenialis serosus, loturæ carniū similes, dein mere serosus, per intervalla iterum subcruentus, dolores torminosi alteri, crescent secunda die catameniorum, tertia, vel quarta evanescent, non sunt vividæ, sed ejus indolis quæ mulier continuo truncum, membra, loco mutare cogatur quasi irrequieta ac identidem sibi videatur pollice vellicari omnes partes uteri vicinas. Vide *hysteralgiam catamenialem*.

Cyrillus in principe muliere quinquagenaria, leucorrhœam identidem subcruentam patiente, cum pallore, debilitate, anorexia, adhibuit hyeme limaturam ferri vel cincturam ejus cum vino, parvam identidem dosim rhei tosti cum paucillo macis & nucis moschatæ, bis in mense, atque his per duos menses continuatis suavit ut ante prandium trihorio decoctum calidum roris marini, vel lamii Archangelicæ dicti ad tres uncias identidem sumeretur, tamquam medicamentum in leucorrhœa expertissimum; ut egra violentos morus atque otium fugeret, cibis salubris, crudis abstineret, animi pathemata moderaretur. An sanguiluvium cui omnes fere mulieres Valentianæ apud Hispanos post partum sunt obnoxie, & in quo loturæ carniū similis est fluxus uterinus; isque pertinacissimus ad hanc speciem attineat, inquirendum: curatur thermis Baregiensibus.

8. *Leucorrhœa gravidarum; Aqua profluens ex utero* pregnantis Rod. a Castro, lib. 3. cap. 19. *Aqua ex utero effusa*, Sennert. lib. 4. part. 2. §. cap. 6. *Ecoulement des eaux*. L.

Lympha nutrita concretescibilis ad ignem quæ in anni cavitate, ut albumen in ovo recondita est, quæque crescit crescente foetu, ejusque pabulo inservit, debet tantum in partu ipso effluere, ut viam foetui lubricam & facilem reddat, quod per ruptionem involucri fortis subito accidere solet. Si vero hæc lymphæ vel subito vel stillatim longe ante partum effluxerit inde difficilior futurus est partus, & infelicior.

Subito & præmature effluunt aquæ ex involucri fortis, si hæc involucri lapsu, saltu, vulnere rumpeantur, atque tunc illico cum impetu ad libram unam aut alteram simul & semel ferre sit effluxus, quod abortum etiam secum trahere potest; cum eadem causa quæ involucri rumpit, sæpe foetui noceat, vel utero; tunc

regimine gymnastico & dietetico eodem modo sunt curandæ mulieres, ac si partus instaret, atque ne arefcat nimis via fœtus caleanda, butyro infuso quotidie ea lubricanda est, usque ad partum, viresque ægræ conservandæ.

S. *Leucorrhœa* Nabothi.

Si vero humiditas tantum ex utero effluat longe ante terminum legitimum, qualis per aliquot dies solet effluere ante partum, mucosa scilicet, vel rosea, vel viscosa pellucida, quæ suppeditari solet a glandulis Nabothi in uteri orificio latentibus, tunc laxitatem harum glandularum & caecohymium serosum prægnantis hoc designat, quod cum sœtus robore vix consistere potest: adeoque examinandus est prægnantis status; si enim juvenula & plethorica sit, tunc plethoram imminuere oportet victu pariori, phlebotomia; si vero habitus cachecticus serum luxuriare significet, utendum est roborantibus, ut morsulis ex margaritis, eoraliis rubris, terra cætechu, caryophyllis, maci, nucæ moscata, conferva rosarum rubrarum, syrupo myrtino, imo ad magis adstringendum bolus amena, terra sigillata adhibenda est.

XXX. GONORRHOEA *Gonorrhœa*.

Est morbus cujus præcipuum symptoma est fluidi puriformis aut seminiformis effluxus stillativus ex urethra in utroque sexu, vel ex vagina in feminis.

Differt a pyuria quod etiam cum nulla sit mictio, effluat materies in gonorrhœa, quod non accidit in pyuria; unde liquet sedem huius humoris esse circa sphincterem vesicæ in gonorrhœa, ultra vero in piuria; in utero vero dum est leucorrhœa, pauca est, & stillatim elabens in gonorrhœa, ubertim vero mingunt in diabete Anglico.

Quoniam semen inter & pus, dum elabuntur stillatim ex urethra, non dantur limites quibus distingui queant, nisi forte microscopii intervenitu, quo semini sano & fertili virorum videtur insille animalcula, ad idem genus pertinent, utriusque humoris effluxus.

1. *Gonorrhœa pura*; *Gonorrhœa simplex*.

Est feminis effluxus stillativus ex urethra in viris sine dysuria ac libidine, nec ab impuro concubitu dependens; talem excitant abusus cerevisiæ, (quæ sanatur potu aquæ vitæ) clymata calida, equitatio apud eos, in quibus copiosum est semen vesicularum, & non levis est ad ejus effluxum dispositio; verum hoc accidens est fugax & nullius momenti, nec generationi obstat. Verum momentosum est nulum & generationi obest gonorrhœa quæ habitualis evasit, quod accidit laxatis aut erosio oculis excretoris vesicularum, tum ab abusu repetitum horumce organorum, ut accidit sordis masturbatoribus, quorum plurimi deinceps semen retinere nequeunt, & in alvi depositione sine sensu effundunt; hoc accidit etiam a repetitis gonorrhœis virulentis

alias acquisitis, & sanatis quoad virulentiam; Cura vero huius mali exigit vitæ castimoniam & injectiones adstringentes in urethram factas, ex decocto quiescit, millefolii, malicorii, & similibus; potum etiam ex similibus decoctis.

2. *Gonorrhœa libidinosa*; *Satyrasis strâsingullor*, Deidier Consultation 43. tom. 1. pag. 301. B.

Est effluxus feminis involuntarius frequenter repetitus, sine erectione, cum intensa libidine.

Differt a satyriasi & priapismo per defectum erectionis; ab onerosmo, per eundem defectum, & quod etiam vigilando accidit. Monachus, qui Ill. D. Deidier consulabat, hoc morbo dudum laborans, plura medicamina incassum adhibuerat, ut balnea ipsa frigida, in quibus pluries accidit fluxus feminis involuntarius libidine acri stipatus; cum penis arrigebat, tunc pollutio nulla, & libido seu cupiditas veneris languidior erat; decussatis eruribus, æger a libidinosis illis emotionibus immunis erat; assiduo ineumbens, & in loco vel lecto calidiori his malis gravior affligebatur, nec non ab usu castæ. Sublecebatur autem usu frequenti chærefolii.

Præscripsit Ill. Deidier usum crucis in acetarii usurpandæ, iustula refrigerantia ex pullo, feminibus frigidis, & foliis chærefolii, denique aquas acidulas, & noctu narcoticum, quo succellu nescio. Notum autem est quod excitat ad venorem turbarum eruca maritima, unde minus indicata videtur hæc herba. Quoad scrupulos qui libidine angentur Monachus, metuens ne peccatum in hac libidine subestet; eos continentibus suadebat Professor, nec magis metuendum illum seminis effluxum quam alvi aut urinx incontinentiam, quippe ubi nulla voluntas, nullum est peccatum; interea a voluptate ad assensum voluntatis via est maxime lubrica. De cætero Professor calculum in vesica huius morbi principium esse suspicabatur, & sedem morbi in prostaticis, non in vesiculis seminalibus reponerebat.

Simili morbo laborabat puella religiosissima, quæ ad pedes sui Confessarii, senis admodum infecti, pollutiones involuntarias pariebatur, & scrupulis ad insaniam sæpe adigebatur; præscripti antiaphrodisiaca plurima; sed eventum ignoro.

3. *Gonorrhœa onerosa* Cæli Aureliani de epilepsia; *Onerosmo* Foehi. *Gonorrhœa simplex* Clariss. Tissot pag. 257. *Pollutio involuntaria* D.

Est involuntaria cum libidine & erectione feminis frequens ejaculatio ab insomnio libidinoso excitata; nomen procedit a Græco *onerosm*, de veneris somniis. Si voluntaria & frequens sit feminis ejectio, vel ea est legitima, ut apud uxoratos, & recas nuptos; vel illegitima, ut apud ganeones & masturbatores, de quo insani vitio legatur liber Clariss. Tissot, D. M. apud Lausannenses, de Onanismo, & Libellus de morbis ex masturbatiōne.

A. fræ

A frequenti, præcocique feminis ejectione superveniunt morbi plurimi, maxime vero apud hypochondriacos, ut asthenia, tabes dorsalis, sterilitas, anorexia, agrypnia, epilepsia, amnesia, hypochondriasis, anasarosis, flusulentia, palor, &c.

Venus quidem moderata, ut docet *Sanctorius*, omnes facultates roborat, sed immodica orbat sanguinem illo fluido volatili hircino quod a testibus secretum, dein reformatum barbam, vocem virilem, robur vigoremque inducit. Hoc orbatu homo laborat primo venericulo, dein oculis, extenuatur, pallet, debilitatur.

Scelera sunt, ait *Ill. Tissot*, quæ tarda sequitur poena, & hac non carere manipulatorum demonstratum est, sed præterea cito & acerbamente, corporeque plestantur, turpitudine notantur, omni privantur excusatione & solatio, impia sunt sepe auxilia; nullum ergo datur crimen quod cautius vitare debeat quicumque nondum desipit.

Curatio exigit ut ægri abstineant a condimentis, utantur cibis bonæ & facilis digestionis, nec non lacte & kinkina, non neglectis balneis frigidis, roborantia vero & nervina genitalibus admoveant.

4. *Gonorrhœa syphilitica. Chaudépisse, gonorrhœa virulenta. D.*

Est ea quæ post impurum concubitus initium dysuria accidit; alia est prima, alia secunda. Qui primo gonorrhœam virulentam experitur, ut plurimum gravi ardore urinae & puris viridescens stillicidium & balneo mulctatur; aut sive gonorrhœa recidivat sine impuro concubitu, vel sine nova eo modo acquiratur, ut plurimum dysuria minor est quam prima vice nulla; mulieres autem, etsi pus viridescens fundant, in prima gonorrhœa raro dysuria laborant, quia sedes ulcusculorum hoc pus fundentium est tunc temporis ab urethra distans. Interea si nictio indolens sit, coitus aliqualis doloris non est expertus, nec tetra illa cloaca a foetore est immunis.

Inveterascent gonorrhœa dysuria recedit, pus colorem flavescens & demum album adipiscitur, dolores, tencigines remittuntur, una aut altera guttula exprimendo & balneo fluat, & indursum contaminat muco flavescens per siccitatem quo lineam rigescit scissendo.

Stillicidium illud sponte ut plurimum intera mensē evanescit; si vero ulterius perseveret remediis etiam diutissime resistit; si citius aut quovis tempore adstringentium interventu reprimatur, succedunt ulcuscula, porri, thymi, verrucae, pustulae, aliaque syphilitica phaenomena, nisi prius viru syphiliticum profligatum fuerit: ut itaque illud vitetur infortunium in gonorrhœa virulenta curanda, 1. phlogosis, ardor, tencigo debent debellari phlebotomia, peisanis emulsionatis, fonticis emollientibus. 2. Debellatis his symptomis ulcus detergi debet usu radicis nymphaeae, balsami de Copaiiva vel Canadensis, & lactis. 3. In usu lactis frictio-

SAUVAGES Nosologia Methodica. Tom. II.

nes aliquot ex pomata Neapolitana adhiberi debent circa partes effusas. 4. Demum sublato viru, si stillicidium perseveret; ad adstringentia confugiendum; sed quod tutius est, aquæ acidulae Alesienæ aut Vallenses per octiduum epotandæ, quæ eundem scopum attingunt. In hoc casu laudant Viennenses kinkinam, rheum tostum absordentibus, essentiam pimpinellæ, balneum roborans.

Virulenta primum inflammant, dein exulcerat, & rodit in gonorrhœa diversas partes, potissimum vero vesiculas seminarias ac prostates in viris; unde perinæ tumor, dolor, calor, dysuria, stranguria; & hac suppessæ tumunt, calent, dolent testiculi, quod vulgo dicitur gonorrhœa in *scrotum delapsa*; vel potissimum afficiuntur in viris glandulae urethrae *Covperianæ*, *Listrianae*, sed raro solæ, & tunc dolor in illis urethrae locis perferitur; quandoque penis tortuosus evadit inter erigendum, atque ea vocatur gonorrhœa *cherdata*.

In feminis afficiuntur etiam, vel prostate Bartholini, seu lacunæ Graafii, quæ urethrae assident, unde dysuria; vel tantum afficiuntur glandulae sebaceæ, per vaginam & vulvam disseminantur, unde harum partium calor, dolor, forditas, & raro dysuria, nisi urina fluens hæc ulcuscula lambat. De hoc morbo consule *Ill. Astrucius*, qui instat omnium est, nec non *Vf. Cockburne*, qui fulse de gonorrhœa scripsit.

Gonorrhœa sicca Astrucii ad dysuriam attinet.

Gonorrhœa habitualis, *Gliste* Anglorum, est idem ac inveterata.

5. *Gonorrhœa spuria Astrucii lib. 3. cap. 3. §. 2. L.*

Est stillicidium puris aut mucii purulenti ex corona balani & præputio ab impuro concubitu oriundum. Hæc species minime rara est, & facile dignoscitur; stipatur quandoque ulcusculis, *chancres* dictis, & tunc temporis phimosis sæpius accersit; accidit ganeonibus quorum balanus præputio rectus est; tunc enim inter præputium & balanum pur virulentum in coitu facile sagitur, sed etiam diu fartum rectum remanet; unde calore & mora acrius factum glandulas odoriferas subit, inflammat; exulcerat; in apellæ vero facile abstergitur post impurum concubitus.

Ea species quandoque pertinacissima est, si hydragryosis non adhibeatur, exigit vero 1. frequentes lotiones ex decocto tepido radicium althææ, immerisiones in lacte, & sedata phlogosi, ac dysuria quam post mictionem excitat, 2. ad hydragryosum deveniendum. Vide curam fusorem apud *Illust. Astrucium*.

6. *Gonorrhœa balani. Gonorrhœa pura du præputio. L.*

Est ea quæ sine ullo viru syphilitico præputium afficit, atque stipatur huius ac balani rubore; levique phlogosi, mucii flavescens, olidi parco stillicidio, ac sub finem mictionis dysuria, ob guttulas urinae præputium subeuntes, quod in recutiis nunquam accidit.

Hoc vitium pendet a singulari acrimonia sanguinis, quæ ob affinitatem cum odoriferis corone glandulis ibi fecernitur, & quamdiu durat levis illa excretio, tamdiu durat levis illa gonorrhœa, quæ nedom periculosa sit, sæpius salubris est, & ophthalmias aufert; interea sanguis edulcorandus & diluendus est, quod præmissis jusculis ex pullo, cichorio, acetoso præstant balnea.

7. *Gonorrhœa leprosa* Leviti capitul. 15. Junckeri.

An simplex, seu pura fuerit gonorrhœa; an vero a viru leproso dependens, judicent alii.

XXXI. DYSPERMATISMUS; Auctor clariss. D. Cusson D. M. M. *Impuissance d'ejaculation*.

Est seminis in actu venerico stillatitia, tarda, impedita, & ad generationem insufficientis emissio.

A Græco *dys*, male, infeliciter, & *Spermatis*, seminis.

Ue recte procedat opus fecundationis necessum est ut fiat coitus, seu erecti penis in vaginam immisso; dein ut fiat boni seminis ejaculatio, quæ recta in uterum tendat; si itaque penis flaccidus sit, tunc vel nulla, vel debilis erit erectio, seminis aderit emissio stillatitia, non ejaculatoria; idem accidit si semen sit aquosum, iners titillandis vesiculis, & erectioni proritandæ impar; si urethræ nodi, angustię, obliquitas, ejus orificium, rectam, celeremque ejaculacionem impediunt.

Differt a gonorrhœa, quod extra actum venericæ, & continuo sine libidine stillet humor in gonorrhœa, non in dyspermatismo qui in coitu tantum emittitur. Ab anaphrodisia, quod non si essentialis voluptatis defectus in dyspermatismo.

1. *Dyspermatismus urethralis; Tarda seminis emissio a morbis urethra*, Frid. Hoffmanni de gravi spasmus & dolore vesicæ obs. V. de la Peyronie Mem. de l'Acad. de Chir. T. I. p. 425. Petit ibid. p. 434. Sharp Recherch. crit. p. 205. André Obs. Prat. sur les maladies de l'urethre p. 113.

Character hujus speciei deducitur 1. ex signis genericis; 2. ex vicio urethræ ipsam angustan- tæ; porro multiplici vicio affici possunt urethræ parietes interni, nimirum intumescentia substantiæ, qua constat, spongiosæ, tumiditate glandularum ipsi adjacentium, varicibus, ulceribus ad margines alatis, spongiosis, callosis, cicatricibus eminentibus, duris, crispis, duplicaturis membranaceis, habenis, contractione, vasorum ejaculatorum mutata directione.

Vitiorum urethræ modo dictorum diagnosi possimum habetur ex immixtione catheteris, vel candelæ in urethram, necnon ex vicio urinae multiplici sæpius observando. Signa quibus obtineri potest vicii singuli specialis cognitio, hujus loci non est ut congeramus; apud Aucto-

res varios, qui morbos urethræ persecuti sunt, legenda.

Susplicari potius quam dignosci potest Peyroniana varietas. Prima hæc dyspermatismi species morbi urethralis, cui debetur, prognosim sequitur, quæ cum ex plurimis circumstantiis numerosioribus certo, quam ut hic recensetur, varianda sit ab Auctoribus modo allegatis mutuanda venit.

Speciei hujusce obtinetur curatio, si urethræ æqualitas ac diameter nativæ restituantur. Porro adversus vitia urethram angustantia varix excogitatae fuerunt medendi methodi, quarum præcipuas indigitavimus.

1. Exoleverunt corrosiva candelarum ope urethræ immissa, quæ inutile, periculosum, noxium in hac ægritudinis specie medicamentorum genus hodie habentur; atamen ægrotos non paucos obicem in urethra gerentes, candelis ex linteamine cerato factis, subtilissimo sabine pulvere ad exiguum vim conspersis, levatos mox & curatos gloriatur *Petis Mem. de l'Acad. de Chirurgie*: curationem obice destructo perficentibus candelis sumptuosis ex emplastro epulotico de cerulla ulla, de lino carpato, aut Nurembergen- si paratis.

2. Commendat idem Auctor sectionem chirurgicam incisioni lithotomicæ similem, quam successu constanti confirmari, & candelis simplicibus, aut catheteribus plumbeis longe præcellere asserit, si rite instituantur. Porro in hunc modum celebratur sectio hujusmodi. Aegro præparato & immisso in urethram, dum locus target vesicæ, catheter sulcato ad apicem aperto, inciduntur cutis & adeps ad duorum pollicum longitudinem, & in catheteris sulcum scalpellus adigitur, qui ad extremum usque sulcum decurrens viam sternit acui trisupidatæ, ac tubulo pariter sulcato incluse, ut in vesicam penetret, facile ac tuto subeundam, si demissa manu osium pubis flexura superetur; acui & tubulo extracta, fluunt urinae, & ope sulci in tubulo extrati scalpello inciditur locus urethræ arcatus: abique negotio tunc intramittitur in vesicam cannula exigua, ibi loci relinquenda, donec sufficientem suppurationem passus sit urethræ canal: educta tum cannula per balani orificium intramittitur in vesicam catheter symoidæus, quo effluit lotium, dum cicatrix interea efformatur. Sunt qui jam dictam sectionem adhibuerunt adhibitis corrosivis, quibus denudatum sectione obicem excusum voluerit, frustranea prorsus, imo & nociva opera, cicatricem inducunt excipiente majori urethræ ar- ratione.

3. Deventum est ad remedia mechanica, quibus locum urethræ angustatum dilatandum fore sperabatur: hinc usurpatæ fuerunt turundæ cera, aut unguento oneratæ; & sensim incrassandæ, quæ filo alligatæ, ut extrahi possent, ope cannulæ argenteæ cavo donatæ, & utrique apertæ, necnon styli, quo pelli possent, ad usque contractionis scdem, adigebantur; edu-
bantur

bentur tunc annula, relicta super obicem per horas aliquot turunda, quæ iis elapsis, opem sibi extrorsum penduli extrahebarur. Experientia compertum est loci affecti dilatationem partium urethræ utrique turundæ extremo respondentium contractione excipi. Hinc etiam in usum vocari sunt catheteres plumbei, qui primum tenues, sensim crassiores in urethram immitti debent.

4. Tandem his omnibus palmam subripuerunt candelæ simplices & compositæ, quales habet *Duran, Goulard, Sharp, &c.* Silemus ingredientia quibus constant, modum quo componuntur, dimensiones quibus gaudent, variam ipsarum adhibendarum rationem, tempus in ipsarum applicationem infundendum, aliæque id genus apud citatos Auctores passim legenda.

Sequentia circa variarum candelarum usum satis sit annotasse. Candelæ simplices, e tela scilicet & cera tantum factæ, præstant semper catheteribus plumbeis, & sæpissime malo depellendo sufficiunt: ratio est quod obices urethram arctantes sunt utplurimum huius canalis varices, quas primum, sustentant, delectur citra irritationem candelæ huiuscemodi. His etiam, necnon catheteribus plumbeis gradatè incrassatis curatæ sunt urethræ contractiones: in casu glandularum urethræ rumenium, cicatricum elevatarum, ulcerum margine tumidorum, callosorum, intumescensiarum textus urethræ spongiosi induratarum, & similium, candelæ *Duranianæ, Goulardianæ* curam & citius & certius expediunt, dolendum quod irritatio modo maior, modo minor earum usum sequatur; huic occurritur, quantum fieri potest, si candelis varia impertiatur energia, & a mitioribus ad potentiores successive transitus.

Aquarum Selteranarum usu ad plures menses protrahito pro potu ordinario suum ægrotum cum sanitatem in gratiam reduxit *Hoffmannus*.

2. *Dyspermatismus nodosus; & Tarda seminis emissio a nodis corporum cavernosorum* La Peyronie *Mém. de l'Acad. de Chirurg.* Tom. 1. pag. 428. *Nota pudendi distorsio* Schenckii ex Arantio de Tumor. præter naturæ cap. 50. *Nodus penis* Clar. *Lieutaud* *Compend. Med. Pract.* pag. 533. L.

Pluries observavit La Peyronie in corporibus cavernosis protuberantibus nodis, aut gangliis firmis, duras, indolentes, erectionem ita depravantes, ut si seriem efferment concatenatam dispositæ difformis ac gibbis plena sit mentula arrecta; si medium corpus cavernosum dextrum, sinistrumve occupent; dextrorsum, vel sinistrorsum incurvetur penis erectus: sursum vero, aut deorsum, si supernam, aut infernam eorumdem corporum partem teneant. Vigente iam dicta corporum cavernosorum labe, dolore quandoque non vacat erectio validissima, nusquam exinde impeditur liber urinarum fluxus; seminis ejaculandi non eadem est ratio, quod et si & valis ejaculatorii effundatur cum vi debita, et non minori forte voluptatis sensu; attamen ex ure-

thræ orificio stillet, remittente erectione tantum; longove post voluptatem perceptam intervallo pullatim effluere incipiunt. *Vide observat. a La Peyronie relatas loco citato.* Hunc dyspermatisum specificè determinat nodi præsentia, qui vigente erectione facilius cognoscendus, & pro causa cellularum quarundam corporum cavernosorum laxitate agnosceus, earum est quædam herniæ species ex celeb. *Lienard*, potius corporum cavernosorum quasi aneurysma dicendum. Nodi penis viri venerei ut plurimum effectus sunt; hos tamen in duobus viris nulla usquam labe cypria tactis observavit *Lu Peyronie*; uno & in senibus qui servidiori temperamento plus æquo indulserunt; rara non sunt huiusce affectus exempla. Emollientibus ac resolutivis variis auscultari renuunt hæc protuberantiz; neque veneres ipsas fugat hydragryrum. Aquarum Bellilucanarum, Borbonienium vim eludit malum, solis Boregienibus resistere nescium, ex *La Peyronie* iraque in protuberantias huiusce modi instituendæ sunt multiplices imbrocationes, qualiter tempestate iterandæ, donec penitus evanuerint: redit tunc peni arrecto forma nativa, & emissio semine jactus celer & saltuosus. Notabis fallere in casu venereo efficacissimum hocce remedium, si prius adhibeatur quam hydragryoseos ope, ex humorum massa penitus exules labe syphilitica; hanc ubi unctiosis mercurialibus debite celebratis debellaveris, aquas præstas integer in nodos superstitres manebit successus; probat *sexta La Peyronie observatio*.

3. *Dyspermatismus præputialis, sive phimosischus, Tarda seminis emissio ab angustiori præputii orificio* Schenckii ex Arantio de Tumor. præter naturæ cap. 54. L.

Pars præputii extrema, vitio, vel congenito, vel accidentali, ita exiguo foramine prædita esse potest, ut non solum glandem detegi prohibeat, verum etiam interdum urinz expulsionem & seminis ejaculationem renoretur, ubi præsertim orificium præputii glandis foramine angustius est. Testatur *Arantius* se non semel vidisse homines, ob præstaram præputii stricturam tardiori seminis emissionem, & impotentia laborantes, adhibita convenienti medela semen jactu debito profudisse, & prolificos factos fuisse. Porro hæc ipsi non alia fuit quam sectio chirurgica, qua phimosis veneræ auxilii incruentis immorigera tollitur. Præputii stricturæ nimis accommodatum pariter præsidium est circumcisio. De bina hacce operatione legantur Auctores Chirurgici. Notabis præputium orificio angustius ex utero allatum ætate crescente sensim & spontaneè utplurimum dilatari, neque modo dictis operationibus locum esse, nihil in viris quibus virium hocce, nec sponte, nec remedium mitiorum ope evanuit.

4. *Dyspermatismus mucosus, sive catarrhalis. Tarda seminis emissio a mucosæ urethræ inflammatione*, observante D. S^{us}. perito huiusce Ur-

his Chirurgo & Reg. Scient. Societ. Social. L.

Viro annos quadraginta nato, vegeto, ceterum sanissimo, ita augebatur liquoris mucosi visciditatis internæ obliuientis, & lymphæ viscidæ per urethræ glandulas percolatæ excretio, ut mucus per penis expressionem stillante infarciretur urethra, & hujus copiam maximam urinæ secum foras educerent. Supra quartam urinæ emissæ partem fere ascendebat mucus ipsi mixtus. Morbus erat qui cum albo mulierum fluore magnam alie convenientiam; neque multum abludabat ab illa gonorrhœa nothæ specie, quam benignam vocavit *Frid. Hoffmannus*; catarrhalis vero nomine salutant Auctores nonnulli ex *Ettmullero*. Similem morbum *Frid. Hoffmannus* sub titulo rari vesicæ adfectus; & *eleb. Lientaud* sub vesicæ fluxus catarrhalis nomine describunt. Id vero discriminis inter Auctorum modo laudatorum ægros & nostrum intercedebat, quod in nostro, simili vitio vesicæ simul & urethræ tentarentur, & exularent dolor vesicæ, ardens mictio & acrimoniæ signa. Cave pro vesicæ calculo, renum ac vesicæ ulcere, & gonorrhœa vera cum excretionem mucosam combinata, affectum vendas de quo loquimur: Catarrhus fuit vesicæ & urethræ. Partes hujusmodi eadem laborare posse defluxione, quæ in ærium, otis, bronchiorum membranas sæpissime depluit, credunt magna nomina *Lientaud* & *egregius Senac*. Porro sequentia incommoda patiebatur vir jam dictus, si coitus indulgeret: probe ipsi erigebatur quidem virile membrum; grato veneris sensu, minus licet quam antea intenso, titillabantur genitalia: ast quod olim ipsi rapido jactu emovebatur semen, hoc jam mucus irretitum at permixtum sensum reddebat urethra citra tamen intersectam a voluptate persistente moram. Character specificus ex signis genericis deducendus venit, & catarrhi præsentia cuius prognosim speciem hujusmodi sequitur. Hanc curabis, si vesicæ & urethræ catarrhum noveris depellere. Atqui huic compertum varia remedium genera, quæ leucorrhœæ acrimoniæ experti prohibent, necnon ea medendi methodus, quæ gonorrhœam catarrhalem debellari vult *Ettmullerus*.

In casu Lientaudiano natura & expectatio morbo sanando satis fuerunt. Aquas Spadanæ, essentiam cascariillæ succini essentia maritimarum, succinum præparatum, potum ex salsæparillæ, scorzonæ, & similibus decocto ægro suo injunxit *Hoffmannus*.

5. *Dyspermatismus hyperionius*; *Tarda seminis emissio a validiori penis erectione. Seminis in actu venere retentione.* Cockburni *Elisæ d'Edimburg* Tom. 1. art. 35. L.

Nobilis Venetus, annos natus duos & viginti, cum muliere pulcherrima, quæ sibi in uxorem cesserat, rem habens, semen nunquam ejaculari poterat, quamvis per insomnia pollutiones nocturnas pateretur. Quod cum sibi & pa-

rentibus curam injiceret, frustra tentato Medicorum Venetorum auxilio, per Legatos Republicæ in variis Europæorum Principum Aulis degentes consilium a famigeratissimis Medicis petiit, ut sibi causam & remedium tam itupendi aperirent mali, quod vigilentem ea defraudabat facultate qua pollebat dormiens. Visum est *Cockburnio* morbum harere urethra, quæ inter coeundum per validiorem erectionem ad obturationem usque fere constricta, tantam seminis exitui obiciebat resistentiæ, quantam vincere non poterat liquor hujusmodi in ipsa effusus, & per potentias ejaculatorias propulsus: in insomnia vero ob minus validam penis erectionem, urethra non arcte adeo constricta, semini erumpenti congrua patebat via. Ex *Dyspermatismo spasmodico epileptico* intelligi possunt & modus & tempus, quibus sub restri veneris remissione effundebatur semen. Morbum debellatur dieta tenuis, refrigerans, humectans, necnon tenues evacuationes.

6. *Dyspermatismus epilepticus*; *Tarda seminis emissio ab epilepsia spasmodica in coitu adveniente, observante D. B***.* Coët. Monspel. clariss. & in Nosocom. Sti Eloiis Med. Vicar.

Vir quadragenarius, temperamento sicco donatus, amare conjungi nuptus, absque prole erat ab annis duodecim, cuius uxor causam florilitatis suæ, quæ ipsa erat viri impotentia, ut Medico prælaudato aperiret, narrabat 1. quod maritus ad rem veneream capellendam alacris, eam tanta petulantia persequatur, ut ad medium opus in ipsam concideret toties membris rigidus, sensu & loquela orbatus, & gravis adeo tactus, ut in alterum lecti partem præ oneris impotentia viribus collectis ipsi excutiendus veniret: 2. quod per novem, decemve annos adeo brevis paroxysmus fuerat, ut prima vice ad se rediret sponsum, dum ipsa timore perculsa opem admoveere solinabat: 3. quod a duobus tribusve annis invaderet malum, accedente scilicet oris spuma, neque tam cito sensu redeunte: 4. quod tandem, remittente corporis rigiditate, effluat semen ex urethra paulatim, & membro flaccido exituriens. Frigida in lumbos denudatos paroxysmi tempore ex alto ad tres vices projecta epilepsiam non fugavit; observatum est tantummodo hujus stimulo epilepticum egi ut artus inferiores retraheret. Ad morbum debellandum varia usurpata sunt remedia, nimirum venæ sectiones iteratæ, cathartica pluries repetita, balnea ad plures menses protracta, jussula refrigerantia, lacticia; quibus minus proficiuntibus, tandem radix Valerianæ sylvestris ad tres menses in infuso & in substantia exhibitâ fuit. His omnibus peractis, (erat annus quo celebs vivebat,) plenarie convaleuit, rem jam habens cum uxore integram, mente ac sensu illibatis, & rapido jactu proficiente semine.

7. *Dyspermatismus apollodes*; *Nimis tarda seminis*.

minis excretio a genitalium ignavia, Aetii Tebr. 3. Serm. 3. cap. ultimo; Matth. de Gradi Conf. 69., Amati Lusitani Cent. II. cur. 18. & 81.; Marc. Donat. Hist. Med. Mir cap. 18.; Schenckii ex Hollerio Lib. IV. de Impot. vir.; Foresti Lib. XXVI. obs. 18. & 19.; Veslingii Ep. & Obs. Ep. 38.; Eemuller de morb. vir. cap. 2. p. 459.

Hujus speciei duæ sunt insignes varietates: in altera penis erectio toto veneris tempore; una in culpa est emissio seminis, quod paulatim ac lento rivo funditur. In altera præsentæ etiam seminis emissio tarditate, peccat membri virilis erectio, quatenus vel nulla prorsus est, vel debilis sit, vel ante absolutam venerem cassat; ipsa inveniunt sufficiens posterior hæc nunc a solo erectionis vicio, viribus ejaculatoriis illæsis, sobolescere potest; nunc vero cum priori varietate combinari.

Singularem hujusce speciei characterem sistant fractæ erectionis, ejaculationis, vel utriusque simul vires. Manifestum est erectionis deficientis, infirmæ, non satis persistentis, vitium. Vires ejaculatorias labefactas esse potissimum cognoscitur 1. explorata sub seminis emissionem, imo sub guttularum urinae ad mictionis finem in urethra resistentium ejectione vibratoria, penis radice, quæ minus intendi, debilius contrahi, imbecillius concurri percipitur, 2. ex minori quam vulgo inter ejaculandum observari solet urethrae & balani intumescencia; 3. ex defectum causarum quibus species dyspermatismi reliquæ natales debent: 4. ex principiorum progressionem, quibus debilitas, dyscinetia inducuntur, quæ præ maximo ipsorum numero hic non recensenda, ex aliis morborum generibus petenda sunt. Si cum erectionis defectu, aut debilitate combinentur modo dicta, varietatem hujus speciei alteram cum prima complacari indicium est.

Dyspermatismi apraxodæi curatio adversus causas erectionem, ejaculationem, vel utramque impediendes dirigenda est; quæ cum numero luxuriante, & de cætero apud Auctores plurimos ipsarum expugnandarum ratio declaratur, in aperiendis, quæ ipsas tollunt, auxiliis operam non locabimus, breviter studentes. Monuisse in universum satis fit sæpius in hac specie stimulantibus, roborantibus, antiparalyticis, excitantibus, aliisque id genus medicamentis locum esse.

7. *Dyspermatismus serosus*. L.

Est ejaculatio seminis aquosioris, adeoque ad genem incepti, quæ species est frequentissimum sterilitatis virilis principium; hujus exempla prostant apud *Ermullerum*, aliisque plurima.

Semen aquosius idque copiosissimum in coitu effunditur, sub mollissima & momentanea erectione; illud enim nimis effortum est quam ut debite titillare possit, & sine titillatione nulla nisi arte coacta erectio. Item intentabat nuper marito suo mulier Italæ, quod ab octo annis nuptæ prolem non suscepisset, maritus qui-

dem antequam foret uxoratus generando par erat, sed forte masturbatio repetito penem ita debilitaverat, ut non nisi uxoris auxilio penis arigeretur, & vix introductus flaccideret, tuncque sine ullo voluptatis sensu, post insignem & voluntarium nifum, magna serosi humoris copiam effundebat, a quo humore non aliud restabat quam quod urina reliquisset in lintre vestigium. Hæc de re consultus est *Hy. D. Hægarot* & *Ch. Chapral*, iudicavimus virum illum laborare dyspermatismo seroso, & matrimonium fuisse nullum, seu a viro generationi constanter inepto tantum fuisse celebratum.

Huic morbo sanando conferunt aphrodisiæa medicamina, ut cocolata, ambara, moschus, vinum optimum, sed præsertim ercior ex drachina una radicis Salep quotidie haustus; radix Ginsch quotidie ad drachmas tres, vel semini unciam manducata, ut apud Canadenses fieri solet, minori enim doli non sufficit; addere electuarium, diaspyrium, & synapismum genitalibus admotum ex ipsis synapis & eruce seminibus.

9. *Dyspermatismus reflexus*. *Aspermatismus* clar. D. Cullen, D. M. M. d. de Prædyspermatismo.

Est refluxus seminis ex urethra in vesicam, aut in vesiculas seminales, adeoque tempore coitus nulla seminat, deinceps vero seminis cum urina mixto. Vide *Mem. de l'Acad. de Chirurg.* Tom. 1. p. 434. *auctore Petit*.

Quandoque ille refluxus seminis in vesicam accidit ob verumtanti resistentiam, ut in aliis qui plures gonorrhæas passî; nodos, scirrhus, &c., ut ajunt, carunculas in urethra gerant; quandoque vero a forti penis compressione inter ejaculandum semen intra vesiculas seminales & canalem deferentem reprimatur. Sic vir quidam qui inter somniandum pollutionem incipientem præpedire conabatur, pene manibus fortiter compresso, passus est paulo post tumorem testiculi, semine inibi vel hærente, & collecto, & forte a vesiculis refluxo.

Impotentiam huic asinem memorat *Ill. Del-dier*, *Consult. 1. Tom. 3.* qua laborabat calculosus ob fistulam & vesiculis seminalibus in rectum pertingentibus; is de cætero vegetus quoties uxorem suam premebat, toties semen vix ullum & pene, at residuum in intestinum emittebat cum urina mixtum, unde sterilis erat.

XXXII. GALACTIRRHOÆA; *Spergavosis* Discord. lib. 2. cap. 98. *Lactis redundantia* Sennerti.

Cognoscitur ex spontaneo lactis e papillis effluxu.

Lac in gravidis paratur eo copiosius, quo ad partum proprius accedunt, sed tenue & serosum; verum tribus circiter a partu diebus ephemera lactea papillarum & mammarum vasa galactophora diducit, & major sit lactis secretio, cujus quæ vulgo secretitur copia ad libras

tres

trus circiter quavis die affurgit. Puerperæ licet tantam lactis e mammis copiam fundant, si alimæ nutriticæ sint, nihilominus tamen partem aliam lactis in sanguine geniti per diversa loca evacuant, partim lochiorum forma ex utero; urinæ turbidas, faeces minus brunneas, si sanæ sint, imo, viridescentes si ægrotent, sudores etiam acidulos copiosiores ejiciunt, sanguis etiam in pectella extractus lacte supernatante albescit in gravidis & puerperis.

1. *Galactorrhœa mammarum*; *Ecoulement de lait des mamelles*. L.

Hoc symptoma puerperis quandoque accidit a lactis redundantia, cum scilicet mammam alumnus sugendam præbere recusant; unde intumescencia, & quandoque inflammatio, caseario, aliaque mala ipsiis mammis superveniunt, lac continuo e mammis exillat. Visæ sunt mulieres, quæ quinto graviditatis mense libram & semilem lactis quotidie fundebant; in puerperis hoc symptoma suctione alumni vel catellorum, phlebotomia, catharsi, poru diuretico tollitur.

2. *Galactorrhœa arteriae*; *Lactis effluxus ptyalismi forma* Puzos: aut *saliva deglutienda forma* Ephemer. Natur. Curios. Ex umbilico; ex cute mammarum sudoris specie; sub urina forma Jour. de Med. Fev. 1756. ex oculis epiphoram lacteam inducens; ex femore, parte scarificata; ex vena sèssa, ex diversis viis extraordinariis elabens, de quibus consulatur *Synopsis Ephemerid.* Natur. Curios. ad verbum Lac.

3. *Galactorrhœa virorum* Collectio Académica, Tom. 3. p. 63.

Testantur plurimi Auctores, ut *Scholtzius*, *Dolanus*, *E. Borellus*, *Lauremburgius*, &c. dari viros e quorum mammis lac purum & sincerum effluebat, aut continuo per longum tempus destillabat, imo quorum alii nutricum officio functi sunt; recens vero nati fere omnes serum quoddam albescent in mammis gerunt, quod mulierculæ primis diebus emungere solent.

4. *Galactorrhœa purulenta* J. Bauhini Obs. med.

5. *Galactorrhœa atra* Ephemer. Natur. Curios. Dec. 2. ann. 4. p. 207.

6. *Galactorrhœa lutea* Ephemer. Natur. Curios. ib. p. 203.

7. *Galactorrhœa viridis* Ephemer. Natur. Curios. Dec. 1. ann. 6.

8. *Galactorrhœa serosa*.

Est lactis aquosioris ex mammis effusio, quod accidit prægnantibus, si fœtus in utero moriatur; mammae etenim flaccescunt, & lac serosum fundunt, sed hoc est accidens parvi momenti; ast in nutriticibus lac serosum ultra primos dies a partu vitiosum alumnus præbet pabulum; cognoscitur vero serosum, si guttulæ etiam minimæ in manu posite statim suo pondere disfluant aquæ instar; illud lac ut plurimum simul est calidius, & minus dulce quam par est, adeoque rejicitur. Curatur illius vitiosa qualitas bono nutriticis regimine.

XXIII. OTORRHOEA, Linn. gen. 171.; *Fluxus aurium* Scnnetti c. 9. *humidité ou écoulement des oreilles*.

Fluxus est sæpius serosus, purulentusve ac scetidus ex auris cavo, quandoque ex hujus ambitu aut parte postica.

1. *Otorrhœa serosa*; *humiditas aurium*, Etmuller. L.

Est humiditas quæ ex cryptis pone auriculam sitis, in pueris cacoehymicis, sobolescit, & puris adinstar lineis maculas flavas ac firmitatem conciliat; ea vero humiditas excrementitia locum tenet vesicatorii, caput, oculos, faciem ab aliis incommodis liberat; hac reptilla accidit ut vel fluxus ex aure interna etiam procedat, aut ophthalmia infestat. Uberrimam otorrhœam serosam ex istu vide in *Ephemer. Nat. Cur. Dec. Ann. 6. obs. 12.*

2. *Otorrhœa purulenta*. L.

Ba est quæ præteritam otalgiam inflammatoriam aut parotidis suppurationem aut cephalalgiam gravem sequitur: Vide *Ephemer. Nat. Cur. Dec. II. Ann. 7.* & auctores de ulceribus aurium.

3. *Otorrhœa menstua* Ephemer. Nat. Cur. Dec. II. Ann. 7. App. p. 157. P.

In viro scilicet quotis mensibus liquor croceus ex aure effluere solebat, non sine fœtore: fluxus hæmorrhoidalis ex cute etiam recensetur Dec. III. Ann. 4. 6. Obs. 162.

ORDO QUARTUS.

AERIFLUXUS.

Charactèr est status vel halitus emissio inassuetata. Flatus est motus aeris vel vaporis, cum sono & impetu; halitus est fluidum elasticum vaporis instar expansile.

XXXIV. FLATULENTIA; Flatulencia.

Est morbus cujus præcipuum symptoma est flatuum ex primis viis per superiora aut inferiora frequens rejectio.

Rejectio simplex flatuum per superiora vocatur ructus, eructatio, Græcis *ergeto*, Gallis *rot* & *rapport*; qui ructus sunt acidi, nidorosi, putres, insipidi, &c. Flatus per inferiora delapsi vocantur *borborygmi*, si cum humiditate quadam edantur, *bombi* vero, si cum sono erumpant, qui Latiniis *crepitus* audiunt, *Gorrii desinit*. Neoterici *borborygmos* vocant intestinorum murmur.

Omnia alimenta, potissimum vegetabilia & potulenta non satis fermentata, magnam aeris copiam continent, ut fuscè docent experimenta *Hales Staticus de Vegetaux*; & *Cotes Leons de Physique*. Ille aer ex vegetabilibus fermentescens extricatus maximam expansilitatem obtinet, ita ut sibi relicto spatium portentose majus priore possit occupare. Præterea aer purus

Inter alimenterum bolos quotidie deglutitur, & in statu sano ventriculū & intestina molli-ter distendit, eorumque vacua replet calore lo-ci debilitatus, seu expansitate moderata prædi-tus. Aërem in corpore, sive genium, sive ad-siccitium continuo absorbere, sensim expansitate sua orbiari fore destrui, docent physici, & potis-simum Mayow, Halesque: sic duodecima tere-pars aeris inspirati destruitur; sed ille aer non ad nihilum redigitur, quippe docet analysi chymi-ca eum fluidorum, solidorumque nostrorum com-positionem ingredi, ipsique solidis duritiem im-pertiri; saltem certum est ea quæ exteris duri-tie præcellunt, ut vesicæ calculi, aeris conteni-ti copia exteras partes superare. Volumen aeris qui exit ex sanguinis suilli pollice cubico 33. pollices cubicos replet; qui ex cornu damæ pol-lice exivit, 234. pollices æquavit; qui vero ex calculi humani pollice, 648. pollices, &c.

Aer qui per spontaneam fermentationem e pa-ne, fructibus, seminibus, herbis educitur intra stomachum, si digestio langueat, destruitur seu absorbetur, si salivæ sanæ miscela digestio bene fiat, ut suadent experimenta Ill. Pringle, in vi-tro capta; bilem huius aeris nimis expansioni obstrare, suadent etiam experimenta *Strovanelli*, quippe si cani vivo per vulnus vesicæ fellæ in-flictum bilis effluxus intra duodenum præpeditur, animali superveniunt borborygmi & em-pyemiceidæ symptoma; bullæ aeris quæ urinæ ac asciæcorum lymphæ in cytho collectæ superna-tant, illico eum crepitu dissiliunt, & evanescent, si contingantur paxillio cerumenis aurium.

A putrefactione etiam extricari aerem ex a-nimalibus, docent inflationes abdominis in ca-daveribus potissimum submersis, quæ ideo acce-dente putredine aquis supernatant. Duplex est itaque principium expansionis in aere intra a-nimalia & vegetabilia contento, scilicet fermen-tatio & putrefactio præter coloris intensitatem. Cum saliva est sana, & sufficienti copia alimen-tis bene præparatis, non incommotis suppedi-tatur, fermentatio, in vase vitreo saltem sine tumultu & sine copiosis bullis peragitur; aut cum alimenta non sunt satis masticata, vel sunt copiosiora, cum carnes nimis firmæ aut adipo-sæ, aut mixtæ cum farinosis non fermentatis, aut cum saliva est parcior viscosa, non intime alimentis immixta, fermentatio tumultuosa eva-dit, flatibus repletur vas vel stomachus, in quo supervenit pyroxis vel ardor interancorum, qui salibus alkalinis frangendus est: Vide *Pringle T. II. p. 150.*

1. *Flatulentia acida*; *Oxyregmia* Tralliani lib. 12. cap. de iis qui ex cruditate acida febricitant, Amati, Cent. IV. obs. 54; Pringle Exp. 36. p. 250. *Rest. aigres. D.*

Ad acium vergere omnia vegetabilia, her-bas, fructus radices, panem, vinum cerevi-siam, exceptis plantis tetrapetalis cruciformibus & condimentis piperatis, &c., docent Chemic, ex horum alimenterum mora in ventriculo, ob

defectum bonæ digestionis producuntur flatus aci-di; ex oleo, pinguedine, larido, aliisque si-milibus, ut piscibus vehementium ignis passu seu frigus extricatur eidem quoddam volatile, saporis urentis, maxime si summus canini exce-perint, cum odore ingrato empyreumatico; his assumptis oritur indigellio, & flatulentia em-pyreumatica aeris, cum pyroxi in œsophago, salivatione frequenti. Hæc flatulentia curatur ca-tharticis, dein vero li restat, utendum est ab-sorbentibus, testaceis præsertim, oculis cancro-rum, corallii, catechu; inter si æger sit pi-tuitosus, frigidus, si viscida, insipida sit saliva, suadet Trallianus medicamenta stomachica calida, præsertim piper. Si vero sit tempera-menti calidi & sicc, jubet ut utatur eibis frigi-dis, ex conchyliorum classe petier, ut ostræis crudis, mytilis, &c., nec non in utroque casu consulum est abstinere a cibis vegetabilibus, & potissimum carnis animalium indulgere; Ast aquæ sale Glauberiano fortæ cæteris præ-stant.

2. *Flatulentia nidorosa*; *Eryge enicocosses* Græcia. *Rest. pourris. Rapport dam's convuls. B.*

Est ructatio quorum putridorum odorem & saporem referens. Illi stipantur utplurimum ano-rexia, nausæ, cardialgia, linguæ forditiæ alba vel lutea, saliva mucosa; & contra in oxyreg-mia saliva est limpida, copiosa, nulla anorexia, lingua nitida est.

Licet omnia vegetabilia putredini sint obno-xia, certum est facilius & frequentius multo a cibis animalis prosapia ructus nidorosis pende-re; maxime vero si succi digestivi ad putre-dinem vergant, ut syncho, amphimerina, typho, &c.; inter æroes putredine obnoxias, quæ sunt diutius servatæ, ex annosis animalibus quæ magis teneræ, coctæ, succulentæ, ad putredinem facilius tendunt quam quæ ex junio-ribus desumantur; ita quæ sunt duriores, vis-cosiores, difficilius putrescunt, ut conchyli. Docent experimenta *Pringle* quod paxillum salis putredinem accersit, multum vero salis averte; a vino, cerevisiâ, aceto, succo limonium etiam putredo corrigitur; sed medicamina corri-gentia vix usurpatis queunt, nisi prius emeticis vel catharticis primæ viæ expurgatæ fuerint, succenturiatio copiosa aquæ calidæ pota, qui has eluat, dein ad absorbentia stomachica est deveniendum, ubi præ aliis eminet confectio hyacinthina.

3. *Flatulentia hypochondriaca*; *Flatulentia hyffe-rica* Junckeri. *Erygmatorides nosos* Hippocratis; *Flatos* Hispanis; *Gallus Vemossæ*.

Symptoma est sæpius hypochondriacæ, sed quandoque in ægritudine præcipuum, unde qua-tur genus; cognoscitur ex pertinacia morbi, ex flatibus ano & cato, potissimum durante digestionē, erumpentibus, ructibus vero nec acidis, nec nidorosis; sed vel inodoris, aut tantum assumptorum odorem retinentibus. Adeo utplurimum parvus mos turbancinandi, aut cru-da

da & dyspeptia manducandi, cum querelis continuis de flatibus, borborygmis, doloribus colicis, spasmodicis diversarum partium affectibus, pyralismo nucofo, urinis limpidis, aversionibus morosis. Vide *hypochondriacum* & *hysteriam*. Hic morbus pertinacissimus est ex se, & potissimum ex pertinacia & morositate aegrorum, qui sæpius & Medicos & methodum medendi mutant, nec regimini accidere se volunt, aut cathartica repetere amant.

Curantur diæta, potu aequo, balneis & equitatione; abstineant a cibis dyspeptis, cibis diu masticent; utantur aqua sero lactis, jusculis emollientibus, aqua pulli, aquis acidulis, balneis; sed potissimum equo vel rheda constanter utantur; ut a curis, mœnore se liberent, & humoribus suis fluxilitatem & blanditiem concilient. *Hippocrates* 5, *Epidem.* repetitis phlebotomiis hunc morbum debellavit; nostrates hanc methodum mirantur, non imitantur.

Hispani huic flatulentie recti valde obnoxii; & plures utuntur Edicto Imperatoris Claudii; quo licebat cuilibet & ubilibet flatum emittere, ut docet *Suetonius*, cap. 32. Qui utuntur cathartica, adstringentibus, ut rheo, ad hunc morbum sanandum, evadunt sæpe insanabiles, ut vidi. Nihil magis nocet flatulentis quam alvi conspissatio, quæ exinde solet induci; anbara in hoc morbo laudatur a *Zacuto Lusitano*, obs. 7. lib. 2. & ab *Amato Cent. IV. cur. 54.* exantlatio flatuum ex recto ope syringæ quod excogitatum sibi tribuit.

4. Flatulentia accidentalis. B.

Est ea quæ a principijs procæsticis, fugacibusque dependet, ut a cibis fermentescibus, ut multo, cerevisia immatura, syrupis, leguminibus, vino vappido, frigore suscepto, constipatione, potu frigido; differt a colica flatulenta doloris fixi, atrocis, &c.

Curatur diluentibus calidis, potu the, caffè, stomachicis, theriaca, extracto juniperi, cortice aurantiorum & carminativis omnibus, anisi, carvi fructu, cumini fenine.

5. Flatulentia infantilis. *Cardiogramus Junckeri*, Tab. 127. n. 32. A.

Tormentibus, flatibus, alvi obstructionibus, & primarum viarum sordibus fovetur hic morbus apud infantes, unde ventriculus & præcordia inflata sunt.

Mulierculæ accusant apud Germanos distorsionem vel luxationem partis cussidam.

Sæpius hic morbus a repressis sudoribus, vel achoribus fovetur.

Curatur lenibus cathartica, mercurio dulci, syrupis de cichorio, de floribus persicorum, spermate ceti, oleis carminativis umbilico calide inunctis, ut oleo ruthe, petroleo, &c.

6. Flatulentia locialis Junckeri Tab. 135. n. 7.

Puerperæ & gravidæ ob alvi constipationem & calorem hypogastrici, aut pressionem recti, obnoxie sunt borborygmis & ructibus. Hunc affectum prævertunt in gravidis potus copiosus,

clysmata emollientia, exercitium moderatum; In puerperis suadet *Junckerus* oleum amygdalarum, nitrum, crocum, & præterea pulveres absorbentes, juscula carminativa, aliaque in nostris regionibus non usurpanda.

7. Flatulentia convulsiva. *Spasmus abdominis* Sennerii lib. 3. p. 10. cap. 8., *Heurnii* de morbis capitis, cap. 15.

Jesuita ab *Hæfettero* observatus per paroxysmos patiebat flatuum copiam, rugitus & murmur in ventre, hypochondriorum dolores, accedebant simul convulsiones totius abdominis & thoracis, cum difficili & anhelosa respiratione, involuntaria seminis excretionem, mentis alienatione. Similem ægrum vidit *Heurnius* Patavii, eo discrimine quod testes ad inguina retractabantur. Hæc species ad epilepsiam valde accedit, unde ab hypochondriaca discrepat.

XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Est flatuum a genitalibus emissio sonora; a Græco *aidia* pudenda & *psophos* peditum edo. Hic affectus non ita rarus est, ut debeat a Nosologis prætermitti. Accidit autem & viris & mulieribus.

1. *Ædopsophia urethrae*. Vide Freind, de febr. comm. 6., Zacut. obs. 112. l. 2.

Quidam laborabat dysuria quam calculosam putabat Medici; urinas purulentas, ramentosas reddebat, identidem cum urinis magno cum impetu & sonitu quoddam flatum erumpentem; aperto cadavere colon erat ulcere rorundum perforatum, & adhererat firmiter vesicæ, quæ inter extimam, mediamque tunicam ductu quodam pennæ asineris diametro erat pertusa; inde vero a colo ad vesicam flatus pertingebant. Similem morbum nuper observavit *Monipelli Collegæ Illustr. D. Fixes in peregrino*, cui erat fistula in recto, & materies stercoreæ cum urina effluens.

Per penem in coitu flatus externi novum est; id autem observavit *Zacutus*; loco seminis scilicet flatus erumpebat; hinc sterilis remedia quaesivit; profuerunt vero cathartica quibus sudorifica succederent, & demum balnea domestica, quibus fertilis evasit.

Ædopsophiam urethrae inter coeundum, seu flatuum cum semine explosionem observatam videtur cum dyspermatisino apud *Frid. Hoffmannum de gravi spasmo & dolore vesicae observatione*. 5.

v. *Ædopsophia uterina* Zac. Lufit. lib. 2. obs. 141., 142; *Tympanitidis fugax* Astrucii de morb. mulier. lib. 2. art. 2. cap. 9.

Notum est tympanitides uterinas solvi solitas per flatum, cum impetu ex utero erumpentes; sed hæc flatuum eruptio fugax est, verum in tympanitide fugaci *Astrucii* quoties mulieres corpus suum antroscum flectunt, aut abdomen, aut in coitu premi patiuntur, toties flatum sonorum ex utero emittunt; testis *Martialis* qui gastrilitate vulvæ offendebantur; ex ipsamet ræ-

gina semi-prolapsa & aerem nunc includente, nunc pro situ corporis excludente peditus illos quandoque proficisci verosimile est.

Mulleri leucotyphia, aut vehementi ira percitæ, uterus portentose intumuit, illa læso commissa, stragula alternatim attollebantur, quasi subitus maximus ventus a solo fuisset explosus, hinc sibilus, qui sensim desit, sed supervenit strepitus flatu cum impetu ex utero excurrente; *Bianchi Journ. de Medec. Mars 1756. p. 174.*

XXXVI. DYSODIA, Puantur.

Est foetidorum vaporum e corpore exhalatio, sive e naribus, ore, ventriculo; sive ex axillis, pedibus, vulva, inguinibus.

Plures sunt foetores qui ad alia genera morborum tanquam symptomata vel accidentia pertinent, quive fugaces sunt, & dysodiam non constituunt; talis est foetor in febribus continuis, ac remittentibus, in *phlegmasi*, ut variola, miliari, in *fluxibus* alvinis purulentis, in *cachexiis*, ut carcinomate, gangræna, tæbe ulcerosa, &c.: hic foetores ab aliis morbis independentes tantum referre nostrum est.

Foetor autem a miasmatis salino-sulphureis volatilibus per aera dispersis procedit; hæc miasmata nares ingrate feriunt, licet oculis & auribus, aliique sensibus non percipiantur. Si aere multo leviores sint, illi sursum tanto velocius volant, quo leviores illo sunt; si ejusdem gravitatis specificæ, tunc illi quoquo versus se diffundunt, & cum aere inspirato nares adstantium subeunt, secus cohibita inspiratione per nares non sentiuntur.

c. *Dysodia ozæna*; *Ozæna* Galeni, non Celsi; *Ulcers du nez*, *Puantise*. Aegri Galli *Puantis*. L.

Est foetor narium cum putridi ichoris effluxu ob ulcus membranam pituitariam exedens.

Ulcus illud vel est simplex, vel virulentum, ut cancerosum, syphiliticum, scorbuticum; ratione loci vel est in ipso narium, vel in sinuum frontalis, maxillariumve cavo alterutro.

Ex foetore ichoris excurrentis non tuto pronuntiatur adesse ulcus, cum ex narium stenochoria ob motum mucii putridi foetidus humor, nec tamen purulentus exstillet.

Utplurimum insanabilis est ozæna; & anofmaniam accersit, atque si ossium carie stipetur, si cancerosa sit, si syphilitica, periculum utut serotinum vitæ portendit.

Curatio exigit in ulcere simplici detersionem quotidianam quæ fit inspirando decoctum hordei cum melle, vel foliorum hederulæ, seu glechomatis, vel aquam calidam; si ulcus sit syphiliticum, præmitti debet hydrargyrosus, & cum medicamentis inspirandis mercurij dulcis pauxillum addere convenit. In hoc casu præter spiritum antivenericum aqua ethinea sæpius naribus est attrahenda, quæ fit ex aqua majoranæ, melle, chelidonio, oleo amygdalarum, & tinctura Aloës; *Locher p. 23.* Si ulcus sit scorbuti-

cum, remedia antiscorbutica, ladicinia sunt adhibenda.

Si sinus maxillaris alteruter pus fundat, quod cognoscitur ex effluxu ichoris, ex determinata capitis positura, tunc nihil est melius quam primum aut secundum dentem molarem superiorem ejusdem lateris evellere, & si via puri sic non pareretur, intruso in alveolum stylo terreo viam puri cedere, quæ operatio feliciter instituta fuit M. n. pelii.

Injectiones deterfivæ & exsiccentes parantur ex vitriolo & viridi æris ac alumine: huc balsamum viride Metense, aliaque in Auctoribus memorata.

2. *Dysodia rhinostenota*. *Puantise des camards* L.

Foetor est narium ab earum angustia, quippe accidit ut vel mucus, vel aer in locis angustatis, diu retentus, foetorem adipiscatur, qui aeri exspirato per nares conciliatur.

Angustia autem est multiplex; vel enim nares sunt reclinæ, id est radicem versus depressæ, vel sunt polypo, sarcomate, mucosissimo intus obstrictæ, vel excrementa, fluxione obturantur.

Si ab ortu reclinæ sit æger, affectus insanabilis est, & cura palliativa exigit ut quotidie aqua tepida & odorata naribus inspirata in os adducatur, sique vix illæ constantè eluantur, dein tabaco & odoramentis foetor ille, prout fieri potest, corrigatur: unde merito dixit *Martialis*.

Hic male semper olet, qui bene semper olet.

Ut adolescentem quidam moschati, anibarati, &c.

Si a polypo pendeat angustia, is est vel eradicandus, vel exedendus, atque cum sæpe pendeat a syphilide, hydrargyrosi est curandus.

Si a mucosum narium viscido, ut in corpyza, expectanda solutio ejus, quæ vapore lactis calidi, aqua tepida inspirata acceleratur; in puerulis hæc causa vel aliqualis finitas, aut nativæ nasi depressio foetorem conciliat fugacem; quippe successu temporis nasi radix atollitur, & via libera aeri sponte paratur, vel & mucus fluidior evadit.

3. *Dysodia stomatica*. *Puantur de bouche*.

Oris foetor Auctorum vel procedit a dentibus cariosis, vel a calculoso concremento circa dentes, vel ab stomacace scorbutica, vel ab ulcere gurgulionis simplici, syphilitico, gangrenodæ.

Si a carie dentium, vel ea caries est humida odontalgiam inferens & per se foetida, atque tunc temporis dentes carioli evellendi, vel caries ferro candenti comburenda, aut palliative oleo caryophyllorum & cinnamomi est curanda. Si caries sit levis, tardissime progrediens, per se vix foetens, tunc foetor procedit ex reliquiis carniū pridie comestorum in cavo dentis putrescentium, quæ reliquæ post singulos pautis dentiscalpio auferendæ, & dein os vino collui debet. Si foetor sit ab stomacace, sucro acetosæ, limonum, cochlearis, ejusque spiritu os col-

luendum. Si a calculis dentium radices obsidentibus, illi fermentis apertis sunt identidem auferendi. Si adde ulcus gangranodosum, ut in panchone, seu cynanche gangranosa & maligna, vix sumum imminet periculum a morbo, cui propriis auxiliis medendum. Si ab ulceribus oris, illa ulcera vel pendet a syphilide, & hydrargyrosi premissa debent bis in die elui ope guttularum aliquot collyrii Lanfranci in aqua rosarum, vel ulculcula ab hydrargyrosi fortiori procedunt cum pyralismo sordido & frequenti; hoc malum est fugax, & sublati hydrargyrosi evanescit; ulcera vero simplicia oris vix sentent, nisi sint fistulosa, fœdida, &c.

4. *Dysodia stomacalis. Puantur d'estomac.*

Est fœtor anhelitus procedens ab stomaco & œsophago; ille ut plurimum est putridus, & ab accidentalibus, vel habituali indigestione putri carniū procedens, ructibus potissimum superveniens, jejunis familiaris, a passu recedens; eaque curatur emeticis, catharticis & stomachicis.

5. *Dysodia pulmonica. L.*

Vide phthisim, anacatharsim, a quibus pendet; odor ille est qualem sputa phthisicorum fundere solent.

6. *Dysodia ab otorrhea. Puantur des oreilles. L.*

Otorrhea est fluxus serosus, vel purulentus aurium; ex auribus scilicet apud pueros non raro fluit humor seroso purulentus qui eos a morbis capitis tuto facit, sed qui ob moram in hinc cavis odorem fœtidum contrahit: hic fluxus sistendus non est, sed locus optime detergendus, renovatis quotidie splenis, injecto hordei decocto, &c.

7. *Dysodia a tinea. Puantur de la tete. L.*

A tinea maligna, achoribus, porriginē, telludine, trichomate, phthiriasi, aliisque similibus morbis capillitii, fœtor non raro horrendus permanet, qui curandus est, ut morbi primarii a quibus pendet.

8. *Dysodia axillarum; Puantur des aisselles.*

Est odor specialis acer, ruficis sudantibus, sordidis communis; acutior est apud homines sanguine acri & bilioso donatos.

Curatur balneis repetitis, sero lactis, quæ sanguinem edulcorant; palliatur aquis destillatis thymi, rosmarini, similibusque quotidie axillas eluendo.

6. *Dysodia hircina; Odeur de bouc.*

Est fœtor genitalium qui promanant ex ungine, seu febo quo perinæum, vulva, & scrotum illita sunt; necnon a vapore spermatis, qui vapo fœtidus apud hircos oestro venereo peritos procul dispergitur; mulieres emunctæ naribus affinem huic odorem in viris cognoscunt.

so. *Dysodia urinosa.*

Est fœtor urinx quo inficiuntur qui emuresi laborant post lithotomiam, vesicæ fistulas, similesque morbos, nisi summa cautela utantur; is odor halece salis etiam refert apud homines

qui mundiciem contemnunt; mulieres hoc morbo viris gravius afficiuntur.

11. *Dysodia pedum; Senteur du pied de mulier.*

Est fœtor teterrimus, qui ex pedibus sudantibus exhalat, apud eos potissimum qui tibialia & udones non mutant.

Sudores illi olidi minime sunt adstringentibus repellendi, sed sanguinis acrimonia est lacticiniis, jusculis temperatis, pediluvia ex infusis aromaticis adhibenda; fontanelle quas suadet Zacutus Lusitanus in hoc casu sunt ipso morbo peiores, & odorem ulcerosum ipse referunt.

De periculosa sudoris pedum fœtidi repressione, vide eruditum Diss. III. Comitis Buchneri, Acad. Naturæ Curios. Praefidis sapientissimi.

FLUXUM THEORIA ET PRAXIS.

1. *Symptomata in excretis Pathologorum. Morbi laxi, Prosper. Alpini, Medic. methodic. Lib. 12. & mixti, Lib. 13.*

Morbi quos Greci rheumata, catarrhos, Latini fluxiones, distillationes, defluxiones, Cælius Aurelianus Rheumatismos vocarunt, licet vi nominis fluxus & fluxus significet, ad hanc classem minime pertinent, & ex causa hypothetica denominati sunt: ast diarrhœa, perithecœa, leucorrhœa, recte à Rheo suo nomen mutuatur funt.

2. *Charact.* Morbi evacuatorii sunt illi quorum præcipuum symptoma est quilibet effluxus, ut sanguinis, feri, urinx, sudoris, puris, alvi, æteri, &c.

Symptoma vero præcipuum est illud, monente Placero, de quo ægri maxime conqueruntur, quod intensitate, extensione & duratione notabilis est, aliorumque symptomatum sæpe principium est.

Commode dividuntur in sanguifluxus; feri fluxus, & alvifluxus. Classis hæc est maxime obvia, atque mirum est eam ab omnibus Auctoribus omissam fuisse; Methodici ipsi hos morbos in duas classes amandarunt; Stahliani quidem, ut Juncker, Nemer, sanguifluxus satis apte in ordinem redegerunt; sed ferifluxus & alvifluxus perperam cum morbis omnino heterogeneis miscuerunt; magis foret homogenea classis, si abortus & dyslocia alio possent amandari.

T H E O R I A.

3. Partes contentæ quæ extra corpus debent amandari, sunt vel fluida, ut urina, sudor, vel firma, ut fœces, foetus, placenta; ambæ vero tum sibi mutuo, tum cum paribus continentibus adherent (ex definitione partium in Physiol.), adeoque non nisi per vim hac adhesionem majorem possunt extra corpus ejici; hoc notant Veteres, solo instinctu in mechanica eruditi, quique vires expultrices a retentricibus distinguabant, optimeque senserant in omni fluxu viciæ expultricem retentricem majorem requiri.

4. Neoterici, hanc cohesionem prætermittentes, & corporibus sese loco movendi facultatem tribuentes, rectius se philosophaturos crediderunt, si eversa illa Veterum theoria vasorum soli aperturæ, ut rixi, diabrosi, diarræsi, tanquam causæ, hos effluxus tribuerent; unde nil vulgarius in Schollis, quam pro causa proxima sanguisfluxus, vasorum sanguineorum solutionem, & pro causa alvisfluxus; urinæ fluxus, spinæsterum laxitatem inculare.

5. Alter error Neotericorum est considerare moléculas fluidorum, sensibiles globulos v. g. cruoris, tanquam duros, ita ut ex eo quod orificia vasculorum lymphaticorum, aut cutis, diæmetrum illis globulis minorem habeant, exinde transitus eorum impossibilitatem concludant; verum uti solida per digestionem abeunt in fluida, ita fluidorum moléculæ etiam crassiores & firmiores per resolutionem, ut aqua per fervorem abeunt in vaporem, seu altum omnium tenuissimum; sic humores nostri perspirabiles, & quæcumque sit globorum viscositas & cohesio, illi vi sufficienti adhibita minimis vasorum hiatus pervadere possunt.

6. Cohæsi itaque fluidorum nostrorum, quæ nondum vaporisationem adeptæ sunt, aut in fluidum elasticum & electricum mutata, sola impediunt quominus cito & machina nostra tubulosa undique porosa & pervia effluant; non vero impediunt molecularum elasticitas, quæ viribus præmentibus obsecundans evanescit, ut quisque in alvi depositione experitur. Hærent ergo Neoterici, qui ad omnem fluxum sanguinis requiri putant vasorum ruptionem, solutionem, eum sufficit ut cruoris guttulæ, si cohaerent nimis, elongentur & angustentur, aut in orificia vasorum, non amissa integritate, nec contractilitate elastica diducantur; sic fœtus per vim expressæ ab utero elongato capite, & distracto uteri orificio citra vulvum, erosionem & laxitatem ejicitur.

7. Diversi generis sunt vires, quæ contentorum effluxui resistunt, & quæ eorum effluxum excitant; Effluxui resistunt 1. mutua partium ejiciendarum cohesio; sic scybala, ob duritiem intestinorum viribus vix solvendam, effluxui resistunt; sic grani cruoris, frigore, debilitate cordis, adstringente medicamine firmati, possunt resistere viribus eos trans uterum promoventibus, unde suppressio fluxus. 2. Posita vi trusiva fluidorum eadem, receptaculorum & orificiorum contractilitas, spinæsterum contractio; crassities, elasticitas impediunt effluxum; verum impedimentum nullum absolutum est, & nulla vis reventrix tanta, quæ ab antagonista expultrice superari nequeat.

8. Vires expultrices receptaculorum sunt a. musculi, & membræ musculosæ ea receptacula componentes vel ambientes, quatenus vires obtinent a conatibus tum liberis, tum naturalibus. Secundum nervum in eos immittentibus. Sic ven-

triculi vis expultrix est vis fluidi nervi & bras ejus organi, & musculos illud ambiens contrahentis, eo ordine, & eaque directione quæ requiritur, ut cum in œsophagum, tum in pylorum ejiciantur, atque si fiat alterutrus directionis delectus, ea vi pendet a facultate sentiente, ut natura, aut libertate. 2. Gravitas ipsius fluidi ejiciendi potest effluxui sufficere, si ea officium deorsum vergens inveniat, & resistentiis major sit; secus obstat ipsi effluxui gravitas; in quo errant illi qui hienteriam, tanquam a gravitate sola feces ad alvum duferentur, ab intestinorum sola levitate ducent, licet pars intestinorum sorsum, pars deorsum vergat.

9. At quæcumque sit vis expultrix, eam nunquam effluxui producendo sufficit. necessario vero requiritur ad effluxum, ut vix expultrix superet vim retentricem, & in hoc excelsu consistit effluxus causa, unde intelligitur 1. quod utcumque sanguis viscosus, grumulosus, graffusque sit, is potest effluere, si vis vasa premens, exprimens major fuerit; 2. quod utcumque fluxilis, tenuisque sit, potest sisti, si vires fluidi subsequentes, aut valis continentes minores fuerint; 3. quod utcumque fortis sit contractio receptaculi, ut uteri, lecti, ea non sufficiat ad expulsionem fœtus, fœcum, nisi minor sit orificiorum resistentia; 4. quod utcumque debilis sit vis fluidum exprimens, ea sufficit ad effluxum, si minor fuerit adhuc ejus resistentia. Merito itaque Medici methodici effluxus ad laxos partem, & ad strictos morbos redegerunt, cum fluxus principia sint æque vasorum contractio & officiorum laxitas.

10. Falsa est Humoristarum theoria quæ causam fluxuum omnium in fluidorum tenuitate reponit; falsa Solidistarum doctrina quæ illam a solo solidorum vitio deducit; falsa Chymicorum ætiologia, quæ effluxus solis adhibet Chymicis partium elementis; vera Veterum, & vere mechanica theoria, quæ incusat vim expultricem retentricem majorem, quæque omnes Sæctarum doctrinas conciliat, praxique velificatur.

11. Sanguisfluxus alii ex valis sanguiferis immediate extra corpus erumpunt, ut ex masticis, vulneribus; alii, in eava quadam statim irrumpunt, ut in intestina, ventriculorum, pulmones, vesicam, ex quibus deinceps foras eliminatur sanguis; in priores sufficit, ut vel orificia vasorum excretoria, ut uteri, partum, diducantur per anastomosim, nec ea dilacerari, vulnerari necessum est, quod sine violentia externa, vel interna fieri vix posset, & sine phlogosi, dolore, ac dein subsequente suppuracione non accideret; cum vero sæpius hæc omnia signa ruptionis, diabrosæ, & diarræsis deficiant, verosimilius est sæpius eos effluxus fieri per anastomosim, seu dilatazionem oculorum excretoriorum; tales sunt sanguisfluxus qui a plethora, aut a febrili organis-

mo simpliciter oriuntur, & revertuntur, hos voco sanguifluxus ab *anastomosi*.

12. Dantur sanguifluxus a *diabrofi*, quoties scilicet erosa ulcerosa, fistulosa sunt organa ex quibus sanguis effluit, ita ut sponte ad minimum horum organorum motum pus cruentetur, vel sanguis ex ulcere dimanet; nunc guttatur, nunc ubertim, talis est hæmoptysis phthisicorum.

13. Dantur sanguifluxus a *diapedesi*, quos nimia sanguinis fluxilitas excitat, quoties scilicet sanguis est dilutus, dissolutusve, ita ut per ostia nativa, etiam non dilatata, per ipsos cutis poros, fluidum rubrum, aut incense flavum eliminetur; talis est sudor ruber axillarum ætate pluribus accedens, talis est hæmaturia hæmaturæ, hæmorrhagia, scorbuticis familiares.

14. Sunt etiam sanguifluxus *traumatici* a rixi vel a diæresi, per violentiam ruptis, aut sectis mechanice vas; a rixi quidem, si impetus, & pressio sanguinis vasorum integritatem solvat, & tenacitatem jam forte debilitatam superet, quod accidit in hæmoptysi, quam validi clamores, vehementia conamina, aut pathematæ excitant; in hæmorrhagia febrili critica: per *diæresin* vero fit sanguifluxus, quoties extrinsece adnotum, vel intus sumptum corpus quoddam secans vasa dilacerat, ut accidit in hæmatemsi ab hirudinibus deglutitis; a clavis, frustis vitii, piscium ossibus sumptis.

15. Qui vero fluxus sanguinis sunt intra receptacula, illi, ut perficiantur, requirunt naturæ conatum, ut inde foras ejiciantur eror; utroque causa duplex ad eos concurrat; sic non datur hæmoptysis ex eo solo, quod rupta erosa vasa pulmonum sanguinem fuderint, inde enim quandoque supervenit orthopnoea, syncope lethalis sine spūto cruento; sed requiritur ut naturæ conatus, tussis dictus, seu expectoratio sanguinis effusi, cum prioris causa concurrat; ita & in hæmatemsi, hæmaturia, aliisque, in quibus sanguinis extravasatio est principium morbi sanguifluxus dicti, cujus causa est conatus naturæ ad expellendum illum sanguinem extravasatum.

16. Alvi fluxus alii per superiora sunt, ut vomitus; alii per inferiora, ut diarrhœa; quidam ano simul, & cato ut cholera. Dejectio per inferiora fit viribus expultricibus intestinorum, diaphragmatis, & muscularum abdominalium, concurrentibus ani elevatoribus, & spindere, qui simul detenduntur, seu gradatim laxantur, ut in omni motu concurrat antagonistarum laxatio cum sociorum, & directoris musculi contractione; concursus ille simultaneus tot muscularum, diversis modis ad eundem scopum conspirantium, non intelligitur, nisi principium movens idem sit quod horum contractionem, illorum laxitatem dirigat, datoque tempore & ordine, viribus ad resistentias proportionalibus exsequatur; nec enim a-

lia potest esse ratio cur eo ordine; eo rhythmo tot actiones diversæ perficiantur: ergo viderisimum est principium illud esse quod necessitatem hujus actionis sentit, seu animam esse; nec ulla ratio sufficiens potest assignari cur ex stimulo ubique diffuso potius subsequatur peristalticus quam antiperistalticus intestinorum, aut ventriculi motus.

17. Qui ex stimulo vellet explicare cur ægri v. g. in extremo periculo certis verbis Dei auxilium implorant, illi deberent exponere cur ceteri lingue, laryngis, pectoris, musculi dato ordine; certa vi, certaque combinatione moveantur potius quam modis aliis, æque possibilibus, & numero infinitis, ex quibus hæc verba minime pronuntiarentur; determinari autem facile potest quod ille concursus determinatus organorum facultati sèligenti soli tribui debeat, atque eadem demonstratio valet pro aliis actionibus similibus, quas proinde veteres Medici animæ facultati merito tribuerunt, ut patet ex *Riverii Physologia*.

18. Vis expultrix itaque ventriculi, ad vomitum v. g. agens, non est solummodo, ut Neoterici putant, vis fibras musculares ventriculi contrahens, quæ viget in digestionem, in gastrodynia flatulenta, absque ulla expulsionem, quæque viget etiam in lienertia absque ulla vomitione; sed est præterea vis quæ determinat pylorum occludit, cardiacum reflat, & simul motum antiperistalticum ventriculi efficit, quæ denique organis ad finem optatum conspirantibus, & selectis utitur. Hanc vero vim agere in vomitu ex attenta effectuum consideratione demonstrari potest.

19. Hanc facultatem, cui ea vis debetur, esse animam, probatur ulterius ex eo quod nullus fere sit alvi fluxus, vomitusve quem anima solummodo pathemate affecta in corpore prius sanissimo non possit excitare. Quot sunt concionatores, qui cum prima vice cathedram consensuri sunt diarrhœa laborant? Quot delicate mulieres, quæ si appositæ mensa audiant ulceris canerosi aut cadaveris patris descriptionem, nauseant, & vomunt? Quot qui pro libitu rursunt, rulant, vomitum cient? Quot qui alvum onustam pro tempore supprimunt, pro libitu exonerant, qui præ ira largius mingunt, præ pavore sudant, præ suavis fructus idca salivam secretunt, præ commiseratione lachrymas fundunt, ut nullena alia mittant?

20. In statu æquilibrii inter potentiam quæ epe fibræ circularis comprimit cylindrum, & resistentiam illius cylindri, spatium percursum a potentia motrice est ut circumferentia, & spatium a resistentia percursum est ut radius: ergo vis impensa a potentia motrice in statu æquilibrii est ad vim resistentem ut 7. ad 44. seu circiter fœces minor; momenta enim sunt æqualia, quando vires sunt reciproce spatii eodem tempore percursum.

21. In contractione maxima musculosæ fibræ uni
sui

Tul tertia parte possunt decutari: fibræ itaque circulares, quæ vesicam, uterum, aliodeve viscus sphaeroidem confingunt, possunt maxima sui contractione ejus cavum imminuere in ratione 27 ad 8, seu plus quam subdupla prioris amplitudinis, cylindrorum vero cavitas a febris circularibus potest imminui in ratione 9 ad 4. seu circiter subdupla.

22. Si vesica alteram diametro decies superans, & æquali prædita orificio imminuatur eadem quantitate quoad diametrum, ita ut diametrum majoris sit 10. pollicum, minoris unius pollicis, & utriusque diametrum intra idem tempus decreseat per contractionem fibrarum circularium 100 pollicis, quantitas fluidi, quæ ex majori exiit, erit ad quantitatem, quæ iuxta ex medioeri ut 275. ad 1. verum velocitates fluidorum per orificia eadem fluentium sunt ut quantitates eodem tempore effluentes, ergo in priori velocitas effluxus est 275 vicibus major quam in posteriori; ita ut vel minima majoris receptaculi contractio sufficiat ad magnam effluxum excitandum; minima itaque æstimaoda est quantitas effluxum ex receptaculorum contractione, nisi habeatur eorum capacitatis consideratio.

23. Quantitas effluxus ex diversis orificiis sub diversa velocitate fluidi, & diversis temporibus, est in ratione composita orificiorum, velocitatum, & temporis, ita ut, si cætera sint paria, quantitates fluidi effluentis sint ut numeri, & magnitudines simul orificiorum; si orificia sint paria, ut & tempora, quantitates crescant aut decrevant pro ratione velocitatum; & demum si orificia, & velocitates pares sint, quantitates sunt, ut tempora quibus sit evacuatio.

24. Quantitas fluidorum in diversis subjectis sanis, & similibus, est eorum ponderis proportionalis, ita ut cum pondera sint in ratione triplicata quorumvis dimensionum, in adulto sex pedes alto quantitas fluidorum sit octies major quam in puero decenot utplurimum tres pedes alto.

25. Evacuatio morboſa eo periculofior censetur, quo intra datum tempus quantitas effluxus major est, & quantitas nativa hujus fluidi minor est in corpore; ergo jactura unius libræ sanguinis in puero est æque periculosa cæteris paribus, quam jactura octo librarum in viro duplo altiori.

26. Periculum sanguifluxus eo majus est, quo copioſior est, simul breviori tempore absolvitur; quippe minus est periculi si jactura duarum librarum sanguinis fiat intra septimanam, quam si fiat intra diem, cum intra id temporis tanto minus reparetur jactura, quo minus temporis intercedit, & e contra.

27. Malum quod ex sanguifluxibus inmodicis resultat, minus pendet a quantitate fluidorum imminuta, quam ab eorum qualitate mutata, quippe cum jussula, & potus quarta quavis hora ad uncias sex circiter ingerantur, adeoque fluidi quantitas corpus subiens intra diem ascen-

dat ad 72 uncias; facile accidit ut multo major sanguinis amissi quantitas refarciatur. Verom quoniam non nisi successu temporis, & viribus vigentibus, quantitas chyli cruoris qualitates adipiscatur, seu ruber, sapidus, inflammabilis, actuosus principis factus evadat, evidens est damnum a sanguifluxibus imminens, ut enolumentum a phlebotomis spectandum, esse potius reperiendum a crasi cruoris mutata quam a copia imminuta.

28. Phænomena, quæ a profusus sanguifluxibus procedunt, sunt varia pro diversa quantitate, & diuturnitate effluxus. Audiamus Illustrum Medicum, qui in sanguineis ægris rheumatismo affectis viginti libras sanguinis intra bidentum emittere solitus est. Quidam nauta, *Coffe* vocatus, rheumatismo laborans, & mutilosus, more meo decem intra bidentum phlebotomias pallus est, in singulis libras duas sanguinis amittit, & eodem tempore sanguis ad libras duas e pede, & totidem e brachio tum mane tum sero effluebat; in primis phlebotomiis præ timore incidebat in lipothymiam, ita ut adhortandus esset, ut bono animo esset, nares & tempora aqua Reginæ Hungaricæ fovenda, & ut sufficiens cruoris copia fluere, aqua in faciem erat proficienda, aut etiam vinum ipsi propinandum; cum nova sequenti die vix celebrata esset phlebotomia, syncope supervenit cum convulsionibus, facie extincta, & plumbea corpus evasit frigidum, & in tantum soporem incidit, ut vix ulla vix indicia exhiberet; pulsus nullus, oculi clausi, sudor frigidus terrore adstantes & Chirurgum prostravere: adstantes clamantes effugerunt; Medicus ope cardiacorum ipsi opiculabatur; paulo post pulsus, calor, visus redire, soporeque discusso, æger dixit se nescire unde veniat, perfecta quiete, & dulci somno se potitum esse; hora tamen quarta vespertina ultima phlebotomia e pede ad libras duas feliciter celebrata fuit, & vicesimo post die æger, quem mortuum crediderant, videre omnes in platea optime valeotem: *Observations intéressantes sur la Goutte 1745. pag. 377.*

29. Virgini 25. annos natæ, similes phlebotomias patienti, post quartam supervenere lipothymie fugaces, & dein morosis hysteriæ, in qua nunc ridebat, nunc plorabat, dein in magnum mororem incidebat, cui succedebat terror panicus; quæ symptomata post syncopen etiam graviorem sequentibus phlebotomiis supervenire; demum synochus putris accessit, atque post longam convalescentiam pallida, & pedibus oedematosa vixit. Quotidianum autem est videre quod ab intempestivis, & pluries repetitis phlebotomiis aut sanguifluxibus oedemata pedes, tibias, imo anasarca, & ascites invadant.

30. Ex historia præteritæ videtur concludi posse pavorem potius quam inanitionem vasorum hinc syncopibus, & convulsionibus ansam præbuisse, cum post quartam phlebotomiam accesserint,

P

serint,

um sanguine plus eicitur materię morbificę quam sanctę; adde quod humores sanguine sensim fecernantur, adeoque sensim fiat eorum a massa sanguinea separatio; & etiam si receptaculis ubi allervantur deinceps subito & absistam eiciantur, non ita insurgunt vires, quam ubi vasa sanguifera pari velocitate evacuantur tum humoribus, tum sanguine; robur enim non infringitur ab alvi fluxibus in hoc casu a vasorum colapsu, & fluidi nervi jactura, ut accidit in gangliis fluxibus.

40. Quo plus virium impendit natura in contrahendis musculis ad fluxum efficiendum necessariis, eo plus imminuit robur in ratione magnitudinis, & intensitatis conatum, eorumque durationis, si ad vomitionem unam intra diem unus gradus virium impendatur, ad decem vomitiones intra idem tempus decem gradus absorbentur; jam supponamus vomitiones esse intensiores, alias vero leviores duplo, eodem dato numero; quę erunt duplo intensiores ratione virium impendium exigent duplo majus; si vero ad unam vomitionem duplo plures muscoli agant eadem intensitate quam ad alteram; duplo plus virium impendatur; & denique si per dies duplo plures perseveret vomitio, duplo plus virium etiam ab hoc titulo requiratur.

41. Si itaque aestimetur magnitudo conatum ex numero musculorum qui contrahuntur, & eorum conatum numero, intensitas vero ex altitudine ad quam hi muscoli contrahuntur, demum duratio ex longitudine temporis per quod morbus perseverat, evidens est, quod neglecta etiam differentia a quantitate & qualitate materię rejectę, periculum nunc variari potest, & in casu superius recensito sequitur unum fluxum esse sexdecies periculosiorem altero ejusdem speciei; atque si quantitas humoris effluentis, ejusque qualitas utilis ad virium dispendium, concurrat in eadem ratione trigices, vel sexagesies, &c. majus fieri posse periculum.

42. Periculum mortis eo majus est, quo virium dispendium in morbo majus est, & robur vitale minus. Robur enim est penus virium, quas exhaurire citra mortem impossibile est; cum itaque tanto facilius exhauriatur penus, quo minor est & quo dispendium actuale majus, sequitur plurimum periclitari eos qui morbo praegresso, pravo victu, inedia, ætate provecita, aut juniores infirmi, si gravis fluxus illis superveniat; atque sub eodem fluxu periculum esse proportionale infirmitati habituali ætatis, constitutionis, &c.

P R A E V I.

43. Cum causa fluxus cruoris sit excessus virium expellentium supra vires retentrices, evidens est, quod si sanandus sit ille fluxus, tollendus est necessarius ille excessus, quod si augendo vires retentrices, vel imminuendo expultrices, ita ut posteriores prioribus non predominentur; ergo duplex est indicatio adimplenda simul; si ve-

enim augemus vires quę retineant, non auctis expellentibus; si ve expellentes vires minuuntur intactis prioribus; si ve denique augentur retentrices in majori ratione quam expultrices, necessario tollitur fluxus.

44. Verum apprimè cognoscendum est primum fluxum ille sit morbus salutaris, qui scilicet majorem præcaveat, vel sanet illius principia auferendo. Vidi pluries, sanati diarrhæa serosa, supervenire ascitem; suppressio diabete hysterico, anasarcam reverti, gonorrhæa suppressa, syphilidem nidulari; anacatharsi retenta, dyspnoeam intendi; menorrhagię suppressę diversos morbos succedere, &c. nullum autem fluxum activum reprimat Medicus, quin attenderit num plus emolumenti ab eo sanato spectandum sit, quam timendum ab eo sanato detrimenti; sæpe Medici operose nihil agunt, aut necdum profint, magis nocent.

45. Fluxus activi sunt illi in quibus vires expellentes sunt vires naturę ad effluxum sollicitatę, vel per quantitatem materię morbificę, vel per ejus qualitatem, vel per errorem. Fluxus passivi sunt illi qui ab imminutis tantum resistentiis, non auctis naturę conatibus, dependant, ut sanguifluxus a vulnere, ulcere, rupto varice, aneurysmate, a diapedesi scorbutica, sudor ab asthenia, alvi fluxus a laxato sphinctere ani, enuresis a simili principio, pyelismus a laxitate, &c. in istis evidens est nullam esse utilitatem fluxus, adeoque eos esse curandos, quod de activis non semper verum est.

46. Vires expultrices ideo agunt fortius quod sollicitantur, atque apprimè respiciendum est num. 1. copia materię morbificę; num. 2. ejus acrimonia; 3. num causa morbifica; 4. num erroneo conatu natura ad hunc fluxum sollicitetur; 5. num ob nimiam sensibilitatem & hystericeam dispositionem, conatus sint vehementiores quam Par. est; 6. num intempestivi sint.

47. Si copia materię morbificę conatus proportionales sollicitet, æger fluxum bene setet, adeoque fluxus est naturę committendus, ut si plethorico proportionalis accidat sanguifluxus; si belluoni diarrhæa stercorosa, si ascitico larga enuresis, asthmatico plenaria anacatharsi, crapuloso vomitus, &c. Si vero major judicetur, moderandus est fluxus, si intempestivus, detinendus est usque ad tempus opportunum.

48. Si vero acrimonia materię morbificę fluxum sollicitet, indicationes desumendę sunt a quantitate fluxus robori relativa, & ab acrimonia materię peccantis; præterea distinguendum an hoc fluxu liberetur corpus ab hac acrimonia; num vero minime: si sanguis acer scorbuticus effluat, imminuitur quantitas sanguinis minime excedens, nec residui mitigatur acrimonia, ergo supprimendus est effluxus, & mitigandus tantum sanguis. Sed si saburra in ventriculo contenta alvi fluxu anoterico ejiciatur, liberatur corpus ab hac noxa per vomitum, ergo juvandum, aut moderandum, aut naturę com-

mittendus; juvenandus; si vires naturæ languant; inoderandus, si metus sit ne robur deficiat; naturæ committendus, si recte procedat.

49. Si a causa mechanica sollicitetur fluxus, illa causa est auferenda; si v. g. hæmatemesis ab hirudinibus, pyuria a calculo, menorrhagia a placenta post partum relicta in utero, evidens est hirudines esse necandas, vel ejiciendas, calculum extrahendum, placenta frustum educendum, ut naturæ conatus cessent, & fluxus sistatur, ut in ablatis impossibilis sit, naturæ conatus anodynis & narcoticis sedandus.

50. Si errores sunt naturæ conatus, seu non conducant ad principium morbi auferendum, ut in ultimis exemplis, aut ubi ex tussi sit hæmorrhagia, ex vomitu menorrhagia, enuresis, ex cranii ictu vomitus, ex sternutatione quia abortus, &c. quia evidens est effluxus illos a natura non intendi, nec proinde utiles esse, illis opponenda sunt remedia, quorum tutiora sunt quæ tollunt materiem morbificam, quam respiciunt illi conatus. Sic in vomitu ab ictu capitis phlebotomia; in enuresi a tussis bechica, in pyralismo a nausea vomitum juvenantia, & similia conveniunt.

51. Si nimia sensibilitas, aut ut hodie placet, irritabilitas, fluxui ansam præbeat, ut in vomitu hysterico, gonorrhœa, œnigo, epiphora ophthalmica, diarrhœa a dentitione, sedandus est fluxus, si inutilis, aut excedens; tollendus vero omnino per narcotica, dolorem physicæ, vel mechanice lenientia.

52. Si inopertivus ratione loci, vel temporis tunc ad debitum locum & tempus cum demittere opus est; sic ratione loci menorrhagia ex naribus, podice, digitis, papilla, ea ad uterum si fieri potest revocanda; diarrhœa quæ noctu revertitur, quæ gravidam molestat, quæ exhaustum enervat, supprimenda.

53. Vires expultrices agunt fortius, quia sollicitantur; sed etiam non nimium sollicitentur, illæ debent quandoque imminui, cum scilicet majus impendat periculum a fluxu perseverante, quam a virium expellentium imminutione; vires autem illæ imminuuntur, 1. detracto sanguine per phlebotomiam, aut aliam quamcumque viam; 2. fluxu ipsomet, ut seroso, alvino, uterino, &c. 3. diæta parca, liquida; 4. potu laxante, diluente, refrigerante; ea etenim omnia robur sanis consuetum detrahunt, & detracto robore omnes vires minuuntur, nisi inæqualis earum distributio fiat, ob partis cujusdam necessitatem, ut cordis, aut irritationem singularem.

54. Sic in vehementi cholera, dysenteria, aliisque effluxibus acutis, non solum initio detrahatur sanguis respectu plethoræ, & infarctus inflammatorii, qui tunc metur; verum etiam, ut detractis viribus cordis, contractio fortior ventriculi, & intestinorum sedetur; sic in hæmoptysi,

hæmorrhagiis aliis febre acuta, aut plethora stipatis, non solum detrahatur sanguis ut plethora tollatur, verum etiam ut robur imminuatur, adeoque moderatiores evadant vires sanguinem trudentes; cum autem in serifluxibus, & alvifluxibus chronicis robur non majus sit quam par est, & continuo minuitur a morbo, phlebotomiam omittimus, & solum diæta jurulenta, potu diluente, si sit acrimonia, vel siccitas, roboris moderamini prospiciamus.

55. Utile est etiam vires expultrices minuere per diversionem, ad est, fluidi nervi impactum alio divertendo, quod præstant irritantia procul ab effluxu loco adnota; sic in hæmorrhagiis narium, Venteris solemne erant ligaturæ dolorificas cruribus, tibisque injicere; in menorrhagia cucurbitulam siccam manus apponere; sed hoc est incommodum, quod dolor, irritationes illas necessario concomitans, robur detrahat, adeoque satius est iis revulsivis auxiliis abstinere juxta Neotericos.

56. Non idem sentiendum est de derivationibus ex parte nobiliori, & magis sensibili in minus nobilem, sensibilemque, maxime cum pauca est effluxio, & hujus defectu est inducenda; sic feliciter in epiphora, catarrhali, quæ oculis lædit, per lobum auriculæ setaceum ex cortice thymelææ ejacitur, vel veterariorum pone aures applicatur, ut huc derivetur seri acris oculos molestantis effluxus; sic per diuretica, & sudorifica diarrhœam serosam sanamus, & epidrosim habitualet per cathartica avertimus, quæ in serifluxibus tantum obtinent.

57. Jam vero vires reentrices augemus multiplici modo per auxilia mechanica, tum chirurgica, tum gymnastica, & per auxilia physica, tum hygetica, tum pharmaceutica.

58. Auxilia chirurgica ad sistendos sanguifluxus sunt, torcular, quo in amputationibus utimur, pressio manualis interventu lineæ carpii, aut boleti ignarii, turunda ex linteo intra nares intrusæ, fasciæ & splenia in vulneribus, &c. Auxilia gymnastica sunt, posturæ contrariæ, ut statio erecto capite in hæmorrhagia narium, situs horizontalis & quies in alvifluxibus, sessio comprimens partem ex qua quid est fluxurum est.

59. Auxilia hygetica sunt aer frigidus, aqua frigida, in epidrosi, in sanguifluxibus calore, febre stipatis; frigida enim poros, vasaque externa constringunt, cruorifuge fluxilitatem imminuunt; alimenta incrassantia, refrigerantia, demulcentia, prout materies morbifica est acrior, calidior, magis activa & concentrata.

60. Auxilia demum pharmaceutica vocantur, adstringentia medicamina tum intus, tum externe adhibenda.

CLASSIS DECIMA.

MORBI CACHECTICI,

S E U

DEFORMITATES.

1. **Qualitates mutatae** Pathologorum; *Vitia corporis*, Fel. Plater. Scilicet *deformationes, discolorationes, exturbationes, defecationes, & consumptiones: Morbi sero-symphatici, Stahlianorum; a Græco cacos pravius, & exilis habitus, forma.*

2. **Charactèr** est ægrotudo chronica, cujus præcipuum symptoma est vitium formæ in magnitudine, figura, vel colore.

Ægri vocantur *cachectici, cachectici, encochimi, deformes; Gallice cachectiques, cachectiques, malingres.*

T H E O R I A.

3. **Forma**, pulchritudo est complexus jucundus omnium qualitatum, quæ ætati, sexui, regioni conveniunt.

4. **Qualitates in Physiologia** sunt corporis dispositiones sensibus obvix, sine motu locali spectatæ; alix mechanice, ut moles, seu magnitudo, figura, numerus, proportio partium; alix physice, quarum non nisi confusa potest obtineri idea, ut color, odor, &c.

5. **Nares** resimæ, capilli lunati, labia prominentia, color niger apud Africanos complexum jucundum qualitatum, adeoque pulchritudinem designant; facies rhomboidea, oculi parvi, lutei, labia, crassa, pallida, dentes nigri ex Bethle, toror brunneus, strilis cæruleis pilis, ungues prælongi, aures pendulæ, mentum imberbe, &c. placent apud Siamcos. Statura tres pedes alta, caput subquadratum, color fuscus, labia crassa & rellæa decent Pygmæos Hudsoniensis sinus, ut statura gigantes, macies; color niger Groenlandicus aridus & nares crassæ, depressæ, clavo ligneo persollæ, aures simili clavo ornatae, caput amplum, globosum, capilli breves, rubro-luteo & cæruleo variegati, apud novæ Guinæe Incolas; apud Timorenses color aurichalceus; apud Magellanicos cupreus; apud novæ Hispaniæ Incolas color initio ruber, dein nigricans, visus hemerolopum; in Madagascariæ cutis nigra, cicatricosa, adipe foetida illita, ut Gallis Indicis, vox glaciens, aut singultuosa; apud Cassios pedum elephantia, ut apud Alpigenas quosdam brachiocele; apud Jaggas os antice edentulum mulieribus, & oculi strabones; in regno Loango pallor cadaverosus, oculi strabones, & hemerolopes; apud Horrentoros unius testis castratio, appendix hypogastrii apud mulieres pudenda tegens, illitus corporis ex adipe & fuligine, sætor, &c. pro totidem leporibus habetur.

Sawage: Nosologia Methodica. Tom. II.

6. In hac classe vero Europæorum tantum deformitates morbosas, seu notabiles enumerabimus, & eas maxime quæ symptomata in functionibus, aut in excretionibus accrescere solent; atque dividimus hos morbos in macilentos, tumidos, tuberosos, leprosos, & decolores.

7. **Males corporis absoluta**, five major, ut gigantea, five minor, ut pygmæa, nullam deformitatem involvit; verum moles deformis est cum alix partes relative majores aut minores sunt, atque ea est quæ viget in tabidis, & in tumidis.

8. **Tabidi** sunt illi in quibus moles partium corporis mollium minor est respectu ad compagemosseam, quam fert formosa corporis fabrica in statu sano adultorum; adeps dimidiam corporis partem componit; ita ut pingues ejusdem altitudinis duplo magis ponderent tabidi; viscera in tabidis ejusdem ætatis, & altitudinis, si omentum excipiamus, ut adipem detrahimus, sunt æqualia pondere pinguium visceribus; arteriæ vero, & venæ respectu ad pondus corporis duabus quintis partibus ampliores quam in adiposis, licet sint absolute æquales.

Comparatio ponderum totius & partium in macilentis.

Pondera.	unc. dram.
Corpus totum.	1140. 0.
Cerebrum.	56. 0.
Pulmo cum mediast. & pericardio.	66. 0.
Cor nudum.	10. 0.
Hepar.	45. 0.
Intestinum tenue.	21. 6.
crassum.	17. 4.
Mesenterium.	8. 0.
Lien.	6. 4.
Ventriculus.	5. 3.
Vesica.	5. 0.
Ren sinister.	4. 4.
dexter.	4. 3.
Pancreas.	2. 4.
Epiploon.	1. 0.
Capulæ renales duæ.	0. 3.
Cutis sine adipe.	160. 0.

9. **Pondera viscerum in macilentis** sunt duplo majora respectu ponderis totius corporis humani quam in sanis pinguibus; ergo si secur v.g. renitatur tactui, tunc ejus moles videbitur major absolute, quam in statu sano, etiam si minime tumeat; difficile est itaque in macilentis judicare de augmento seu tumore viscerum.

14. **Adeps solvitur in omnibus morbis febrilibus, inflammatoriis, alvi fluxibus, serifluxibus, maxime in suppuratis, & sudantibus** necnon ab agrypnia, labore, pathematis diuturnis, ut merore, a doloribus, &c. ergo his succedit macies.

11. **Quadratum cutis segmentum in pectore cadaveris** aramento descripietur, cujus longitudo 85. 7. linear. latitudo 102. adeoque super-

P 3

facies

fices 873 t. lin.; reflectæ vero cutis illa pars habuit in longitudine 57. 2. & transversæ latitudinis 94. lin. adeoque superficiei sui æqualis 5386. lin. ergo plus quam tertia parte minor priore.

12. Minima vis fluidum impellens intra plures vesicas valet superare intra longum tempus magnam resistitiam; textus cellularum, intra quem adeps a vi circulationis adipitur, debet itaque, licet lenissime distensus in adiposus, cutis contractilitatem superare, eamque nitidam, glabram, turgidulam reddere; verum ubi viscositas, qua resistit adeps calore, alkaliescentiæ soluta est, tunc adeps cedit vi contractivæ cutis, quæ sui juris facta, rugosa, stricta & arctior evadit, ut patet experimento allato: ergo & corporis moles debet in partibus carnosissimis, color floridus in sordidum mutari ob eroris expulsiōnem a cute contracta, immo si adeps uberius effusus quam a cutis contractilitate spectandum est, cui debet esse flaccida, marcidæque, ut in atrophia accidit.

13. Quoniam vero ossium capita seu apophyses in genubus, manibus, omoplatis, &c. sola cute teguntur, nec a macie decreverunt, illa videntur excrevisse, si de eorum volumine ex carni mole judicemus, ut non raro defectu attentionis accidit; ergo in hoc casu articuli in macilentis protruberare videntur, & fieri potest, ut rachiticos judicemus, qui simpliciter macilenti sunt.

14. *Extuberantia* partium est earum supra consuetam l'bellam elevato; fit autem vel in partibus omnibus carnosissimis ab adipi, ut in polyfarcia, vel ab humore collecto, ut in anasarca, vel in partibus quibusdam tantum, ut in ascite, phyfconia, vel in offeiss partibus, ut in rachitide, vel in subcutaneis cutaneis glandulis, ut in leprosis; in quibus duo sunt potissimum spectanda, scilicet extuberantia, quæ est symptoma classis, cuius theoriam ex theoria tumorum primæ classis deducere est; symptomata accessoria, quæ ut plurimum vitiosam sanguinis humorumque crasim arguunt, ut virus syphiliticum, scorbuticum, canerosum, leprosum, scabiosum: quandoque infectis tribuenda sunt, ut phthisis, malis, &c.

15. Vitia crascos, quæ hos morbos fovent, ad huc in obscuro latent; & nondum Chemia satis adelevit, ut ad eorum cognitionem claram nedom distinctam nos possit manuducere; quidquid enim novimus de salum alkaliescentium, & acidorum indole, aut vitibus, nimis est genericum, nec quidquam fere prodest ad speciem virus syphilitici, scorbutici, canerosi cognitionem assequendam; cum itaque horum theoria sit confusa, necessum est ut theoria sit empirica.

16. Corpus humanum præbet hospitium multis insectorum generibus, ita ut nulla sit fere pars quæ insecti sui generis evolendis; nutriendisque non inserviat. Capiti insident pediculi; cutim fugant cimices, & pulices; aures

infestant forficulæ; in natium sinubus muscæ ova sua deponunt; in carnibus dracunculi; in ventriculo, & intestinis lumbricis, tæne plurimum specierum; in recto ascaris; in ductu cholecho ovium alia insecta nidulantur; horum venena sunt nobis medicamina; quæ sola experientia cognoscuntur: omnia autem insecta vel ex ovibus incubatis prenascentur; ut pediculi, vel forte ex frustis majorum reflectis, ut polypi, germinant; quod de tænia verosimillimum; est verum ea theoria nondum sufficienti luce est illustrata, ut ad praxim medicam deducere non valeat; ergo iterum hic sola valet empiria, imo cognitio vermium horumce historica nondum satis est erecta.

17. *Decoloratio* est nativi coloris in alienum mutatio. Europeorum color alius est in genis, ut rubro-roseus; alius in cute residua, ut albo-roseus; alius in iride, ut dilute caruleus, fuscus; datur in uvea niger, in nævis etiam color ab illis omnibus diversus, frustaque hos omnes a nativo cuiusdam humoris peculiaris colore repeteremus, cum nullus sit humor in nobis cæruleus; atque ex theoria colorum mechanica, quam *Newtonus* adumbravit, *Eulerus* elaboravit; resultat tantum ex data tantummodo crassitie molecularum inconspicuarum, & data densitate pendere diversos colores seu determinati toni vibrationes in lucis radiis; verum inde nil ad praxim utilis adhuc redundavit; ergo mere empirica est decolorationum qua talium theoria, & hoc tantum superest, ut obstructions viscerum valorum debilitatem, cacochymiasque variis hisce morbis conjunctas curemus, quod in generibus tantum atque speciebus quibusdam horumce morborum exponemus.

18. Chronici sunt omnes morbi hujusce classis, id est d'uturni, & periculosi simul si gangrenam excipiamus, quæ brevis, & periculosa est, adeoque acuta. Morbus est nature conatus ad corrigendum corporis viventis statum; corrigere est in usum mutare; cum itaque vitiosus est corporis status, natura hujus confuse conscia uritur suis organis ad vitium illud fluidorum, & solidorum corrigendum; vitium illud est vel materies noxia functionum exercitium lædens, vel obstruendo vel irritando, & prout organa utiliora impedit vel lædit, eo promptiora, & fortiora conamina exerit natura ut ab illa materie se liberet.

19. Verum quo potentia motrix limitata fortiora exerit conamina, eo symptomata ab hisce conatibus oriunda, ut febris, convulsio, fluxus, dolor, graviora sunt, & virium impensæ majores; atque ex eo quod symptomata graviora sint, viriumque impensæ majores, eo minus perseverare possunt sine periculo; ergo eo brevior, & periculosior est morbus seu acutior.

20. Mors omnium virium exhaustionem aut suppressionem supponit; exhauriuntur eo citius vires, quo majores conatus exeruntur, & quo parcius est vitium promptuarum, seu minus est robur;

robur; supprimuntur seu suffocantur eo promptius vires, quo materies morbifica est vehementior, & cum robore minori vires impensae majores; in morbis acutis materies morbifica vehementius agit; & vires impensae proportionem eadem sunt magnae: ergo duratio morbi est in hoc casu plus minusve brevis, prout robur nativum minus vel majus est.

27. Si materies morbifica obstruat vasa sanguifera, ea vel intercepti totam molem sanguinis circulantem per obstructionem in quacunque alvei sanguiferi sectione sectam, & in hoc casu mors in promptu est. Si dimidia pars ramorum primi ordinis obstruatur, circulatio sit per aliam partem dimidam, morbusque duplo minus est acutus: si dimidia pars ramorum secundae ordinis obstruatur, quarta tantum pars circulantis in sanguinis interceptur, & periculum est quadruplo minus; si demum decimi ordinis pars dimidia vasorum obstruatur, obstructio intercepti tantum 512^{am} sanguinis partem, & periculum toties minus est.

28. Obstruitur fere totus alveus sanguinis in orihopnoea, seu subita totius pulmonis inflammatione, constrictione, aut ingurgitatione, qualis in suspensis, fumo sulphuris praefocatis: totus enim sanguis transiens per ultima vasa pulmonum subito haerens infarcit totam arteriam pulmonarem, eor extremos conatus eosque frustra neos exerit, illico perit animal.

29. Si vero dimidia pars vasorum pulmonarium infarcitur, ut in peripneumonia gravi, tunc conatus maximus, & hinc resistentiae proportionales exerit natura, usquequo resolutus sit infarctus, unde salus intra tres, vel quatuor dies: vel usquequo vires sint exhaustae, unde mors intra illum circiter terminatur.

30. Verum si ren alteruter obstruatur, quoniam una arteria emulgens decimam circiter partem sanguinis a corde ejecti partem transmittit, decies minus est periculum mortis quam in orihopnoea, & quinque minus interceptur sanguinis quam in peripneumonia gravi; ita & labor morbosus ad multo plures dies extendi prodest, & morbus non ita acutus est.

31. In morbus febrilibus & inflammatoriis, quales fere sunt omnes acuti, datur interceptione sanguinis ratio sufficiens periculi; verum in sporosis, ut apoplexia, idem vasorum cerebri infarctus datur, & ex eo infarctu intercepto fluidi nervi, unde vinum suppedio, & proinde debilitas. In dolorificis, ut gastrodynia, colica, non solum ab dolore absumitur fluidum nervum, verum ut inflammatio saepius accedit, ex constrictione vasorum circulatio interceptur; ergo ea theoria omnibus acutis intelligendis sufficit.

32. Cronici sunt illi, qui juxta Hippocratem, ultra 14. dies extenduntur, & juxta Neotericos, ultra septem septimanas; in illis vero major est distantia ab initio ad incrementum, ab incremento ad statum, & sic tardigradus est morbus, seu lente sua pereurit stadia, & in

hoc differt a diuturnis, quod periculosus sit, ut Meoterices placet.

27. In chronicis materies morbifica minimam intercepti sanguinis circulatori partem, utpotest quae materies afficit vasa ulrimorum ordinum, scilicet serosa, vel lymphatica, in quibus tanto minor sanguinis copia trajectitur, quo numerosiores sint a corde numerando divisionum vasorum ordines; obstructa sint vasa lymphatica oriunda circa 24^{um} ordinem divisionis arteriae v. 2. lienaris, cujus sectio est ad sectionem coeliacae, ut 1. ad 3: cum vero coeliaca transmittat vix octavam partem sanguinis aortam trajectientis, sanguis lienem ingrediens vix est 24^a pars ejus; ergo primae divisionis dimidium vix 48^{am} partem, dimidium secundae 96^{am}, & sextae divisionis dimidium obstructum vix 1500^{am} partem totius sanguinis intercepti; itaque non plus interceptur ex obstructis omnibus lymphaticis, quae ex hac sexta divisione possunt successive pronasci, quam 1700^a pars totius.

28. In remotis divisionibus arteriarum dantur anastomoses venarum sanguinearum cum suis arteriis, antequam ad divisiones lymphaticas perventum sit, ut videre est in mesenterio: ergo fieri potest ut fere totus sanguis per arterias delatus, obstructus etiam omnibus lymphaticis inde oriundis, per venulas sanguiferas revehatur; ergo non nisi exiguissima datur resistentia cordi opposita ex illis obstructis, fere nullum itaque exinde vitae periculum, fere nullum naturae comamen, nullus itaque morbus acutus, nisi accessus quartanae febris in hoc casu reponatur.

29. Interea tamen lien sensum distenditur ab hoc infarctu, tumescitque, unde vicina viscera permentur; praeterea lienis actiones physicae, seu preparatio sanguinis ad bilem conficiendam, & si quae aliae sunt, deficient; unde bilis iners minus ad chylopoiesin apta; hinc chylus minus aptus, magis crudus, imperfecta haematopoiesis; inde pallor, frigus, oedema pedum, anasarca, aliaeque mala oriunda; parcius praeteritum liquidum nervi ex crudo sanguine secretio, robur minus; inde periculum quod remotissime tantum vix imminet.

30. Alterius est originis periculum, quod a morbis evacuatoriis chronicis inferitur, ut a serifluxibus & alvifluxibus; malum enim illud oritur vel ab acrimonia irritante, quae simul dissolvit sanguinem, unde deficit resistentia illa ad perfectionem machinae necessaria (Class. 6. n. 37.), simulque influxus fluidi nervi ad ejectiones ano, vel caro producenda vires detrahie in ratione frequentiae, & vehementiae conatum si fluxus fiat per organa, quae motu musculari agunt in effluxibus; denique in quovis effluxu diuturno, ob imminutum in organo secretorio resistentiam, lymphae nutritiae, maxime si fluxillor, per organum laxius effluit cum succo excrementitio, unde deficit succus nutritius, & vires a laxitate organorum labascunt; cum musculi laxi, flaccidique non possint trans-

mittere ad artus vim fluidi nervei, quam accipiunt, laxatur ipſus cordis textus, & ſanguificatio impedita impar eſt præparando fluido nerveo, necnon tandem hiſce de cauſis ſucci digeſtivi inertes chylum aptum præparare nequeunt; hinc inappetentia, inedia, chyli, ſanguinis, fluidique nervei penuria.

31. Ex hoc morborum circulo, ſcilicet ex vitiata digeſtione, vitioſa ſanguinis craſis ex qua fibrarum atonia, fluidi nervei, proindeque virium penuria; ex hiſce etiam principis fibrarum & vaſorum atonia; hinc ſtaſes fluidorum, unde vitium maſus contrahunt; hinc extravasationes & hydropes, qui partem magnam chronicorum terminant; reſiduam vero partem tabes amphimeræ, heſtica, poſtiſſimum pthiſis ad mortem committantur: verum hiſ addendi ſunt halitus putridi, venenati, qui ex certis corruptelis humorum, & ex omni ſphacelata parte exhalant, qui fluido nerveo vel extinguendo, vel deſtruendo mortem inferunt, & hæc ſunt pericula ultima a chronicis metuenda.

32. Vitia itaque ſatis cognita in chronicis

ſunt, 1. cacochymia, 2. cacochylia; 3. debilitas, & mollities in ſolidis, 4. obſtructio ab ſpiſſo & acri in vaſis poſtiſſimum lymphaticis. Auxilia itaque generalia in hiſ indicata, ſunt, 1. quæ colatoria perſpirationis, urinæ, cæterorumque excrementorum pravis ſuccis inquinata depurant, 2. quæ vitioſas digeſtiones corrigunt; 3. quæ tonum ſolidus reddunt; 4. demum quæ obſtructa, vaſa, viſcera reſerant, acrimoniam edulcorando, ſimulque viſcida fluida reſolvendo.

Cacochymiam bilioſam, ſeu bilem in hepate, & ſanguine reduodantem educunt cathartica iterata, modo prius huius excrementi fluxilitas huic expurgationi locum præberit; in hunc itaque ſinem juſcula & apozemata ex plantis cichoraceis, hepaticis dictis, præmittuntur, ſerum lactis æſtate poſtiſſimum uſurpatur, necnon aquæ martialis adhibentur.

Cacochymiam purulentam, ſeu purulentiam in quovis viſcere enatam, expurgant natura per anacardiſm in pthiſi, per miſtum in pyuria, & ſic deinceps; ergo Medici officiū eſt illam evacuarē.



CLASSIS DECIMÆ ET ULTIMÆ

S Y N O P S I S

C A C H E X I Æ.

CHARACTER. Vitiōsus corporis habitus quoad volumen, æqualitatem, levitatem & colorem.

ORDO I. MACIES, (*Consumptions*) morbi quorum præcipuum symptoma est imminutio voluminis a pinguedinis defectu.

- I. **T**ABES, (*Esfise*) macies cum amphimerina lenta sine tussi.
 II. **P**HTHISIS, (*Phthifise*) macies cum amphimerina lenta, tussi & anacathartu puru-
 lenta.
 III. **A**TROPHOBIA, (*Atrophie*) macies sine febre.
 IV. **A**RIDURA, (*Dessèchement*) macies unius tantum partis.

ORDO II. INTUMESCENTIÆ, (*Enflures*) deformitas a volumine adaucto.

- V. **P**OLYSARCIA, (*Corpulence*) intumescencia universalis ab adipē.
 VI. **P**NEUMATOSIS, (*Bouffissure*) intumescencia universalis corporis a flatu.
 VII. **A**NASARCA, (*Anasarque*) intumescencia totius corporis œdematosa.
 VIII. **P**HLEGMATIÆ, (*Oedématis*) intumescencia partium inferiorum œdematosa.
 IX. **P**HYSCONIA, (*gros Ventre*) intumescencia abdominis a partibus solidis sine graviditate & fluctuatione.
 X. **G**RAVIDITAS, (*Grossesse*) intumescencia abdominis ab hypogastrio incipiens, opus generationis subsequens & partu terminanda.

ORDO III. HYDROPEꝶ PARTIALES, (*Hydropifus locales*) tumor a fluidis in capite, abdomine, uterove congestis.

- XI. **H**YDROCEPHALUS, (*Hydrocèphale*) est hydrops capitis a sero.
 XII. **P**HYSOCEPHALUS, (*Enflure de tete*) est hydrops capitis a flatu.
 XIII. **H**YDRORACHITIS, tumor cysticus ex hiatu vertebrarum lumbarium in reconditis protuberans.
 XIV. **A**SCITES, (*Ascite*) hydrops totius abdominis a fluido non elastico, seu gravis & fluctuosus.
 XV. **H**YDROMETRA, (*Hydropifis de matrice*) tumor hypogastrii sine graviditate ab utero fluidis distenso.
 XVI. **P**HYSMETRA, (*Tympanite de matrice*) tumor hypogastrii a flatu uterum distendente.
 XVII. **T**YMPANITES, (*Tympanite*) hydrops totius abdominis a flatu, seu elasticus & levis.
 XVIII. **M**ETEORISMUS, (*Mécorisme*) est inflatio flatulenta, vel epigastrii, vel in morbo acuto ipsius abdominis.
 XIX. **I**SCHURIA, (*Ischurie*) tumor hypogastrii ex urinæ retentione sæpius intra vesicam.

ORDO IV. TUBERA, (*Protrèrance*) tumores partium solidarum non hydropici.

- XX. **R**ACHITIS, (*Rickets*) deformitas est articularum tumore duro, carniū marcore, capitis mole, cum ingenio præcoci, in puerulis.
 XXI. **S**CROPHULA, (*Ecroûelle*) tumor scirrhosus glandularum colli, mesenterique; cum labiis & naso crassioribus.
 XXII. **C**ARCINOMA, (*Ulcères chancereux*) ulcera cancroſa cum doloribus lancinantibus.
 XXIII. **L**EONTIASIS, cognoscitur ex papillis setaceis, vel corniculatis cutim exasperantibus.
 XXIV. **M**ALIS, (*Clavels*) tumores sæpius purulenti, vel ulcera, cum infectis vermiformibus, passim enata.
 XXV. **F**RAMBÆSIA, (*Taruv, Piau*) excreſcentiæ fungosæ mori instar granulosa, sæpius cum ulceribus, &c.

Q R-

CACHEXIAE

SEU

MORBI CACHECTICI.

Sunt morbi quorum præcipuum symptoma est sorditas, seu formæ nativæ alteratio notabilis.

Cum forma seu pulchritudo supponat concursus qualitatum sensibilibus, ut figuræ, molis, numeri, proportionis partium, nec non glabrietatis, coloris, consistentiæ, &c. quales apparent in hominibus qui ea ratione cæteris omnibus placent, quoties alterutram ex hisce deficit, datur deformitas, quæ tamen non est morbosa, nisi notabilis & constans sit, atque utplurimum aliis gravibus symptomatibus stipetur.

Deformitas Græcis *cachexia* vocatur, seu pravus corporis habitus. Cachexia titulo vulgo Veteres designant macies, icteritias, impetigines, diversasque lues chronicas, ut ex definitionibus Cerehal deducuntur.

Non omnis sorditas accenseri potest inter morbos hujusce Classis; sic parvus odor licet ad qualitates vitiosas attineat, est potius symptoma aliorum morborum, ut orænz, enureticos, diarrhææ; *caloris* & *coloris* vitium in febribus phlegmaticis, aliisque morbis acutis, non est præcipuum symptoma, adeoque licet vitiosæ sint qualitates illæ, ad alias classes, quarum sunt symptoma, rectius pertineant.

Habitus vitiatæ *mechanicæ* ubi situs, numerus, figura, proportio partium sensibilibus mutatur, ut in rachitide, gibbositate, vulnere, hernia, monstruositate, hydrocephalo, &c. *physicæ* vero pervertitur ubi debita proportio vel humorum inter se, vel molecularum insensibilibus diversæ qualitatis mutatur, sic bile prædominante flavescit cutis, lymphæ excedente pallescit, partibus igneis nimis extricatis calet, densata scigore cutis rige, &c. Consultatur *Physiologia de temperamentis*, p. 241.

Vitia corporis mechanica vocantur vitia *structura*; vitia physica vocantur vitia *crasis* seu *mixtura*. Omnis mutatio fit per motum, adeoque per vires motrices vel resistentes; omne vitium est mutatio in corpore sano facta; ejus proinde causa ad vim mutantem reduci debet, eamque vel *mechanicam*, qualis ad luxationem, excrecentiam, aliaque vitia organica concurrunt; vel *physicam*, ut adhesionem, secretionem, motum intestinum, ex quibus vitia physica seu intemperies oriuntur; ut vires corporis humani mechanice & physice concurrant ad eundem finem propter quem a summo Numine institutæ sunt, sanitas viget, *Physiologia*, p. 128. & tunc structura & mixtura partium se habent perfectissime *Pathol. n. 2*. Causa itaque vitiorum cor-

poris conspicuorum in structura & crasi, est vitium earum diffusum, fusius demonstrante Ill^o *Schreibero in Physiologia*.

Natura vitiosis organis utens & mediis ad finem suum obtinendum aptis destituta non potest solito vigore & successu machinæ humanæ vitia mechanica & physica corrigere, ut ea corrigat; vel emendare nititur, dum vigor est in machina, viget ætatis robor, & vires animæ longo morbo non sunt fractæ; in morbis itaque cachecticis, in quibus nec ea est soliditas firmitas, nec ea fluidis activitas, quæ ad vitium exercitium vegetum requiritur, maxime si ætas ingravescent, debilitas nativæ, vel morbis acquisita accedant, deficiunt illi naturæ coactus, qui febres acutas, metastases, crises celeretque mutationes excitant; morbi itaque cachectici sunt utplurimum chronici, id est, tarde procedunt, lente mutantur, & deficiente facultate sæpe morte terminantur.

Pectinent juxta methodicos ad morbos *laxos*, in quibus scilicet solidorum tonus nativo minor est juxta Galenicis ad *insuperis frigidas & pituitosas*; juxta Chymicos ad aquei seu *phlegmatici* principii prædominium; juxta Mechanicos ad inæquilibrium ex solidorum oriundum, & ad obstructions lymphaticas.

ORDO PRIMUS.

MACIES.

SI pressio lateralis vasis illata a fluidis præteritis perseveret, ea vasa consecram servant diametrum & tensionem, adeoque partes ex iis vasis conflata suam firmitatem & magnitudinem; pressio vero lateralis decrevit tum ex immutato influxu liquidorum ex arteriis in vasa minora, tum ex aucto eorum in venas & vasa excretoria effluxu, atque ex excessu effluxus supra influxum pendet lateralis pressionis imminutio.

Decrescente vero laterali pressione fluidorum in solida; si vasa sint satis elastica, pari passu coarctantur partes, cutisque corrugatur, fit consumptio cum aridura & liccitate; si vero vasa elatere careant, partes marcescunt; seu flaccide magis quam macilentæ evadunt. Hinc discrimen inter marcorem & macilentiam; marcorelaxitatem supponit, non voluminis imminutionem; marces voluminis potissimum imminutionem importat; quo vero pacto ab imminuta laterali pressione vasorum oriatur macies per vim elasticam, tanquam causam, & sola imminuta pressio marcorem oriatur, intellectu facillimum est.

Influxus fluidorum in vasa minora minuitur imminuta *facilitate* cor contrahente, ut a motore, tenebunt, languore, longo morbo prægratia, longo jejuniis, laboribus immodicis, pathetice.

thematiz diuturnis, vigiliis, vel etiam aucta *resistentia* locali in magnis arteriis alicubi compressis, ut a tumore, luxatione, fracto osse, excrecentia, vel ab aneurysmate impetum sanguinis interceptante, vel a concretionem polyposa idem præstante.

Effluxus fluidorum & vasu minoribus sanguiferis lymphatica & adiposæ, augeatur in majori ratione quam influxus, si *aperticia* excretoria sudoris, urinæ, perspirationis, aut coloraria morboſa, scilicet ulcera, fonticuli, intestinorum emundatoria, nimis patula sint, vel etiam irritata ad excretionem, quod accidit in evacuatoriis serosis, purulentis, alvifluxibus, nec non si fluidorum *viscositas* nativa mutantur diluentibus, potulentis, medicamentis fundentibus, exercitiis, venenis, laconicis, amnochafis, vel dissolventibus miasmatis, medicamentis alkalinis, mercurialibus, diureticis, acerbis.

Macies itaque erit in ratione excessus quo effluxus superat influxum, & elasticitatis valorum.

L. TABES. *Esifis*.

Character est totius corporis malicentia, cum pyrexia lenta, habituali, citra tussim & puris sputum.

Differt ab atrophia, quæ febre habituali caret; a phthisi, quæ tussi & puris sputo, vel alterutro stipatur; alia est primaria, seu morbi præcipuum symptoma; alia secundaria, quæ morbo alterutrius generis jam degeneris supervenit aut succedit; eaque frequentissima est.

Ægri vocantur tabidi, *etiques*.

Symptomata essentialia sunt *macilentia* & *hædica*. Hædica quidem causa est conatus naturæ ad expurgandum sanguinem a purulentis, acerbisve miasmatis per frequentes cordis & vasorum pulsationes, sed ob facultatis imbecillitatem, lentas & interpolatas: maciei vero causa est elasticitatis naturæ excessus supra pressionem lateralem fluidorum in solida, sed huius pressionis lateralis imminutio. Pressio autem lateralis imminuitur maxime in tabe ob auctum effluxum humorum & vasu, sive quia ea fluida sunt acrida, & ad secretionem cutaneam ulcerosam vasa sollicitant; sive quia sunt simul dissoluta, fluxiora, unde perspirando, sudando, aut quovis modo avolunt, eliminantur.

Differtur tabidi ab hædica, quia in tabidus major est morbus ratione maciei, in hædica ratione febris; nec non quia in hædica nullum est viscus nulla pars vitio hxo & organico affecta, quod valet sæpe in tabidis. De cætero vulgo confunduntur sine errore in præxi periculoſo.

1. *Tabes dorsalis* Læmmii Obs. l. 2. *Phthisis* notata Hippocratis lib. de morbis C.

Ea est quæ recens uxoratos & luxoriosos, in veneris rebus non satis continentes, aggreditur; febre capent initio, & cibos appetunt, ast emaciantur; fornicarum a capite secundum spinam decurrentium sensum se habere putant;

urinam emittendo semen simul emittunt, vel mucum proflatarum viscidum; anhelosi, debiles, capite graves, febriculosi evadunt. Nihil videri usus teste *Sandorio*, nocet stomacho, oculisque, perspirationem præpedit, fenes debilitat, refrigeratque, juvenes leviores & calidiores reddit. Qui diutius libidini indulgent, nec febris vivunt, illi vires stomachi labefactant, & inde pravæ digestionis; unde cruditates, stertus & hypochondriasis, simulque viribus imbecilles evadunt, colliqueſcunt, & tandem *hexanſti*, sic enim vocantur ægri, percutunt.

Juxta *Læmmium* accidentia tabis dorsalis sunt cephalalgia vehementis, acuta lumbago dolore formicanti collum & lumbos sequente, rheumatismus inflexionem crurum impediens, alvus pigra, mictus difficilis, feminis effluxus inter mingendum & in somno, dyspnœa & lassitudo ab ascensu cum gravitate capitis & tinnitu aurium; febris nulla, macies in dies crescens, dolor artuum crescens: morbo inveteralente accedit phlegmatia, tremor manuum, amaurosis: ægritudo post annos plures reverti solet, non raro per septennia: vide *Satyrion*, *Camphoram*. Hæc descriptio optime convenit ægro quem prius oculis habeo: vires autem varietates tabis dorsalis quas refert *Hippocrates*, citatus a *Riverio*, signis sufficientibus sunt destituta: Vide *Lumbaginem* 16. m.

Pramissis universalibus *Hippocrates* præscribit lac asinum, deinde lac vaccinum per quadraginta dies, & postea cibis molibus vires reſcit.

Prodest etiam illis qui venere abstinere reculant, cibis eucharis & reſcients ex carnibus succulentis assis, coccolata cum vanilla, moscho, ambra; semina pinum, radix ginseng, pisticia, avellaneque fructus, bulbi ex orchide, salep, ex quibus parantur cremores.

2. *Tabes renalis*. *Phthisis nephritica* Hippocr. C.

Ea est species quæ ex renum exaceratione dependet. Memorabilis huc pertinet casus chiliarum *Tovynshend*, quem refert *Cheyneus*, *the English malady* p. 308. A multis annis laborabat ille doloribus nephriticis, cum constanti vomitu, unde vitam miseram incebat. Usus erat strido regimine, lacte asinino, & aquis Bristolii. Is ipse pro lubitu modo in sedili se componeret sibi omnia vitæ signa eripere, deinde reſtituere poterat, cujus singularis facultatis, & in proprium cor imperii testes fecit Ill. *Cheyneus*, *Baynardum* & pharmacopolam *Skrine*. Facto experimento suis valedixit, codicillum testamentum suo addidit, & Sacramentis assumpsit tranquille expiravit.

Scito cadavere omnia rite se habuerunt, excepto rene dextro, qui quadruplo major erat solito, vesicæ instar distensus, & pulte albescens; quæ durante morbo post urinas excrebatur; tingidus erat calceæ materie vel gypsa; & carnea renis substantia dissoluta evanescat, hoc nephriticis cancro excisa.

3. *Tabes apostematosa*. *Tabes ab apostematibus & ulceribus* Morton Phthisiol. cap. 5. C.

Ea est species quam fovet apostema, vel ulcus, vel fistula cuiuscumque partis musculosæ. Substractio succi nutritii a massa sanguinea huic originem præbet. Hanc continentur febris, languor, inappetentia, vigilie, febris, continuata hæctica vespere exacerbans, quæ ad ultimum maciem ægrum deducit.

Sedes abscessus ulcerisve est in quavis parte, ut in tegumentis, capite, corde, diaphragmate glandulis colli, lumborum, crurum, pedum, &c. Vide *Sepulchretum Boneti Tom. 3. sect. 7. de Tabes*; *Morsanum Phthisiologia cap. 5.*

Curatio ex Mortono fusc habetur. In genere sectio apostemate, pus expurgetur auxilii chirurgici, intus balsamica; crasis sanguinis demulceatur lacticiinis, aquis sulphureis, decoctis ex china, falsiperilla, dulcamara.

4. *Tabes nutritium* Morton Phthisiol. c. 6. C. Tabes a nimia lactatione cognoscitur 1. inappetentia; 2. languore virium; 3. frequenti hystricia; 4. calore hæctico, quibus non raro rufis, dyspnœa, & signa ipsius phthiseos imminens accedunt.

Tabes illa recens curatur 3. ablactatione alimæ; 2. cibis eulymis nutritici oblati; 3. hilaritate animo conciliata; 4. usu diæte lactæ, in loco ubi iucundam vitam transigere possit.

5. *Tabes ab hydropse* Morton. Phthisiol. cap. 2. C.

Hydrops nomine non genus morbi, sed ordinem morborum intelligi, ubi continentur ascites, hydrothorax, hydrocephalus, &c. Hos morbos tabes subsequitur ob sanguinis depauperationem, succo nutritio in abdomen vel thoracem effuso. Signa sunt pallor faciei, febris assidua, urina pauca & lateritia, languor virium, inappetentia, febris lenta; eventus est sæpissime lethalis.

Indicantur 1. hydragoga repetita, si vires vigent; 2. vel diuretica salina; 3. aperientia martialia, ut principium morbi, scilicet iccinoris vel lienis aut ovarii obstructio, tollatur. Vide *Sydenhamum & Alex. Trallianum de Ascite*.

6. *Tabes sudatoria*; *Tabes a sudoribus immensis* Morton. Phthisiol. C.

Hanc speciem sudores assidui vel nocturni atque febricula comitatur. Hæc phthisi confirmatæ comitem se adiungit; aut quandoque scortum a crasi sanguinis dissoluta, acri, scorbutica pendet. Vide *Ephrosium*, in morbis evacuatoriis.

7. *Tabes a pericardio*. Salius de affectibus omissis, Zacutus Prax. admirabil. lib. 2. obs. 137.

Galenus hanc tabem in simia & gallo ob tumorem in pericardio ortam observavit sectis animalibus; Zacutus ter observavit, cuius signa sunt frequens animi deliquium, cordis palpitatio, pulsus durus, parvus, febricula & absumptio.

Secundo cadavere tubercula dura intus quandoque suppurata reperiuntur in pericardio.

Hic affectus chronicus, insaniabilisque est.

Similem tabem in bove observavit *Boreholius*, Hist. 32. centur. 2.; a cordis abscessu *Galen.* lib. 5. cap. 1. de locis affectis.

8. *Tabes hepatica* Boneti Sepulchret. T. 1. p. 742. *Tabes a scirrhus hepatis* Ol. Borrichii observ. 95. C.

In hac specie substantia hepatis est referta granulis duris, albis, qualia in jecore porcorum strumoforum vulgo observantur.

Hanc tabem in adolescente observavit *Borrichius*; plures huius historici vide in *Boneti Sepulchreto*. Si suppurati hepatis substantia per ductum cholecysticum seratur dissoluta in intestinum, inde oritur hepatirrhœa purulenta. Hanc tabem incisio hypocondrio curantur *D. Choleymean & Soulier*.

9. *Tabes hepatica* D. Monro Essais d'Edimburg Tom. IV. art. 47. obs. 5.

Incipit ab hepatalgia gravi; apparet tumor dolorificus in hepatis regione, color faciei plumbeus evadit, pulsus parvus & frequens, paroxysmi nocturni sudore matutino terminantur, anorexia; a passu magis dolet epigastrium; si continua, somnus interruptus, diarrhœa pertinax.

Observavit *Monro* talem tabem, ubi admotis epigastrio cataplasmatibus maturantibus, diarrhœa ope feri lacus perseverante, intra aliquot dies, tumor qui fluctuabat sensum evanuit, licet nulum pus in facibus appareret.

9. *Tabes mesenterica* Baglivi; *Tabes a glandulis mesenterii* Boneti Sepulchret. pag. 745., 746. Tom. 1.; Frid. Hoffmanni de affectione phthisica, cap. xt. 3. C.

Ea species pendet a glandulis mesenterii scissis tantum, ut sæpius observavi in Nosocomio generali, vel etiam simul suppuratis; in illis quandoque nulla scrophulæ signa alia reperiuntur. Infantes circiter septennæ ex scortis nati maxime huic tabi sunt obnoxii; pallent, morerent, cum addaphagia, seu fame voraci; quandoque pica accedit, alvi luitas, lienterica, emaciantur, febricula absumuntur, & sæpe in ascitem, vel phlegmasiam morte terminandam delabuntur.

Vide horum scirrhorum descriptionem apud *VWhartonum Adenograph. cap. XII.* & delineationem apud *Russellum de Tabes glandulari*, Londin. 1750. in 8. Curantur martialibus, aquis chalybeatis, infuso rhei pro potu, & deinde lacticiis.

10. *Tabes glandulari* *Russelli* de Tabæ Gland. *Glandula indurata* *Pauli Aeginetæ*, *Tabes scrophulosa*.

Ea est quæ glandularum colli, aurium, bronchiorum, & mesenterii simul tumore fovetur, eoque albo duro. Triplex est tempus distinguendum, 1. indurationis glandularum, 2. inflammationis, 3. suppurationis. Glandulæ lymphaticæ affectæ constituunt catenam quæ ex auribus ad collum thyrum in pectus, & inde in abdomen descendit utrinque.

Glandulæ illæ indurantur a vitu scrophuloso, quod

quod per litum mercurialem frustra aggressi sunt percelebres Medici; suadet in hoc casu *Geoffrey* antimonium crudum in pollinem tenuissimum redactum ad grana pauca per menses continuandum; *Russellus* vero in libello de tabe glandulari, & aqua marina, suadet in hoc primo stadio tanquam expertum pluries remedium, & a *Sereno Samonico* ac *Calso* olim laudatum, aquam marinam sive puram, sive melle edulcoratam, quæ nunc *Thalassemel* vocatur, & ad libræ unam singulis diebus mane hauriatur, non neglecto lactis usu in tertio stadio.

11. *Tabes syphilitica*; *Tabes Gallica* *Roderici a Fonseca* tom. 1.; *Schenckii* lib. 6.; *Atrophia a lue venerea* *Alstruc.* lib. 4. cap. 3. C.

Ea est quæ post concubitum impurum, gonorrhæamque virulentam inopportune repulsam, ulcuscula in pudendis, tubones inguinales, herpes, varosque frontis, vel colli, demum dolores nocturnos, vomeris, tonsillarum, uvulæ, palati exsectionem, ac osium erosiones & tumores accersivit; ea quidem rite administrata hydrargyrosi, post sufficientem jussulorum, lactis & balneorum usum, curari solet; verum si imperite tractata fuerit, adeoque resistit, non raro syphilis in tabem eo magis curatam difficilem abit. Vel etiam si rite curata fuerit syphilis; interea tabes syphilitica perseverat, si osium medulla tabo & carie pertruxit, in quo casu non alia tentari medela potest, quam ossis aperitio, ratio, excisio, ultio, si vires ægri fuerant, intereundem inunctus æger est hydrargyro; dein vero lacticiuia, jussula ex tenuissimis parata colophonum imponunt.

12. *Tabes ulceroſa*.

Ea non aliam curationem exigit quam quæ sit ab abscessibus, excepto quod cum ulcus & fistula perniciosa fuerint, timendum est ne vel a latente carie cuiusdam ossis fistulæ soveantur, vel ne pus a finibus & labyrinthis sovetis partes internas excavantibus suppedietur, vel demum ne sanguinis labe quædam syphilitica, variolosa, cancroſa, vel scrophulosa merbum sustineat, in quibus casibus auxilia chirurgica remediis internis consocianda sunt.

13. *Tabes catarrhalis* *Frid. Hoffmann.* de affect. phthisica. §. 3. *Hætica catarrhalis* *Guarionii*. C.

A catarrho inveterato, rheumate neglecto febricula quotidie cum rigore exacerbans accidit; inde inappetentia, inedia, tussis, mætor, marcor, macies. Quomodo hic affectus a phthisi imminente distingui possit, & an sit ab ea diversus, judicent alii.

Curatur præmissis generalibus, per ea quæ lymphæ fluxilitatem & blanditiem conciliant, lacticiuia scilicet, & dixtam mediocrem.

14. *Tabes a stomacho* *Collect. Acad.* Tom. 3. p. 152. observ. 4.: *Mal subtil*, *Furetiere* *Diſſionn. C.*

Fredericus Archiepiscopus Bremensis ob tussim siccam, maciem, aliæque symptomata pro phthisico apud Medicos habebatur; in cadavere pulmo sanus repertus est, stomachus vero cor-

ruptus quasi sphaculosus, & ita scetidus, ut nihil magis.

15. *Tabes a vomica* *Vandermonde Journ. de Med.* Nov. 1758. p. 449. C.

Febris adeit quasi recidiva post peripneumoniam, cum dyspnœa, seu oppressione pectoris, tussis spasmodica, difficultate decumbendi in quodvis latas, dolore obscuro in interiore pectoris crescente, cum in alterum latus vomicæ oppositum jacet, febris hætica, macies in dies crescens, demum post violentum tussis paroxysmum rejectio cythidis, vel membranæ pus continentis. In observatione citat *D. Caussio Aquismortuensis Medici*, viginti vermiculi in pure cythidis natabant.

16. *Tabes rachialgica* *Tulpia Lib. III. obs. 14.* & *Tabes dorsalis* 2. *Hippocratis*.

Ea non est venerea; pendet ab acri humore medullam spinalem opprimente, cum doloribus atrocibus totius spinæ dorsalis & febricula lenta: *Boneti Sepulchri. T. 1. p. 762.*; *Journ. de Med. Mars 1764. p. 215.*

Hæc tabes notatur facie macilenta, mœſta, macida, oculis languidis, artubus extenuatis, fere immobilibus; corpus sceletro simile est; synochus, quæ secundam rachialgiæ periodum stipabat, jam hæticæ locum cedit; mesenterii glandulæ sæpius scirrhusæ & suppuratæ hanc favent; solida sunt exsucca, indurata; fluida actia & sicca. Ægri nutriuntur decocto cichorii & gruti; utantur lacte asinino per autumnum, vaccino & caprino cum asininam deficit; & dilui debet decocto chamæmeli, pauſillo salutaris, vel misceri cum acidulis ferrugineis; ætate balnea medicata usurpentur.

17. *Tabes a veneno*, *Amati Cent. II. cur. 65. C.*

Ab arsenico exigua copia assumpto, vel ab ejus levi decocto aqua Italorum dicto, sensim tabo assumi, & serius occlusæ perimi haud dubium est, nisi longus lactis usus veneni acrimoniam deleat.

11. **PHTHISIS**, Græci *Phthoe* & *Phthisis* a *phthis* vel *phthoo*, corrompo, *Phthisis pulmonaris* *Morton.* *Phthisiol.* *Pulmonia* *Cirigli* *Consult.* & *Tise* ac *Tischezza* *Italarum*; *Gallis Phthisis*, *Pulmonis*, *Consumption.* Ægri *Phthisiques*, *Pulmoniques*.

Character. Est corporis emaciatio cum amphimerina lenta, tussis, dyspnœa, & ut plurimum puris spuro.

Constitus naturæ aut expurgandos pulmones a purulenta, aut ichorosa materia eos irritante, videtur omnium symptomatum causa.

Principium vero est infarctus pulmonis suppuratorius, initio scilicet scirrhusus, vel tuberculosus, cum acrimonia summa; unde tussis sicca & frequens, lex qua tuberculorum illorum suppuratio promoveatur, forte puris pars fluxilior resorpta sanguinis massam inficit, dissolvit, vasa irritat, febremque amphimerinam sollicitat.

est, cujus paroxysmi sudoribus colli, capitis, pectoris effusus terminantur; hinc facti pallor, marcor, corporis macies, colligatio, debilitas, somnus tussis interruptus, anxietas, qua sit ut sine ratione sibi & aliis facile irascantur, nullus tamen pectoris dolor constans, unde forte nunquam de recuperanda sanitate desperant.

Cognoscitur phthisis 1. tussis initio sicca, pertinaci, quæ rheuma neglectum, pertinax & recidivans ab ægro vocatur, cum vocis sono solito acutiori, canglofo, pondere & oppressione pectoris, mœore, difficili inter ambulandum respiratione, quæ mucosa uberi expectoratione sublevari. 2. Pyrexia quæ habitualis est, post-patium exacerbans, cum genarum rubore roseo circumscripto, dum residua facies pallet, fordet, marcescit; est cum pulsu parvo, frequentiori; vespere & noctu incenditur, unde vigiliæ, calor acer, & summo mane sudor; pyrexia autem illa identidem veluti peripneumonia evadit, cum dyspnœa majori, quandoque sputo suberuento, & dein uberiori expectoratione, quæ purulenta est; hinc sitis, urina rubra, macies crescit. 3. Sputa initio pauca, expectoratu difficilia, viscosa; dein remittente febre, mucosa, copiosa evadunt, grisea, subdulcia, vel salsa & acria, fœtida, flava dum siccantur, & viscosa, in aquam conjuncta demerguntur, nisi spuma sustineantur, supervenit demum diarrhœa colloquativa sputa suppressim, unguens curvantur, capilli delabuntur, corpus extenuatur, & vix unquam ab ægro prævisa, mors supervenit.

Sectio cadaveris monstrat pulmones tuberculis duris resperfos, cum diversis interpositis abscessibus; hinc pulmones nedum exesi sine, ut vulgus putat, sunt tumidiores & solito ponderosiores, puræ & mucæ referti, adeps in toto corpore nullus, musculi exiles, entis rugosa, flaccida, tempora concava, facies exsuffa, Hippocratica dicta: Vide historiam & curam *Diénaire de Santé*.

Phthisis primaria.

Illæ sunt quæ sæpius hæreditarie a decimo octavo ad trigimum sextum ætatis annum supervenire consueverunt, vel acquiritæ, quæ quavis ætate prædispositis accedunt.

Prædispositio autem est siccitas & macies habitualis, vox exilis, & levi de causa rauescens, cutis alba & mollis, scapulae prominentes velut alata, pedus angustum, aut male conformatum, collum longum, genæ rubræ, exsecratio matutina, copiosa, frequens, species sequentes sunt velut gradus diversi phthiseos, qui tamen ob diuturnitatem morbi singularem medelam tanquam diversæ species exigunt, maxime cum aliquando suos ægros ipse primus gradus auferat, antequam sequentia stadia morbus percurrat.

1. *Phthisis sicca; Tubercula pulmonis*, vulgo *Phthisis incipiens* Morton. *Tuberculum cradum* Hippocrat. *Phthisis a scirrhis pulmonum; Phthisis sèche*. C.

Illa est quæ sine ullo aut notabili puris sputo ægrum successive emaciât, sudoribus extenuat; cum febre amphimerina, dyspnœa, manuum & pedum calore intenso, sicco.

Principium ejus est induratio & intumescencia glandularum bronchialium, quas per totum pulmonem resperfas, duras & nigricantes in cadaveribus observavi, nequaquam in centro suppuratas, sed veluti coherentes & firmas, avellana-rum, aut nucum magnitudine; interea ex illis in bronchia exsudabat mucus purulentus, quem in sputis nunquam observare potueram.

Cognoscitur hæc species, 1. tussis chronica non unius circiter, ut in rheumate, sed plurium mensium, eaque etiam initio & continuo sicca, quæ in rheumate humida est; tussis illa phthisica, mitis initio, dein ferina evadit, & vomitionem a pulsu excitat; hæc tussim ægri fæpe tribuant humori acri in laryngem depulenti, eamque stimulant; unde sibbus repetitis, mucum quidem guttaris & salivam uberem exspuunt, sed nihil, aut quid paucum expectorant, contra quam accidit in rheumate; hæc tussim phthisicam comitatur vox habitualiter exilis, quasi calitratorum, necnon dyspnœa ex motu corporis, pectorisque oppressio, unde pro asthma sicco sæpe Medicis ipsi imponit; comitatur etiam anorexia, necnon difficilior in aleritum laus decubitus, accedit ægri morofitas insolita, ut vix ab amicis tolerari possit. 2. Cognoscitur ex febre cum siti, inappetentia, urinae rubedine, fervore volæ manuum & pedum, vespertina & pomeridiana exacerbatione, unde a rheumate & catarrho distinguitur, quæ quidem febris lenibus etiam catharticis resistit, & nunquam desinit. 3. Tandem macies quæ eo velocius procedit, quo eratis sanguinis est acrior; aut in pituitosis & adiposis sæpe vix per annum est sensibilis.

Lympha concrefcens in glandulis bronchialibus scirrhos, seu tubercula steatomata producit, ac proinde indicatio eurativa est, ut huic lymphæ fluxilitas concilietur ea cautela, ut sine violentia & irritatione referentur hæc vasa lymphatica; sed hoc opus, hic labor est, adeoque incidentia levissima, antequam febris accesserit, sunt præscribenda, & cum lacticiis, vel edulcorantibus similibus diu usurpanda. Huc referunt, præmissa phlebotomia, jussula ex pullo, ranis, testudine, cum uno, aut altero cancro fluviatili, foliis hederulae, floribus tussilaginis, vere & autumnum repetenda. Si chlorosis, menium suppressio, scrophulosa dispositio adit, pulvis tenuissimus ferri, antimonii crudi ad granum duo per menses addantur, aquæ chalybeatæ pro potu usurpentur.

Serum lactis cum succo cichorii, symbrii aquatici & decem assellis, opiata ex carchu, assellis pul-

metis est & chronica ab admissio frigore, vel errore in victu; febris accedit cum inappetentia.

Cognoscitur ulterius eruptione exanthematicum instar herpeticis miliaris, & erosione gingivarum.

Indicantur in hac specie raro opiatia, quæ sputum supprimunt, nec juvene lacticiia, quæ stomacho vix tolerari possunt, sedus conducunt apozemata antiscorbutica ex naturis aquaticis, beccabunga, hederæ terrestris, lapacho, nec non abstergentia, ut mel, syrupus de erythimo, millepedes, balsama, ex quibus pilulæ parantur. Verum cum suppuratio aperta est, tunc aquæ sulphureæ, juscula incrassantia & præmissis opiatibus absorbentibus lac aluminum, quod non ita facile coagulat, est usurpandum.

5. *Phthisis asthmatica* Morton. c. 3. *Phthisis scilicet* Morton. ibidem *Phthisis asthmatica*. C.

Ea est quæ asthmaticis supervenit, æque ab asthmatis paroxysmis fovetur. Cognoscitur ex eo quod per totum ægritudinis decursum respiratione difficili, sibilante, sit stipata, ob mucum viscidum & nodis seu tuberculis pulmonum excillantem, & tracheæ ænaciter hærentem. Phthisis illa chronica est, & insanabilis, senibus familiaris; febre, macie ab asthmate distincta.

Exigit in paroxysmis non quidem incrassantia, multo minus narcotica quæ sputum supprimeant, unde suffocatio, sed parcas phlebotomias, incidentia, bechica, ut mel, hydromel, syrupum de erythimo, balsamica, millepedes, benzoinum, storacem, sperma ceti; & si spasmodicum fuerit asthma, spiritum cornu cervi, vel salis ammoniaci; mixtura Riverii emetica ex æqualibus partibus oxymellis scilicet, & aquæ cinnamomi caute, si nausea accedat, est adhibenda. Juscula ex gallo veteri, enula campana, iride Florentina, marrubio albo, seminibus anisi, anethi, passulis, liquiritia laudantur a Riverio, nec non syrupus de peto, seu nicotiana Quercetani; verum acriora sunt remedia in hoc morbo: terebinthinæ drachma una, cum ovi vitello exhibetur ad expectorationem movendam, vel balsamum Canadense ad guttas decem, cum syrupo de tussilagine, superbibendo lac vaccinum ebutyratum, & infuso florum tussilagine, vel gnaphalii montani temperatum. Potus thelmonis ex foliis hederæ terrestris etiam conducit.

6. *Phthisis hæmoptica* Monton. cap. 5. D.

Ea est quæ hæmoptisum habituale subsequi consuevit, quæ hæmoptisum tum pulmonarium vasorum laxitatem, tum sanguinis acrimoniam & motus febrilis supponit; hæc vero phthisis præcaveatur præmissis generalibus per corticem peruvianum, vel kinkinam, quod optime vasorum restituit, acrimoniam alkalinam emendat, & motus febriles reprimat.

Illius phthiseos duplex est varietas; altera acuta, altera chronica, utraque extirpabilis; acuta vero periculosior. In hac sputum sanguinis levi de-

causa reverteitur; & sæpe ægrum de medio tollit; in hac phlebotomix, decocta adstringentia, pectoralia, & symphyto, hederæ terrestris, pilulæ ex trochiscis de karabs, sanguine drachonis, narcotica maxime conveniunt; at super omnia in hac acuta phthisi decoctum & syrupus de kinkina sunt palmaria remedia.

In chronica lacticiia, & æstate aquæ chalybeatz non magna copia, sed pro potu ordinario haustæ laudantur a Montono.

7. *Phthisis calculea*. Vide Morton. capite 6. C.

Ea species cognoscitur calculis per tussim rejectis, sæpius alperis, siccis, lentis magnitudine, post tussim siccam, nec non doloribus acutis pectoris, quandoque etiam sputum cruoris acerbiscentibus.

Ea dispositio mucæ ac concreciones cretaceas producendas sæpe in eodem subiecto calculum in renibus indicat; ex hac vero calculorum pulmonarium minera phthisis chronica inducitur, quæ aquis sulphureis parca dosi & diu usurpatis, lacte etiam alnino, in paroxysmo vero tussis, doloris, aut spuitionis cruentæ, narcoticis potissimum debet sedari.

8. *Phthisis syphilitica*, Vide Morton. cap. 7. & 8. *Phthisis veneralis*. C.

Illam cognoscitur ex syphilidis conjunctæ signis, & ex eo. quod asthmatica est & humida, multum phlegmatis viscosi expectrans; circa quod duplex varietas distingui debet; vel enim phthisis vera, & ex pulmonibus erosio, materiz viscidæ, purulente ejiciuntur, atque ea species certe apud nos nunquam sanæa est: utrum vero per decocta sudorifica & pilulas ex æthiophe minerali sanetur, ut asserit Montonus, dubito.

Verum videre mihi contingit alteram speciem, in qua licet omnia phthiseos pulmonaris signa forent, tussis scilicet, sputa purulenta, amphimerina lenta, & emaciationis summa, cum pustulis veneris hac illac resperitis; & ea hydragryosi perbellæ sanata fuit; verum pus ex tonsillis, palato, uvula & vicinis partibus ulceratis muco albedo tectis oriebatur, cum tono vocis nasal, & intra sequentem sine pyralismo omnia sanata sunt.

9. *Phthisis a metastasi puris* Morton. capite 8. C.

Adolescens vulnus in crure ab explosa catapulta passus, ibi loci largam & diutinam suppurationem expertus curabatur; at phthisis pari passu accedebat, quo ulcus cruris exsiccabatur; post plures menses ulcus in crurem reversum est, atque phthiseos symptomata evanescebant; sanato cruoris ulcere iterum phthisis revertebatur, &c. unde facile est concludere in simili casu non solum dietam lacteam & balsamica, jusculaque antiscorbutica vulneraria convenire, sed etiam ulceris externi cicatricem integram esse præ-

Q vendam,

vendam, ut fontanellæ ad instar hoc emunctorio purulenta materies possit à sanguine eliminari.

10. *Phthisis chlorotica*. Vide Morton. cap. 9. Schenckii lib. 2. C. Leigh. *Phthisiolog.* & Lanea-Strienf. C.

Ea est quæ mulieres, sive virgines, sive nuptas, quibus estamētia supprimuntur, cum tussis sicca & perinacis, ac cachectico vel pallido colore, doloribusque pectoris atrocibus, demum emaciat.

Chlorotica licet nuncupetur, non tamen illis parit virginitas quæ optime coloratæ sunt, imo floridæ; verum e suppressis estamētis, vel rariis & parvis fluentibus doloribus laterales, dorsales, tussis sicca habitualis, sputum quandoque eruentum, demum febris nocturna, & cetera phthisis prænuſcia symptomata, colorem cito mutant in pallidum.

Ille phthisis perverti debet usu martialium, amarorum, jufculorum aperientium, & estamētia resistentium; verum cum mœore summo & animi languore stipetur, necessarium est ut quæ crenobis inclufæ virgines hoc morbo tentantur, rusticantem aerem respicere, exerceantur, phlebotomiis, lacte, cæterisque auxiliis tempeſtively utantur; à cantu tamen assiduo, frigore vespertino caveant; nil est mellus anequam febris accedat, quam Syrupi martialis cochlear unum singulis diebus, vel limaturæ martis granum unum, alterumve per plures menses in cochleari offæ deglutire; & hoc solo remedio novæ puellas quibus hæc phthisis imminet, radicibus sanatas.

11. *Phthisis a peripneumonia* Morton. e. to. C.

Ea est quæ à pulmonis inflammatorio morbo quovis, ut peripneumonia vel pleuritide neglectis, ortum ducit, sive prædispositi pulmones fuerint vitio hæreditario, sive non sufficienter & maturè institutæ fuerint venæ sectiones, sive bechicis & acerbis nimium insisterit Medicus; sive demum ægri infantes catarrhali peripneumonia oppressi sint; cum enim expectorare nesciant, facile in phthisim ex hoc morbo delabuntur.

Ea phthisis, cum sanguinis crasis aeris non est, & pulmones de cætero bene constituti sunt, facile curatur, licet copiosa puris viscidis, grisei, gelatinosi expectoratio, febris amphimerina lenta eam comitetur. Præmissis lenibus catharticis ex manna, floribus malvæ, perſeorum, ad dextram lacteam properandum est, & sedato pectoris fervore, præmissis prisanis detergentibus, ut ex infuso theiformi, hederæ terrestris, balsami Canadensis, vel opobalsami guttæ sex circiter singulis diebus ex cochleari syrupi sunt hauriendæ, hæc methodo convalescere quidam quos observavi. In hac specie quam peripneumonia vel hepatitis præcesserat, quæque stipata erat phlegmatia, surigine, diarrhœa colligativa, amphimerina lenta & sudore nocturno, successit usus lactis infuso semidrachmæ thei intra semilibram aquæ

calcis; hæc scilicet coquebatur cum hoc infuso: *Memoires des Errangers Tom. III. pag. 450.*

12. *Phthisis rheumatica arthritica*. Vide Morton. cap. 11. C.

Ea est species quæ dolores rheumaticos vel arthriticos excipit & tollit. Arthriticæ similis est, sed ab aere crasso non exacerbatur; tussim non siccam, sed phlegmatis visciditate moleſtam creat.

Prævertitur phlebotomiis, dextra lactea, & thermis sulphureis, ut Balneolensibus, Barreganis, St. Laurent apud Helvios. In hac Mortonius laudat kinkinam, vomitoria etiam repetita, quæ ab Anglo superiori mirum in modum extoluntur.

13. *Phthisis a febrilibus* Morton. cap. 12. *Tralles de Opio sect. 4. pag. 22. VVerlhof de febribus pag. 54. C.*

Ea est quæ ab intermittentibus potissimum febribus ortum ducit. In hac ab ipsi febribus primordiis tussis, dispnoea, aliæque phthiseos imminentes signa adiunguntur; sequitur etiam synochos potissimum erapuloſa, & tunc a peripneumonia tussi ordini confuevit, & paulo acutior est: verum prior chronica & mitis est, & nihil peculiare exigit curæ, nisi ut kinkina bechicis admisceatur, quo etiam solo remedio tussim phthisicam, quæ alias à kinkina exasperatur, sedata aliquando vidi.

14. *Phthisis exanthematica*, Vide Morton. cap. 12. *Phthisis impetiginosa* Carol. Leingh. *Phthisiolog. C.*

Ea est species quæ a febribus exanthematicis, potissimum variolis, morbillis repressis, cutaneis etiam eruptionibus chronicis retropulsis ortum ducit, inter quas ea quæ rupeolam repressam sequitur est infans bubæ & frequens & funesta, atque Monspeli an. 1752. epidemica fuit: a scabie repulsa, vide *Fr. Hoffmann. III. 187.*

15. *Phthisis isterica* cap. 13. *Phthisis hepatica* ejusdem. C.

Cognoscitur 1. ex urinis intense flavis, coloris etiam brunnei, qualis decocti caffè: 2. flavedine cutis sæpe pruriginosa: 3. pondere, duritie, imo quandoque tumore hypocondrii dextri: 4. inappetentia & cacochilia insuperabili: 5. Sæpe accedunt etiam dolores atroces hepatis ad viciniam & pectus extensi, & tribus à pastu horis recrudescentes: 6. Meror & prostratio animi summa: His vero se comites addunt symptomata phthiseos, sed chronicæ tardigradæ, quæ dolores hepaticos & tandem ascitum inducit.

Prævertitur hæc phthisis remediis generalibus, & potissimum illis quæ bilem diluant per urinas & alvum ducere valent, ac primo præmissa phlebotomia, ad apozemata aperientia properandum est; ex radicibus bruci, asparagi, foliis elebori, pimpinellæ, scolopendriæ, incoctis simul intra linctum, rheo crassiusculo trito & limatura ferri. Serum lactis etiam cum succo charophylli, nasturtii aquatici, levis cœreviſia lupulæ, millepedes potissimum debent usurpa-

usurpari. Verum nihil est præstantius, antequam peccatus moleste affectum sit, quam aquas Valenses identidem epotare, & si jam phthisis signa se prodant, aquas sulphureas usurpare, interpositis catharticis, decoctum cichorii, iusculum eroci martis pro potu ordinario sit.

16. *Phthisis hypochondriaca* Morton. cap. 4. Ciri- gli Consult. Med. cent. 1. pag. 66. C.

Ea est quæ melancholiam, hyfferiam, hypochondriacum, mærores inveteratos subsequi solet, tum ratione spasmodicæ pulmonum & pectoris contractio, quæ frigore subito perniciosior est pulmonibus, tum ob ipsitudinem humoribus inductum, unde pulmonis obstruitur.

Hæc phthisis est chronica & funesta, nec multum a cura phthiseos generica differt huius curatio, nisi quod ex *Moroni* mente, volatilibus ut spiritu cornu cervi, calore, autem vires excitandæ sunt; narcoticis liberalius sumptis mæror & pectoris contractio sublevanda est; aquis martialibus antequam pus efformatum fuerit, potius quam lacticiis utendum est; imo si fides ipsi adhibeatur, levibus vomitoriis initio utendum.

Ciriglius in hoc morbo inuente usum thei, jusculi viperinæ, iuscula Lud. Septalii: & pilulas balsamicas pectorales fuisse.

17. *Phthisis chylosa* Car. Leigh. Phthisiol. Lancast.

Albescent faeces, intumescit abdomen, marcescit corpus, gravis tussis divexat, obstruendis verosimiliter lacteis vas, & intumefactus mesenterii glandulis.

18. *Phthisis vomica*; *Vomica* Ill. Linnei Gener. Morb. Xide Pleurodynem 16. & dispersonum 6m.

In hoc differt ab aliis speciebus quod confectum multum pus sæpe foetidum expulsum, sine præviis phthiseos vulgaris signis; 2. quod si folliculus hoc pus contineat, nulla pyrexia morbum comitetur; 3. quod sæpius sanetur, maxime si folliculus pus continens ejiciatur. Hic morbus *vomica rupta* vel *aperta* vulgo dicitur.

19. *Phthisis a plica*, Stæbel Histor. 8.

Sanata fuit post biennium plica evoluta.

20. *Phthisis cellularis*, Ill. de Haen. Tom. 3. cap. 5. pag. 89.

Ea est quæ, sine ulcere pulmonum, pendet ab anacatharæ crustæ albæ, quæ solent obducere pulmones post inflammationem, quæ materies puriformis e pulmone fungo transudat intus.

III. ATROPHIA; *Marasme*.

Illud est genus morbi macilenti in quo corpus vel ejus pars sine febre notabiliter marcescit, & extenuatur, unde dicitur a tabe & a phthisi per febri absentiam. Derivatur nomen a *strophē* nutricatus, & a privativo. Marasmus derivatur a Græco *maraino* marcesco, quod de fluxibus languentibus dicitur abusive; marasini significatus etiam extenditur ad tertium gradum phthiseos &

tabis; quod si nomen genericum pro gradibus mutaretur, triplicandus esset nominum genericorum numerus, unde obrueretur memoria.

1. *Atrophia nervosa* Morton. de phthisi nervosa, cap. 1. *Atrophia Anglica & Virginiana* Morton; *Tabes nervæ*, Lorry de Melanch. p. 182. *La Consumption*; *Phthise nerveuse*, Dict. de Saute. C.

Est consumptio totius corporis absque ulla signi febre, vel tussi, vel dyspnæa; verum cum appetitus & digestionis eversione, unde languor & marcor in dies crescent.

Habitus initio œdematosus, facies pallida, squalida, ciborum omnium fastidium præter tolerantia. Languor virium qui lætos ægros continuo affigit; urina sæpe pauca & rubra, quandoque pallida & copiosa; febris nulla nec dyspnæa, nisi quæ debilitate summa oritur. Principia procatartica, patheuzata animi graviora, liquorum spirituosorum potus liberalior, aer insalubris, ut Virginianus morbus est chronicus, & in phlegmatiam lethalem degenerat.

Curatio. Initio morbi exigit ea quæ tonum solidis valent restituere, ut stomachica, nervina, martialia, cephalica, amara. Purgetur æger tertio; vel quæque mane, decocto amaro, thei, myrobalani. Potus ordinarius sit ex vino, vel cerevisia alterata abinthio, cinnamomo, mentha, juniperi baccis, ferro. Pilulæ sunt ex balsamo, pulvere ari, galanga, zedoaria, calamo aromatico, cascarilla, kinkina. Opobalsamum, spiritus cornu cervi, & salis ammoniaci cum pauillo sacchari usurpentur. Victus varius, jucundus in aere puro, cætu hilari.

2. *Atrophia a sanguifluxu*: Vide Morton. lib. 1. cap. 3. C.

Ea est quæ a quovis sanguifluxu per nares, tussim, vomitum, secernum, uterum, mictum, &c. uberius, vel longiori procedit; si menorrhagia ab uteri ulcere syphilitico procedat, syphiliticum virus est impugnandum. De cætero in quocumque casu, dixta lactea, cremores de sagou, salyp, oryza sunt eximia remedia.

3. *Atrophia lactentium* Frid. Hoffmann. Tom. 2. de tabe infantium.

Ea est quæ defectu lactis accidit infantibus qui sugunt ubera exsucca & lacte destituta, tum quia nutriti pabulo caret, tum quia gravis est; hoc *ingannatus*, seu *delusos* vulgo vocamus. Cognoscitur infantes non sufficienter lactari ex eo quod parum mingunt, parum deiciunt, vagiunt, marcescunt; & accepto lacte copiose conquiescunt.

4. *Atrophia a leucorrhæa*: *Tabes a gonorrhæa*, *fluore albo* Morton; ab *oniragvo* Hippocr. Epidem. VI. sect. 7. 52. C.

Ea est quæ ex longo semini, tum fertilis, tum infertundi in maribus & feminis effluxu procedit, a tabe dorsali discrepans per definitionem generis.

Initio mælistia hypochondriaca, nimia cogitatio,

tio; virium languor, famis defectio, hæc, in viris ex largo seminis effluxu; in feminis vero pallorem ædematofum, squalidum, pathemata hysterica, lassitudo insignis cum debilitate, inappetentia; hæc in feminis ex leucorrhœa simpliciter accedentis, marcor crescens, emaciation sine ullo phthi, feces nigro. Vide casum Saryri in Hippocr. pag. 1201.

Cura. Sistratur quantocius affluxus gonorrhœicis, non virulentis, & leucorrhœa per remedia sua propria, fames exercitii levitius, frictione leni, aere sufficiens sustineatur, cibis variis, gravis, eucharis excitetur, a vino & ardentibus liquoribus sere abstinere; cathartica & omnia evacuantia fugiuntur.

Accedente calore hæctico aquæ minerales assistent, & vere æ autumno lactis cura usurpatur.

5. *Atrophia nutricum.* V. Tibem nutricum. C.

6. *Atrophia ab alvi fluxu.* Morton. cap. 7. lib. 1. *Tubes a dysenteria, diarrhœa* Mortoni. *Alientia* Mortoni Append. pag. 23. C.

Si acrimoniam humorum alvi fluxum fovet, bibantur aquæ sale Glauberiano fraterentes pro potu ordinario; serum lactis chalybeatum cum bolo absorbente usurpetur, dein hoc ipsum adhibeatur.

Opus abstergentes & adstringentes cum narcoticis interponantur scilicet ex terra catechu, oculis cancerorum, creta campana, & syrupo de rosâ siccis.

7. *Atrophia a pyralismo* Morton. cap. IX. de tabe a salivatione. C.

Est ea quæ pyralismo quemcumque uberiorem sequitur, sive sit pyralismus scorbuticus, sive qui a prava expurgandi consuetudine oritur, sive qui ab usu hydrargyrosos procedit, inde ægri emaciantur, & ad tabem, aut ad phthim vergunt: si a pravo more procedat pyralismus, ab eo deterrendi sunt ægri, illos docendo salivam esse digestionem necessariam; si ab acrimonia sanguinis, aut ab hydrargyrosi, digesta hæctica est præferenda.

8. *Atrophia rachitica* Frid. Hoffmann. c. 8. to. 3. *Tubes pestiores* Bonet. Sepulchr. tom. 1. 742. C.

Hæc non seivus; nec ociosus prodeit quam detentionis tempus; infantes magnum caput, ingenium præcox, articulos, potissimum genua, carpos, tarsos, crassos habent; sæpe sunt valgi, vel compenes, gibbive, sed in residuo corpore emaciati & flacidi. Vide *Rachitidem*.

Non raro infantes antea sani, & per omnia recte valentes, absque pægressa manifesta causa languente, corporaque extenuari incipiunt; atque hoc patiuntur, quando maturius absteruntur; seu a lactis usu ad solidum ciborum usum deferuntur; illi pedibus insistere recusant, artus evadunt penduli, corporis habitus, potissimum in nobilibus & naso, evadit flaccidus. Qui affectus rachitice atrophie affinis est; aut curatur bono lacte restituito.

9. *Atrophia a vomitu* Velschii. C.

Tubes a pyloro obstructo quasi cartilagineo non ita raro accidit; hinc vomitus habitualis a

passu superveniens, ipsa duodeni durities aliquando tactu percipitur. Hunc morbum aliquoties observavi, nec quidquam profuit præter diætam lacteam.

10. *Atrophia a erinonibus* Horsii. V. Malidem.

Comedones, vel erinones sunt pili rigidi, per dorsum potissimum sparsi, qui recens notis subveniunt, eosque punctura quodam dirigunt, ut illi miselli seminum capere nequeant, marcescant, & atrophia laborent; illi pili pro vermiculis habentur a plurimis Medicis, quibus assentiri vix possum; hos nutrices solent quotidie manibus abstergere, conficere ut elabamur; sunt qui infantes calida eluunt, ut fundet Hoffmannus: Hæc affectus non raro solet recurrere. Vide *Malidem* infra in ordine ultimo.

11. *Atrophia senilis Mercenialis.* *Marasmus senilis* Galen; *Morbis frigidis* Galeni; *Marasmi* Aristotelis. *Senium* Philippi. C.

Est ea quæ vel omnibus hominibus senescentibus accidit, quæ vulgo tribuitur succescere corporis; non, ut ajunt, senescere est succescere, & ea proprie *marasmus* vocatur *Aristoteli*; vel est atrophia; quæ licet nulla febri stipetur, febrem sequitur, unde dicitur a marasmo torrido, seu hæctico comitante. Hic morbus exigit exitium cibum, & usum vini generosioris, calorem assiduum hieme, & Sunamitæ concubium, qualis Regi Davidi præfuit.

12. *Atrophia scorbutica* Severini, *Atrophia scorbutica* Infantum Frid. Hoffmann. de morbis infantum cap. 8. §. 9. Villis de Scut. cap. 4. C.

Hoc nomen non solum insignitur atrophia, quæ a læ scorbutica soletur cum stonacæ, maculisque diversicoloribus extremorum inferiorum; verum etiam ea quæ morbis diversis chronicis, aut acutis succedit in prava convalescentia; nam apud Anglos, imo Parisinos, plurimi morbi hæctici pertinaces ad scorbutum referuntur.

Vide *Mortonum de tabe ab hydropse, a sudoribus, &c.*

13. *Atrophia infantilis* Frid. Hoffmanni tom. 2. cap. 8. *Hæctica infantum* Sydenhami Schedulmon. C.

Est paulatina corporis consumptio cum abdominali inflatione. Vide *Tabem pæteritam*.

Initio artus superiores & inferiores marcescunt, abdomen vero distenditur, plenum est & crallum; respirandi difficultas, lassitudo corporis; fames magna utplurimum, unde prava digestio; hinc alvus inconstans, sæpe laxa, abdomen dolet; facies pallens, palpebræ mone livescunt; urina modo crassa, modo rubra; noctu calor & siccitas cum siti inextinguibili; frigens extrema, pejus habent hieme.

Mortuis mesenterium glandulis duris, quædoque suppuratis obitum; tumet & hepatis lien, amurca nigra in intestinis vacuis statu distentis, musculi tenues.

Aqua in qua ferri clavi infundantur sit potus ex.

res ordinarius; in primo cochleari offe nunc rhei, nunc limaturæ martis grana duo, vel tria nunc pulvis cachecticus Hartmanni ex limatura martis, cinnamomi pulvere & facebato factus, pulvis ex radice chinæ ad gr. vi. singulis diebus sumatur, aqua paxillio vino tingatur.

Juscula ex radicibus graminis canini, feniculi, petrosellini, asparagi, apii dulcis.

Abdomen oleo chamamilli, vel anethi unguatur.

14. *Atrophia verminosa* Frid. Hoffmanni de tabe infantum; *Atrophia a fascino* Plebis. Salmuth Cent. I. Observ. 5. C.

Est macies successiva sæpius infantum ablactatorum, quæ fovetur a lumbricis, aliisque verminibus intestinalibus, cibum suffurantibus, quæque apud Plebejos ob symptomatum contumaciam & causæ obscuritatem fascinationi tribuit. *Mæger Bibl. Tom. I. pag. 219.* aliam speciem verminosæ refert.

15. *Atrophia lateralis*; *Atrophie de la moitié du corps*. Collect. Acad. Toun. 3. pag. 693. C. J. Dolzo. C.

Corporis pars dimidia ab axillis ad calcem pedis erat emaciata, ita ut ossa tantum cute involuta viderentur, dum latus dextrum pingue fuit; admotis spinæ dorsali hujus pueri septennis topicis antispasmodicis, & sumptis sudorificis melius habere cepit.

16. *Atrophia febrilis*; *atrophia febris superveniens* Villisi de Morbis conv. Cap. 8. C.

Est ea macies universalis quæ febribus longis aut acutis, potissimum ardentibus sudatorisque, supervenit, ut syncho ardentis, typhoideæ, caustionis, elodi, &c. finita febre illa est maxima procedit a fluidorum acrimonia, siccitate, depauperatione, seu inopia lymphæ mucilaginosæ, nutritivæ, quæ sensum reparatur jussulis ex pullo, ranis, testudine, rusticatione, vectura in rheda, aliisque gymnasticis auxiliis corpus roborare aptis.

IV. ARIDURA Etmulleri; *Dessèchement*.

Aridura est macies pæcis, ut manus, brachii, cruris, pedis, oculis, &c. & in hoc ab atrophia discrepat, quod atrophia sit macies universalis, non vero unum aut alterum artum excicet.

Pendet itaque aridura a vitio topico ipsius artuum, aut nervorum & arteriarum ipsi prospicientium, quod vitium est ut plurimum pressio his nervis, vel vas, seu medullæ spinali illata, unde supprimitur influxus, saltem sufficiens, fluidi nutritii in hac partem, dum cæteræ solitam pinguedinem aut evexiam obtinent.

1. *Aridura rachialgia*; *Aridura scorbatica*, Etmulleri Tom. I. pag. 250. Boneti Sepulchr. Tom. I. p. 766. Observ. 96. L.

Illâ cognoscitur ex eo quod præcesserint dolores rachialgici, potissimum spinæ dorsalis, quandoque cum convulsionibus, dein vero pars

Sawages Nosologia Methodica Tom. II.

formicatione, stupore, constrictura laboret; ille morbus pertinacissimus sæpius brachium, raro crura, afficit, emaciat & fere sensu tactus orbat; vide *Rachialgiam* quam scorbuticum affectum judicabant superioris sæculi Auctores.

2. *Aridura hydropica*, Ephemer. Nat. Cur. passim; Bartholini in Boneti Sepulchr. Tom. I. pag. 762.

Est macies partium superiorum, dum omnes infimæ oedematose tumescunt: Vide *Hydopes*.

3. *Aridura traumatica*; Vide Etmullerum de Aridura. L.

Est ea quæ a vulneribus, ulceribus, fistulis, carie, fractura veteri, luxatione veteri non reposita artuum procedit: Vidi ariduram cruris a lecto nervulo.

4. *Aridura paralitica*, Ephemer. Nat. Cur. Dec. II. Ann. 7. Observ. 27.

Vide *Contracturam*: Artus enim dudum paralytici fere semper contractura & macie, quandoque flacciditate laborant.

5. *Aridura ab arthoraco*.

Arthorace seu tumor geniculorum ossis, hyarthrus seu tumor eorum lymphaticus, tumor etiam articularum scrophulosus ejus sunt principia.

6. *Aridura spasmodica*, Ephemer. Nat. Cur. Dec. I. Ann. 3. Observ. 236. L.

7. *Aridura scorbatica*, Ephemer. Nat. Cur. Ann. 3. Observ. 78. Vide Atrophiam. C.

ORDO SECUNDUS.

INTUMESCENTIÆ.

Volumen corporis humani, vel ejus partium crescit quoties a fluidis sufficienti copia genitis & congestis pressio lateralis infertur vasis, quæ solito major sit. In statu sano certa est inter sanguinem & humores proportio quæ mutatur in statu morbofo, maxime vero in morbis cachecticis; quanciens lymphæ, feri, bilis, adipis, alteriusve humoris respectu ad cruoris quantitatem exsuperat, & sic causa cachecticorum, tumidorumque affectuum est pressio lateralis facta major a lymphâ, vel humore excedente.

Si pinguedo excedat, & textum cellularem distendat, datur corpulentia obesa; si lymphâ dilutor prædominetur in textu celluloso, datur phlegmatica; si in abdomine, ascites oritur; si lymphâ viscida in glandulis cumuletur, scrophula oritur; si bilis, vel bili affinis humor exundet, aurigo nascitur.

Quandiu debita vi pelluntur fluida a corde in arterias libera, exindeque per venas ad cor revertuntur, tandiu debita fluidorum crasis perseverat, excrementitii humores ex sanguine segregantur, nullibi sunt stases feri, quod vasa relaxaret; sanos & albo rosei cutis color efflorescit, verum imminuta vi cordis, retardato fluidorum in vasis circuitu, crasis eorum mutatur, serum ab ipsis nec per urinas, nec

perspirationis via satis segregatur; hinc vasa laxantur, color cutis defraudatur, nec cruor ruber preparatur; hinc in dies ejus proportio ad lympham imminuitur; hinc calor decrevit cum rubro colore, crescit vero cacochymia serosa, hinc fit ut cachectici illi morbi frigus, pallor, et carniū laxitatem comites habeant.

Deficiente vi trativa, cruor minori vi triditur quam ut possit arterias ultimas laterales inducere, adeoque subire, unde deficit in vasis cutaneis; hinc iterum pallor, nec ea vi attritur qua possit calor natus foveri, hinc caloris imminutio, nec fluidum electricum nervum satis extricatur; hinc virium omnium languor.

Potentia non bene miscetur sanguini, nec in sanguinem commutatur, tum ob bilis ferose inertiam, tum ob languorem pulsationum cordis; hinc urinae pallidae, cruae; hinc etiam accidit ex sanguis habet in duas substantias, unam caseosam, spissam, non satis elaboratam, quae vasa ultima infarcit, obstruit, hinc viscerum infarctus, obstructions; alteram aquosam, quae fluxuilior solito facile in vasa lymphatica lateralia, inde in textum cellulolum loco adipis insitit; hinc sensim textus ille cellulofus serosa & aquosa lymphā diffenditur.

Totus in humano corpore textus cellulofus est continuus; cellulæ omnes pervia sunt, ita ut facile a capite ad pedes, & a dextris ad sinistras, prout declivitas sint; illud serum intra textum cellulolum elabatur; verum cum illud serum a pressione cordis sit immune, illud viribus solius gravitatis regitur, atque ideo statim agro in pedes delabatur, coque in latus dextrum jacente in illud latus facile desluit.

Si ob cibum viscosiorem, uberiorem seri evacuationem praegrassam, aut virus peculiaris energiam lymphā viscidior, crassiorve evadat, ea facilius haeret in glandulis & glandulosis visceribus, quia hisce in locis ob vasorum angustiam summam, & iteratam complicationem agnitus sunt majores; ergo in hisce vasis lymphā viscida emulatur; hinc lateralis pressio lateralibus vasis inde prodeuntibus major infertur; hinc durities & intumescencia & viscerum & glandularum.

Acrimonia humorum quiete exaltatur, ut crystalli salium in lixivio quiescente coeunt, data vero fluidorum stasi deficit necessaria in vasis excretoriis sanguinis purgatio, aut ab excrementis fluidis repurgatio; hinc acrimonia intenditur, unde patet rur in cachecticis morbis ab eodem principio & vasa minima obstruantur, & fluidorum crasis acris evadat.

Hæc sunt itaque sere omnibus cachecticis communia symptomata, scilicet 1. virium vitalium languor, minor fluidi pervei secretio, lentior circulationis impetus; 2. minor calor, proindeque debilior cruoris attritus, parciore ejus genesis, major vapiditas; 3. pallor & squallor cutis, tum ob debiliorem sanguinis motum, tum ob excedentem seri & lymphæ etiam crassæ copiam; 4. vasorum minorum ob-

structio, & infarctus, & sæpe defluxus aquosifleri in textum cellulare; 5. humorum acrimonia major defectu excretionis & depurationis, quæ continuo per emunctoria fieri debet, sine qua ad putredinem & ranciditatem sanguis, lymphæ, adeps, facile vertunt; 6. denum laxitas & mollietas solidorum, quæ fit ut prementibus fluidis maxime congestis cedant & in tumores frigidus, indolentes; pallidos excrecent.

Praxis. Hinc evidens est ad genericam horum morborum curam requiri ea medicamina, & præsidia quæ valent cordis vires recreare, fluidique nervi copiam adaugere, quod præstant, 1. volarilia, aromatica, spirituosæ elixiria, spiritus volatiles, liquores fermentati, vinosi. 2. Calefacientia, ut calida acta, & calida potentia, ut stomachica, cephalica, cardiaca, amara, frictions, thermæ, ammochasia, vesicles laneæ calefactæ. 3. Stimulantia excitantia, quæ fluidi nervi & cruoris appulsu ad exteriora sollicitent, ut sinapismi, dropacæ, modo vires non dissolvantur. 4. Maxime conveniunt resolventia, aperientia, quæ fluidorum spissitudinem corrigan, ut calcarilla, kinkina, ammonii pollen, ferri limatura, resina, ammoniacum, bdellium, opoponax, aloë. 5. Diuretica, calida, ut cancri, millepedes, radices rusci, asparagi, eryngii, apii, elichorii, necnon antiscorbutica, ut folia silybrii aquaricæ, sit, cochleariæ, amaracæ, erucæ. 6. Simul ea indicantur quæ sanguinem edulcorant, ut juscula ex pullis, testudinibus, ranis cum aperientibus & diureticis, atque si fecitas sit in sanguine, serum lactis, lacticia, aquæ acidulæ. 7. Denum indicantur quæ tonica simul sunt & aperientia, adeoque martialia, rhubarbarum, rhaponticum, kinkina, calcarilla palmam ceteris medicamentis præcipiunt. 8. Verum frictions, deambulatio, equitatio, rusticatio, maxime profunde ad roborandos musculos, excretionem juvenandam, coctionem & sanam instaurandam, fluorem spissis humoribus conciliandum, & si fiat rure in aere puro, secco, loco ameno, animus simul recreatur, moror cachecticorum morborum principium & fomes abigitur.

V. POLYSARCIA, la Corpulence.

Is est morbus qui nimia pinguedinis mole figuram corporis deturpat, rursusque agilitatem minus.

Unde differt a gigantæ, sed proportionali partium omnium magnitudine, quæ nec decori quidquam detrahunt, viresque molli respondentes obtinent. Differt maxime a phlegmatia & pneumatosi, quod textus cellulares non sero, nec afflatu, sed bono adipe sit turgidos, unde calor & tonus non minuitur, cum tamen moles movenda major sit, nec organa motus musculosa sunt potentiora, segnitia & pigritia accedunt, & inter accedendum dyspnœa defatigat.

1. *Polysarcia adiposa*; Cyrill. Consul. 17. Centur. IV. de la Tour Jour. de Méd. Juin 1757. pag. 322. *Ovisitas* vulgo; *Corpulentia sanguinea* Foresti lib. *La Corpulence*.

Differt a corpulentia carnosa, seu althetico habitu, quod si segnitias ad motum, & respirandi difficultas in motu. Corpulentis brevioris vitæ putantur, atque apoplexiæ & orthopneæ magis obnoxii.

Vix coëctrix stomachi valida, diæta plena ex cibis euechymis, habitus corporis laxus, transitus ex regione calidissima in frigidam, convalescentia ex synocha maligna, vita hilaris, o-pipara, otiosa, sunt corpulentæ principia.

Sennertus refert mulierem triginta sex annos natam, quæ 480. lib. & virum qui 600. libras pendebant.

In eufarchis non saginitas subiectis quondam inveni pondus adipis esse dimidiam totius corporis partem, & in his hominibus adiposis inveni arterias, venas ac viscera non esse majora quam in macilentis ejusdem stature, adeoque hepatis v. g. splen, pulmo in adiposis dimidio minoribus respectu ponderis totius quam in macilentis.

Cura exigit 1. abstinentiam a somno longiori, a diædia tum corporis, tum animi, ita ut nihil magis extenuet corpus quam curæ & sollicitudines, ac quævis pathemata; 2. detractio alimoniarum quoad quantitatem & qualitatem; 3. excretionum quoad quantumvis augmentum, maxime perspirationis, per exercitia, venationem, cursus, feminis per maritimum. 4. adipis liquo per fœta, pipæratæ, acetum, caffè, oxymel scilicetum, per medicamina omnia evacuantia, maxime cathartica, diuretica, sudorifica, nitrum, tartarum, semen faxini; epipallica &c. vel quotidie saponis drachmam unam, aut alteram.

VI. PNEUMATOSIS: *Hyderos* Galeni; *Empneumatosis* Cæli Aureliani; *Sarcitis flatuosa* Smetii; *Tympanitis universalis* Schenckii; *Emphysema universale* Bouffissure.

Est elastica & flatulenta cutis intumescencia.

Causa est expansio aeris in fluidis latentis, qualis in cavo ipsius abdominis, in tympanite abdominali, accidit; & in emphysematis sub cute sæpius observatur. Aerem elasticum generari 1. a putredine in animalibus aqua submersis deest observatio multiplex; 2. a fermentatione ex reliquis alimentorum in primis viis colica flatulenta testatur. Discrepat a phlegmatia per elasticitatem parvum, nec non ab anasarca per crepitum sub tactu.

1. *Pneumatosis a veneno* Linnæi Faun. Succ. num. 261. A.

Smolandi narrat a morsu colubri *asping*. dicti corpora horrendum in modum intumescere:

An flatu expanso, an alio modo ignoramus: id a pluribus venenis subito fieri notum est *VVillif. de tympanite*, pag. 146.

2. *Pneumatosis a vulnere*. Littere Mem. de l'Academ. R. des Sc. 1713. *Tympanitis universalis* *VVillifii* cap. 4. *Sennert.* pag. 954. *Haller Phys.* de tela cellulosa Toni. I. p. 13. A.

Juvenis Leodientis vulnus punctum factum sub axilla dextra in thoracem penetrans acceperat, postredie toto corpore turgidus apparebat, non solum pectore, sed dorso, ventre, lumbis, scroto, femoribus, brachiis, humeris, collo, vultuque, ut ne palpebras quidem diducere posset, quin etiam in vertice ipso, cute ubique distensa & tumefacta, tumor ubique erat tensus, & cum dolore non paucio. *Smetius*.

Similem casum observare *Sennertus* & *VVillifus*: aerem in obliquo vulnere ex thorace exeuntem textum cellularem subire, & per totum corpus insinuari facile crediderim historia sequenti fustulius.

Ante duodecim annos miles, a pectore laniatus in specu Jovis deprehensus, insuflatus est tabulo in vulnus inguini insitum immisso; totum cito corpus intumuit, exceptis manibus; pedibusque; paulo post crescente colli tumore, & inde dyspnœa miles cultro sibi colulum scarificavit; sequenti die in Nosocomium delatus est, cutis erat sanæ concolor, sed tensa & elastica, manibus tractata crepitabat; novas hic, incisiones cutis exostulabat æger; ut levaretur a doloribus, & immobilitate artuum; sole autem scarificationes profuerunt. Eadem operationem utantur Medici Guineenses ad sanandos morbos chronicos; sic inflatus ægros potu sudorifico assumpto currere cogunt, usquequo sudor accedat; & sic pneumatosi cum morbo priori evanescit. *A. Soc. Sci. Harlem. Tom. VI. pag. 676.* cum curam in canibus instituit cum succellu *Cl. Negro ibid. p. 688.*

Si quæ pneumatosi a flatu dependeat, ea certe quæ vulnus thoracis sequitur; interea *VVillifus* hoc negat, & contendit hunc tumorem a spirituum nerveorum agmine indignabundo, furente & tumultuario cutem subeunte fieri; sic *Baglivus* memerosissimum abdominis a musculorum ejus spasmo deducendum putat, errore haud ablimili.

Coram vide apud *Hist. Chirurg. pag. 182.*

3. *Pneumatosis hysterica* Vide Sydenh. Diss. Ep. pag. 41.

Ut hysteria omnes partes internas, ita & externas quandoque afficit, carnes scilicet musculosas, ut maxillam, humores, manus, crura, tibias, nunc dolorem adducens, nunc tumorem, in quo genere si tibias distendit tumor præ reliquis conspicuus est; cum enim in hydropiciorum tumoribus duo hæc semper observari possint, ut tumor scilicet sub vesperam se majorem exhibeat, tum etiam ut postea instat madentes vestigium digitis impressi, formamque referat, jam in hoc altero, tumor matutino tempore protuberantior est, nec digito cedit prementi, aut vestigium ullum manet plerumque etiam tibiarum alterutram tantum inflat; de cætero si magnitudinem spectes, siue

etiam superficiem, hydropicorum tumores ita ad anasimul mulatur, ut ægre se haud facile ab ea quæ infedit sententia se hydropes esse, dinoveri possint.

Ille pneumatosus cum diabete & pryalismo hysericis alternat, ab his solvit, his suppressis revertitur: Vide Ill. Raulin des maladies vapo-
reuses, pag. 221.

4. *Pneumatosis febrilis.* Vide River. obser. 69. cnc. 2. A.

Inflatio totius corporis in pueris. Infans 18. mensium ætate toto corpore inflatus est subito, cum febre; alter ejusdem familie ex eodem ruobio interierat. Varia præscripta remedia per 12. dies cothartica, aperientia, vesicatoria & tandem alvifluxa & urinæ profluvio excitatis, sanatus est.

Vidi & chirurgum qui cum diu quartana consisteret, toto corpore intumuit cum dolore, atque cumor in quibusdam locis erat quidem cedomatofus; verum in facie, pectore, manibus, suris erat simul emphyseumatofus, elasticus; per duos fere annos auxilia medica fere incassum expertus est; ille vero paucis ab hinc annis quater electrisatus, ita subito convaleuit, ut vires, colorem, somnum naturalem simul recuperaverit, & tumor omnino evanuerit. Vide *Alta Societ. Reg. Monspel. ann. 1751.*

Quid est apostema ventosum Avicennæ quod inter tendines & sub pectiole oritur tradit, quem statum per vices accedere, currere, & membra disrumpere tradit? Est forte rheumatismus flatuosus, *Nakir Albucasis.*

Nata. Adolescens dum ensis tractandi arte informabatur, & pro more solito ahi ab! clamaret, gladio præpilato commilitionis in faucibus percussus est, atque die sequenti media pars pectoris antica, abdominisque cutis emphysemace mite intumuit, cum dolore & febre; undecim phlebotomis passus est, & sic sanatus, durante *Illustrissimo Professore Antonio Eizes.*

Adolescens ab aratri mole in pectore compressus, & magno conatu equum coercens, traxit colla toto corpore immittit, cum sensu stuporis, voce clangulosa, cutis ubivis premeatur strepitum edebat, ut charta pergamenta; secta vena aer cum sibilo, simulque sanguis effluebat. Curatus est diversis cutis scarificationibus, & fomentis resolventibus. *Daniel Hoffmann. Dissertat. de aere faustio, Diss. Halleri, Tom. 3.*

In duobus dysenteria epidemica affectis familiaris est pneumatosus, non tamen universalis. Hippicaris cognita; ea diversis dorsis & lumborum partes obsidet. Si manu prematur hæc pars, dolet animal, & pars sonitum levem edit; sectis eorum cadaveribus, ipse inveni pulmones emphysemate distensos; eadem emphysemata in equis observavi.

P. de Serbait in *Alt. Naturæ Christianæ*, narrat apud Austriacos endemicam esse pneumatosism, quam ipse emphysema, Germani vero *Rausch* appellant, quæque suffitu & foliis myrti vulgo sanatur; sed hæc ex auditu narrat.

VII. ANASARCA; *Leucophlegma* Platonis; *Hyposacidus* Hippocratis IV. de Rat. Vict. in Acut. Illus. Hippocratis Focli pag. 555. *Phlegmatitis* Arethæi de Diut. Lib. II. Goræi Desinit. *Anasarca* Galeni; *Episarcidum*, *Catafarca* Galeni in Hippoc. de Dixta Acut.; *Intercus* Latinis; *Leucophlegmatia* Cæli Aureliani. M. C. lib. III. cap. 8. Goræi Desinit. *Hydropis vera* & *hypofarca* Gordon. de passionibus hepatis; *Pituita alba* Goræi; *Hyposarca* Dodon pag. 575. & Jonston. Idea Medic. *Plegmaria* Jancken Tabul. 87. *Hydrops universalis* Audotum; & Gallis *Anasarque*, *Hydropisie* per infiltrationem.

Character. Est cutis totius intumescencia, mollis, pallida, non elastica.

Diversis gradibus diversa nomina generica male tribuit *Græculus*, recte *Calio Aureliano*, ut leucophlegmatia initio morbi, catafarca vel anasarca statui, &c. cum enim quivis morbus suos gradus, sua istia habet, nulla est ratio cur huic diversa nomina tribuamus, non vero alteri; unde nominum multiplicatio vana.

Sed est in textu celluloso totum corpus ambiente, ipsiusque musculos, tunicasque subeunte. In hoc itaque lymphæ aquosa & copiosa cumuletur, sit tumor mollis, vestigium digiti fortius impræsi retinens, pallidus & squalidus, per totum corpus diffusus.

Hinc differt a phlegmatia in qua tantum partes infimæ vespere tumunt, mane detumescunt; in anasarca vero totus habitus tumet, ut etiam mane magis tument partes potissimum palpebræ genæ, accedit difficultas respirandi, lassitudo, inappetentia, urinæ tenues, aquæ, febricula, sæpe somnus non levans.

1. *Anasarca metastatica. C.*

Illam sic voco quæ suppressis evacuationibus solitis sanguinis, urinæ, hæmorrhoidum, diarrhææ, ulceris, supervenit. Cum enim moles sanguinis ac proinde lymphæ crescit in vasis, pressio lateralis in vasorum lymphaticorum oscula, pari passu crescit; hinc uberior ingressus lymphæ in ea, & inde in adiposa, quæ textum cellulæ constituunt; textus autem illius cellulæ implentur & distenduntur eadem vi quæ solis hydrostaticus. Ex hac feri diffusionem laxantur carnes, motus cordis debilior evadit, vix ruor ad vasa cutanea pervenire potest; hinc pallor, frigus, mollities, corporis gravitas, febricitas. Cum autem aliqualis sit transfluxus, tardus tamen lymphæ e cellulis in vena, ex artibus lymphaticis in cellulas, ejus liquidi putredo ardeat, aut tardius sit; hinc minus periculum in anasarca quam in ascite.

Curatio. Eo debet collineare Medicus, ut pressionem lateralem sanguinis in vasorum parietes, & lymphæ in sanguine prædominium tollat.

1. Ut primum scopum obtineat necessum est suppressi.

suppressa catamenia, suppressas hæmorrhoides re-
vocare, unice præmissa phlebotomia, medica-
mentis diureticis, emmenagogis, martialibus,
resinosi, forma jusculi, apozematis, præparan-
tibus, opiate. Huc spectant potissimum ra-
dices asparagi, ruscii, eryngii, pimpinellæ,
apii, petroselinii, dauci, menthæ, dictamni,
capparis, ononidis, cucumæ, cyperi, galan-
gæ; folia tanacetii, mattiaricæ, absinthii, ru-
thæ, menthæ; flores croci, calendulæ matricæ-
ricæ.

2. Sucçi, assa ferida, bdellium, opoponax,
myrrha, aloë, ut lymphæ excedens eliminetur,
conveniunt, quæ alvum, urinam, sudores, vo-
mitum movent; sed potissimum conducunt ca-
thartica & diuretica; cathartica autem hydrag-
ga cæteris maritata maxime profunt, nec non
tonica aperientia. Huc refer jalsappam, scam-
oneum, iridem, sambucum, syrupum de thainno,
aquam vitæ Germanicam, rheum, mannâ. Di-
ureticis accense præter radices & herbas cichorii,
chrophylli, eryngii, ruscii, &c. millepedes, ci-
neres plantarum, ut genistæ, tabæ, in vino albo
infusæ, corticem radicis ulmi, cochleariam,
apiam, nasturtium aquaticum, trifolium aquati-
cum, rubiam, balsam, terebinthinam, botacem,
tartarium.

3. Demum evacuatis aquis superfluis tonus est
vali restituendus usu martialium, cinnamomi,
macis, cassiæ lignæ, thei, myrobalanorum, aquis
thermalibus, ammochasæ, læconici, fustibus
aromaticis. Plurima exempla anasaræ per fonticu-
lolum aut fistulicætionem, ambulationem, aquis
effluentibus sanata: vide apud *Hallerum Physiol.*
Tom. I. pag. 14.

Hujus varietas est.

a. *Anasarca periodica.*

Sex octovæ diebus antiquam fluere catame-
nia, intumescere toto corporis habitu virgo vi-
ginti quatuor annos nata; in quacunque cor-
poris parte imprimeretur digitus, illius vestigium
retinebat, tumor ille evanescere in ea ratione
qua fluebant menses. Tertium redibat morbus
cum virginem invis prædictis symptomatibus la-
borantem; solutionem morti, quæ prius successerat,
expectavi, & recipie eadem die qua fluxerunt
catamenia, tumorem decreverat, & cum mensi-
bus deficientibus penitus evanescere observavi.
Exacto tempore illo, præmissis præmittendis, ju-
scula refrigerantia, chalybein tracta & interpolata
dosi præscripti, instanti mensitrua purgatione,
opata cum antihystericis maritata ulupavi, &
non rediit anasarca. Observatio *Cl. Doctoris*
Broussai.

b. *Anasarca ad aliapneustia.*

Tertia morbi die nullum invisebam qui ob-
sidebantur tumore molli per totum corpus diffu-
so; referebat ille se post mellem factam sanum
recubuisse; mane vero sequenti surgere non po-
tuisse propter corporis intumesceniam. Inter
varia responsa quæstionibus a me factis, dixit
se recubuisse super stramen in loco humido

Hanc causam morbo natales dedisse judicans
jussi, ut linteis calidis perfricarentur, ut panib-
us mox e furno extractis cooperiretur, pro po-
tu biberet decoctum calidum radicis ruscii, qua
methodo intra biduum redintegratur perspiratio,
& evanescit anasarca. Communicabat *Clariss. Do-*
ctor Broussai.

2. *Anasarca a fluxu. C.*

Talis est ea quæ longis hæmorrhoidum, ca-
tameniorum fluxibus, hæmorrhagiis, phleboto-
miiis repetitis, necnon diarrhæis, henterijs, dia-
beti, &c. supervenit. In hoc casu ob virium vi-
tium & digestivum defolutionem chylus cras-
sus & crudus, sanguini mixtus, non satis elabo-
ratus, non potest reparare cruoris jacturas, totus
sanguis chylosus, aqueus, crudus evadit, unde
obstruuntur ultima vasa, & serum in lymphaticâ,
hinc in adiposa vasa fertur uberius, in illis sta-
gnat, cumulat.

Scopus Medici est ut 1. vires facta sustineat
analeptici stomachicis, cibis facillimæ coctionis,
abstinendo ab omnibus medicamentibus; quæ eva-
cuando vires ulterius exhauriant; 2. ut tonum
vasis laxatis, & fluxilitatem congestis liquidis
conciliet, circa ullam irritationem; usus pueri
docuit diætâ lacteam his indicationibus satisfacere,
quod expertus sum ex fusu *Alexandri Tralliani*;
interim non negligenda aqua in qua
rheum & ferrum cum cinnamomo infusa fuerint.

3. *Anasarca exanthematica. C.*

Ea est quæ scabiei supprellæ, quæ puerulis a
tubercula, variola retrogressa, similibusque morbis
cutaneis supervenit.

Huic præter generalia remedia competunt ma-
ximè curcumæ & radix lapathi acuti in jus-
culis; feliciter sanatum hunc morbum, necnon
ascitem ex eodem principio oriundum vidi indu-
ta cutanei tunica, seu sabie resumpta.

In ea vero quæ a rubeola suppressa non satis
erumpente supervenit, auxilia generalia, sed po-
tissimum serum lactis fuceo chrophylli alteratum
profunt.

4. *Anasarca a febris. C.*

Ea est quæ ab obstructione hepatis lienis fe-
bres intermittens foventibus, ut quartanâ,
tertianâ, organum ducit.

Ulla species eodem modo curatur ac ascites
febrî intermittenti superveniens. Consule *Syden-*
ham de febr. intermitt.

5. *Anasarca gravidarum* Puzos pag. 82.

Si phlegmatæ limites tumor edematice ex-
cedat, tunc intumescunt hinc & inde lumbi,
qui tumor vulgo *le Burtel* dicitur; partes supe-
riores, ut manus, facies simul intumescunt; vera
anasarca est a phlegmatia quoad prognosim lon-
ge discrepans, maxime si febris hæctica, & poly-
dipsia accedant.

In hoc casu usurpanda sunt juscula aperientia
ex cichorio sylvestri, symbio aquatico, chero-
phyllis, & crystallo minorali, vel sale Glauberi;
cathartica identidem usurpanda; opiatum
dein aperientia præscribitur ex millepedibus, vipe-
tis,

vis, antimonio diaphoretico, amaris & febrifugis; imo initio una proderit phlebotomia, nec diæta sic negligenda est; parvus præmaturus est expectandus.

Si vero his resistat anasarca, partus non vicinus sit, crescat tumor, dyspnoea molester, timendusque sit ascites, vel hydrothorax; tunc labia vulvæ quæ ultra modum turgere solent, vel infima pars tibis leviter incidenda sunt, unde uber feri proventus, & parvus facilior expectatio, a quo sananda est mulier.

6. *Anasarca hysterica; Leucophlegmatia hysterica. C.*

Ea est quæ mulieribus hystericis, siccis, melancholicis, supervenit, v. g. post synochum media æstate; in hac vestigia digiti prementis cutis vix retinet, unde a serosa, seu flaccida differt.

Cathartica & diuretica nocent; serum lactis urinæ fluxum resistit; hoc solo per mensem continuato corpus detumescit, lac albinum deinde felicitè usurpatur. *Pomme Essai sur les vapeurs, observ. 10. pag. 145.*

Differt a phlegmatia, quod brachia; manus, facies ipsa intumescant etiam vespere.

Eam specie vidi olim diabete terminatam in muliere hysterica.

7. *Anasarca Americana; Mal d'estomac* Labat Voyage en Amérique. Chevalier des maladies d'Amérique. C.

Nomen vulgare ineptum est; morbus enim est vera anasarca, juxta descriptionem *Parri Labat*. 1. Pallent etiam ægri, tumescunt, cum aliquali flavedine, pedes, tibis, totum corpus, & potissimum facies, si hies sit *D. Chevalier*, œdematose turgent; 2. summa lassitudine prostrati sunt; 3. cum cephalalgia gravativa; 4. inde somnolentia continua; 5. epigastrium & abdomen intumescunt, & tandem ascitici fiunt.

Tribuitur hic morbus etiam cancerorum, qui vulgo *Crabes* dicuntur, utpote cibo dyspepto, gravi, nisi corrigatur cruditas vino & aqua vitæ sacchari vulgo *Tafsa*; sæpius ortum ducit a decubitu sub dio, morte. Nigritiz Brasilienses qui distillate tractantur, huic sunt obnoxii & ut sanentur ab heræ dimittuntur rus, ubi libertate fruuntur, matrem discutiunt, & fructus acajou subacidi usu intra paucos dies convalescunt. Apud Europæos qui in America degunt, hic morbus familiarissimus est; illi vero utuntur in curationis initio potibus cardiacis & sudorificis, balneis calidis, cibo facilis digestionis, vino generoso, dein vero auxilii hilaritatem conciliantibus, & potissimum exercitio ita vehementi, ut sudor copiosus proripitur.

8. *Anasarca rachialgia* Theod. Zeist de dolore colico scorbutico in hydropem mutato, Traclat. de podagra, pag. 30. an. 1738. C.

Est faciei, pedum, manuum, ventrisque tumor cum dyspnœa, pulsu debili, inæquali, urina rubra, biliosa, clara, arenulis referta, parca, succedens colicæ scorbuticæ, seu ra-

chialgiæ, quam arthridem intropulsam putat *Theod. a Zeist*.

Laudat maxime aquam gemmarum pini per fermentationem paratam, ad unc. sex; tincturam niuvæ maris nativæ, ad unc. duas; tincturam verum majalium drach. t. syrupi de cicorio compositi cum rheo drach. sex, de qua mixtura singulis bihoriis sumat nnc. duas.

9. *Anasarca purulenta*, Haller Physiol. Tom. I. pag. 14. Jac. Nic. VVeiss progr. 5.

Est intumescencia cutanea a pure diffuso intra telam cellulofam.

10. *Anasarca hydropurum* De Meyscrey Malad. des Armees. 371. C.

Ea est quæ ab alimentis aquosis, frugibus horreis, aquis mollioribus, cœnolis, aut etiam acidulis intempestive adhibitis procedit. Curatur diæta exsiccante, carne tosta, vino generoso albo, vel cerevisia, pitanis diureticis vel sudorificis, catharticis hydrogogis: tibis in situ horizontali sunt servandæ; linteis pannificis siccis calidis fovendæ; molliter fricandæ; lateribus calefactis, fursure calido, avena servida involvendæ; prodest etiam fortis ex aqua vitæ camphorata, addito sale ammoniaco &c. modo nulla sint erythemata.

11. *Anasarca urinosa, Leucophlegmatia urinosa* Journ. de Med. Nov. 1765. p. 421.

Plurics supervenerat puero ischuria calculosa affecto; extracto per lithotomiam calculo vesicæ, is tamen iterum incidit in ischuriam nephrospticam, unde anasarca urinosa, foyor, tumor universalis ad collum usque sensim ascendens, pulsus durus, depressus, hypogastrium vacuum.

Linteis humidis tepidificæ omni horæ quadrante mutæ; per quadrihorium æger involutus fuit, multamque frigidam bibie, syncope accessit urina ubertim fluxit, hinc salvus evasit.

VIII. PHLEGMATIA, *Leucophlegmatia* F. Plateri; Gallice *OEdimate*. Vandormonde *Infiltration des jambe; Pies enflés*. Diction. de Sanite. *Ægri OEdipi*.

Est intumescencia œdematosa artuum inferiorum, seu turgescencia mollis, non elastica, cuti concolor, indolens in diversis tamen speciebus varia.

1. *Phlegmatia vulgaris; Leucophlegmatia Veterum; Enflure œdemateuse; Infiltration seruse. C.*

Prodromus est & comes 1. ascitis; 2. anasarca; 3. hydrothoracis; 4. pedissequa empiematis; 6. prodromus puerperii; 6. comes chloroseos auriginis; 7. quandoque morbus solitarius; harum vero varietatum, aut specierum signa distinctiva desiderantur. In genere tumor incipit a malleolis, vespere crescit, mane minuitur, aut evanescit, digiti prementis vestigium servat, subpellucidus est, sensum ad tibias, dein ad femora, lumbos ascendit. Curatur diureticis, catharticis, aperientibus; tonicis martialibus, ut ascites, necnon topicis, potissimum folia

foliis ebuli, aut sambuci sub cineribus coctis, calidis, artus involvendis, necnon foliis hederæ in aqua, aut vino coctis, & calide applicatis.

3. *Phlegmatia hysterica* Sydenhami de passione hysterica. C.

Ea species a nullo alio Auctore memorata differt a priori ex eo quod tumor digito prellus illico resistatur; seu velligium digiti non servet; quod etiam faciei pallor non stipetur. An pneumatica? Verum tumor non crepitat.

3. *Phlegmatia lactea* D. Levret; *Inflamation lacteuse* Journ. de Med. Juill. 1759. des Mem. de l'Acad. R. de Chirurg.

Differt a vulgari, 1. quod puerperas, raro vero nutrices, aggrediatur; 2. quod lactis uterini, aut mammaris repressionem sequatur; 3. quod ab hystericalia lactea incipiat; 4. quod infarctus circa inguina fit initio dolorificus; 5. quod crura & dein tibiz, denum pedes successive tensione, dolore afficiantur, non vero ordine retrogrado, ut in vulgari, seu serosa; 6. quod dum partes intumescunt dolor recedat; 7. quod tumor sit opacus non pellucidus.

4. *Phlegmatia gravidarum*: OEdematæ des femmes grosses. *Eaflure des extremités aux femmes grosses* Puxos pagin. 84. Mauriceau libr. 1. cap. 17. L.

Familiaris est ultimo ac penultimo graviditatis mense tumor oedematofus pedum, dein & tibiarum & femorum, successive ascendens, vespere crescens, noctu evanescens, mane nullus; qui tumor, licet vulgo tribuatur pressioni ab utero venis iliacis illatz, aliquot ante partum diebus solet recedere, ubi tamen compressio minime imminuta est. Ea varietas nullius fere momenti est; curatur accedente partu; prævertitur abstinentia a situ erecto, aut ad summum catharsi circa duos ultimos menses adhibita.

Altera varietas ortum ducit a solito majori abdominis & uteri intumescencia, unde dolor & pondus; plures hac phlegmatia laborantes melius habent, si stent erecti, quam si decumbant, & stant ut facilius respirent, cujus ratio mechanica facile intelligitur, cum stantibus abdomen extorsum magis protuberet, tantoque minus sursum prematur diaphragma. Curatur difficilior; interea quæ sanguini fluorem conciliant suscipienda, dein partus expectandus; crescente eo morbo jam est anasarca gravidarum.

Si phlegmatia lumbos non transcendat, vigeatque fames, color faciei non sit plumbeus, & si sexto, septimove graviditatis mense abdomen magis prominens quam aliis, nono prominere consuevit, tunc vel graviditas est duplicata, seu plures fortis utero gestat mulier, vel hydrometra laborat; & citra noni mensis finem paritura certo est. Hæcenus Puxos.

Mulieres quæ duplicem sætem utero gerunt, quæ pluries pepererunt, quæ multum diuque pedibus insistant, duobus ultimis potissimum

graviditatz mensibus sunt huic obnoxie, quia cum premantur venæ iliacæ ab utero, lymphæ a sanguine represso, & in venis congestæ uberius in textum cellularum divertitur, ibique congeritur; sed si textus ille a quacunque causa sic solito laxior, vires cordis trutinæ minores, tunc impressio digiti fovam diuturniorem relinquit, & vespere magis intumescunt extrema, atque concurrunt pressio iliacarum cum principio quod oedematiam in non gravidis excitat, vi scilicet imminuta circulationis, uode utriusque habenda est ratio.

Phlegmata gravidarum ab uteri in iliacas venas pressione tantum orta, sponte post partum evanescit fluentibus foetibus; imminuitur etiam decubitu in lecto, quo pressio iliacarum minuitur; nec impedit illa oedematia phlebotomiam. Si concurrant varices tibiarum ab eodem principio oriunde, illæ lenibus fasciis circumductis reprimendæ sunt, non vero aperiendæ. Si dolores crurum & tibiarum vexent ægram, phlebotomia ipsa indicatur, quæ contraindicatur ubi oedemata ab altero principio fovetur, ea autem phlebotomia e brachio tuto celebratur, non e pede.

Si concurrat solidorum laxitas, & virium cordis imminutio, sufficit durante graviditate ad topica adstringentia & tonica confugere, paretur scilicet vinum aromaticum ex decoctione foliorum rosis marini, lauri, thymi, majoranæ, salviz, & lavendulæ, ana, manipuli. ℞, rosarum rubrarum manipuli. semisse; balsuliorum & aluminis, ana, unc. 1: bulliant in vini rubri libris sex, ad tertiam partis consumptionem; cola & servetur ad usum; lintea hoc vino candido madida bis vel ter in die partibus oedematosis applicentur.

5. *Phlegmatia a Menstasia*, Observat. 102. La-motte des tumeurs. L.

Puellæ a suppressis catameniiis supervenit chlorosis, scilicet faciei pallor, lassitudo, fastidium omnium, inappetentia, lumbago, gravitas femorum, eorumque, necnon tibiarum & brachiorum oedema.

Brachio sinistro tuitum oedematoso, incisus tegumentis manus inter ossa carpi, quæ respondent digitis annulari & auriculari, pollicis magnitudine, non solum copiosorum serum successive extrallavit, & brachium detumuit; sed & hæc virgo inde convaleuit.

6. *Phlegmatia ulcerosa*; *Black-leg* Anglis; *homa* Cl. Linnzi. C.

Est tibiarum & pedum turgescencia oedematosa, & erysipelatosis ulceribus stipata.

Nil est frequentius illo symptomatum concursu, adeoque mirum est inde speciem singularem nondum fuisse constitutam.

Rubent, tumentque tibiz, rubere quandoque livescente, cum calore molesto; inde exulcerantur; & fundunt serosi puris copiam. Signum imminens exulcerationis est cuticulæ separatio a cute rubra, tensa, dein vel a levi ictu, vel a pustulis rubris sponte abortis oritur.

dicitur suppuratio, quæ vel serosa, vel legitima, semper autem pertinacissima, nec œdematis inde fit immunitio.

Ulla ulcera sunt duplicis indolis; vel enim est mera exudatio feri ex cuticula abrasa, aut ulcere molli, humido, fungoso, & tunc diureticis iusculis, simul & antiscorbuticis, serum illud versus renes derivandum, pars affecta siccanda; renis spirituosus, ut vino, aqua vitæ camphorata, & similibus fovenda est; huc conferunt unguenta ex solis schlaræ; ipsa etiam folia pari admodum: vel ulcera sunt erysipelaceo rubore in vicinis stipata, pruriginosa, rodentia, & tunc calor & acrimonia temperantur medicamentis saturninis, ut cerussa, albo Rhafis, solis adstringentibus, ut plantaginis, vel refrigerantibus, ut vitis, betæ, butyro illitis.

Si œdemate rigeant; duræ sint tibiz, & dolent, exponantur vaporis aquæ cum pauco aceto, vel pauxillo salis ammoniaci, deinde oleo palmæ illinantur, vel leviter frica cum stannella calida quæ exceperit fumum ambaræ, vel benzoini accensæ, vel aquæ spirituosæ accensæ. Si ulcera sint fœdida, inungantur melle rosaceo, spiritui vitrioli acidulato.

Ea omnia vana sunt in senibus, cachecticis valerudinariis, imo in vegetis, nisi utantur diætâ vegetabili, identidem purgentur, sumptis remediis sanguini depurando & edulcorando aptis. Vide *Heisterum de erysipelate, de ulceribus, &c.*

7. *Phlegmatia Malabarica; Hyperfarcosis ulcerosa pedum* Kemper. observ. VIII. Annon.; *Perical* Malabarici endemium, sive *Pikal*, seu *pes fabricians*; *Pedarthroscaces* Christianis Sancti Thomæ familiaris; *Pes de Sancte Thoma* Lusitanis Indis. *Koëssii* Japponensibus. C.

Viget hic affectus maxime in montibus quos Christiani, Sancti Thomæ religionem amplexi, & ideo ex Provincia Coronanda a Paganiis ejecti, incolere coacti sunt, tribuiturque malum a quibus nictosis, acerbis huius loci. Indigenæ narrant a Diis gentilibus poenam illam inhicam esse; verum similem morbum in Ceilan & Omeræ in Japponia observavit *Kemperus*.

Crus tantum alterutrum afficitur a fura ad pedes, genu nunquam, digiti rarius; hanc partem singulis mensibus cum lunæ incremento phlegmone corripit, quæ intra aliquot dies deservente, tumor tamen non remittit, sed in carnem vitiosam fecedit, ut ambigus cruris crescente ætate, duplo, triplove major sit quam sanis; crassities est inæqualis, œdematosa, duriuscula, aspectu scirrhusa, fungosa, ulcerosaque sanie scatens: qui hydrocelem fovent, a malo illo, sunt immanes; *Kemperus* suspicatur esse cariem.

Malum est insanabile, & licet sit nigricans & fœdum, non facile in sphacelum degenerat; imo si ulcusculis scatent, non impedit bajulos ne gravia onera gestent, & palmas alas agilitate scandant.

Morbum illum solebant Malabarici excitare

circa femora & genua multis fonticulis, quibus sunt toti veluti fasciati; ast ab ipso mali initio post paucos tantum inflammationis recurrit, sic avertitur feri acris influxus in tibias; serius instituti fonticuli non profunt.

Japponenses vero tumorem scarificant, & pluries innoxia comburant.

8. *Phlegmatia elephantina*; An diversa a Malabarica Kemperi? *Elephantia* P. Alpini Med. Ægypti Amati Cent. II. cur. 34. C.

Hac correpiti pedes muleis magnis duris tuberculis tumidos, magnos, arque deformes habent, elephantinis pedibus maxime similes cruribus etiam tumefactis, quod Malabarici non accidunt; æger nullum dolorem parit, sed ad ambulandum ineptus est; interea capillis ligneis calceorum loco utens pederentem progreditur.

Tribuitur hic morbus piscium & aquarum semiputridarum usus, necnon cibi crassus, ex bammia melochia, anguria batocel, eideque principio tribuunt hernias, pneumatoeclesque ibi frequentes.

9. *Phlegmatia cruralis*, Zacuti Prax. L. Vidi quinquies in gravidis octi-vel novimestribus crura tumida & aquoso humore plena, ac œdematosa simul labia uteri pendendi; scarificatis cruribus intra horam decumere coxæ, & fixtus ad statum tempus servatus est: *Boneti. Mercur. Compilat. p. 582.*

10. *Phlegmatia exanthematica*. C. In confluyente variola, cum pustulæ maxime sunt, cutis tenditur & intumescit; facies primo quidem, quippe ibi pustulæ tument citius, dein collum & succedentibus pustulis facies detumescit, oculi palpebris tumidis ante clausi aperiuntur, & tunc brachia, manus, deinde vultu extrema infima intumescunt: Vide *Pryaltissimum variolosum*.

In militari, tum primaria, tum potissimum symptomatice, quæ synoehis & typhis non raro apud Septentrionales supervenit cum tussi & dyspnœa, inclinante morbo, non raro phlegmatia, imo abdominis intumescencia succedit, tum vel sine aridura partium superiorum, donec tandem sudoribus vel spontaneis, vel arte proleptis, ex toto cedat.

11. *Phlegmatia Dellenfis*, Æsclepiæ in Epistolis Philocraei.

In Insula Delos endemia erat hæc phlegmatia in qua œdema, partibus inferioribus parcens, superiores tantum pallore & tumore afficiebat, potissimum collum & pectus; hoc erat autem singulare quod non solum facies, sed etiam capilli albescerent: nulla febris, dolor nullus; hæc Apollinis ira sibi evenisse putabant.

IX. PHYSCONIA. *Hypofarca* Illust. Linnæi Gen. Morb. 218.

Est intumescencia totius fere abdominis a partibus solidis citra graviditatem.

Physonum nomine Græci indigitarunt homines

nes ventericulosos; inde *Ptolemæi* cognominatus est *Physæ* apud *Ægyptios* ex *Tito Livio*.

1. *Physcentia hepatica* Cl. Cusson. Bonet. Sepulchret. de Gravitate falsa Observ. 3. num. 8. 9. 10. Verduc Patholog. du Rachis. (a) *scirrhoidea* Georg. Segeri Misc. Nat. Cur. Ann. IV. Observ. 142. (b) *calculosa* Bonet. Sepulchret. de hypochondrii tumore Observ. 5. (c) *hydratidosa* VVinkleri disput. de hydratidibus apud Bonet. Med. Septentr. Tom. II. pag. 313. C.

Mulier ob suppressionem menses gravida habebatur; hepar habuit quadraginta librarum pondus.

1. Puellulam primo ætatis anno optimè ut videbatur constitutionis, eo clapsu, varia afflixere accidentia, primum quidem levia, ast quæ intra sex menses mire ingravescebant. Apparbat tumor totius abdominis durus, in hypogastrio maximus, summe dolorificus, ac plumbeus. Emissis urinis purulentis per aliquot dies, erumpentibus ad certam usque vicem in pedibus præprimis ac collo quibusdam, scorbuticorum adinstar, maculis, accedente diarrhœa, intra quatuor menses, debitum naturæ solvit. Aperto post mortem corpulculo, omentum cum mesenterio, magna parte, putredine absumptum apparebat; pancreas putridum erat; ren sinister discissus copiosam fundebat saniem; hepar magnitudine donatum insolita, pallidoque colore, totam abdominis replebat cavitatem.

2. A longo tempore conquereretur mulier de tumore ac duritie hypochondrii dextri; adhibitis in calum remediis multigenis, ietero tandem correpta intra aliquot dies fero surgitur. Aperto cadavere, hepar repertum est impense magnum, libras circiter 12. pendens, durum, flavum, calculis hinc inde flavis, respersum: Vesica fellea, arenulis flavis & calculis duobus, meatus hepaticus calculo unico sœta erant.

3. Difficili virginis 43. annos natæ, & abdominis tumore laborantis cadavere, inveniebatur hepar multis obitus hydratidibus, quarum aliz ovi gallinacei, aliz ovi columbini, aliz minoris erant magnitudinis.

Tumorem in regione hepatis a quindecim annis sætebat mulier quadragenaria; de anno in annum eo increverat tumor, ut vidua illa in prociutu duplicis parvis diceretur. Tumor externam hepatis figuram retinebat; erat durissimus, volumine monstruosus; illo fortiter compresso, vix dolebat ægra; inter ascendendum unhelebat; pedes nunquam intus urunt, catamenia rite fluxerunt. Pertæsa mulier illa medicamentorum, quæ clarissimi Doctores per plures annos & ego per plures menses in vanum usurpabam, devoravit simul & semel drachmam unam & semisse mercurii dulcis, quod remedium in conservæ enulæ campanæ exceptum in plures doses partitum, & intra quinque dies assuendum præscripseram; ab assumpto remedio vis tres elapsæ erant horæ, cum vividissimum dolorem in abdomine conquegerit, & inter tru-

citur exclamare se sentiret aliquid e pectore in infimum ventrem tuens; interea evanescere tumor, & fere examinis in lecto procumbit ægra; illic invisurus accedens vires prostratas, pulsus vix micantem, intestina velut in aqua immantia deprehendo; compressa levi manu parte quam prius obidebat tumor, dolorem acutum periculi ægra; virtus per quatuor dies recollatis, abdomen intumuit, sensilis ille fluxus & jam sepius excurrere dies, quo clarissimo *Falsete Farcken* in consilium vocato, parentem instituentem decrevimus, juxta quam ad decem, quindecimve libras coacta fuit aqua limpida; tribus vero a punctione diebus clapsis, redit acites, & non modo abdomen, sed & totus corporis habitus intumescit; in hoc debellando hydrope in calum usurpavi hydragoga rogetabilia melioris notæ, ad mercurium dulcem & antimonium crudum coniungendum erat, quibus hydropem penitus fugavi. & agram adeo perfecte sanitati restitutam dedi, ut a sanitate adepta tertius excurrat annus; nullum dolorem amplius perpella in hepate, licet valde compresso; ex communicat. D. *Boussanet* D. M.

2. *Physcentia splenica* Cl. Cusson; (a) *cephalica* Haller Disput. Pathol. To. IV. disp. 109. Talpi Observ. Med. Lib. II. cap. 30. (b) *scirrhoidea* Bonet. Sepulchret. de ventris tumore Observ. 34. nu. 3. C.

1. Puer 9. annos natæ, per remedia purgantia ab ascite liberatus, gravissimis dein tentatus in infans ventre doloribus, hypochondrii sinistram tandem oculis & palpo exhibebat valde tumidum ac dolens. Præter alia in ipsis cadavere observata, deprehendebatur lien insignis magnitudinis, ast immutæ figuræ, super ventericulum assurgens, hepar reprimens, quoad colorem & consistentiam hepatis similis, non scirrho, non ulcere, non inflammatione tentatus, verum ab uberius affluente, quam transivente sanguine infarctus atque obstructus.

Infans male habitus a nutrice, & loco lactis altius graviore cibo, quam tenella ætas ferendo fuit, collegit inde plurimum lenti ac viscidæ succi, infarcientis usque eo angusta lina vasa, ut viscus illud summo opere intrinsecens abdomen prorsus distenderet, contabescere integrim torpore univerfo. Sublata obstruktionē & imminuta uberiori succi copia, decrevit tam manifeste lien, ut luce clarius apparuerit tumorem hunc, non tam fuisse a mala conformatione, quam a redundante alimento.

2. Refert ex *Hypoth. Beseho Theophr. Bonetus* Sectionem mulieris laborantis scirrho lienis in tantam molem excreti, ut totum fere repleter abdomen & libras 33. penderet. Morbum præstium decem & septem annos mulier tulit, muna sua de cætero obiens. Exemplis similibus scateat historiz Medicæ, quæ brevitate ergo missa facimus apud *Schenkiū*, in *Boneti Sepulchretico*, *Medicina Septentrionali*, &c. legenda.

3. *Physcentia renalis*: Clariss. Cusson, Bonet. Sc.

Sepulchret. de gravid. falsa Observ. 3. num. 7. (a) calculosa Plater. Observ. Lib. II. pag. 449. River. Centur. IV. observ. 34. (b) *sarcomatocystica*, Haller Disp. Pathol. disp. 114. C.

In cadavere mulieris *Frane. Flaxxonius* unum dumtaxat reñem invenit in medio ventre sicum tantæ molis ut initio femininam prægnantem putaret, *Nobilis Mantiff. anatomi. observ.* 31.

1. Nobilis quædam matrona multos annos gravissimis renum doloribus, sinistro præsertim in latere, divexabatur; & quatuor decies uterum gestans toties ante absolutum graviditatis terminum parturiebat. Tandem una cumtate doloribus invalescitibus de dexteri præsertim lateris dolore, ita ut nec contractum nec decubitum in illam partem ferre posset, conquereretur; rejectis interim, toto corpore tempore, multis calculi & puris ac sanguinis copia per urinas, accedente insuper gravissimo stomachi & gutturis ardore. Cuius anatomicus exhibebat reñem sinistram penitus consumptum, puriformem, sinibus amplis, scirrholis tuberculis reñem, cum uretere dilatatissimo, intestini simili; dextrum vero reñem tumidum, in immensum adactum, in quo per medium dissecto, calculus totæ molis nidulabatur ut sinum secundum omnino adimpleret &c. *Riverius* reñem vidit calculis 22. reñem in magnitudinem nativæ quadruplo majorem excrevit.

2. Refert *Jean. Martin Ottus* casum fabri ferrarii qui biennio ante mortem persensit in sinistro lumborum latere tumorem abdomeni, ea in parte præprimis ac sinistro hypochondrio, maxime tandem distendentem; & borborygmos; jejunum præsertim ventriculo, edentem ac si verum quoddam animal inus delitesceret & vocem, sese hinc inde convolvendo, ederet: hanc molestiam cibis ingessis mitigare diu novrat æger: increverunt in dies symptomata; accessit immedicabilis dyspnœa, insultus apoplectici, dysphagia, psellismus, dextero lateri hemiplegia, mors. Aperto abdomine mox prodibat corpus immane, globosum, tensum, vas sanguiferis ac nervis dives, magnitudinis cucurbitæ mediocris, inflammatione gangrænosa inferne tactum, in tus sacrum sanguine fusco, copioso, parum vel nihil fœtente, conjuncto cum substantia flavesciente, spongiosa, lamellatim sibi incumbente; in qua hinc inde apparebant vomicæ atro sanguine ac pure collectæ distentæ. Nihil erat morbosum hocce corpus præter partem renis sinistri dimidiam, illæsa ac sana erat renis ejusdem medietas altera.

4. *Physconia uterina* Boneti Sepulchret. de gravid. falsa observ. 2. num. 5. 6. 7. C.

In muliere quæ utero gestare putabatur, uterus apparuit undique distensus, durus, crassitie quinque digitorum, pendens libras novem cum dimidia, in capacitate massa carnea concreverat. In altera utero post partum tantam molem retinuit, ut totum inferum ventrem solus occuparet. In altera utero adnata erat exterior excrecentia candida, seu lipoma.

5. *Physconia ab ovario*. Monroo *Essais d'Edinburg* Tum. VI. art. 74. obs. 1.

Mulieri 36. annos natæ prius hydrometra graviditatem mentiente afflicta, catamenia quæ eruperant steterunt, venter intumuit cum omnibus graviditatis alterius signis; sub finem noni mensis accessere tormina partus in quibus obiit. Aperto cadavere, inventum ovarium dextrum molis graviditatem mentientis intus cellulis sacrum, & intra cellulas materiem steatomatosam observavit *Monroo*, vasa sanguiferis in eius molis superficie repentibus; præterea lien mollis erat, superficies viscerum nigro humore infecta, cyllis fellæ plena grumis, mori fructus colore & superficie referentibus, sexdecim aquæ brunneæ libræ in abdomine.

6. *Physconia mesenterica* Cl. Cusson: (a) *hydridosa* Gregor. Horsii Lib. V. Observ. 33. Tulpii Observ. Lib. II. cap. 34. (b) *strumosa*, Bonet ex Rudnicio de ventr. tumore Observ. X. num. 15. Ambr. Parisi Lib. VII. cap. 21. Scultet. Armamentar. Chirurg. Observ. 38. (c) *scirrhouosa*, Marc. Donati Hist. Medic. mir. lib. VII. cap. 15. Cludini Consult. Sect. II. cons. 134. Trincavelli. Libr. III. Consul. 22. Riolan. Antropogr. Lib. II. cap. 26. Morgagni de sedib. & caus. morb. Epist. 39. nu. 2. Tom. II. (d) *sarcomatosa* Bonet. Sepulch. de falsa gravid. Observ. 3. nu. 1. (e) *steatomatosa*, Barch. Cabrol. Observ. 33. & 35. Tulpii Observ. Lib. II. cap. 32. & 35. Joh. Lecheli apud Bonet. Med. Sept. Tom. II. pag. 486. idem Collect. Academ. T. III. pag. 585. Hierne Collect. Academ. Tom. III. pag. 226. Observ. 166. (f) *sungosa*, Bonet. Sepulchr. de gravid. falsa Observ. 3. C.

7. Juvenula, altero post nuptias anno, corpore variis torqu岸 in imo ventre & hypochondriis doloribus, qui nunc omnino evanescerant, nunc ad lithophymiam usque sæviebant; pallescebat facies; venter in tumorem surgebat inæqualem. Irris Empiricorum ineptiis nec non Medicorum contumaciis ita increverunt dolores, præprimis circa uterum, parturientium instar, ut obsestrix accersita vel molam vel simile quid ex utero proditum expectaret: sed præter aqua quædam effluvia nihil apparuit; & dolores paulatim omnino remiserunt: interpositis diebus aliquot tumor ventris & dolores, aucti sunt; purgantibus, cataplasmate & incessionibus adhibitis subsidie insigniter tamot; dolores sese sublati; ægra rursus munia domesticæ pericere incipiente. Haud ita multo post accedentibus subito convulsionibus, ea ipsa die vitam cum morte commutat. Aperto cadavere vena glandularum mesenterii apparuerunt vesicæ venosæ ejusdem implicatæ ac tectæ, uti & toti mesenterio hinc inde adnatæ, ultra viginti omnes inter se connexæ, molæ variz, aqua limpidissima surgentes: harum maxima caput infans, sex alia pugnum, reliquæ ova gallinæ & columbina æquabant.

Filia celebris pharmacopozæ, dissecta post obitum ob ascitem, ostendit in mesenterio suo inf.

insignem tumorem libras viginti ponderantem, involuacro membranaceo extus tectum, intus vero resectum veticulis pluribus aqua limpida distentis. Inerevit tam lente hæc moles, ut prægnationis suspitionem moverit: sed elapsu partus tempore, conflavit deinceps misera hæc integrum triennium cum funestissima ascitis specie; adeo ut vix unquam spiritum libere traxerit. Huic Physconiz speciei, ruptis veticulis, socius accessit ascites.

2. Virum ingluviem deditum variis corripuerunt affectus, qui quidem curati, nusquam tamen in totum sublati sunt: tandem totius abdominis inæqualem tumorem percipiens, sensimque languore universalis affectus dolorem in lumbis gravativum, in sinistro hypochondrio obtusum & sub ventriculo transversalem, constrictorium, conquestus est: Irris remediis sensim contabuit. Aperto cadavere observabantur glandulæ omnes tum mesenterii, tum externæ abdominis, maxime in regione lumbari, induræ; cellulæ intestini coli scybalis, frustisq; caecorum ingestorum fere omnes infartæ; denique tunc crusta subossæ partim obduras.

Mulier sexagenariæ ab octo annis abdominis tumor exercebat sensum atque indolentem ad summam magnitudinem progressi: interim naturæ, animæ, ac vitæ munia, perinde fere ac sana, ægra obibat: duobus ante mortem mensibus tantum lecto se tradere coacta fuit, febre superveniente. Secto cadavere inventum est mesenterium tumore miro ac prope incredibili turgens, librarum decem & levis pondere, totum extus schirrhosum, solis parte sui postica lumborum vertebra adhærens, antica autem peritonæo schirrhoso pariter ac prorsus cartilagineo, nullatenus vix interstinis, aliisque partibus, quibus velut connatum alligabatur. In ipso suberant innotui tumores cystici materia varia, aquosa nimirum, oleosa, mellæ, sebacea, albuginea, pultacea referti, &c. . . . Aquæ scilicet habebat abdominis cavum, ascite in physconiz societatem eandem veniente.

3. Puer octennis ab alio puero fuisse circa lumbos percussus, aliquot diebus post male habere cepit, & septimanis aliquot præteritis, licet ad vitæ tempus ultimum cibo sufficienti nutritur, tamen assumptis obiit. Huic licet nec tussis molestia esset, nec febris laboraret; nihilominus tamquam phthisicus a quodam tractatus fuit. Parentibus mortis causam intelligere cupientibus, decreta est mortui pueri exenteratio. Cadavere denuato, abdomen turgidum & utrinque circa umbilici regionem renitens inventum est: quo aperto glandulæ mesenterii non solum tumentes, sed etiam schirrhosæ apparebant, atque ita conglobatæ ut duorum pugnorum magnitudinem superarent. In thorace & pulmonibus vixi nihil penitus occurrit. Varietatis hujuscemodi Historiz habent *Claudius, Trincavellius, Riolaus, Morgagnius* locis citatis.

4. Refert *Bonetus ex VVesebio* mulierem Parisiis visam fuisse iugenti totius abdominis tumore cor-

reptam cum aliquo lumborum dolore, quam Medici quidam gravidam existimantes ad partum accingi jubebat, parum omnino proficientes. Abdomen universum quod tractatum, non aque, sed carnis duræ consistentiam præ se ferebat, ita elevaverat tumor, ut geminis utero gestare videretur: cæterum aderat appetitus; alvi & vesicæ beneficio libere fruebatur mulier, de re alia nulla conqueffa, nisi de tumoris molestia & indecentia. Accitus postea *Honorius* bono animo hanc esse jubebat, reique familiari operam dare, neque de onere illo die deponendo quidquam ultra cogitare; prægnationem enim hanc non esse, sed mesenterii larcæma, cujus scilicet glandulæ mirum in modum intumuerant, accedente quadam insensibili syphilis: tres jam eodem affectu laborantes feminas sibi olim fuisse observatas.

5. Puellæ menses nata tredecim insigni ventris tumore ac tænhone vexabatur, tanto respiratori factio impedimento, ut statim suffocatione jugulanda videretur. Tumoris ad illa utrimque pertingentis aliquis palpo deprehendebatur circumscriptio: quinque adhuc menses fere duravit affectus hujuscemodi, quem intra octiduum lethalem pronuntiabant optimæ notæ Medici ac Chirurgi. Facta cadaveris sectione occurrebant in sinistro latere ruber immensæ molis cystide duplici venis varicosis intertexta præditum, libras 10. pendens, materia pulmentum, ova cocta, fæces, carnem referente factum: rubeis tribus aliis, pondere trium librarum, quoad cystidem & materiem contentam similibus factum, quod ab apophysis transversalibus vertebrae lumborum ortum duens, deinde sub lien: transiens totum id latus occupabat; dextrum vero latus exiebant duo iidem immensæ rubra prope vertebrae originem trahentia, quoad cystidem & inclusam materiam similia, libras 4. pendencia: quorum alterum alterum cavam hepatis partem adimplebat; alterum ad os usque pubis descendebat. Diaphragmate ad claviculas impulse duorum digitorum spatium pulmonibus non erat reliquum. Sana erant reliqua omnia thoracis atque abdominis viscera.

Puero intra biennium excrevit abdomen in eam molem ut crederetur firmiter ascite laborare. Sed secto cadaveris deinceps adhibita, in venit tamen illic nihil liquoris; verum ingens solummodo steatoma quod ex mesenterii glandulis excrevisse venerat in eam magnitudinem; ut bilanci impostum ultra libras octodecim ponderaret. Erant jecur, lien, ventriculus illæsa, pancreas pingue ac ponderosum, & alterutrum latus rene suo destitutum. . . .

Steatoma mesenterii capitis magnitudine, sensu gravitatis, coloribus per intervalla, & vomitionibus stipatum; quandoque diarrhæa torminosa accedebat; pedes ante obitum œdematosi fuerunt, nullum serum in abdomine.

Miles quem hydropicæ existimabant. omnino macilentus, œdematosa, seu phlegmatia crurum & ribarum laborans, abdomen portentosi volu-

voluminis habebat cum dispœna, debilitate, anxietatibus præcordiorum, & fame maxima sine siti.

Gerebat in abdomine molem adiposam, trilobam, quinquaginta quinque librarum pondere, quilibet lobus tumoris intus cavus continens liquidum obscuro-flavi circiter libras sex, in altero quid arenosum latitabat, vix aquæ libræ dux circa tumorem, qui valis sanguineis, imo quibusdam lacteis circumdatus erat; unde jure refertur glandulas mesenterii portentofo auctas fuisse.

Fungus est excrementa mollis; ille innascitur mesenterio, & ita sensim crescit, ut mulieribus graviditatem meniat. Plures sunt observationes, ut *VVelschii*, *Slegalii*, *Severini*, *Horslii*. Appetitus, alvi, vesicæque munia bene se habent; tantummodo est in hoc morbo magni, carnosique tumoris in abdomine molestia & indecentia. *Pigretus* hunc tumorem vocat *Sarcoma mesenterii*; alii *Vasarcosum*; Galli *Chamignon*.

Aliam historiam vide apud *Bonell Sepulchret.* tom. 3. pag. 93. num. 8.

7. *Physconia intestinalis*, Cl. Cusson; (a) *concreta-glomerata*, Morgagni de Sedib. & caus. morbor. Tom. II. Epist. 39. num. 21. 25. (b) *Sarcomatosa*, Fantoni Observ. Med. selectiores, Observ. 15. C.

s. Vir hypochondriacæ affectioni & fluxui hæmorrhoidali obnoxius vivebat: imminuto fluxu præfatus dolores quidam ventris, sæpe repentini momentarii, nonnunquam paulo longiores, ipsi interdum creabant molestiam, quæ, fluxu penitus compresso, major in dies facta est. Elapsis pluribus mensibus animadverti cepit in ventre durities quædam, ac tumor: prædicta incommoda alvi adstrictio stipabatur; accesserunt vomitiones contumacissimæ, nulli morigeræ remedio, supervenit macies, febriçula; interim ventris tumor ita increverat ut jam circulum æquaret cujus diameter esset octo digitorum: erat autem is non tactu modo, sed & visu persentiendus, cuti concolor, medius inter ensiformem appendicem & umbilicum locatus, & ab utroque modice distans: tuberosus, renitens: ex corporibus glandulosis quali compactus palpo videbatur, dolebat a pressione, & etiam cum flatibus vexaretur æger, huc illic movebatur, si manu utraque comprehenderent ipsius latera: facile erat animadvertere eum non ventris parietibus, verum his proximum esse. Docuit abdominis apertio totum ileum intestinum & jejuni proximi partem aliquam sursum retracta, coarctata, & inter se artissimè conjuncta magnam illam ac circumscriptam protuberantiam efficere &c. Signa quibus hæc physconia varietas utcumque dignosci possit, necnon causas quibus debebatur hæc intestinorum retractio, & coarctatio, memorat laudatus Author. Patent ex concretione theoria apud *Gorterus* aliosque legenda causæ quæ artissimam intestinorum conglobatorum connexionem in hac varietate observatam inducunt.

2. Puer 10. citetur annotum, habitus corporis

caruosi, cepit ægrotare dolore ventris violento, cum febre & vehementi vomitu: observabatur infra sinistram hypochondriam versus epigastrium oblonga eminentia cum aliqui duritie, quæ videbatur æmulari prolapsum lienis. Febre, quæ fugata fuerat ope congruorum remedium, redeunte, dolore continuo nullis remediis auscultante, & protuberantia immutata permanente, puer extinctus est. Aperto cadavere omnia satis fana indenta sunt, præter intestinum colon in latere sinistro & sub-ventriculo, longitudine palmari valde durum, dilatatum, & tumore carnosio, fibroso, admodum denso, ipsius cavitatem coarctante, instructum. Secedebat tunica ejus exterior purulento humore infecta, & fræcida.

8. *Physconia omentalis*; Frid. Reebman. Diss. de Omento; Cl. Cusson. C.

Est abdominis intumescencia ab omenti mole adhausa cum duritie scirrhosa, cartilaginea, vel ab infarctu ajus & convulsione.

Scirrhosum totam epigastrii regionem occupans omentum *Riverius* in Canonico Monspeliensi vidit. *Præc.* lib. 13. cap. 5.

Scirrhosum & adiposo carneum vidit *Ryschius* *Observ. anat.* 63. In eodem crasso carnosio pilosum globum idem vidit. *Observ.* 18. In puella carnosio glanduloso crasso, *VVartolani Adnogr.* cap. 12. *Bartholini*, *Anat.* lib. 1. cap. 1. Cancrosum ventriculo & hepatis adnatum, *Haller. comment. in Boerhaave*. Crassum, durum, fere lapideum, *Paracelsus pentec.* 3. *observat.* 10. Osseum tridecim librarum pondere, *Mengin. Hist. de l'Acad. des Sciences.* 1732. p. 34. Austum ad quinque libras refert *Vesalius*, teste *Bartholino*. Multis millen's glandularum infarctum, *Segneri Ephemer. German.* Conglobatum viginti sex libras pendens, unde mulier primum gravida, dein hydropica habebatur, *Reisslii*: triginta libras pendens, unde orthopnoea exorta, *Furzius & Boerhaave*, *Haller comment. in Ing.* Capitis infantis magnitudinem adæquans, *Raynerus*. Durum ingens sexdecim libras pendens, atroces dolores creans in femina, *Huxham Philosoph. Transact.* vol. 7. pag. 519. & 134.

Mulier ventris tumorem gerebat quæ ascitem ingentem quantitate mentiebatur. Ab aliquot annis exordium supererat affectus, & pedetentim invaserat, irritis remediis omnibus ad resolutionem & dissipationem tumoris accomodatis. Tanti ponderis extensione non solum doloribus variarum partium consumebatur, sed insuper præcedente reliqui corporis atrophia tandem extinguebatur. Aperto abdomine in conspectum veniebat tumor ingens, totam ventris capacitatem implens, libras 46. pendens, undique satis crassa ac robusta membrana donatus, substantia constans primum adiposa, dein scirrhosa ac glandulosa, cujus medium tenebat cavitas foetida ac sordida sanie repleta. In parte inferiori ac in lateribus facili negotio sine partium reliquarum læsione separabatur tumor; aut superius a fundo ventriculi, pat-

partibusque circumjacentibus non sine laceratione
divelli cutis. *Greg. Horfii Prob. 10. Dec. VI.*
Cura obtinetur longo usu martialium, mercuria-
tium, salinorum, nec non extus saponaceis, re-
sinosis, emplastis; interpositio usu laxantium,
millepedum, salinorum, saponis, acetii, &c.

9. *Phyllostoma polyplachna* Cl. Cañon 2; (a) *scirrhus*. Fabr. Hildani Cent. II. Obf. 45. (b) *scirrhus* & *sarcomatica*, Huldreichi Misc. Nat. Cur. Ann. VI. & VII. p. 321. (c) *scirrhus* & *adiposa*, T. Bartholin. Cent. III. Obf. 6. (d) *hydatidosa*, VVolch. Coiter Obf. Anat. p. 2. 7. Maur. Cordaz Comm. 5. ad lib. priorem Hippocri. de mulieb. (c) *hydatidosa* & *scirrhus*, Halleri Disp. Pathol. Tom. V. p. 256. C.

1. Scabatur *Fibr. Hildanus*: mulierem morbo jam pridem detentam, quæ sibi perfulserat fortissimi mortuum; post fortis alterius intra triduum mortui partum, per menses 14. in utero remansisse. Hanc ipsi opinionem iniecerat durities sinistro in latere manifestâ; oblonga, inferne rotunda, caput infansis repræsentans, adusque illa sese extendens, & simul comprehendens regionem umbilici una cum lateris dextri costis spuriis. Reperiebatur autem hepar tantæ magnitudinis, ut costas sinistra lateris spurias transgrederetur; lienem vero mole portentosum, durum, inferne rotundum, sanguine adulto plenum, hepatis lobo adnatum.

2. Mulier aetatis 45. temperamenti biliosi, post consolidatum ulcus, quod sub axilla dextra per aliquot menses atherat, incidit in cibum fastidium, vomitum, sitim intensam, cum dolore circa hepatis regionem gravativo & insigni dextri hypocondrii tumore: invaluerunt in dies symptoma; non remiserunt dolores; tumor nec emolliri, nec discuti potuit; accessit icterus; tandem misera, dextro latere, prae tumoris ipsam trahentis ac ferme opprimentis mole, versus terram inclinato, dies noctesque sedens animam efflavit. Secto abdomine inventum est hep. scirrhosum, vastissimum, libras 14. pendens: in mesenterio autem detecta fuit excrecencia carnea, caput infantis magnitudine aequans. Viscera reliqua a nativa bonitate nihil defecerunt.

3. *Femina* *pragnans* *ac* *obstetricæ* *judicabat* *ur* *ob* *ventris* *tumorem* *ac* *duritiem* : *per* *intestivallâ* *modo* *remittebat* *durities*, *modo* *augebat* : *pedes* *subinde* *tumidi*, *interdum* *abique* *fensibilibus* *evacuacione* *subsidebant* : *cæterum* *elegant* *totum* *corpore* *carneâ* *ac* *florētis* *ætatis* *erat* *femina* . *Intra* *4. menses* *ita* *invalens* *deficiente* *symptomata* *præstata*, *ut* *doloribus* *ingentibus* *excruciata* *vivere* *desierit* . *Culter* *anatomicus* *insitebat* *intestina* *tenuia* *omnia*, *arcissime* *inter* *se* *con-* *nexa*, *eminentia*, *membranis* *ac* *pinguedine* *cooperta* ; *hepat* *grandius*, *æramque* *implens* *hypocondrium*, *scirrhusum*, *cum* *ventriculo* *liene* *&c.* *mediate* *pinguedine* *coherens* ; *lienis* *adipi* *immerfus* ; *ventriculus* *densus*, *cartilagineâ* *duritie* ; *intestina* *crassa* *sub* *membrâ* *præ-* *pingui*, *ac* *per* *abdomen* *protenfa* *univervum*, *de-*

Sauvages Nosologia Methodica. Tom. II.

litescentia; intestini recti vicinias pinguedine ob-
 itas &c. In villorum prædictorum societatem ven-
 erat sanguis serosus in ventris ac thoracis ca-
 vum magna copia effusus.

4. Phlegmici ventrem distentum secabat *Göiterus*, & inveniēbat *vesiculas* inæquales, aqua *lympha* referas, ubique *peritonæo*, *mesenterio*, *intestinis*, *hepatis*, *lienī*, *visceribus* denique omnibus adhærentes. Consumpta & exulcra erant viscera præfata. Aquam nullam habebat abdominis capacitas. Simile exemplum *hydatidum* loco citato refert *Cordaus*, qui in mulieris cadavere nullum cavum observavit in quo non penderent *vesicæ* aqua citrina & foetoris experti repleta: his featebant *intus* & *extus* *vesica* *urinarīa*, *renes*, *utērus*, *ventriculus*, *intestina*, *pericardium*, *cor*, &c. his tegebatur *hepar*, *lienque* *univerfus*: *Odīngentas* numerus *facile* *superasset*.

5. Mulier 46. annos nata, temperamento sanguine-phlegmatico & habitu corporis macilentum prædita, post suppressa menstrua, acerbissimos abdominis dolores patiebatur. Trium annorum spatio in dies ita intumescere abdomen, ut ambulatio ei ob difficultatem respirandi denegaretur; & summa oriretur imbecillitas: pedes & femora nullo tumore affecta, ino & contabida erant: nulla corpore moto sentiebatur fluctatio: verum hepar durum, scirrhum percipiebatur, non secus ac regio circa vesicam urinariam: interim paracenthem urgebat ægra, quæ asciticam non ita pridem curatam horat: reluctabantur Mcalei: insitititur tandem paracentesis in latere sinistro, mollissimo, tenuissimoque: effuebat aqua pauca, viscida, gelatinosa, tenax, quæ ad vesperam sponte subsistebat: profundioriem incisionem idem sequebatur effectus. Ex apertura identidem prodibant cuticulæ: exacto biduo cum impetu prosiliebant hydatides, partim disrumpæ, partim sero limpidorepleta, majores, minores, quæ sub qualibet deligatione per tres dies exire pergebant. Secto cadavere, musculi abdominales, peritonæum, uterus cum suis ligamentis, & vesica urinaria scirrhouea inventa sunt; viscera vero reliqua vesicis fere repleta vel cooperta, vel resecta. Plura vide loco citato.

10. *Physciaa visferveralis* Bonet. Sepulchr. de gravid. fals. Obs. 3. *Megalosphaera* Hippocratis i *Physciaa megalosphaera* Cl. Cuslon. Marck. Donati Hist. Med. Mir. Lib. IV. c. 2. Schenck. Garnero de Liene Lib. III. obs. 9. Salmuth Cent. I. Obs. 22. Boneti Med. Sept. Lib. VII. p. 487. Bianchi hist. hepat. T. I. p. 130. C.

Mulier novem menses utero gestare putabatur; infante partus tempore obit præ dolore; totum corpus internum, epiploon, mesenterum, hepar, lien; pulmones, cor quoque & peritonæum erant obstita veticulis aqua limpida plenis, cuique vesiculæ triplex erat tunica. *Ballonius Parad.* 186. In alia hepar & splenem immensæ molis invenire.

Hanc speciem sistit visceris unius aut multi-

plis, insulphabili undequaque substantia conplexi, magnitudo abdomen elevans atque distendens; perstat illæ viscæris functio: una peccat moles, palpo iudice: quod non ita tamen intelligi volumus quasi functionum aliarum a viscere iusto majori non pendendum nusquam adesset læsio; in hac specie non semel observantur dyspnœa, ponderis sensus, molestia subvario corporis motu & similia: Cæterum vita vel sana est, vel a sanitate parum omnino abluat. Megalosplachniæ plurima apud Auctores præstant exempla. Hepar mole maxima præditum, naturalis tamen habitudinis, in subjectis plurimis per varia morborum genera denatis invenit *Blanchi*. Fœminæ optima sanitate fruente, & hepar vastæ molis in corpore alcutis historiam *Salminus* commemorat. In puella similis hepatis magnitudinem dyspnœa nulla stipatam, quamvis alia adessent symptomata dolorifica quæ in hepatis molem obnormem refundenda certe non veniebant, vidi *Carolus Offredus*. Non semel tamen difficultatem spirandi comitem habet Megalosplachnia hepatica. Exempla de hoc genere apud præfatum *Offredum*, *Dominicum de Marchettis*, aliosque legere datur. Quod de hepate modo diximus in liene etiam locum invenit, qui ob malam conformationem vel hypertrophiam sua mole, sana licet, nonnumquam spectabilis est, abdomenque distendit. Historias Megalosplachniæ splenicæ referunt *Schenkius*, *Marcellus Donatus*, *Vesalius*, *Helvigijs*, & sexcenti alii. Hujus cum hepatica combinatæ casum, ut alios sileamus, describit in observationibus *Anatomico-Medicis Schraderus*, qui incisio quoddam cadavere hepar & lienem insignis magnitudinis invenit, parenchymate interim utriusque viscæris integro ac bene colorato . . . Cæterum ex hac specie exulare jubemus obsecrum megalosplachniæ adipis copix abdominalia viscera obsidenti tribuendam, quæ nimium Polysarcix symptoma est vulgarissimum: Speciei hujuscemodi varietatem tunc tantum creat pinguedo, cum interiores abdominis partes ita obtuit, ut ventris protuberantia, cum reliqui corporis marcore aut saltem impinguationis defectu conjungatur.

11. *Physconia externa lupialis*, Cl. Cusson, VValter Graham Transf. Philos. Compend. Vol. IX. cap. 4. p. 187. C.

Puella 30. annos nata, prospera sætis veletudine gaudens, nisi quod interdum de mensesuorum suppressione quereretur, dum pondus abdomini applicatum elevabat, nifum edidit validum, quem iniequebatur dolor vividus in sinistro latere; exactis duabus tribus hebdomadis, in eodem latere observandus veniebat exiguus tumor rotundus; & paulo post assurgebat abdomen univèrsum, magis tamen in sinistra quam in dextra parte. Querimoniam habebat sæpius ægra de cerebri ac vehementibus in intestinis doloribus, qui interdum ita ingavescebant, ut solo opii liberaliter assumpti usque ac somnus obrepente; cæterum parce admodum fluebant urinæ; & tanta alvum te-

nebat segnities ut raro admodum, nisi cathartice potionis aut clysteris beneficio, ea descenderet; a cathartice male semper, ad emollientibus vero enematis optime habuit ægia: adeo non tumebant pedes, tibia, femora, ut porius artus inferiores, non secus ac reliquas partes marcor obsideret. Tumor abdominis erat insignis, præcipue circa umbilicum, inæqualis, major scilicet latere sinistro quam in dextro, ita durus ut pressio prorfus obliqueret. Regionem epigastrii sinistram tenebat peculiaris protuberantia, molliscula, quæ digito prementi sese inflecti patiebatur.

Tres fere annos morbus cunctatus est. Cuius Anatomicus exhibuit membranam adiposam tenuissimam, musculos abdominales gracilissimos, peritonæum, præcipuum morbi sedem, adeo portentose incrassatum, ut circa & infra umbilicum pollicem quinque latitudinem superaret, supra ipsum crassitie donatum paulo minori: in eo observanda veniebat numerosissima lupiarum substantia alba & spongiosa distinctarum cohors: quarum alix rotundæ, oblongæ alix: maxime in latere sinistro reperundæ ovum aserinum æquabant, alix columbinum, his minores erant nonnullæ; colore ac consistèntia variabat materies in his contenta, quæ nunc tenuis, albida, nunc viscosa, gelatinosa, bellucida, albumini ovorum similis, nunc tandem spissa, alba, puri analogæ: ut contentorum ita & cystidum varia erat conditio; membranz his tenues, illis crassiores, plurimis cartilaginæ. Debeatur peculiaris epigastrii sinistri protuberantia cystidi aqueosæ, splenis ac renis regionem occupanti, intra peritonæum eo in loco tres fere lineas crassum efformatæ. Abdomine exultabat pus, nec non aqua. Maximum erat hepar, sanguineque sacrum. Intestina in latere dextro adegerat lateris sinistri protuberantia cystica, &c.

12. *Physconia externa scirrhotica* Cl. Cusson, Ger. Blas. Obs. Med. VI. C.

Mulier 35. annorum, tabe confecta, & a mola, uti credebatur, extincta per triennium ventris intumescencia sensum aucta laboraverat; durum valde abdomen; sic ut constitutionem lapideam referre, ubi manū attingebatur. Cuius Anatomicus nec pinguedinis, nec membranarum, imo ne musculorum quidem abdominalium vestigia exhibuit: omnia hic in substantiam commutata reperiebantur alienam, ulna dimidia in regione umbilici crassam, omnino cartilagineam, circa corporis exteriora, versus interiora vero magis carcinomatodeam. Otrum duxerat malum ex tuberculo duplici ad spinam & os pectoris sinistro in latere sito, cystidi propriæ inclusio, cui protuberantiz reliqua pars adnata quasi intumebat.

13. *Physconia externa hydatidosa* Cl. Cusson, Bonet. Sepulchr. de Grav. falsæ Obs. 5. §. 2. 3. 4. 11. &c. Cachexiæ apud Schenckium lib. III. de Hydroke Obs. 4. & apud Scholtæum Conf. 336. Solenandri Conf. 15. Sect. V. Riverii Obs. communicat. ultim. C.

Inventus est in mesenteria puellæ tumor viginti libra ponderans, inus reclusus veticulis. In femina altera quæ gravida habebatur, abdomen erat plenum veticulis crebris, aqua limpida repleta. Vide *Ballanum parad.* 186. Vide de hac re *Philosoph. Transact.* ann. 1722, n. 370. ubi in eisione in vivo octo millia globulorum, seu hydatidum educta sunt ex abdomine.

Mulier plebeja, annos circiter 40. nata, humilioris domus partem inhabitans, ætate & autumno ventre tumere cepit absque molestia, ut gravidam se crederet; hyeme accedente, eam invaserunt dolores gravativi, cævi, lancinativi, noctu vehementius affligentes, inrescente simul ventre, absque reliqui corporis inflatione ulla, imo potius emaciatione. Graviditatis spe in meum hydropis muerata, perquisivit & admisit undequaque remedia, sed frustra: quia dolores, una eum ventre subinde magis aucti fuerunt, ut noctu neque in lecto, neque extra quiescere puerit, sed in summo gelu extra domum obambulare ejulabunda, donec tandem dolorum magnitudine exanimata concessit. Sectione abdominis facta, status nullus compertus est, aqua vero parca; angusto spatio ardebant intestina & reliqua viscera. Abdominis parietes a cute ad peritonæum quasi alba pinguedine domtaxat eorum texti videbantur, nulla musculorum carnea substantia interposita, sed veticulis crebris, majoribus ac minoribus, aqua limpida repleta, atque invicem cohererentibus: elatior magisque teusa erat regio umbilicalis. Dum, adacta profunde novacula, circa umbilicum abdominis integumenta incidere, aqua obscura, quasi repleta propria cavitate, largissime profluit; totaque citissime evacuat fuit: in societatem ergo morbi nostri tandem venerat cyllis aquosa, rupis in focum communem hydatidibus natales debens. Physconiz hydatidosa casum narrant Solenander simplicem, Riverius eum apostemate combinatum, agro emergente.

14. *Physconia ab adipi subcutaneo*, Cl. Cusson, (a) *simplex* Cl. Lieutaud Comp. Med. J. Mich. Fehr. apud Bonet. Med. Sept. Tom. I. p. 936. (b) *syphilitica* observante Celeb. Fizes. C.

5. In muliere observabat Cl. Lientaud tumorem abdominis duritie seirrhodæ præditum, lente inrescentem, admodum dolentem, febre lenta stipatum, tandem portentosum, a coærcervatione, ac congestione adipis subcutanei enatum. Abdominis integumenta, etsi crassissima, partis hujusce ambitum excedebant, ac dupliciaturum palli feromoribus incumbant: Partes corporis reliquæ interim gradatim contrahescebant: mulier satis fugebatur macie confecta. Cadaver apertum exhibebat cellularem textum abdominis adipem ita distentum, ut in nonnullis locis ad sex pollices ascenderet ipsi crassities; viscera vero abdominalia obstructionibus scierhosis, suppurationibus, ac corruptela tentata. *Hypogastriæ*, Cl. Lientaud audit rara hæc Physconiz species, quam remediis omnibus adhibitis immorigeram expertus est.

Varietatis ejusdem exemplum cum copiosa pinguedine nonnulla etiam abdominis viscera obfidente combinatum ex *Febrio* refert *Bonetus loc. cit.* Varios cruciatum labores exantlaverat patiens eni in insignem magnitudinem elevabatur abdomen, primo aspectu hydropem mentiens, nisi hanc opinionem delere iussisset durities ejus insolita: cæterum exsueca erant membra omnia. Secta abdominis cute pinguedo sub ea occurrebat quatuor in umbilicali regione digitorum latitudinem æquans; copiosa adipi obolvebatur lien ac renes; intestina omnia particulis pinguibus hinc inde conspersa videbantur, &c.

2. In viro syphilitice confirmata laborante observabat alteram hujusce speciei varietatem *Coleb. Fizes.* Abdomen viri venereo tactum mire turgēbat, infarctis, distentis, induratis per adipem subcutaneum coærcervatum scilicet cellulæ loculis. Celebrata post debitas præparaciones, ut MonsPELLI moris est, hydrargyrosi, & inuncto, præ reliquis partibus illini solitis, ad septimam usque vicem abdomine, evanuit protuberantia; & in gratiam eum sanitare æger profusus restitutus est.

15. *Physconia ab excrecentia*. C.

Ea est abdominis partialis durities, aut intumescencia quæ pendet ab excrecentia obstructionem mentiente.

Excrecentiam ad pylorum memorant *Vesalius*, *Boniventus*, *Fernelius*; ad intestina reni ovillo similem ano rejectam *Chr. VVincel. Collect. Acad. Tom. 3. pag. 274.*

X. GRAVIDITAS, Græcis *Cuesis*; Græc. *Ægræ Gravida*, nostro *gerentes*.

Verus est morbus, isque apud mulieres pœnalis, (docet *Genesis*) ejus lignum præcipuum est abdominis intumescencia in axi hypogastriæ prominens, sensum ascendens, partuque terminanda.

Differt ab hydrometra, 1. quia ultra quantum mensis in graviditate vera datur motus (sæpius in utero contenti, vel sensus molæ per graviditatem huc illuc ineliantis); 2. quia datur resistencia tanquam a partibus solidis in utero contentis; in hydrometra vero nec motus tum toralis, tum partialis, nec firmitas adeß, sed potius fluctuatio tanquam a fluidis in utero congestis.

Principium graviditatis ejusmodi est coitus feminæ cum mare, unde quæ viro non utuntur hydrometræ quidem, minime vero gravidæ esse possunt; verum dantur plures fallaciæ ex parte earum quæ innuptæ graviditatem celare, aut quæ nuptæ eam simulare cupiunt, præter errores involuntarios.

Causa graviditatis est evolutio fœtus, vel placente in utero, aut tuba alterutra, præmissa fecundatione, si fœtus exolvatur, graviditas vera est tum uterina, tum tubalis; si vero suffocetur ab evolutione placente, datus molaris,

R 2 non

non potest autem distendi uterus prius in pelvi contentus, & crescere ad hoc ut contineat forum novissimum cum liquore amnii & placenta, quæ omnia duodecim circiter libras adæquant, quin sensim sursum ulera umbilicalem regionem super in abdominis axi prominens ascendat, quin ligamenta distendantur, distensusque uterus vicinas partes premat; unde dyspnœa, constipatio, difficilis incessus, gravitas seu lassitudo totius corporis; præterea suppressa majori sanguinis mensura copia, quam quæ primis saltem menibus ad nutrimentum ex sui scetus impendi potest, superfluo sanguine onerantur viscera acutiori sensu prædita, potissimum stomachus; unde nausea, malacia, aliæque gravidarum incommoda, initio graviditatis magis conspicua.

1. *Graviditas vera* Mauriceau libro 1. cap. 6.

Ea est quæ a fœtu in utero evoluto producitur, quæ cum mulari eadem per tres, vel quatuor primos menses habet symptomata, nec distingui potest a tubali, nisi quod tumor in axi hypogastrii constantem observatur; in tubali vero constantem ad alterutrum latum. Cognoscitur 2. ex eo quod post coitum catamenia solito tempore prius exurgunt jam delicata, nisi valde plethorica sit mulier; 3. quod phænomena eadem ex parte appetituum superveniant, quæ in progressu graviditatis, etque diversa in diversis mulieribus; alia enim vinum, alia tabacum, alia panem, halesces, &c. quibus delectabatur, jam fastidis, aut quæ oderat jam sectatur. 3. Intumescit hypogastrium, colore tamen faciei florido permanente, unde a chlorosi, & ascite incipiente cum opilatione discernatur. 4. Insuper quartum & quintum mensem distincte percipit motum parvalem fœtus qui initio, velut exiguus nuscitillabaz, deinde alterutram corporis partem huc, vel illuc pro lubitu movet, icalcitat, extenditur, mox in alterum latus seprovolvitur; qui motus vegetiores quovis mense evadunt, & sæpe matri dolorem creant, quique palpo explorant videntur fieri a capite fœtus, vel a clunibus, vel a pedibus, hanc modo, vel illam uteri regionem prementibus, qui certe motus parvales in mola deficient. 5. Ultra quartum mensem mammae turgescunt lacte quidem seroso, sed tamen albescente, & multo copiosior quam in feminis dudum vacuis, viduivæ. 6. Si digito in vaginam immisso tangatur orificium uteri, dum altera manu jejuna mulier exploratur hypogastrium, & in partes oppositas alternis vicibus premitur, ut docet *Puzos*, graviditas inter secundum & tertium mensem detegi poterit; quippe eo tempore fundus uteri gravidi duobus, tribusve transversus digitis ossa pubis supereminet, & pressio hujus fundi transfertur ad digitum uteri orificio admotum; illa tamen exploratio in mulieribus ventricosis non nisi inter tertium & quartum mensem profutura est; addit signis *Mauriceau* orificii uteri clausuram, cervicis ejus breviteram & crassiem majorem, ejus etiam versus posteriora inclinationem,

de quorum signorum veritate merito dubitabat *Blar. Puzos*.

Cura exigit ut initio & in hoc graviditate mutantes abortum caveant a lapsu, istu, pathematibus, saltibus, similibusque nimis commotibus; quoad victum insalubris modo jucundior & expectatus cibis nimis nocet gravidis quam non-gravidis; plures gravidæ indigent phlebotomia his rursus in decursu graviditatis repetita, & per illam a pluris incommodis liberantur; phlebotomia vero a brachio tantum, non e pede instituenda est juxta usum; caveant ab arctioribus crocoticis, thoracibusque abdomen comprimentibus, nec non ab occasionibus pathematum quibus magis perculiuntur quam non gravidæ ultimo mense butyro vias fœtus inungant.

Quomodo vero liberantur per partum, vide in dyslocia.

2. *Graviditas molaris*, Mauriceau lib. I. cap. 9. pag. 104. & lib. II. cap. 31. Synopsis Ephemerid. Germaniz. L.

Signa mola vide in *Dyslocia a mola*.

Concreta carnosa in utero sunt vel falsa germina, vel ova immatura, vel mule, vel fungi. *Falsa germina* sunt placenta inflata, undique clausa, in pyrisformem molem efficta, intra quam vel aqua tantum later, vel nullus contineatur embryovirus, sed tantum embryonis rudimentum exiguum & informe. *Ovum* vel germen verum est folliculus filamentosus, pellucidus, albumine pellucido plenus, in quo latet embryo mensis ætatem nondum adeptus, vermiculo similis. *Mola* demum est moles carnosa vel hydatidosa ex solius placente incremento per multos menses facta, prodicens embryone destituta.

Quoniam intra mensis spatium tantum crescit falsum germen, nullo signo illud, dum latet in utero, dignosci potest. Abortus vero ejus, qui effluxio proprie dicitur, illud in conspectum prodit; verum mola idea evadit cum diutius, imo ultra novem menses, in utero resistat, & fœtus instat excrescit; adeoque graviditatem veram mentitus usquequo, cum ad quartum mensem & semissem devenit est & ultra, nullus motus parvialis in utero persistit, sed tantum motus totius in partem declivior pro diversa matris positura diversus.

Adsunt scilicet initio graviditatis molaris anorexia, malacia, vomitus, suppressio catameniorum, æsthenia, ut in vera graviditate, sed illa non ita diu durat, & identidem menorrhagia serosa exigua & irregularis accedit, lumbago obscura supervenit, quin ulli principio procatartico nec menorrhagia, nec lumbago tribui possint. Exploratio etiam docet utrum non ita eninere intra abdomen, ac in vera graviditate sub eodem termino eninere solet supra pubem; si intra secundum, tertiumque graviditatis mensem subito superveniat gravis menorrhagia, cum lumbagine parturitionis prodromo, grunorum effluxu, & gravitate podicis, signum est certius falsi germinis, maxime si exploratur uteri orificium possit digitum admittere, & digitus percipiat

in utero corpus molle quoddam extorsum tendens, fere certum est instare falſi germinis ex-
cluſionem. Vidi nuper poſt aliquot dies a me
norſiſſia gravi dolore partus ſuccedere, ſeda-
to aut cellante fere ſanguinis effluſu & abortum
felicitate terminari; quo facto vires ſenſim re-
cuperabant; quibus cautelis debeat in hiſce ca-
ſibus ſollicitari partus, docet *Puzos de falſo
germine, cap. 19.*

Molam viginti libras pendentem, aſſumpto
ſpiritu ſalis ammoniaci ſalito Zvelteri, & ca-
thartico expulſit *Khenius Collect. Acad. Hem. 3.
pag. 368.* Huic ſcopo frequentes clyſteres pro-
ſunt, ſi mola ut extra uterum, ut ea quam re-
ſcripſit *Fronmann. ibid. pag. 50.* & ad phyſico-
niam pertinet, qualis in virginibus etiam repe-
ritur.

Molas quinq; imo ſeptemdecim annorum ob-
ſervavit *Academia Germanica Socii.* Vide *Synop-
ſim Epemerii.* Molæ hydatidoſæ, vecicariæ, ſeu
velicales, ſebaceæ ſex pingues, ſanguineæ, & car-
næ obſervantur. Omnes vero vaſis, vel lymphati-
cis, vel ſanguineis placenta infarciſtis, dilatatis
fabrefactæ ſunt.

3. *Graviditas perennis, Collect. Acad. Tom. 3.
pag. 697. L.*

Uxor miligis grvida termino conſueſto advo-
cavit obſetricem, ſed parere non potuit: deci-
mo graviditatis menſe ſæpius erat jam mortuus,
cum lochia uberius fluxere, & lac per duos
menſes & mammae promanavit; ſupervenit dein
ſcabies maligna; tunc moles abdominis decrevit;
interea ſæpius ſceletum in utero percipiebatur,
carnes aſumptæ judicabantur. Hæc judicabat poſt
ſex graviditatis annos *Georg. Hannau Med. Danus.*

Monſepii vero uxor Senatoris per multos an-
nos ſterilis, paulo ante mariti obitum concepit,
non menſe conamina partus experta eſt, &
a peritiſſimis in arte obſetricia viris explora-
ta fuit, quorum teſtimonio minime æquivoco,
conſtabat eam ſæpius geſtare novimeſtrem, cu-
jus caput intermedia tantum membrana craſſiori
manibus ſuis tetigiſſe ſe ſideſidigni Chirurgi aſ-
ſeruerunt; demum a menſe in menſem fruſtra ex-
ſpectabatur partus, quievit omnia ſæpius cona-
mina, ipſe ſæpius obiit, & tumor durus in regio-
ne hypogaſtrii ſphæricus per aliquot annos per-
ſiſtit, ea demum mulier Lugduni obiit poſt efflu-
um materiei putris ex utero; in hujus cadave-
re repetitum ſceletum partus ruptum in tuba fal-
lopiana dilatata latitans.

*Seigenthal in Philoſoph. Tranſact. n. 367. anno
1721.* per quadraginta ſex annos geſſit in utero
ſæpius, ſeu potius molam, cujus iconem vide
loco citato.

Rob. Henſon in Philoſoph. Tranſact. regulit gra-
viditatem extrauterinam in qua ſæpius per quin-
que annos in abdomine latuit.

Oſſa ſæpius anno excretorum obſervavit *Bern.
Shlezer.* Fœtum per anum expulſum memorat
D. Nouſe. Vidit Monſepii *Cæſellanus filius Med.
Profeſſor.* Graviditas novem annorum extra ute-
Savvages Noſologia Methodica. Tom. II.

rum contento ſæpius, *Philoſoph. Tranſact. volum. 9
pag. 191. Bromfield.*

4. *Graviditas veſicularis.* Tranſact. Philoſoph.
1718. n. 405. *Mola veſicularis Synopſis Ephem.*
*German. Journ. de Med. Juill. 1738. Nov. 1761.
pag. 438.*

Eſt eſt in qua loco fœtus maſſa hydatidum ge-
neratur; omnium molarum vel falſorum germi-
num frequentiſſima eſt nullis ſignis ante abortum
dignoſcenda. Vide *Hydrometram hydaticam.*

Litteræ obſervavit hanc graviditatem; malla ex-
cluſa poſt decimum menſem novem libras pende-
bat, & ſimilis erat racemis groſſulariæ: acini al-
bi, pellucidi, lineam in diametro obtinebant &
racemoſus erat.

5. *Graviditas a falſa mola. L.*

Eſt ea quæ loco fœtus geſtat tantum placen-
tam, vel a prægreſſo partu reſiduum, vel con-
crementum lymphaticum, polypoſum a crure
effluſo eſſitum, quæ ſubſtantia molis quidem ſo-
lent annumerari, atamen ita ab illis diſcrunt,
ut ſine coitu in utero videtur, virginisve generari
poſſint; cum e contra veræ mola prægreſſum
coitum ſupponant, quandoquidem illæ nihil aliud
ſunt quam germinis involucri ex ovis imaturis
aut ſubventaneis ex ovario in uterum delapſis,
& ſufficienter accreta; de ætæro obſcuriſſima eſt
earum diagnoſis. De his legi meretur Diſſertatio
de generatione molarum Auctore Illuſtriſſi. Co-
mite Buchnero, Acad. Natur. Curioſor. Præſide
digniſſimo.

6. *Graviditas tubalis Aſtrucii de morb. mulier.
Tom. 4. pag. 44. C.*

Eſt ea quæ fit a fœtu intra tubam Fallopi-
am creſcente, cujus exempla numeroſa pro-
ſtant. Vide *Litteræ Mem. deſt Acad. R. deſt Sc. 1702.
Cyrianum, Diſſert. de fœtu ex tuba exeſſo 1700.
Halleri in Boerhaave Tom. V. pag. 329. Santorinum
Obſerv. anat. cap. 11. Bonetus in Sepulchreto, lib.
3. tom. 2.*

Ex tuba denique rupta fœtum in abdominis
cavum delabi non novum eſt: hinc vero mors
fœtus & matris. Vide ſuperius relatam hiſtoriam
ſimilis graviditatis perennis.

7. *Graviditas ovarii Abtah. Vater. Diſſertat.
de graviditate apparente ex tumore ovarii dex-
tri enormi orta per tres annos cum dimidio du-
rante, Vitzembergæ, 1722. C.*

8. *Graviditas ſarcoma. Sarcoma uteri Aſtruc.
lib. 2. cap. 6. art. 2. C.*

Eſt excreſcentia adipoſa uteri cavitati adna-
ta, quæ, cum notabiliter excrevit, gravidita-
tem ſæpe mentitur, id eſt, mulieres viro uten-
tes ſenſim intumefcere hypogaſtrum percipien-
tes, ſine ullo gravi incommodo facile ſe gravi-
das eſſe exiſtimant, & ſi quondam hoc ſarcoma
in lucem edant, videtur corpus uteri modulo
accommodatum, adipoſum, ſolidum; unde a mola,
germine, aliſque corporibus diſſert; initio,
dum totum uterum non replet, catamena libe-
re fluunt; dein vero ſupprimuntur, imo phleg-
matia gravidis familiaris ſupervenit: ſunt tamen
qui-

quibus hoc *scarcoma leucorrhæam* accersit. Vide curam apud Ill. *Astrucium*.

ORDO TERTIUS.

HYDROPE PARTIALES.

Sunt tumores majores, sed non universales, a fluido intra cavum capitis, abdominis, uteri, vel vesicæ contento, unde differunt ab intumescentiis textum cellulare earumdem partium flatu vel fluido quovis distentibus aut partibus solidas infarciuntibus.

Differunt a cylindibus primæ classis ratione gravitatis symptomatum: huc itaque referre non juvat hydroceles, bronchoceles hydromphalos, othoecceles, aneurysmata, varices, lupias, hydrothorax, &c. nec hydrothoracem, hydrocardium, eclampias, apoplexias, &c. quæ a fluido in cavo thoracis, cerebri effuso, sed nullo tumore conficuo, dependent.

Causa tumorum est pressio lateralis fluidi congesti in cavitatibus quarum claustra distenduntur. Principia frequentissima sunt effusum lymphæ per vasa lymphatica in suis nativis emissariis obstructa, si de ascite agatur; flatuum generis aut expansio, sic de tympanite, & sic de cæteris.

XI. HYDROCEPHALUS, *Hydrocephale*.

Est tumor capitis, facie sæpius excepta, mollis aut elasticus a fluidi intra ipsum congestione.

Intumescit caput cum facie, & quandoque residuo corpore, in variola confluyente. Vide *Prædilectum variolosum*: sed hic affectus ad anasarcam tertiam attinet. Intumescit etiam mane facies œdematose in cæteris anasaræ speciebus, nec non emphysematose tumet quandoque in pneumatosi, quem affectum physiocephali nomine quidam insigniverunt; sed ab his discrepat hydrocephalus, quod in cavitate notabili fluida congesta supponat.

Morbis hic vel est congenitus, vel junioribus tantum supervenit, cum nullo exemplo constat adultis accidisse, pars tota capillata capitis fississime intumescit; raro accidit ut tumor vesiculosus aquam ex futurarum hiantium intercapidine mutans, & capiti superimpolitus morbum hunc constituat. Vide *Magneti Bibliothec. Med. pag. 872. de Hydrocephalo*.

1. *Hydrocephalus interior. Hydrocephale des ventricules. C.*

Ea est species in qua serum intra cranii thecam latitat, eamque ita distendit, ut futuræ hiant.

Illius ferè origo in sinibus ipsis cerebri, sæpius a glandulis plexus reticularis vasorum, & vel tantum ipsos sinus cerebri ita distendi, ut plures hujus libræ in ipsis contineantur, vel inter meninges ipsas & cerebrum, meninges & cranium cumulantur. Si caput minime intumescat, nullus proprie dictus est hydrocephalus, licet

hydrope sinum cerebri hoc nomine abusive significetur, sed adest alterum genus morbi soporosi, spæmodici; vesani, &c.

Cognoscitur ea species ex hiatu futurarum qui digito præmenti innascitur.

Ægri sunt sæpius somnolenti, stupidi, tardi, cæci; & non pauci spina bihda simul laborant, & sive congenitus sit morbus, sive primæ vitæ annis supervenerit, ea species omnino insanabilis est; qui simul laborant spina bihda, ea secta citius moriuntur, incisus enim ope chirurgicæ tegumentis, mors acceleratur; interca apud jumenta, ut boves, aquarum emissionem ope trepani factam vulgo institui apud Helvetos, docet *VVæferus*.

Sunt hydrocephalici quorum caput portento se tumet, ita ut residuo corpori præponderet, & simul est fere totum pellucidum & molle, quæ hic nondum vidi; illi ad annum unum aut alterum vitæ prorogasse visi sunt, lac nutriticis apprime sugentes, de cætero somnolenti, vix sentientes, stupidi.

2. *Hydrocephalus exterior. Hydrocephale des téguments. C.*

Est illa species in qua omnia capitis integumenta turgida sunt, alba, mollia, œdematosa, non invicem hiantibus futuris; textu vero celluloso aquis admodum distenso. Illa distensio fit successiva, eadem ætate quo in priori specie, æque vel est simplex morbus, quod rarissime accidit, & tunc functiones cerebri vigent; vel simul adest vitium simile in cerebri sinibus, & tunc ægri surdi, cæci, vel stupidi, somnolentive sunt, imo ut plurimum tumor conspicuus secundarius est, & ab hydrope sinuum cerebri dependet.

Cum simplex est illa species curationem admittit quandoque; & in hoc casu hydragoga cathartica diuretica tenellæ huic ætati accommodata usurpantur. His frustra institutis ad vesicatoria, imo scarificationes, præmissis tonicis, resolventibusque deveniendum est.

XII. PHYSOCEPHALUS.

Est tumor totius capitis emphysematosus seu tensus, elasticus, sub digito crepitans.

Hujus vero unica datur species a pneumatosi distincta, eaque est a Græco *hysæ*, inflo, & *cephale*, caput.

1. *Physocephalus artificialis. Artificialis hydrocephalus Mangeti Bibliothec. Med. Pl.*

Mendicus Parisius visus anno 1593, ut pro monstruo suum natum lactentem ostenderet, & inde quæstum sibi faceret, cuso foraminulo in ejus vertice intra cutem & musculos ope tubuli sensim quotidie aerem iussuflavit, & intra menses aliquot, repetita operatione, monstrum in molem nati sui caput extendit, æque sic per Galliam de oppido in oppidum visendum exhibuit. Sceleratum hunc partem Magistratus Parisiensis morte mulcavit. Pneumatocelem

eclem artificiosam a unendico in similem finem factam narrat *PARAS.*

XIII. HYDRORACHITIS, ab *odor* aqua, & *rachis* spina; *Spina bifida* Ruyschil; *Spina* Linzxi Gen. Morb. *Lupa species* 1^a. Editionis.

Est morbus cujus præcipuum symptoma est tumor cysticus sero turgidus ex hiatu vertebrarum lumbarium in recens natis protruberans cum anæsthesia.

Propter hiatum vertebrarum lumbarium dicitur *spina bifida* ab Arabibus; hic autem est velut hernia hydrocelica perioleæ medullam cinnentis, quæ dilatatio fit a pondere columnæ fluidi seroli, quod ex quarto cerebri ventriculo trans medullam spinalem ad usque caudam equinam Anatomicis dictam pertingit: ibi vero robustius factum illud perioleum resistit anteriori suæ dilatationi, unde fit ut citra hunc obicem ille veditus aqueus vertebrae divellat & trans hunc hiatum tumor extorrum effundatur: ea ratione morbus dictus est ab *Illustr. Morgagni* hydrorachitis, quasi hydrope spinæ medullaris.

Tam grav's est ille morbus ut recens natos serus oculive e medio tollat ut plurimum: hoc affecti anæsthesia laborant, quasi somnolenti, nil fere sentiunt, nec moventur, nisi a nutrice percussis ad lac sugendum sollicitentur. Quoties vero ignari Chirurgi hunc tumorem aperiant, toties infantes illico pereunt. Quinque vel sexies Monspeli hunc morbum vidimus; tumor autem erat mollis, castaneæ magnitudinis ac figura, ut plurimum subfusus, indolens, pressione recedens, atque canalem qui ex hoc ad cerebrum pertingit non solum statu demonstrabat *Classif. Doct. Tendon*, verum erecto corpore aqua ex cerebro ad hunc saccum evidenter delabebatur.

XIV. ASCITES, ab *askos* uter; *Pachus* 4^{um} Hippocratis p. 559. *Askites* Tralliani Lib. 1. *Hydrops abdominis*; *Ascite*; *Hydropis ascite*; *Ægri Hydropiques*, *Ascitiques*.

Character. Gravis & fluctuosa abdominis intumescencia.

Si manu latus abdominis prematur, & altera latus oppositum percutitur, tunc persentitur repercutio seu antitypia quam vulgo *fluctuationes* nuncupamus; hoc signo ascites distinguitur a phlyctonia. Gravitatis sensu de quo ægri conquerentur, & defectu elasticitatis ac soni ex percussione ediet, distinguitur a tympanie. Abdominis totius sphaeroides tumore non solum hypogastrii prominentia circumscripta, qualis est in graviditate, saltem initio morbi, distinguitur ab hydromora & graviditate: alit hoc signum fallit in ascite intereunte, aliisque non abdominalibus.

Serosus voco eos qui ab humore lymphatico

sunt: *Non serosus* qui a cruore, putre, chylo, urina, &c. *Abdominales* voce eos quorum humor fluitat in cavo eodem, ac viscera abdominis; *non abdominales* vero, si humor coarcescat in alio quocumque cavo & intra cutem, musculos, laminas peritonæi, ovarium, uterum, &c. portento dilatarum, hinc quatuor ascitum differentiatione vix ulla sunt, & Medicis restant indaganda.

1. Serosi abdominales.

Horum sunt permultæ varietates, de quibus in genere quomodo titulo ascitis vulgarioris, dein eas sigillatim examinabimus.

1. *Ascites vulgaris*. C.

Ascitis character est gravis & fluctuosa abdominis intumescencia, ut plurimum cum polydipsia, urina pauca lixiviali.

Incipit ab urinæ paucitate, colore intensius flavo, rubescente, lateratio, pedum tumore molli, pallido, qui vespere crescit, mane diffunditur in faciem, palpebras potissimum, manumque alterutram, in quam æger nocte recubuit; his assidua accedit, abdomen tenditur, tumore non solum hypogastrii, ut in graviditate, sed totius abdominis uniformi; ægro resupino, si altera manu ut sinistra prematur latus abdominis, dum dextra latus alterum ex adverso percutitur, fluctus seu impetus aquarum persentitur, clarior vel obscurior, prout aquæ liberius vel difficilior voluntur in abdomine; obstructis alicubi in abdomine, ut in hepate, liene, ovario, vasis lymphaticis exterioribus, lymphæ a retro urgente cruore pellitur, unde vasa sua distendit, vel rumpit, vel vicina pulgula diducit, unde stillatim in cavum abdominis effluit, lymphæ inquam non serum perspirabile; fluidum enim paracentesi extractum ad ignem concrevit, ut albumen ovi; sensum itaque repletur abdomen hoc fluido quod premic quoquo versus æqualiter sub eadem altitudine, si sola gravitate premat; unde stanteascitis hypogastrium magis tenditur epigastrio.

Verum si turgidum sit abdomen collecto fluido, & ejus tegumenta semel distensa fuerint, tunc pressio aquarum respondet tensioni claustrorum abdominis & quoquo versus ea ratione æqualis est, unde diaphragma sursum in fornem attollitur; hinc respiratio difficilis, maxime jacente ægro, hinc conatus respirandum, conatus ad molem corporis auctam movendam, quæ major est viribus assuetis, unde lassitudo; lymphæ depauperatus, cruor non refarcit jacturas parrium, hinc macies in dies crescens, potentia moris cordis decrevit, hinc pulsus minuitur, & pari pulsus frequens evadit; cruor non satis elaboratur, unde lymphæ cruda prædominatur, quæ gravitati potius quam viribus cordis trivis obsequitur, unde juxta textum celulosum cutis deorsum semper ad partes inferiores & declives delabitur, hinc pedum, cru-

rumque oedema vespertinum; lumborum, palpebrarum, manuum oedema matutinum; aut progrediente morbo ager vix prodest horizontaliter jacere, ob respirandi difficultatem, unde erecto truncus jacet; sero superfluo imbibit partes laxantur, hinc & cerebrum, unde somnus gravis, forte & securitas animi circa eventum morbi, hinc nullus metus, summa confidentia de recuperanda sanitate; pressis pulmonibus & laxatis fupervenerit tussis sicca, quæ sputum cruentum paucum deinde excitat, effusa lymphæ in seroto & præputio hæc partes laxas poriose diducit; alvus sicca est, & difficillime solvitur, languente intestinorum sero imbibitorum sensu & motu peristaltico; facies pallet, sordet, corpus supæne sceletum representat, abdomen quandoque ulcerosum exstillet, unde æger sollevatur; quandoque exulceratis & fluentibus tibiis detumescit, hinc natura monstrante viam, Medici paracentesim necessariam esse intellexerunt.

Si sanguis misceatur ascitico, thrombus ruber est exiguus respectu feri circumfusi; ergo serum prædominatur, quod laxitatem solidorum, fluidorumque cruditatem indicat. Si cadavera asciticorum secentur, viscera plurima nunc hæc nunc illa obstructa, indurata, vel etiam remollita, semina putrida, callosa, retorrida, granulosa, suppurata, assumpta, adæqua respuuntur, & explisime hepar, dein lien, mesenterium, pancreas, uterus, rarius renes, epiploium, pulmones, cor. Si cutis pedum secetur, ea vix hiat quod atoniam summam significat. Herpetes, exulcerationes, lisis, hamorum stagnantium accrescens simul indicant, unde gangræna vulneribus horum sæpe supervenit.

Ex dictis patet cur plurimi ascitici omnino insanabiles sunt, maxime inveterato morbo & solidis graviter vitatiis; inveterascente morbo onera in pejus ruunt, fluidis scilicet laxantibus, puerescitibus, congruentis vasa laxantur, canales obstruantur, vires vitales absumuntur, unde morbus initio sanabilis, dein curæ nulli cedit. Prognosis pejorem reddit ignorantia principiorum hujus morbi in dato ægro; desunt enim signa quibus diversa hæc viscera & humorum vitia primaria cognoscantur, unde methodum curandi genericam tantum sequimur, quæ causam sæpe non attingit; in praxi ad sequentes ascitis varietates attendendum est.

1. *Ascites ab opilatione. Hydrops ab obstructione viscerum.*

In recenti sunt 1. pedum oedema; 2. urina pauca rubra; 3. sitis in dies crescens; 4. abdominis intumescencia, gravis, flexuosa.

In vetusto 1. febricula; 2. anorexia, 3. macies; 4. dyspnœa; 5. tussis sicca; 6. ante mortem hæmoptysis parvissima; 7. erisypelas abdominis ichoreum fundens; 8. decubitus horizontalis suffocans.

Desiderantur in recente 1. obstructionum referre; 2. aquarumeductio per paracentesim; 3. urinx copiosus proventus; 4. diarrhoea fetosa; 5. abstinentia a potu.

Obstructiones referant 1. succi expressi ex herbis anaris, ut cichorio, silymbrio aquatico, apio, addito rheo & limatura ferri; 2. apozemata ex radicibus petroselinæ, asparagi, fenniculi, rusci, ononidis, herbis diureticis, millepedibus, rheo.

Urinæ movent vinum Rhenanum, Mosellanum, claretum cum rheo, ferri limatura, abinthio, salibus maris, bolus ex terebinthina, ipsius spiritus, levissima cantharidum infusio cum vino Campano facta, maxime actum scilicet; diarrhoeam ferream procreant succus ieros, radicibus ebulli, syrupus de rhamno, jalappa, aqua vitæ Germanica, remedium Medicæ Arabis, seu scammonii in succo limonis correctum, guta gummi, &c.

In inveterato ascite, sola diuretica tolerari possunt; cathartica hydragoga vires nimis petulant. Exus emplastræ resolventia abdomini admodum laudantur; suadentur; etiam a Tralliano & ab Hecqueto incisiones cutis in malleolis ad aquas stillatim educandas. Hoc natura quandoque itec sibi evadit; imo in cute abdominis phlyctenæ ruptæ aquas viam præbent, ut vidi; verum sive iponte, sive arte educantur aut non educantur, aquæ, sphacelus ibi timendus; ex ulcere putri, veninosis tibiis, videmus aquas effluxisse, & ægrum convalescere; sed in cachecticis annosis, obstructisque vix illa salus speranda est. Vinum medicatum hic conveniens, fit infundendo fennæ fol. polydiodici radicem, ana, unc. 12. rhei, jalappæ, ana, drachm. 11. abinthii, manip. 1. macis, cinnamomi, ana, semi-drachm. in vini albi lib. 111. colaturæ unciæ quatuor mane sumantur.

Ex bulbis Colchici autumnalis in aceto maceratis & melle paratur oxymel Colchicum, quod ad drachmam sumptum urinæ felicissime movet in ascite, hydrothorace; aliisque morbis hujusce classis. Adhibetur etiam pulvis cantharidum intus, incipiendo a grani triente cum quadruplo camphoræ triturando intima mixto, & augendo successive utriusque dosim, utiquequo, vel urinæ fluant uberius, vel gravia dysuria oborta finem huic medicamini imponat.

3. *Ascites ab hepate. Ab hepate obstructo, indurato, scirrhus, tuberosa, calculosa, flavo, corrupto, pallido, œnormi &c.* Boneti Sepulchret. obl. 4. 5. 6. C.

Hepatis superficies numerosis scæzet vasibus lymphaticis ad cisternam lumbarem lympham devehentibus; obstructo hoc viscere, rupto altero lymphatico vase, lymphæ ab abdomine abuta sensim colligitur; opæque pretium est itaque ut libertas circulationis in hoc viscere restitua- tur; frustra enim aquæ per paracentesim & cathartica educerentur, cum novus ab hepate proventus semper expectandus est, adeoque in hoc casu ab initio remedia auriginis aperientia & martialia, radices aperientes debent usurpari forma apozematum, jusculorum, opistarum quæ diu debent usurari.

Si bilis austera, viscida, retorrida, ob labor

rec.

res; æstivos sudores, calorem summum, hepatis obstruat, tunc juvant serum lactis, aquæ minerales Vallenſes, Bellilucanæ, caute tamen, jussula diluentia, quæ omnia inveterato asciti nocuerent, causam primordiale morbi tollunt, ut expetris sum; sed non expectandum donec aquæ efflux sint.

4. *Ascites a liene.* C.

A liene tumido, adhaesit, indurato, pallido, molliori, corrupto, lapidoso, vel cartilagineo obducto, crasso, cruore eurgido, apollenatoſo, &c. *Boneri Sepulchret.* obf. 6. 7.

Hæc vitia sensibilia sunt sæpius sequelæ quam principia ascitis; aut designant sæpius latere in hoc viscere vitium primordiale, scilicet obstructionem quæ anſam dedit ejuſdem lymphatici vaſis ruptioni, aut diapedeſi, vel anastomosi, quod conſectamus præcipue ex hujus regionis tumore, renitentia; ex prægreſſis quartanis & tertianis febribus maturius ſuppreſſis, ſine ſufficienti aperientium uſu, deinceps revertentibus; ex ægri colore fulco, habitu macilentio, animo melancholico; hoc facit etiam hæmorrhoidis affluæ ſuppreſſio, fontanellæ, ulceris, catameniorum reſpreſſio.

Dum levis eſt vaſorum ſplenis, vel hepatis inſarctus a ſanguine ſpiſſo, crasso, vel lymphæ eruda, ſcæculenta, eurgitur ſeſeiter, aut prævertitur ascites juſculis, peſanis, apozematis ex rheo, ſetri limaturæ, cinnamomo, radicibus aſparagi, bruſci, ulmi, capparidis, cnulæ, ſolis abſinthii, chelidoſii, amoraſciæ, eupatorii, agrimonæ, cereſolii, cichorii, ſylimbri aquatici.

5. *Ascites ſcrophuloſus. A meſenterio ſtrummoſo.* C.

Hæc ſpecies infantibus crasso cibo utentibus, ab impura venere orſis, non ſatis exercitatis, eſt familiaris; creſcit a liberaliori ſanguinis miſſione in morbis acutis eos inſeſtantibus, ſuppreſſa diarrhœa ſeroſa intenditur, cum hydrothorace & anafarca complicatur, & exigit levia attenuantia ſcrophuloſi adverſa, tenuiſſimum antimonii & martis pulverem, juſcula aperientia cum calendulæ, rutæ, xanthi, ſilipendulæ, bellidis, elatinæ, ſcrophulariæ, ſolii aut radicibus incoctis; huc opiatæ ex rheo, martis tinctura, millepedibus, ammoniacæ gummi.

6. *Ascites ab ovarii* Mead Monita de hydrope, p. 127. C.

In quamplurimis mulieribus ascitis origo morbi eſt in ovarii obſtructis, hyſteridofis, quorum lymphatica rupta lympham fundunt, quod evenit præſertim illis quarum catamenia deſecere, viduiſ, ſterilibuſque, aut iis quæ morboſo tubæ, ovarii, uterive paſſæ ſunt.

Flatus ex utero per tubas in abdomen fertur facile, ut expertus ſum in cadaveribus humanis; mirum eſt quod hæc via aquæ aſciticarum ex abdomine foras emitti nequeunt quodam artiſicio.

Illæ ſpecies rareſſime cedit remedii; ex Mead incipit a dolore & tumore inguinis alteruterius; mulieribus eſt familiaris; ſanatur quandoque longo uſu decocti ſummitatum genuiſtæ viridum, &

femium ſinapi, cochleari uno bis in die vorato.

7. *Ascites a ſanguifluxu* Juncker, de aſcite & Ab inanitione & colligatione Schenckii obf. 1. 5. *Idropſia minaciante* Delſſa conf. 37. tom. 1.

A repetitis phlebotomiis, catameniiſ, aut hæmorrhoidibus inmodicis, ab hæmorrhagiis profuſis, non ſolum ſuccedit cachecticus & ordonatus totius corporis habitus, verum etiam aſcites verus cum urina pauca, lixiviali, ſiti inenſa, aliſque ſymptomatis, & magna debilitate.

Decreſcente ſcilicet vi truſiva ſanguinis per arteriolas ob cordis debilitatem, quæ patet ex pulſu exili & frequenti, arteriæ majores & minores proprio elatere complanantur, unde ſanguis illas diſſiciliſ permeans premit, & ſubit oſcula lymphaticorum in majori ratione quam in ſantate; lymphæ etiam illa debilius elaboratæ craſſior obſtruit vaſa ſua, hinc non mirum ſi aliunde eſſat in cavum abdominis, ubique aut in textu celluloso colligatur. In hoc autem caſu aliquoties expertus ſum, *Tralliani* ſuaſu, lactem dietam eſſe præſtantiſſimum auxilium, quo non ſolum ægri vires reparantur, hæmorrhagiæ prævertuntur, verum etiam aſcites radicibus ſanatur; an vero aſcites ille procedat a principio prius aſſignato, an ab uberi adſtingentium & Kinkinæ prius adhibitorum uſu; non aſum deſidere; illorum adſtingentium uſum neccellarium reddit ſanguifluxus uber & perinax cum febricula ſæpius quotidiaua eum concomitante. Quando hæmorrhagia eſt naſalis, uterina, vel alvina, ſimilem aſcitem longis diarrhœis ſeroſis, diuſis, vel diabeti etiam ſupervenerit obſervavi; aut in his caſibus magna adhibetur adſtingentium copia.

Curam aſcitis diureticis & lacticiis perfectam vide apud *Villifium*, 5. 3. p. 142.

Hic morbus familiaris eſt mulieribus: menorrhagiam vel a partu, vel a quavis origine copioſam paſſis; incipit a pallore pedum & tibiærum edematæ, inde aqua turgit abdomen, quæ pulſata fluctuat; ſitis, urina rubra pauca, aliæque ſymptomata accedunt; multi, ait *Hippocrates VI. Epidem.* ex hæmorrhagiis nimis in hydrope incidunt.

Bis morbum vidi in quadragenaria menorrhagiam maximam ter, vel quater in anno experiri ſolita cum naulea, anorexia, ob uſum falſorum nimium; ille vero aſcites in ea bis ſanatus ſuit præmiſſa levi cathariſi pec uſum lactis bis terve de die ad menſem continuatæ, & *Papa* in hoc morbo ſuadet 1. ut ſitis conſtanter toleretur, ſecus 2. paucæ vini albi Avenionis, ejuſque chalybeati per inſuſum ſetri limaturam temperetur; 3. ut per diuretica lenia; minime fortia, urinae fluxus copioſus reſtituantur, in quem finem adhibeantur decocta ex radicibus aſparagi, apii, ſal tamariſci, quod idem eſt ac mirabile Glauberi, t. rebinthinæ, ſallaſtras; 4. a catharticiſ timet ne vires imminuantur; ſolum oleum amygdalarum & clyſmata concedit, 5. ad roborandum corpus juſcula ex columbis, guttulas ciliariiſ proprietatis

tis in iusculo, usum thez, infusum lapidis medicamentosi, &c. suadet.

8. *Asciteis ab exanthematibus*; *Ab scabie repulsa* D. Deidier, Profess. Monspel. Obs. *Ab herpetibus, maculis, &c. repulsi* Charleton; *Ab rubecula repulsa mole curata*. Vide *Anastream*. C.

Bis in Nosocomio Monspeliensi accidit a suppreffa scabie ascitem supervenisse, qui frustra tentatis ceteris auxiliis, sanatus est assumpta scabiosis tunica, unde repulsi sunt scabies, & ascites evanuit; vix unquam in ascite succedunt sudorifica, in hac specie tamen indicata videntur.

9. *Asciteis arthriticis* Musgrave de arthritide, cap. VII. hist. 3. C.

Hanc speciem ascitis feliciter curatam vide sis in Austore.

10. *Asciteis artificialis* Louveri Experim.

Est ille qui canibus inducitur ligata vena quadam majori ut cava; tunc enim sanguine in venis congesto alteri retro sequenti opponitur resistencia, qua fit ut fortius premat oscula omnium arteriarum huc tendentium, ergo ut oscula lymphaticorum ex his oriundorum diducantur, & majorem sui liquidi copiam fundant; quod liquidum antea forma tantum halitus in cava abdominis, pectorisque transudabat, jam forma sensibili colligitur.

11. *Asciteis scorbuticus* Boerhaave Consult. 16. Charletoni, VVillisi de scorbutico.

Post auriginem, melasiderum, a cacochimia biliosa ortum, & scorbuti signa, ut maculas pedum luteas, punctatas; maculas crurum & dorsiflavidas, laticas, gingivarum faetorem, cruentationem, superveniunt crurum & pedum oedemata, urinae brunnea, atro flavæ, paucissimæ, lateretice, sitis urgens, macies artuum, abdominis tensio, tumor gravis, fluctuans, facies lurida; his comites se præbent hepaticæ scorbutica, tussis hydropum sicca, dein sanguinea mortis prænuncia, dyspnœa, &c.

Curatio Boerhaavina. In his circumstantiis sumat æger omni bithorio per dies quinque pilulas, singulas gr. iv. sic paratas.

Recipe bulbi ari recenti & rhei ana, drach. l.; ossa fossida, creta, sorbentina, & balsami copai. ana, gr. xv.; saponis Veneti, unciam semis; misce, fiant pilule; superbibat vena. l. de liquore sequente. Recipe aqua stillatitia baccarum juniperi, coelestina; ana, uncias sex. Salis polybreffii, drach. ij.; tartari vitriolati, drach. l.; rob. baccarum juniperi, unc. iv., spiritus rectificati baccarum juniperi, unc. unam & semisse; cinnam. myrrha, unc. l.; misce. Hac per menses decursus fiant; interim panis calidis facies mane & vespere totum abdomen fortiter confrices; addatur exercitatio pedestris, vel equestris assidua pro viribus; vitæ ex lactuca, spinachia, paucoquo vino, aut cerevisia. hac inuenio morbo suadentur, jam factis nulla spes superest. Hac Boerhaave.

Franciscanus Religiosus, quem hoc ascite laborantem vidi, sumptis vulgaribus remediis, post sex circiter menses, cum videretur apozemat

antiscorbuticis, interpositisque catharticis, contra meam & omnium expectationem, superveniente urinae profuvio, liberatus est ab ascite & scorbuto, & convaleuit; illa itaque species ascitis minus multo periculosa censenda est quam cæteræ.

Ea species a sanguis dissolutione dependet, ejusque acrimonia, qua fit ut defectu nativæ viscositatis in sanguine; pars serosa ab eo facile secedat, ex valis lymphaticis exhalantibus uberius in abdomen exillit, aut in carni interapedinem dimanans topum earum deterat, simulque mora acrior reddita putredinem contrahat, viscera corruptat; hæc vero species etiam ascitem inducere potest ob hæmorrhagias immopias quibus scorbutici sepe exhauriuntur; stipatur vero gingivarum tumore livido, sanguiluxu ex ore, dentium nigredine, oris faetore, tibiæ & crurum lagis, livescitibusque maculis, simulque distinctis, nigris, flavis, luteisque punctulicis.

Iuscula ex carne vitulina, rheo, lapathi radice, foliis cichorii, pimpinellæ, sanguisorbæ, &c. balneo maris parata, interpositis lenibus catharticis, indicantur; & deinceps diuretica cum roborantibus mixta, quorum ope evacuetur abdomen, atque demum lactis asini usu sanguinis acrimonia temperetur.

12. *Asciteis febrilis*; *Asciteis a colligatione* Sennerii de hydropo ascite. C.

Illam speciem ab initio comitatur, vel immediatæ præcedit febris acuta, continua, vel exacerbans, vel inflammatoria, mox accedit abdominis calor, intumescencia, & mors, ut observavi, minime seta; unde discrepat ab ascite intermittebatibus febribus succedente.

Asciteis ex quartana VVerlhof. obs. de febrib. p. 59. C.

Mulier a biennio quartanæ obnoxia, ab eo fere tempore ascitica sensum evaserat cum mensium obstructione, & dysuria urinae lixiviosæ; crura & femora cum dorso oedemata laborabant, turgebat facies, respiratio anhela, & lassitudo, omnibus remediis resistebat hydrops & quartana; VVerlhofus ter mane ante paroxysmum pomeridianum præscripsit vini emetici unciam unam & semissem, unde mite immittitur est tumor abdominis, sudor erupit post ocellus; præscriptum deinde electuarium ex kinkina, enulæ radice, sale ammoniac, vitriolo maris & rob. juniperi, unde omnia melius se habuerunt; deinde purgata est ægra succo ex iridis vulgaris uncis quatuor in aqua fœniculi maceratis expresso, cum paucis sacchari; quod plurimum arcanum est exitum.

Recipe radicem Iridis vulgaris recentis subtiliter rasatam, uncias quatuor; purum macerentur in aqua fœniculi uncis duabus; expresso succo addatur saccharum, & aqua cinnamomi paucillum; fiat potio.

Kinkinam in ascitis illa specie laudant Francus, Restaurant, Boeler la Hermannus, Brunnerus, Alex. Camerarius.

13. *Ascites calides*. Vide Sponii aphorismi. 8t.; Mead. Nonii. p. 139

Non infrequenter in praxi occurrit species ascitis, quæ largo potu, sero lactis, sanguinis missione felicitur tollitur, contra vero solitis aliis artibus exacerbatur. Vidimus hydropem curatum viginti venæ sectionibus, qui ab exhibitis hydragogis & diureticis cuiusvis generis magis ac inagis intumescit; in hac liquorem specie calor exsuperans fundit & liquat sanguinem ac fere totum in serum convertit; ac proinde dum diagrydiatis aut salibus diureticis res peragitur, morbus ingravescit, cedit & contra benignioribus & refrigerantibus præditiis.

Asciticus, quem refer Mead, a collisione in hypochondrio dextro per ictum violentum post sex septimanas intumescit, dolor erat gravissimus in abdomine, sitis intensa, urina lividissima pauca, adhibitis diureticis & catharticis, pejus habebat, tumor in dies crescebat, paracentesis recusabatur, demum ad levandos dolores adhibita sunt narcotica; mirum ductum, non solum dolor sedabatur, sed urina fluebat, alvus libera erat, sed cum finita somniferi actione rursus pejus haberet, narcoticum octava quaque hora adhibitum est, & ad famem inde languentem excitandam addita est infuso amara, nec non vomitantur pilule ex strace & kinkina cum cerebinthina, & sic æger contra omnium spem convalescit, Mead monita an *Hydrope* pag. 141.

2. Sero si non abdominales.

14. *Ascites intercus*, Edema Lamotte Chir. T. I. obs. 100. des tumeurs: *Hydropisie du péricolpe*, Transf. Philos. n. 106. a. 3. C.

In ascitea extra peritonæi cavum 54. men-
suras aquæ ichorose invenit J. Scutetus *Miscel. Curat. ann. 4.*

In peritonæi duplicatura P. Barbet *Anatom. fr. par. 4. cap. 2.* & sub cute ipsa *Platerus, lib. 3. par. 3.* & *Juvet Journ. de Med. Oct. 1761. p. 336.* cum signis hujus speciei, scilicet defectu sitis, defectu dyspnœæ, phlegmatæ & urinis minime lateritiis.

Hæc species non confundi debet cum ea in qua viscera omnia abdominalia in glomum collecta & peritonæi lamella involuta locum cedunt aquis effusis & totum abdomen replentibus, licet extra peritonæum contentis, quia verum ascitem abdominalem ita representat hæc posterior, ut non nisi ab anatomico perito post cadaveris aperturam dignosci queat: glomus vero viscera vel sursum vel ad alterutrum latus fertur, cujus exemplum vide apud Mead. *monis. de Hydrope.*

Cognoscitur ex tumore partiali tegumentorum abdominis circumscripto, intra quem fluctuatio percipitur sine signis suppurationis ac effusionis intra cavum abdominis.

Aperto ope acutis triquetris ex hoc hygromate aqua limpida effluxit, & æger intra tres septi-

manas convalescit; evidens est non oedema fuisse, ut putat Lamotte, sed hygroa.

In observatione 101. ejusdem Auctoris aqua limpida ex simili tumore fluctuante emissa est ope incisionis, ubi pus adesse suspicabatur, & hunc morbum *abscessus* nomine indigitat. Sedes eis erat inter peritonæum & musculos abdominis.

15. *Ascites uterinus* Nicolai Decad. obs. Argentorati, 1725. obs. 9.

In cadavere vidua sexagenaria, uterum sphæroidea distentione cartilagineam xipoideam attigisse vidit; ille sexdecim mensuras aquarum instar amurcæ continebat; orificium arcte clausum erat, ubi limus fusci coloris, extus hydratides multæ, intestina versus superiora protusa, ovaria oblitterata, viscera abdominis partim scirrhusa, partim livida; mulier ante duodecim annos lochiorum regimen in puerperio made observaverat, inde malum in dies crevit.

Videatur apud *Verdier anatom.* alterum hujus morbi exemplum.

Vidua sexagenaria, quæ pro ascitica habebatur, tumores abdominis tenuis, non fluctuantes, sine ullo umbilici vestigio, habuit integumenta communia valde extenuata, musculos abdominis oblitteratos, peritonæum callosum jussu crassius; in illo cavo uterus tendineo cartilagineus, sphæroideus, usque ad cartilagineam xipoideam distensus; aquæ amurcose sexdecim mensuras Argentinenfes continebat cum limo fusco in fundo, hydratidibus orificium uteri exacte claudens, tubis & tubæ Fallopii oblitteratæ, intestina versus superiora omnino protusa, hepar rursus scirrhusi, gangrenodei, lien exiguus & lividus, omentum absumptum; *Salicam. Obs. Dec. Obs. 9.*

16. *Ascites stomachi*, Riverii Cent. 4. obs. ab Anton. Jodon, Alciussiodotensi communicata pag. 107.

Hydrops ventriculi est ascites a nonaginta libris feri in stomacho contenti in muliere quadragenaria, quæ pro gravida habebatur.

17. *Ascites intermuscularis*, Thom. Short philosophi. Transact. vol. 8. pag. 150. C.

Aderat triplex ascites; 1. intermuscularis in latere sinistro abdominis; 2. abdominalis in cavo; 3. in ovario omnium maximus.

Cognoscitur ex lateris dextri mollitie; aderat inappetentia, vigilia, sitis exguia, febris lenta, dolor multus, ovarium viginti libras pendebat.

18. *Ascites omentalis*, Munnieks observat.

Illam est species in qua cavum omenti aquis collectis distenditur; verum nullum est in symptomatis nec in cura discrimen quo ab abdominali vulgari dignoscatur.

19. *Ascites ovarii*, Mem. de l'Academ. de Chirurg. tom. 2. pag. 431. & *Ascites sacculus*, vulgo *hydropise exfoliée*. C.

Est species quæ incipit a tumore alterutrius lateris hypogastrii, unde differt ab ascite vulgari seu ab effuso liquido; crescent tumor sensum

etiam abdominis cavitate implet, sed fluctuatio est multo obscurior, & extractus humor est crassior, viscosior multo quam lymphæ ascitis vulgaris, humor lutosus, cruentus, frigidissimus, urinis laetitiis paucis, febre, sæpe vomitu, abdominis dolore, alvo constipata; in cisione facta, injectis deterfivis, fistula succedit, & demum exhausto humore per fistulam convaluit: *Le Drav. obs. 11.*

Aquæ gelatinosæ copiosissimæ intra ovarium & tubam ita distendunt ut totum abdominis cavum occupans prima paracentesi viginti lymphæ pintas suppeditaret. Multi scirrhi in abdomine ab ovario, cætera viscera sana *D. Montau lier.* In abdomine febricitæ inventa duo ovaria scirrhosa intus hydatidibus turgida, alterum quindécim, aliud duodecim librarum. *M. Malaval.* Moles enormis ovarii dextri ascitem in toto abdomine referens continebat ultra quadraginta libras gelatinæ pellucidæ viscosissimæ. *M. de la Porte.*

2. *Ascites sacculus* Abraham Mercklini, Coll. Academ. tom. 3. obs. 283.

Est ascites a sero urinoso contento intra folliculum ex ovario pronatus.

In puella ante sexdecim annos abdomen intumescere cepit sine dolore, sine difficultate progrediendi; nupta per gravidatam peperit, nec tumor evanuit, imo accessit progrediendi difficultas, ischias, anxietas ininterdandis, urinis rite fluentibus, demum dyspnœa, & tumore crescente obiit.

Inventus sacculus membranaceus portentosæ molis, urinoso fere plenus, vilcibus impositus, omento sursum retracto.

3. Non scissi abdominales.

Sunt Sanguinolenti, purulenti, urinosi &c.

20. *Ascites cruentus*; *Ab aqua sanguinolenta*, Ger. Blasi obs. 11.; *Ab aqua nigrescente*, Bonet. Sepulch. obs. XX. §. 5.; *A cruento lotura earum simili*, Holler. de morb. cap. 39. *Aerum vero*, Saxonia lib. 3. cap. 31.; Beniven. cap. 16.; Tulpii cap. 40; Severin. de abscess. pag. 79.; Ant. Pozzisi Collect. Acad. volum. 3. p. 209. C.

Menstrualis trigenaria menstruis tunc deficientibus abdomine intumuit post inguinis dolorem. Inventa est tuba uteri liquido feminali distensa, & moles sanguinis atri octoginta libras pendens inter peritonæum & musculos abdominis præter quadraginta libras feri in cavo abdomini effusi.

31. *Ascites purulentus*, Mead de hydropse; *A pure aquoso, fistulo, abdomen replente*, Saltzman. obs. anat. 31.; Journ. de Med. Avril. 1761. p. 364. *A purulentia saccula*, Boneti Sepulchr. obs. XX. §. 7.; *A pure abdomen distendente*, Plateri Obs. C.

Ulla species sæpe tympanitidem refert, seu flatibus abdomen implet, & insanabilis est omnino.

22. *Ascites urinosus*; *a vesica disrupta* Plateri lib. 3. cap. 3. C.

Et bene poto humique strato, alius venterem. insiliens velicam ex ebrietate distentam eo impetu ruperat, unde urina in abdomen effusa ventre ante mortem intumuerat. Velicæ vulnus post mortem aperto cadavere vidit Platerus.

23. *Ascites chylosus*, Mem. de l'Acad. R. des Sc. 1700. p. 11.

Liquidum paracentesi educum lactis colorem, consistentiam, imo saporem; sed paulo magis fæluginosum, obtinet, spumit bulliendo, ac conquisando, acidis non coagulatur, sed sale tartari; bis in mense ultra 26. libras hujus aquæ chylo tinctæ educabant.

24. *Ascites oleosus* Baglivi Praxis p. 313. C.

In cadavere viri æthetici quadragenarii febre vehementissima, & spirandi difficultate, & demum horridis motibus convulsivis precepti invenit Bagli-vi intestina undequaque veluti innascantia in pinguedine fusa, & oleum olivarum condensatum referente.

4. Nec scissi nec abdominales.

25. *Ascites sanguineo uterinus*.

Mulier ascite laborans ex urbe *Le Puy en Velay* Monspelium appulit auxilium implorans; venter protentose distensus, urinx paululum lixiviosæ, pedes etiam œdematosi, sitis exigua; tentatis frustra confectis remediis paracentesi insitruit; hinc fluunt libræ circiter quatuor cruoris meri; stupent Medici, & Chirurgus eorum jussu cannulam retrahit metu syncope per paulo post summum metum incussit: restituit paululum viribus ea patriam repetit & elapso mense fato succumbit; æperito cadavere cruoris immensa copia intra uterum protentose distensum inventa est a *D. de Frénefre D. Med.*; uterus autem ita expansus erat, ut totius abdominis cavum repleret; hinc pro ascite abdominali lymphatico rarus ille morbus Medicos sciebat ut peritissimus.

26. *Ascites sanguineo-incurus*, C.

Histrio noctu insilit in cœlestiam, unde præceps in vicum plures hexapedas altum ruit ita tamen ut in pedes lapsus sit; dolorem atrocem in abdomine, deinceps tumorem & febrem expertus in nosocomio deferret; post aliquot dies abdomine intumefacto moritur. Secundo cadavere invenimus musculos abdominis a peritonæo separatos per salus violentiam, & spatium intermedium copioso errore repleto: hic itaque morbus acutus est, datur ergo intercus sanguinolentus.

27. *Ascites sanguineo-peritonæus*, C.

Mulier quadragenaria abdomen turgidum sine insigni molestia octo annos circumtulit, omnem culpam in menstrua suppressa conjiciens, demum crescente mole fluctuata; vix cute cadaveris pertrusa amuræ fixidæ copia ad libras XX. medicas profluit; hæc intra musculorum abdominis tunica & peritonæum continet.

nebatur; quod ex venis epigastricis internis periodo lunari, destillaret; illarum venarum extremis aderant tubercula nucis avellanæ similia, ac si papillæ forent etiam scilicet. *N. Bogdanus observ. XI.*

18. *Ascites fluctuans-peritonæus*, Vid. Mead monita pag. 124. Combalusier Pneumatopathologia.

Mulier ex oppido Mauguio tympanitidis symptomata primum patiebatur, his se comites ad junctæ fluctus abdominis, pedum oedema, sitis assidua &c. puncto post mortem abdomine a D. Serres chirurgus clariss. & Regio Anatomiz Demonstratore, situs cum summo impetu exiit, abdomen apertum exhibuit aliquot libras lymphæ effusæ, sed intra eam in quo nulla viscera reperiuntur, omnia autem viscera latebant versus diaphragma in breve spatium congesta & a peritonæi lamella involuta: Secti omni interfuit D. Combalusier D. Med. Montpelienfis.

Praxis.

Curam quod spectat consultat *Synhelm*.

Vix aut raro curatur *Ascites*, quia ejus principia sæpius ignorantur, aut quia chronicis morbis, visceribus jam labe factis, supervenit, nec non quia diversarum specierum historia deficit; qui vero recentes sunt & robore integro præditos ægros afficiunt quandoque sanantur, in genere remediis aperientibus, catharticis, diureticis & dein tonicis. Præstantissima, si recte usurpentur, sunt in ascite vulgariori, si robur perierit, hydragoga iterata vulgaribus catharticis mediocribus maritata vel sola; hæc spectat syrupus de rhanno cathartico, aqua vitæ Germanica, vel succus iridis Germanicæ, vel succus medii corticis sambuci ad unciam; pilulæ hydragogæ D. Helvetii; imo catharticum, arabs dictum, v. g. antimonii tenuissime pulveratæ, grana xii. scammonii gr. xxiv. syrupi de limonibus uncia una; niscæ pro dosi; oxymel scilicet ad draehmas tres vel quatuor; si vires non ferant ad diuretica consulendum est, quale est lixivium & cineribus genitæ, vel sabs stipiticibus in vino albo infusus, ex quo uncia aliquot sero & mane propinantur; mitto loqui de vulgarissimis radicibus aperientibus, asellæ &c. forma juseuli. Profunde etiam succi expressi ex foliis contritis cichorii, sylumbrii aquæque, api, petroselinæ, additis & velut infusus ante succi expressionem asellæ & ferri limatura; hi succi sero & mane ad paucos uncias hauriantur; scrotum sæpe aquis distensum foveatur vino rubro, rosis rubris infusus onuslo, vel aqua secunda caleis, intra quam diluatur cinis spongiæ combustæ: vidi asciticis diæta sicca, id est abstinentia ab omni potu & humido cibo, curatos; paracentesis ad sublevandum ægrum a quarum mole suffocatum prodest. Ascites qui intermittentibus supervenit sæpe curatur, licet præmissa paracentesi, modo viscera non fuerint indurata.

Celebre *Louveri* experimentum quo constat ligata vena cava inferiori ascitem cito in capæ excitari nos mones obstrui non raro vasa minima viscerum, & inde ascitæ principium exurgere, adeoque in chronico morbo aperientibus tonicis ut martialibus, antimonii polini, rho etc. insistendum.

Procellum therapie videtur in curationibus *Professoris Regii illustriss. D. Lænnæ*, nec enim actum agere in me fuscipio.

In ascite seurburico, in eo quem summa acrimonia, summus fervor emittatur, juseula in balneo mariæ parata, serum lactis ehalybeatum & millipedibus onuslum, ino læ ipsum, aquis nondum collectis aut etiam evacuatis ab *Alexandro Trailliano* a *D. Leschillier*, aliisque, ut in ascite colliquo, sudentur; errant certe illi qui una methodo tam diversa species curari volunt; in morbo adeo desperato, qui novas vias ineunt certe laudandi, non vero ut fieri solet, decetendi.

Asciticis aliunde bene constitutos sola a potu abstinentia sanatos dum succo limonum vel pomorum sitim sallebant, memorat *Mead, Osier, &c.*

In ascite qui a tympanite inceperat cum atrocibus doloribus lumborum & umbilici repetitæ phlebotomie & narcotica optime succellerunt, observante *Cl. Porte Journ. de Med. Juill. 1759.*

Methodus *VVarickii* Chirurgi in *Trans. Philos. a Clar. Russell* relatæ & ab *illustr. Hales* probata hæc est: injiciantur aquæ partes vini tubri & aquæ Bristolienfis in abdomen, statim atque per paracentesim aquæ evacuata fuerunt: hæc mixtura iterum cum feri morboi residuo rejecta, aquæ Bristolienfis pars tertia & vini duæ partes in abdomen injiciantur, iterumque illico emittantur; nisi vero quam promptissime fiant illæ injectiones æget animi deliquia patitur, quibus tamen finis vires restituantur.

19. *Ascites purulenta-peritonæus*; observ. X. *Mead* die. pract. Paris. 1743.

Est ea species intercus, seu in qua magna puris copia reperitur inter lamine peritonæi in antica abdominis parte, ita ut intellina peritonæo undique obvoluta in angulo superiore & postico abdominis lateant.

História. Mulier scirrhus abdominis laborans incidit in ascitem; cadavere aperto quadraginta pintæ humoris tulli, coloris coctæ, grumoli, amurcosi repetitæ sunt in duplicatura peritonæi; intestina macilentia in glomum collecta tam parum spatii occupabant ut vix inveniri possent, yecetibus adherentia.

Nulla litis erat; si prius cognita fuisset species, a incisione & decurtivis curati potuisset.

XV. HYDROMETRA; *Hydras uteri* *Sennerti*; *Roderici* a *Castro* c. 19. *Inflatio uteri* *Roderici* a *Castro* cap. 2. *Hydropisie de matrice*.

Est hypogastrii in mulieribus successive crescens tumor, uteri figuram referens, pressioni cedens, flu-

fluantur, ab ischuria & graviditate divestus.

Circa imum ventrem tumor adest amplus, laxus, ex parte duofus, graviditatem aliquatenus mentiens, cum borborygmis intestinorum, in ambulando, gravitate, spirandi difficultate, sæcum graveolentia insolita, catamenicum turba aut suppressione, dolore abdominis, lumborum, hypochondriorum, inguinum, pollutione nocturna, rigore, sæpeque febris, non inflammatoria, phlegmatica, mammarum mollietie.

Hydrometra observatur vel cum vel sine graviditate; fluidum effusum est vel in uteri cavo, apud vacuas, vel inter uteri cavum & membranas sætum involventes, vel inter ambas sætum involventes membranas seu chorium & amnium, vel in ipso cavo id quo fœtus innat, vel in vesiculis uteri hydatidos; an inter uteri ipsius membranas? denunciat observationes.

1. *Hydrometra ascitica*. Vide Astrucii lib. 2. cap. 8. C.

Est ea quæ a sero tantum in uteri cavitate collecto fit, unde differt ab hydrometra hydatidosa & gravidarum. Signa præcellere sæpius; 1. uteri scirrhus vel obstructio, menostasia, vel leucorrhœa vetus; 2. obstructio orificii uteri a muco spisso, vel a tumore adnato post dyslociam, vel ab erethismo sæpius hysterico.

Tumet hypogastrium successive, pro voluminis incremento; pondus, difficultas gradiendi, & truncum ad anteriora inflectendi, crescunt; catamenia supprimuntur; hinc sterilitas, phlegmatica, seu ædema inferiorum accedit; periculo utero ex una parte, antitypia in opposito latere persentitur.

Vix confundi potest hydrometra ascitica cum hysteritide, quæ dolore, febre, ægitudine acuta designatur, nec cum hysteralgia scirrhusa, graviditate molarum, &c. ob firmitatem uteri in istis morbis; a phylometra distinguitur per antitypiam, graviditatem & elasticitatis defectum; ab ascite uterino per hypogastrii solius tumorem; ab hydrometra hydatida, per antitypiam; a graviditate demum, quod in ista post tres vel quatuor menses motus partialis fœtus distinguuntur.

Hydrometra ascitica difficulter sanatur, & ratione principiorum periculosa est, inde enim sæpe hæctica, vel ascites ipse accersitur.

Cursus exigit 1. hydragoga qualia in ascite usurpantur; 2. diuretica & aperientia; 3. remedia uterum aperientia, ut saltum, sternutatorium, vomitionem, balneum, injectiones, pessaria emollientia, suffusis; quibus incassum præmissis stylo mucico orificium uteri est reficiendum, & evacuatis aquis injectiones ex aquis deterfivis aut thermalibus instituendæ.

2. *Hydrometra gravidarum*, Puzos pag. 86. *Hydropis de matrice des femmes grosses*. C.

Moles abdominis est solita major; minus tamen obnoxia est mulier phlegmatica quam in graviditate duplicata; fœtus vel debilis evadit, vel sæpius obijt; nunquam sanus est, &

vegetus, ut in graviditate verè, nec ita crevit, maxime si aqua in cavo amni cum ipsa lateat.

Si aqua inter uterum & chorium sita sit, ea sponte effluit, statim atque uteri os hiat incipit, quem effluxum ter quaterve, intervallo seminiensis inrer utrumque, accidisse vidit Puzos, quin partus ante quartum effluxum successerit.

Frequenter inter chorium & amnium colligitur aqua, in quo casu minor est earum quantitas quam cum in amni cavo fit hydrops, vel cum inter placentam & uterum; tunc autem membrana exterior in partu laceratur sine dolore, deinceps vero etiam interior, quandoque plurimum dierum intervallo; si vero conamina partus langueant, tunc digito laceranda est membrana suspectes, ut partus juvetur.

Cum in amni ipsius cavo colligitur aqua, sæpius fœtus moritur, & diu in utero mortuus remanet, usquequo uteri distensionem maxima, ulterius crescere non potest; exigua sunt in parturitione tormina, unde mollior est membrana, quæ dilatatum uteri orificium obturat; obstitrix in hoc casu parturienti succurrat, opus est. Cognoscitur hæc species ex debili vel nullo fœtus motu, ex mole enormi abdominis; in partu licet orificium uteri multum pateat, caput fœtus rite se offerat, tormina per multa horas languent; tunc si obstitrix digito premat caput fœtus, ille sursum facillime pellitur, utpote innatus aque, nisi plures lineæ simul in utero, tunc digitis scindendæ membranæ, & sic tormina utilia fœtum expellent.

3. *Hydrometra sanguinea* Boneti Sepulchr. Tom. 3. p. 92. n. 2. C.

Fœtinam recens enixam obstitrices alterum fœtum gestare credebant, quia inferior abdominis pars adhucdum erat tumida; uterus aqua cruenta repletus apparuit: Vide *Ascitem uterinum*.

4. *Hydrometra hydatida* Astrucii de morbis mulierum, lib. 2. cap. 8. *Hydrops uteri vesiculosus* Nicol. Tulpii, Vandermonde Journ. de Méd. Juill. 1758. p. 54. C.

Compertum est gravidationem aliquando degenerasse in substantiam membranaceam globosam, totam aquosis bullis rotundis tumidis, pellucidis, innumetis plenam, aliquando cum sanie sætida & diluta, ut compertum in uxore Bibliopolæ. *Mercatus, de mulier. affect. lib. 3. cap. 8.* Eisdem hydarides inveniunt in utero Th. Bartholinus: *Boneti Sepulchr. p. 88. Tem. 3. n. 3.*, & omnium prius *Actius form. 4. cap. 79.*

Hæc species spontaneo partu potest sanari, sed rarissima est, & difficulter distinguitur ab ascitica.

5. *Hydrometra puriformis* Boneti Sepulchr. Tom. 3. p. 88. n. 5. & p. 92. n. 1. C.

Augusta Imperatrix omnia signa veræ gestationis habuit; in cavitate abdominis erant ichotoli humoris, tum phlegmatis libris viginti quatuor, uterus erat valde magnus, plenus humore crassissimo, albo.

6. *Hydrometra ovarii* Astrucii de morbis mulierum. Tom.

Tom. 4. pag. 43. obs. 45. lib. 4.; Nicolai Tulpii; Acta Eruditor. Lipsiæ anno 1701. Februarii. Ephemerid. Germaniæ, decur. 2. obs. 95. anni 2., Bianchi de generatione, p. 107.; Munnicks in Bibliotheca Anat. C.

Sunt hydrometræ ovariorum asciticæ quarum penultima octoginta; ultima 112. libras feri continebant.

Tumorem tubarum 150. librarum aqua plenum memorat Ill. Bianchi Taurinensis Professor, nuper amicis multis ereptur, & Cyprianum testem citat.

XVI. PHYSOMETRA, a Græco *metra* uterus, & *physia* insilio; *Inflatio uteri* Sennerti; *Tympanite de la matrice* D. Astruc de morbis uteri Lib. II, cap. 9.

Est constans, permanensque tumor levis, elasticus, uteri figuram, & sedem referens in mulierum hypogastrio.

Differt ab ædoplosia uterina per constantiam & permanentiam, eodemque modo distinguitur a globo hysterico, & ab erethismo uteri fugaci in abortu subintrinseci, in hystericalia catameniali observando; nam in his casibus non raro uterus intumescere sen indurescere per intervalla videtur, & ræpe nunc ad unam, nunc ad alteram partem inclinat, ut ipse expertus sum.

1. *Physometra sicca* Astrucii lib. 2. cap. 9.; *Tympanites uteri*, Valesci de Taranta lib. 6. cap. 15.; Matthæi de Gradibus in Rhasim. C. de mola; Thadzi Duni Lib. Miscellan. cap. 8. R. Dodonæi obs. 49. L.

Signa communia graviditatis & chlorosis, tumor elasticus, & a pulsatione resonans, increfcentia a calore ignis, lecti; volumen nativo non multo majus; nullus ex vagina crepitus, ut in ædoplosia seu tympanite fugaci Astrucii.

2. *Physometra humida*, Astrucii lib. 2. cap. 9.; Ambr. Pare lib. 25. cap. 34.; Salmuth. Centur. 2. obs. 57.; Laur. Jouberti de urinis, cap. 13. &c. C.

Est ea in qua cum flatibus concurret serum quo potissimum uterus distenditur, molem quandoque maximam adipiscitur, unde simul & ratione ponderis a priori distinguitur; de cætero eadem sunt signa.

Curatur utraque species, si flatuum emissio per uteri orificium promovetur; cætera enim auxilia inutilia sunt. In hunc finem prænitatur usus balnearum, semicupiorum, injectionum, pessarium emollientium, quo factio sollicitetur uteri orificium obstetricis digito, pessariis acribus, clysternis irritantibus, sternutatione, vomitione, saltu; denique si hæc non prosint, stylus mucosus caute in uterum immititur; evacuato utero fiant injectiones pro re nata diversæ, ut in prima specie emollientes, in altera detergæ, tonicæ.

Memini me olim duabus vetulis hoc morbo recentiori affectis præscripsisse iuscula diuretica,

& emplastrum de Gallano regioni uteri admoventum, unde oborta copiosa urinæ excretionem cito convalescere.

Physometram fugacem, sed quovis mense revertentem, observo in muliere quæ hystericaliam catamenialem patitur, seu quæ quoties catamenia ipsi fluunt, per duos dies his uberim prurum-pentibus, dolores assiduos in tota uteri vicinia, & ipso utero patitur, atque tunc uterus, pugni magnitudine supra pubis altitudinem, ad eandem, non ad visum, tumet; illa olim sæpius pedibus ex utero edere erat solita; sed ædoplosia, jam si quæ sit, ita parate se habet, ut non audiat; is vero tumor a flatibus esse videtur, cum subito recedat pluries; deia vero aere ingresso & obitum sanguinis utero obturato sit ejus rarefcentia, unde physometra fugax. Hæc mulier pluries peperit, unde non mirum si uterus ita altus & magna sit; de cætero ille omnino indolens est, & post catamenia nullus; æe nunc dextrorsum, nunc sinistrorsum paululum inclinans.

XVII. TYMPANITES; *Typhos quartus* Hippocratis Foetii pag. 555.; *Hydrops secus & flatulentis* ejusdem Aphor. II. Sect. IV.; *Tympania* Galeni Comm. de victu in acutis, Tralliani Lib. III.; *Tympanita* Sennerti; *Tympanias* Frommanni apud Bonetum. *La Tympanite*.

Est intumescencia totius abdominis, levis & elastica, a pulsatione sonum edens, huius morbi præcipuum symptoma, adde ructus, borborygmus, constipationem, & dolores.

In colica flatulenta volumen totius abdominis minime est adactum, & morbus acutissimus est in paroxysmo, unde differt a tympanite. In meteorismo volumen quidem abdominis est adactum a flatibus, sed ægritudo est acutissima, & sæpe accidens aliorum morborum; tympanites vero, licet doloribus colicis initio saltem stipetur, est morbus chronicus, & ideo ab aliis distinguendus. Physometra, hydrometra, & colica flatulenta quatenus tantum abdominis partem instant a tympanite discrepant, in quo constanter prominet abdomen versus umbilicum in quocumque ægri situ.

1. *Tympanites intestinalis*, Smetii Miscell. lib. 10.; Fabricii Hildani Cent. 6. obs. 74.; Hercul. Saxonie Præl. part. 2. cap. 24.; Plateri obs. p. 656.; Litte Mem. de l'Acad. R. des Sc. 1723. D.

Est ea species quæ fovetur a flatibus ventriculi & intestina valde distendentibus; hic fovetur sæpius a materia verminosa; supervenit etiam puerperis, hypochondriacis, mæstis.

Incipit non raro a borborygmis, doloribus abdominis atrocibus, peritinacibus, adeest constipatio, dolores initio ad umbilicum, deinde ad ambitum abdominis referuntur; a flatibus erumpentibus levamen fugax; secto cadavere, intestina alia admodum intumefacta, alia velut in

in cellulas contractis, & veluti convoluta apparent; illis punctis non multum refédit tumor. nisi multis in locis aperiantur, unde peracentesae inutilitas apparet.

Deest phlegmatia, urina lateritia, sitis urgens, nisi sub finem morbi asites, accedat, unde difert a tympanitide ascitica.

Curatio difficilis est ob contraindicationum concurrentium; initio venena secunda ob dolores, calorem, tensionem; alvus est emollienda oleosis, diluentibus, refrigerantibus ob dolorem, siccitatem, constipationem, tensionem; anodyna etiam blanda, antispasmodica fuaudent; ergo cavendum a catharticeis, nisi mitiora sint, a carminativis nisi sint anodyna: interea cum flatus generantur sæpius a materibus fermentescentibus, putrescentibus, verminosis, tum necessaria videntur cathartica mediocria, vermifuga, saponacea; inveterascente morbo; & calore, spafmo, dolore immixto, tunc cathartica fortiora, resolventia, ac tonica tutius agunt.

Æger utatur fero & mane, dum recens est morbus, clysmatis laxantibus; & post unam, alteramve phlebotomiam dein purgetur ex manna, tamarindis, oleo amygdalarum; dein ter in die sumat decoctum hordei in quo flores rosarum infusi fuerint, cui prisanæ addantur spiritus vitrioli, sal nitri dulcis guttæ aliquot ad gratam aciditatem; vel usurpet emulsiones. anodyna, julepia refrigerantia, prisanam ex crystallo minerali: tum repetita catharsis æger lacte asinino, vel etiam vaccineo, thermalibus aquis mixto utatur; abdomen urina calida foveatur identidem; ac his irritis fiat remedium D. Rast aucti nostri apud Lugdunensis Medici experientissimi, scilicet fomentum ex aqua frigida, deinceps vero gelida, quo duos tympaniticos Lugduni sanatos vidit; & quod etiam mire convenit intus aqua gelida, imo frustula glaciæ sunt voranda ad condensandum flatum, maxime ubi calor intensus, ætas juvenilis, temperamentum fervidum, æstas, similesque circumstantie suadent; quoniam sunt varietates hujus morbi iniquibus prædominatur vel acidum, vel glutinosum, vel atonia, pro diversis hisce conditionibus diversa auxiliorum genera sunt prioribus addenda, quæ videlicet apud Clariss. Combalsusier in *Pneumatopathologia* n. 353.

2. *Tympanitis abdominalis* Valleii comment. in lib. 4. de victus ratione, pag. 284. Balloni Paradigma 241. Combalsusier *Pneumatopathologia*, num. 26. Zeviani libr. del. flato C.

Est ille qui flatui in cavo abdominis collectos gerit, quique vel *siccus* est, quod de recenti quoquecumque sere valet, vel *humidus*, seu asciticus, cum urina lateritia, sit, phlegmatia, ascite, in fine morbi veterascentis se committit præbente, & in hoc casu sede tantum differt ab ascite flatulento peritonæi duplicaturam non eam videri diffidente, in quo scilicet viscera abdominis convoluta in glomum sub diaphrag-

mate non ument, sed peritoneo tecta, latent.

Tympanitis abdominalis siccus aliquot observationibus constat, utur a *Lietro* In dubium revocetur; est in eo resonitus evidenter quam in intestinali, flatuum emissio rarior, minus levans ægrum, dolores abdominis magis exteriore, alvus minus pertinaciter adstricta. Si a priori dignosceretur, posset institui paracentesis, ut factum novi in cadavere, & tunc illico explosio flatu sæpe ferrido tumor subsidet; hujus diagnosim, prognosim, & curam specialem videlicet in extimo tractatu *Fr. Combalsusier*.

Quoad ejus principia, verosimile est erosio quomodocumque, vel ventriculo, vel intestino flatus in abdomen irrepsisse, ut vidimus, in vesicam ex intestino erosio sese insinuasse ad producendam ædoprophiam; & ut in uxore Medici Salvatoris dicti reperit olim *Jeanes Baubinus*. Vide *Mangest Bibliothec. Medic. Præd. de Hydrope*, pag. 1003.

Signa hujus erosinis erant dolor hypochondrii sinistris, vomiturius, ructatio, febris; dein venter intumuit, dyspnæa accessit, cum lumbagine, dentium fridore, siti, asthenia; intra mensem mors cum mentis constantia; in fundo ventriculi fuit orificium digitiun admittens; a flatibus intra vasa lactea adactis in colica flatulenta, ea disrumpi quandoque, & inde in abdominis cavum irruere suspiciatur *Combalsusier*; verum non facilius est flatu disrumpi hæc vasa minima, quam ipsa intestina; nam vasa minima tanto magis resistent fux ruptioni, quo minorem habent diametrum, ut norunt Mechanici; si tamen hæc lactea debiliora fuerint, & eo usque ducta, ut guttulum aeris possint admittere, ea conditione poterit fieri tympanitis.

Hæc tympanitis principia vix dignosci, vixque tolli queunt etiam cognita; verum si acre fluidis exsiccatis, fermentescentibus, putrefactis emergens in abdomen irruerit, ut generatur in emphysemate de quo egimus dum de pneumatosi spontanea, tunc pro diversis hujus flatui principis, diversa methodus est adhibenda ad præpendendam ulteriorem hujus genesis; dein collecti flatus elasticis est destrucenda; demum huic flatui quidam est exitus parandus.

Cum aeris extricatio debetur summo æstui sanguinis, phlebotomia, acida refrigerantia initio conveniunt; si ab acido & verminoso pabulo fermentescente, tunc omnia absorbentia, terrea, alkalina, aromatica, stomachica amara; kinkina juvant; si a glutinoso pingui, quale in lactentibus sæpe viget, pendeat flatuum genesis, tunc est impugnanda victu ex pane bene fermentato, vino veteri, infuso chamæmeli, cinnamomi, jusculis amaris cum enula campana, cicchorio, salibus neuris; frictione ex pannis calidis; clysmatis ex urina calida, lixivio, terebenthinæ pauxillo in ovi vitellæ soluro; dein catharticeis evertendum illud glutin-

nosum, tonus visceribus laxatis restituendus; iterum clysmata resolventia, tonica, acria usurpanda.

Denique si irritis omnibus auxiliis æger cruciatibus in ambitu abdominis torquetur, qualem olim me vidisse memini, alias vegetus sit, nec putredinis in primis viis sint indicia, unicuique solatium ex paracentesi videtur expectandum, hancque olim non adhibuisse me prænuit; quippe misera mulier, ad quam acceritissimam, ita cruciabarur tympanite, ut viribus adhuc integris, facie rubens, medix ætatis, mente donans, nullis remediis internis sublevata, eadem die qua ipsam invisi & dereliqui, fato functa sit.

Obiit quidem brevi æger tympanicus post paracentesim, cujus testis fuit *Habmonius*; verum summe putridus inde exivit status, quod gangrænomum viscerum statum arguebat; erat enim odor cadaverosus; præterea foramen nimis amplum cufum est, cum venter illico subsederit, unde periculum summum, quod averti posset exigua ac tricuspidata, & per intervalla obcurato foramine, intereadum arcte stringitur abdomen, & cardiacæ vires sustinentur.

5. *Tympanites emetophyodes* Combalusier. nom. 122. & 152. C.

Est ea species quæ ab emphysemate intestinorum, cæterorumque abdominis viscerum dependere putatur, quæ species non confundenda cum pneumatosis abdominalis regiones afficiente, & subcutanea, a pressu crepitante.

Dignoscitur hæc species ex inæquali tumore abdominis aliunde tympanitici, maxime vero ex conjunctis pneumatocæle, pneumatomphalo. Jam recensui me pluries observasse in equis apud Helvios non solum emphysemata valde dolentia per lumbos, dorsumve equorum dispersa Hippiatrici dudum cognita, verum etiam in boni pulnone post mortem a me observata, tanquam membranam pellucidam in vasorum & lobulorum interstitiis ære elastico turgidam, & demum in ipsis intestinis humanis emphysema observavit clariss. *Duverney*, ut docent *Acta Acad. Petropolitana*, tom. 5. pag. 213.

Verum huic speciei paracentesis nulla convenit, & tantum, præmissis resolventibus, ope cathartico & diuretico exitus huic aeri parandus est, & auxilia priori specie accommodata videntur suadenda.

Puer Nofocomii generalis pro ascitico habitus a D. *Verny* & *Lazerte*, ob abdominis tumorem & fluctuationem; insinuit a D. *Serres* paracentesi, nihil omnino effluxit, nec æger pejor meliusve habuit; æger demum obiit; secundo cadavere intestina inventa sunt flatu admodum distensa, & invicem ope textus cellularis ac epiploï oedematosorum in glomum colligata; hic puer phlegmatia, siti intensa, & urina pauca lixiviosa laborabat.

4. *Tympanites asciticus* Del Papa Consult. 2. tom. I. *Idropisia tympanitica*. C.

Sauvages Nosologia Methodica. Tom. II.

Adulescens adolevit robustus, sanguineus, diarrhæis, colicis, dysenteris diu vexatus, tertianis prius affectus. Intumescit abdomen, & subito digitis pulsatum cum sonitu digitum repellit. Urina pauca rubra, alvus asitrica, oedema pedes infestat. Morbus difficillime sanatur etiam recens; statulencia ano vel cæto prorumpens sublevat.

Indicantur ea quæ statulencia digestiones & acorem corrigunt, ut 1. abstinencia a fructibus, lacte, crudis, dispepsique alimentis; 2. abstergentia, ut niater perlarum, oculi cancrorum; 3. amara, ut rheum, absinthium, vinum absinthiacum ab *Hippocrate* contra flatum laudatum; 4. laxantia, ut emulsionem ex amygdalis amaris, harum oleum; 5. diuretica, ut radices aperientes, terebinthina; 6. Paracentesis & cathartica valida fugienda.

Tumor abdominis subito accedens a repressis alvi fluxibus putridis, aut ab intermittentibus kinkina suffocatis, utut ascites videatur, vers est tympanitis, juxta *Pringle*; præmissa phlebotomia si opus sit, præscribetur theum quovis vespere ad alvum laxandam; vitentur carminativa, & violenta cathartica, sumetur electuarium ex floribus chamamelis, Zingibere & croco maris.

5. *Tympanites spasmodicus* Poque, Essai sur les vapeurs, obs. 14. 45. est varietas tympanitis intestinalis D.

Hic morbus sexagenarie hypocondriacæ quartana per hydragoga & kinkinam sanatur supervenit cum dolore abdominis.

Fortis frigidi, aqua pulli, aqua nive frigidata, serum lactis, clysmata ex oleo, dein diarrhæa biliosa status multos emittens abdominis tumorem & dolores sustulere; levissimum catharticum nocuit, lac asinum curam absolvit.

Alteram mulierem catameniam anno quadragesimo quinto cessantibus, siccam, melsnecholicam invasit tympanitis; phlebotomia e pede, clysmata, serum lactis vix profuere; sed fomenta frigida & balnea profuere; ex lacte supervenit diarrhæa biliosa quæ morbum solvit.

Hippocrates lib. V. Epid. observ. 18. triginta uras aque frigide effundi jussit supra corpus mulieris robustæ, quæ a sumpto medicamine ventre intumuerat cum dolore, dyspnœa, animi consternatione; huic vomitu ex aqua frigida nec dolor, nec dyspnœa remiserant, quinque mortua visa fuerat; hac affusione frigida sublevata est, bihem copiosam dein eiecit, & vixit. Vide *Fossum*, pag. 1153. n. 42.

Videatur clariss. *Combalusier*, n. 368. de *tympanite cum exitu, spasmoque prevalente*.

6. *Tympanites* Sevvartii. Philosophicarum Transactionum anni 1730. n. 414. ab Alexandro Sevvartio. C.

Est tympanitis acuta, nisi malueris meteorismo hanc accensere, quæ a bilis extra cystidem effusione ob vulnus inflatum sat cito supervenit, ut *Ill. Sevvartius* in milite observaverat, & in canibus dein expertus est.

Miles vulnere accepto quo vesica fellea per-

tula fuerat, sit cito intumuit abdomine, ut in tympanite; aut sine dolore, febre, inflammatione, cum alvi constipatione pertinaci, urina pauca, crocea, perrigillo, quod opiatas testit, lingua sicca; aperto cadavere, bilis intra abdominis cavum exundabat, intestina valde inflata & extensa, nulla ne in vulnere quidem inflammatio; paulo ante mortem, quæ septimo die advenit, pulvis inæqualis, levitque singultus.

Huiusmodi est quilibet bilis in intestinis, ut saliva in venterulo expansionem aeris in alimentis contenti, & in chylo copiosissimi coetceat, adeoque quin ea deficiente aer expandatur, & tympanitis ac borborygmus edere debeat; in auriginosis non raro observavi recursum morbi a borborygmis & flatibus abdominis incipientem; ubi vero bilis deficit, modo non a vulnere, debent ægri illius defectum resarcire amaris, resinosis & saponaceis, quæ etiam in tympanite a viscido pradamante commendantur. Vide *Melancholiam 7am, adaphophiam, physometram*.

7. *Tympanitis verminosa*, De Meyley tom. 3. n. 192. A.

Est ille qui febres verminosas sæpius comitatur, aut qui a vermibus fovetur: distinguitur ab aliis per ligna vermium. Curatur 1. phlebotomia iuxta dolorum intensitatem & ægri robur repetita; 2. oleosis blandis, dolores mitigare, vermes necare, alvumque laxare apertis; 3. potu diluente, emolliente, antiphlogistico, addito succo limonium, utpote vermifugo & refrigerante; 4. decocto cassiæ; vel quod melius est & flatulentiam non fovet, extracto cassiæ, decocto tamarindorum, manna &c. ut alvus laxetur, & vermibus, flatibusque exitus pareatur; 5. sedatis doloribus, pyrexiaque sublata & alvo aperta, sumptis amaris, vermifugis & catharticis reliquis morbi tollendæ.

XVIII. METEORISMUS, *Meteorismus*.

A Græco *Meteoros*, *sublimis*; est intumescencia abdominis, vel tantum epigastrii, aut hypochondrii a flatibus contentis; in eo diversa a tympanite, quod si totum abdomen tumet a meteorismo, illud symptoma sit fugax, & acuti cuiusdam morbi comes; si vero tantum tumet epigastrium, hoc symptoma, licet pertinax, cum tympanite minime confundi potest.

Differt a colica flatulenta, & gastrodynia flatulenta, ex eo quod vel dolor nullus sit in meteorismo, vel exiguus & non atrox, ut in his morbis; addè quod in colica & gastrodynia raro extus tumet abdomen, licet palpo explorata intestina ratione doloris, ac tensionis tumere videantur.

1. *Meteorismus venteruli*. *Inflatio venteruli* Sennerti. L.

Est inflatio epigastrii, ita ut nulla sit cavitas ab æthero ad umbilicum qualis in sanis est, cum vel sine dolore, quæ chloroticis & puellis quarum catamenia sunt suppressa, non raro accidit

viris pituitosis, phlegmaticis, & pendet a flatu intra ventericulum contento, nec tamen admodum eum distendente; merito incusatur languor notus peristaltici intestinorum, vapiditasque succorum digestivorum, viscositas cacochyliz, simulque ventericuli laxitas, unde sit ut magis solito distendi queat cum minimo, vel obstruo dolore.

Therapia vulgaris inflationem ventericuli eo vergit, ut 1. viscoso, pituitosque humori primas vias insarciens exitus ano vel cæco præbeatur; 2. ut ventericuli tonus, & succorum digestiva viis restituatur; in hunc finem diæta fit attenuans, & flatus discutiens; cibi sint boni succi, cocti faciles, non flatulenti; lac, recens vinum & cerevisia non facit fermentata fugienda sunt; vinum vetus & meracum juvat, panis laneus calidus, ventericulo continuo applicatus, calorem ejus fovet & revocat; cathartica ex rheo, rhabarbaro præmittuntur; dein ad stomachica, maritima, incidentia, caminata deveniendum; sic radix angelicæ condita, semen anisi, fœniculi, cinnamomum, zingiber, bæccæ lauri, juniperi, &c. possunt suppeditare diversas formulas huic affectui debellando aptas.

2. *Meteorismus abdominis*. A.

Est symptoma ilei, enteritidis, & plurium morborum acutorum, præsertim tritophyæ, amphimerinæ, synochæ, ubi magnus putridæ cacochyliz apparatus cum inflammatione systrophica, vel gangrenodea, adeoque vel cum dolore & tensione maximis, aere intestinali rarefacto ob calorem, vel sine dolore, ob gangrenosum viscerum flatum, & expansionem aeris a putredine oriundam; qualis meteorismus in cadaveribus aqua diu meris, aut soli expositis observatur.

Ille meteorismus in acutarum febrium vigore pessimum est symptoma, tum quia usum cathartecorum maxime necessariorum interdicit, tum quia materies putridas, aut fermentescentes, noxiolque succos in primis viis hærentes supponit; hinc phlogosis viscerum, eorum putredo, simulque flatuum expansio; hinc abdominis tumor umbilicum venterum cum tensione, velut in tympanite, qui tumor ex sono petculiosis a flatibus foveri videtur.

Curatio & prognosis eadem quæ enteritidis; post Hippocratem clariss. Tissot ausus est in hoc casu aqua frigida abdomen fovere, quod bene successit: *Tissot de febre biliosa*, pag. 115.

3. *Meteorismus hystericus*, Ill. Raulin des Maladies vaporeuses, pag. 29. L.

Hepaticide laborabat mulier, pressio epigastrii ea olcitabat, unde hysteriæ suspicio in mentem Medici venit; depulsi hysteritidis symptomatis, ac febre, abdomen intumuit admodum; existimabant alii Medici hoc esse a pure tumidum, seu acutemp purulentum; Ill. vero Raulinus meteorismum hystericum adesse tantum cognovit, & egram semicupis tepidis brevi sanavit.

4. *Meteorismus a manzanilla* Journ. de Med. Decemb. 1757. D. Peyssonel. A.

Comestis multis pomis huius hippomanes post horam abdomen multum intumescit, interanea ardent, tremit totum corpus, sudor frigidus, cardialgia, syncopes, labia exulcerata, & acutè prurientia, hinc sæpe mors; excitata cholera, seu adhibito cathartico emetico ex insulo feminum sabbæ purgatis, seu jatrophæ gossypifoliz, evacuat venenum, & dein edulcorantibus, ut oryza quandoque ægri sanantur.

Tam acre venenum in arbore Hippomanes ferunt Auctores, ut umbram, vel maxime ex eo delabentem pluviam meruendam esse asserant.

D. Jacquin Medicus Leidensis, & Imperatoris Botanicus, nuper ex America redux, mihi retulit se experiundi causa nudum exposuisse pluviz ex hac arbore delabenti, idque impune, imo succum manu supina excepsit; verum cum huius succi guttulus prona manu tetigisset; Illico magnam erympelas ibi se passum esse.

XIX. ISCHURIA: *Ischuria Græcis; Urina suppressa*, vel potius *retentio* Fæder. Hoffmanni de Morbis infantum; *Hydrops vesicæ* Nouvell. Class. des maladies: *Retention d'urine; Ischurie*.

Morbus est cuius potissimum symptoma est hypogastrii intumescencia ab urina intra vesicam retenta.

Cum urina omnino in vesicam non venit, vocat etiam vulgus Medicorum ischuriam, quamquam ischuria non fit, & permittendi sunt perfectio ita nomine, cum propriam appellationem non habent. *Galenus lib. 3. de symptom. causis, pag. 246.*

Sunt huius generis species plurimæ: quæ in methodo perfecta ad Classẽ phlegmasiarum attinerent; verum nulla methodus perfecta est; sequentes species collegit clariss. Doctor Cusson.

Character. Ischuria vera signa sunt.

1. Sensus ponderis in hypogastrio, pube, perineo. 2. Perceptus urinz stimulus cum ejusdem fundendæ cupiditate, & irritis ad vesicam exonerandam conatibus; (hoc fere aut prorsus exulatur, si vesicam teneat sudor, vel anæsthesia.) 3. Protuberantia supra os pubis magna; (minus patet in ischuria fugaci a calculo vesicæ, vel si vesica contracta, indurata parum extendi queat) ad tactum dolorifica; (absit prorsus aut fere dolor in ischuria a vesicæ anæsthesia, stupore,) nati-vam vesicæ figuram referens (alienam inducit mala conformatio, cystocèle, &c.) subfluctuans, nisi lotio referatissima fit vesicæ; urina sponte emissæ, aut per artemeducta, decrescens, evanescent. 4. Detectio tumoris insoliti, immisso in anum, vel in vulvam digito. 5. Effluxus lotii sub profundiori catheteris immisione; in ischuria quam facit inflammata vesicæ uvula, cathetere licet intra huius collum adactò, non effluit urina. Tumor notabilis ad musculorum restorum in femorum latera, ad inguina, scrotum, peri-

næum, & intra vaginam; quandoque, sed raro, protuberantiæ hypogastrii modo memoratæ aliam addi sociam, huius similem, sæpius minorem, quandoque vastius tumentem, imo hypogastrica vices suppletent.

Ischuria vesicæ signa sunt.

1. Lumborum uterumque dolor punctorius, obtusus, vel gravativus. 2. Absentia stimuli per urinam vesicæ inferendi, necnon conaminis ad lotium emittendum. 3. Protuberantiæ in hypogastrio, necnon in ipsius viciniis defectus. 4. Vesicæ contractio, collapsus catheterismo, vel digito in anum; aut vulvam adactò, cognita. 5. Catheteris in vesicam immisso frustra nihil lotii effundens.

Solius ischuria vera ac falsa supervenire morbi sunt anorexia, cardialgia, nausea, vomitus, sapor urinosus in ore, anxietas, lingultus, agrypnia, febris, cachexia, corporis tumiditas, hydrops, sætor urinosus, affectus soporosi, dyspnoei, delirii, motus convulsivi, ephidrosis frigida.

Symptomata alia in hac vel illa specie suppressionis urinz observanda silet character specificus sub ischuria quilibet inferius tradendus.

Curatio. Cum maximus sit principiorum ischuriam producentium numerus, diversissimæque indoles, nemo non videt, modo vario, principiorum nimirum varietati accommodato, sanationem absolvi debere. Regulam universalissimam ut minus generale reddamus, tria proponimus auxiliorum genera, quæ si non omnes, præcipuas saltem indicationes complectuntur in numerosis ischuriæ speciebus adimplenda.

Primum auxiliorum genus suppeditant antiphlogistica, nimirum veniz sectiones, clystera emollientes refrigerantes, oleosa nitrata, potus laxantes, diluentes, ascenses, acidi, linimenta, foras, cataplasmata blanda, balnea, semicupia tepida, tum simplicia, tum emollientium, & oleosorum societate majorem efficaciam naçta. Conveniunt auxilia hujusmodi in ischuriis omnibus, in quibus adest, aut imminet inflammatio, viget motus febrilis, plethora, tensio, spasmus, irritatio, dolor.

Alterum auxiliorum genus sũstunt stimulantia, attenuantia, extus nimirum fomenta, cataplasmata, linimenta calida, spirituosæ, nervotica, phœnigmi, vesicantia, duciz, balnea thermalia, concussio ab equitatione, curru-vestitione; intus vero diuretica calida ex herbis, radicibus, seminibus, balsamis, salibus, animantibus eruta, clysmata aciora, cathartica, emetica, aquæ thermales. Memorata auxilia competunt illis ischuriæ speciebus, quas faciunt humores crassi, lentescentes, fibratum atonia, renem, aut vesicæ stupor, anæsthesia, torpor, paralysis.

Tertium auxilii genus subministrat Chirurgia; si illud est in artificiosa totii in vesicæ contenti educatione, immisso scilicet in urethram cathetere cavo, candelave tubulosa; vel celebrata, si catheterismus institui nequeat, vesicæ paracente-

racentesi ad perinæum, aut supra pubem ope acus tricuspidatæ, rectæ, vel incurvæ, tubo inclusæ simili; encheiretibus memoratis locus est ischuria vera quacumque, si remediis congruis statim adhibitis auscultare remuerit, diutiusque persistat.

Circa ischuriz curationem satis sit hæc generaliter delibasse. Quid methodo antiphlogistica stimulant, catheterismo, paracentesi addendum sit in speciebus variis quibus competit horumce auxiliorum genus unum, aut alterum inferius sub qualibet specie declarabitur; ischurias in quibus locum nullum præstata auxilia inveniunt, specialissima suo loco manet therapæia.

Ischuriz renales.

1. *Ischuria (nephritica) a renum inflammatione* Schacht. Instit. Med. Pract. lib. VIII. cap. I. & VIII. Gorteri Syst. Prax. Med. de Ischur. Fabric. Hildani de Lithom. cap. IV. Lxi. a Fonte Conf. 19. Boneti Sepulchret. lib. III. sect. XXIV. observ. IV. §. 3. Schenk. lib. III. de Ischur. falsa, cap. IV. & V. Estmulleri Coll. pract. pag. 994. A.

Character specificus deducitur ex notis ischuriz falsæ genericæ & signis nephritidis; sunt hæc ultima dolor lumborum acutus, pungens, pulsans, ardens, in partes vicinas, inferas præcipue, ut ad venterem, pubem, genitalia, inguina, femora se extendens; stentatione, tussi, & simili corporis commotione, exasperandis; sæpius contumax, interdum per intervalla remittens; febris acuta, inflammatoria, erragice exacerbans, cum cibi fastidio, nausea, vomitu, extremorum, pedum imprimis, frigore, agrypnia, gravioribusque aliis symptomatibus; testiculi alterutrius, vel utriusque retraction; femoris dextri, sinistri, vel utriusque dolor obtusus, stupor; alvus arcte compressa, inflata, borboryzans; trunci erectio, conversio, incensus vix possibiles; decubitus in latum oppositum, & in ventrem difficilior, faciliior in latum inferum & dorsum; præcedit mictio difficilis, tenesinodes, ardens, urina primum tenui, aquosa, dein rubra, flammæ, semper pauca, tandem suppressa. Rara hæc ischuria species periculosissima est, mortem nunc citissimam, nunc lentam quidem, aut animæ declinandam, de facili inferens, curatur methodo antiphlogistica. Ischuria quæ interdum contingit in morbis inflammatoriis, ut phrenitide, peripneumonia, pleuritide, gastritide, reumatismo, in febribus acutis, ardentibus, in paroxysmo febrium intermittentium; ischuria quam faciunt materies arthritica, catarrhalis, scorbutica, variolosa, ad renes delata, necnon aperientia acris, salia alkalina, insecta eminenter diuretica, cathartica emergica, verbo medicamenta calidiora hinc intelliguntur, atque curantur.

2. *Ischuria (nephrolithica), a renum calculo* Schacht. lib. citat. cap. II. & VIII; Gorteri lib. citat. de Morb. renum; Car. Pison. de Morb.

a colluv. serosa; Schenk. de Ischur. Boneti Sepulchret. de urin. suppress. & Medic. Septentrional. de Ischur. &c. &c. A.

Signa ischuriz noctæ genericæ, necnon calculi renalis hanc speciem determinant; signa calculi renalis sunt dolor in lumbis fixus, stabilis, nisi per ilia ad pelvim, vel testes excurrat, sæpius gravativus, interdum acerrimus; & inhihi aculei more pungens, sub decubitu in partem affectam minor, in oppositam augetens, post assumptum cibum, & corporis metum exasperatus, jejuno ventriculo, & quiete remittens; febris nulla, utique initio; tellis retraction, femoris stupor, trunci incurvatio; anorexia, flatulencia, nausea, vomitus, alvi adstrictio, pulsus durus, paroxysmi nephralgici, recurrentes, dysuria, stranguria frequenter affligens, excretio urinae cruenta, muco, membranæ floccis, sabulo, lapillis repleta, calculus antea excretus, ortus a parentibus calculosis, podagra prægressa; paroxysmo ischurico præz urina tenuis, acris admodum, dolorifica, pauca, Hujusce speciei frequentissimæ, & cum colica affinitate lubrica est diagnosi. Signum calculi renalis certum nullum dari vult Joan. Bapt. Sitavatus; non semel docuit anatomici in renibus hæsilis calculum, de quo ne vel minima suspicio per vicem aderat.

Ischuria nephrolithica, quæ gravissima est & in renis inflammationem, apostema non raro abiit, competunt methodus antiphlogistica, & maxima opiata. Vitanda diuretica calida, stimulantia tonica, adstringentia. Nephrotomia admittit calculus renalis in eo tantum casu, ubi inflammationem a calculo accersitam exceperit apostema protuberantia & fluctuatione in lumbis insignitum. Hujus loci non sunt quæ ad novi calculi generum præcavendam ab Auctoribus commendantur. Renes a calculo perforatos fuisse, succedente immedicabili ischuria, Mercatus testatur.

In Nephrolithica seu arenulosa ischuria succi petrocælini una. iij. succus expressus ex xxx. millepedibus, olei terebinthinæ semi-drachma, & lilii Paracelsi drachma, hæc mixta & sumpta in balneo promoverunt ejectionem centum lapillorum pisi magnitudine, quorum ulterius sexcenti intra tres menses ejeti fuerunt. Journ. de Med. Oâbr. 1756.

3. *Ischuria (nephroplethorica) Renalis a plethora* River. Cent. I. observ. 1. & 89. Estmulleri. Schacht. loco citat. Gaubii Pathol. de vit. miction. Ludw. Instit. Med. Clin. Seb. Nafii specul. method. pag. 167. A.

Virum temperamenti sanguinei, & habitus athletici post consuetum calidissimis æstivis diebus longum iter, corripit ischuria noctæ, clysteribus, fotibus, linimentis, semicupis, diureticis, immorigerea; nulla aderat febris, nullus dolor in lumbis, in pube; hæc tamen affectu renali quocumque & urinatum vicio omni immuni vixerat æger; una Riveria accusanda videtur plethora mittitur sanguis larga manu; vix elapsa a venâ.

nae sectione hora minam a renibus in vesicam descendentem perferit scilicet æger, & tanta paulo post profudit copia, ut intra horæ spatium, nullo alio adhibito remedio plenarie convalescat. Ex plethoræ signis & therapæia discite hanc ischuriæ speciem nosse, ac debellare.

4. *Ischuria (lunatica) Renalis lunatica* Tulpîi, observ. med. lib. II. cap. 49. C.

Urina viro suppressabatur quolibet ferme plenilunio, cum insigni angustia, corporis incendio, febre; persistebant ad diem quintum ut plurimum jam dicta symptomata, si fibi relinqueretur æger, neque redibat urinae effluxus, nisi luna decrescente, vel secta brachii vena. Tantæ erat efficacitæ sanguinis missio, ut ea adhibita statim exacerberetur lotium. Aperto cadavere, inventa est renis sinistri pelvis in eam amplitudinem excrevisse, ut vicem vesicæ urinariæ commode suppleret; hinc ischurici paroxysmi tempore tam velia fuit vacua quam ren sinistè repletus. *Vide Authorem citatum.*

5. *Ischuria (nephrospastica) Renalis spasmodica* Schacht. Gorteri. lib. citat. Sydenham Dissert. Epist. tom. I. Raulin. des Malad. Vapor. Mem. de l'Acad. R. des Sc. ann. 1715. A.

Ex consensu, convulsione, passione hysterica, hypochondriaca, dolore vehementi ventris, capitis, lumborum, intestinorum, coxæ, uteri, menstruatione, dentitione silitur non raro urinae secreto. Gorteri. *Syph. prax. medicæ de Ischuria*; Dignoscitur spasmodica ista species signis pseudo-ischuriæ genericis & spasmi renalis præsentia. Fibra renales spasmo tentari consilii ex præsentem morbo spasmodico, aut insigniter dolorifico; ex ægri hyperæsthesi, mobilitate, ex causis prægressis, ex signorum absentia speciebus aliis renalibus propriorum, ex dolore renali vivo, ambulatorio, fugaci. Curationem subministrant antispasmodica, anodyna remediis, quantum res postulat, maritata, quæ socius jubet morbus spasmodicus, aut dolorificus.

6. *Ischuria (nephroverminosa) Renalis verminosa* Gorteri. lib. citat. Gaubii Pathol. de vit. mixtion. A.

Vermes in renibus repertos, & cum urina excretos fuisse testantur Gentilis, Fernellius, Holærius, Zacutus Lusitanus: His posse in renibus obstructionem produci, & exinde ischuriam nemini sane incipiendum. Suppressam ex hac causa urinam agnoscunt Gorteri & Gaubius. Rarissimam hanc speciem nephralgia, neque aliud ullum symptomata designat, solo eventu cognoscendam. Curationi superledemus. Vidi verminos tubulos a errore in ureteribus concreto effectos.

7. *Ischuria (nephroverminosa) Renalis a sanguine concremento* Mercati de Morb. inter. cur. cap. 11. Estmulleri de lxf. urin. secret. pag. 314. Fernellii Pathol. lib. VI. cap. 13. Gorteri Gaubii loc. cit. A.

Rarior est hæc species quam ischuria grumosa, ureterica & vera; hanc cognoscere signis pseudo ischuriæ genericis, dolore in lumbis, *Sauvages Nosologia Methodica Tom. II.*

hæmatiria prævia, causa prægressa, ut si percussione, lapsum, ponderis maximi elevationem, longam, validamve equitationem ischuria exceperit; his accedunt gravissima symptomata, uti pallor, pulsus parvus, obscurus, anxietates, virium coincidentia; rigor, febricula, nausea, animi defectio, sudores frigidi, &c. Curationem vide apud Mercatum.

8. *Ischuria (Nephropica) a Renum purulentia* Schemck. lib. III. de ren. tumorib. Gorteri, Gaubii, loc. citat. Bonet. Sepulchr. de urinoprop. Salii Diverfi de affectib. particularib. cap. 14. A.

Cognoscitur hæc species notis pseudo-ischuriæ genericis & signis renis purulentia tentari communistrantibus; hæc ultima eruantur ex prægressis, nephritide contumaci, pulsati, nephralgia acedinetosa & maxime calculo, ex apostemate exinde orto, ex superfluitate caloris & doloris sensu in lumbis, ex horribilibus, febricula, & nunquam lumborum tumore fluctuante, ex urina turbida subalbicante, cruenta, graveolente, ad fundum valis deponente sedimentum crassum, tenax, purulentum, flocculentum, membranofum, carnosum aliquando, quod renum apostema præstat; hoc & etiam, si in renes materies purulenta confluerit, producere pars est aliarum partium internarum abscessus. Puris crassitie debetur renalis obstructio. Hujus speciei sanatu difficillimæ curationem inchoant intus abstergentia incidentibus maritata, extus vero laxantia; perficiunt vero, interpolitis, si opus sit, remediis generalibus & opiat, edulcorantia, aquæ Vallenses, Spadanæ, & præprimis balsamica, vulneraria, detergentia. Diuturnum pulveris uræ uris usum mire laudat Clar. de Haen. Nephrotomia tantum locus est cum tumore & fluctuatione in regione lumbari conspicuis sese prodit apostema; cave protuberantiam ac fluctuationem a lotio ob ureterum obstructionem congesto in lumbis excitata & a Sebastiano Nafio observatas pro apostemate vendas.

9. *Ischuria (Nephroplegmatica) Renalis pituitosa seu mucosa* Salii Diverfi loc. citat. Graßii, Ephem. Natur. Cur. ann. III. observ. 111. Schacht. Gorteri, Gaubii, Mercati, loco citat. V. Randzi de ren. affect. Bonet. Sepulchr. de Ischur. observ. IV. V. A.

Speciei hujusce diagnosis subministrant pseudo-ischuriæ signa generica, hujus repentina ac, cessio ex Hippocrate Lemnio, dolor obtusus seu gravitas in lumbis, symptomatum remissio multo gradus, temperamentum pituitosum, prægressi morbi mucosi, evacuationes similes, excreta prius urina mucro referta, apyrexia, absentia signorum pseudo-ischuriæ inflammatoriam, calculosam &c. commonitranrium. Raræ huic speciei, de facili est cetera periculum cum insequenti confundendam, competunt auxilia stimulantia, incidentia in curatione generali memorata.

10. *Ischuria (Nephroplegmatica) Renalis paralytica* Salii Diverfi, Mercati loc. citat. Horlii tom. II.

lib. IV. observ. 49. Marcel. Donati Histor. med. mirab. lib. IV. cap. 18. Bartholini Cenrur. IV. epist. 18. 38. 39. Hæschlether. observ. Dec. V. Caf. 20. Claudii Hæschle Præfici Monspelienfis felicissimi. A.

11. *Ischuria (suppleta) Renalis ab alia evacuatione suppleta.* (a) *A diarrhoea & sudore* Marcelli Donati Histor. medic. mirab. lib. IV. cap. 17. Schenk. lib. III. de diabete obs. 9. (b) *Ab otorrhagia* Sennerti ex Platero præf. lib. III. part. VIII. sect. II. cap. 9. (c) *A perspiratione* Vandermonde Journ. de Med. tom. IV. (d) *A sudore* Vandermonde Journ. de Med. tom. X. A.

Memorat Marcellus Donatus historiam monialis cui per sex menses urinas supprimebatur alvo interim descendente; restituta vero urina per menses quatuor omnimodo cohibebatur alvus. Substitit deinceps & lotii & fecum excretio, refundante in epigastrio ad plurimum librarum pondus humore qui urinam colore & odore referebat.

Narrat Platerus casum puellæ annos nate tredecim, cui, postquam aliquandiu copiose minxisset, urina subito supprimebatur, accedente otorrhagia serosa ita uberi, ut per aliquot dies assatim ex aure dextra sæpe ad duas mensuras aqua efflueret; interim bene habebat puella, neque de ullo affectu conquirebatur. Diureticis ac terebinthinæ ad magnam vim elicitæ est urina quæ subito iterum subleuit, recurrente otorrhagia memorata: adhibita efficaciori medicina, rediit urinæ excretio liberalior primum remittente aurium fluxu, postmodum vero ad copiam nativam, nihil exinde mali perpetiente puella.

Legitur apud Vandermonde historia puellæ hysteriæ per octo menses maxime vexatæ, cui tandem supervenit omnimoda urinæ & fecum suppressio, quæ elymata, balnea tepida, pituitam pulli, apozemata laxantia, refrigerantia, & potiones oleosas & dictam humectantem per tres menses solidos aspernata est; primis quidem balneis fæces olidissimæ cum vermibus & sanguinis grumis descendere cœperunt; pseudo-ischuriam, atque alvi suppressionem fugarunt balnea frigida ad duos menses protracta, quæ urinam mox cierunt, & sensim in integrum huius excretionem restituerunt. Quolibet die ægra horas decem in balneo commorabatur, quod si glaciæ injecta magis inrigidaretur, crescebat urinæ cum ardore minori tunc emissæ quantitas, deficientem lotii excretionem supplebat perspiratio cutanea.

Observationem aliam habet modo laudatus auctor de muliercula annos circiter 50. nata, cui repente alvus & urina profus restituta sunt. Frustra adhibita fuerunt diuretica & cathartica etiam valentia pluries anno injecta ex ore assumpta nullam præter sudorem, evacuationem excitarunt. Naturæ commissa paupercula, sine febre, dolore & fere citra morbum annos septem vixit, nec per anum, nec per urethram quidquam e-

mittens. Interim excretionum harum defectum supplebant sudores universales copiosissimi, fortissimi, nunc die quolibet, nunc quovis biduo, triduo, erraticè recurrentes ad duas tresve horas continuari. Toto hocce tempore alimenta omnigena, integro appetitu, voravit ægra, vultu florida, imo pinguisfacta, lecto tamen præ debilitate affixa, contra spem omnem spontaneè crepente alvus descendere, urina effluere, cessante tunc sudore & redintegrata penitus sanitate, quæ ad sex. septemve annos illibata persistit.

Mitis ischuriæ renalis speciebus aliis, quæ vel ab Auctoribus minus bene describuntur, vel e præcedentibus facile possunt intelligi ad ischurias uretericas sermonem convertimus.

Ischuria ureterica.

Ischurias inter renales & uretericas limites certos statui non posse superius diximus, collatis quantum pene nos fuit signis conjecturalibus, quibus ambæ possunt ab invicem utcumque determinari. Monuimus etiam eadem fere methodo utrasque impugnari, quotiescumque causæ simili natales debent. Porro cum vix ac ne vix quidem vitium sit ischuriam uretericam inducens, quod renalem non excitet, si renibus hæserit, uretericæ tantum memorare satis esse ducimus, unius eujusque diagnosis ac therapiam mutatis mutandis, subministrante ischuria renali simili. Ex ischuriis nephreticæ, nephrolithicæ, nephrothromboide, nephrophlegmaticæ & nephropyppicæ, nec non ex ischuriarum uretericarum signis conjecturalibus intelliguntur ischuriæ sequentes uretericæ.

12. *Ischuria (ureterica) ureterica inflammatoria* Salii Diverfi loc. supra citat. Ludvig Instit. Clin. Gaubii pathol. de vit. miction. Schachtii instit. practic. de Ischur. spur. &c. A.

13. *Ischuria (ureterolithica) ischuria ureterica calculosa* Tulpii observ. med. lib. II. cap. 45. Monro Essais d'Edimburg. tom. VI. art. 69. Boneti Sepulchret. lib. III. de urin. suppres. Schenk. lib. III. de ureterib. Salii Diverfi loc. citat. &c. A.

14. *Ischuria (uretero-thromboide) ischuria ureterica a sanguinis grumo* Salii Diverfi, Schachtii, Gaubii loc. citat. Boneti Sepulchret. de urin. suppres. obs. 1. &c. A.

15. *Ischuria (uretero-phlegmatica) ureterica a pituita* Gorter's præf. med. syst. Schachtii, Salii Diverfi loc. citat. Boneti Sepulchret. de urin. suppres. Sebast. Nafii Spec. meth. med. loc. citat. Epiphani. Ferdinandi histor. 97. &c. A.

16. *Ischuria (ureteropyppica) ureterica purulenta* Horteri lib. citat. de ureter. morb. Schachtii, Salii loc. citat. &c. A.

Has itaque species descriptione ac curatione singularibus perlegi supervacaneum est.

17. *Ischuria (ureterostomatia) ab orificii ureterum inferioris clausura* Theod. Ellert Miscell. Berolin. Tom. IV. pag. 381. Verdieri ex Noel

Mcm.

Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. II. observ. 17. Lieutaud. Mem. de l'Acad. R. des Sc. ann. 1753. Franc. Syvii Deleboe prax. med. lib. II. Saltzmanni observ. anat. pag. 61. A.

Posse ureterum orificium vesicale calculo, sanguinis grumo, mucos, pure obstrui, patet ex jam allegati speciebus; hic vero speciatim verba facere de iis ischuriis volumus, quas oris ureterum inferioris summa constrictio, coalitus, vel obturatio inducent.

Vidit Noel puellam pluribus diebus ischuria frequentibus motibus convulsi stipata vexatam, aderat exocyste seu prolapsus tunicae vesicae interius obviens, quae per meatum urinarium erumpens, sacculum siftebat ovuli, gallinaei magnitudinis, diaphanum, tenuem, humore limpidi refertum. Aperto cadavere inventi sunt ureteres ita dilatati, ut colon adulti crassitie aequarent; oculus erat ipsorum ad vesicam introitus; veram urinam continebat sacculus inter vulvæ labia conspicuus.

Invenit Saltzmannus in puero ischuria laboranti ureteres sero distensos, ad vesicam vero angustissimos, ita ut stylum exiguum non nisi vi admittentem.

Credit Lieutaud ab intumescencia trigioni vesicae inflammatoria aut aphloga obsuari posse ureterum orificia, subsequente ischuria satis frequentia, inter renalem & vesicalem media seu uretica.

A calculo unico magno, aut pluribus mediocribus vesicae cavitatem replentibus ischuriam observavit Sylvius Deleboe, ureterum ampliorem, & ad renes usque urina distentorum orificiis per lapidea hæc concreta obturatis.

Aliis præter memoratas ureterum noxiis ischuriam deberi asserunt Auctores, ut partium ureteribus adiacentium vitii multigenis Schachtius, Gambius; flatibus colon distendentibus, Ludovigius, Varandans, Sennertus &c. Hæc species, quoniam memorantur potius quam describuntur, idcirco prætermittuntur.

Ischuria Vesicales.

18. Ischuria (Cystica) a vesica inflammatione Schacht. instit. practic. Mem. de l'Acad. R. des Sc. ann. 1704. 1753. Boneti Sepulch. lib. III. de urin. suppress. Foresti lib. XXV. observ. 27. 28. Zacuti Lusitani ex Galeno Hist. med. princ. lib. II. Hist. 150. A.

Inflammatio vesicae sphincterem, vel ex Lieutaud ipsius uvulam occupat: addit Schachtius huius tunicae, Diagnosis huiusce speciei fistula ischuricae veræ generica, ut hypogastrii intumescencia, renitentia &c. urethrae perviatio, nec non cystitis. Cystitidis notæ sunt febris acuta, fervida, dolor acerbior, ardens ad perinaeum, accedente interdum huiusce partis rubore, diffensione dolor pariter & ardor ad pubem & exinde ad umbilicum perveniens; dysuria maxima, sæpiissime vero ischuria summo flagrantis meiendi desiderio ac conatu; alvus adstri-

ctor, tensus maximus; catheteris ultra vesicæ collum immittendi impossibilitas, vigilie, delirium, vomitus biliosus, extremorum frigus. Hoc habet peculiare ischuria ab inflammata vesicae uvula tobollescens, quod catheteri non obijciatur resistentia, nisi superatis prolata & sphinctere, æque ita ipso intra vesicam nonnihil jam adacto; & quod obicem catheteri non superandum injecto removeat, subsequente, urinae effluxu. Periculosissima est hæc ischurica species, quæ gangrena, abscessus sæpiissime excitantur. Convenit methodus antiphlogistica; malo vero perstante, tentanda est catheteris immisio lenis, cautissima tandem sub huius in vesicam adigendi impossibilitate, paracentesis ad perinaeum vel supra pubem celebranda, ope acus apicis tricuspidatæ, & tubulo inclusæ hic rectæ, illic rectæ etiam & præparis incurvatæ. Optima Sharp Recherches critiques &c. habet monita circa vesicæ paracentesim in hypogastrio institutam; adversus ischuriam ab inflammata vesicae uvula in locum catheteris ad urinam educendam frustra adhibiti fausto cum successu injectiones. Sufficit Clar. Lieutaud.

19. Ischuria (Cystolithica), a vesica calculo Tulpii observ. med. lib. IV. cap. 37. Essais d'Edinburg tom. IV. Foresti lib. XXV. obs. 23. Fabric. Hildani Cent. III. observ. 67. Car. Pisonis de morb. a colluv. serof. Boneti Sepulchret. de urin. suppress. observ. X. &c. &c. A.

Hanc ischuriam cysticæ speciem facit calculi vesicalis præsentia, quem cognoscere vaga circa pubem & perinaeum titillatione, vel ponderis sensu in iisdem locis, in cellis cruribus divaricatis, erectione penis, frequenti tencimo, dysuria, stranguria, mictione eruenta maxime post equitationem, vel curru unctionem, dolore post mictum in toto urethrae ductu vel ad extremum tantum balanum percepto; genitalium ab ægro crebrius contrectandorum pruritus; ischuria frequenti, fugaci; mictione crebra, derepente, postquam ea institui cœpit, intereisa, mutata corporis postura interdum, vel immisso cathetere haud ægre revocanda; urina crassa, alba, turbida, sub decubitu horizontali facilius fundenda. Symptomata jam dicta modo sæviora sunt, modo mitia & obscura, quin etiam culla, præsentem in vesica calculo non semel observata, per intervalla sæpius, imo post inducias nonnumquam longiores recurrentia; his signis certitudinem addunt, quantum fieri potest, maximam exploratio ope digiti in anum apud pueros, in vaginam apud mulieres immissi, & catheterismus, quo nulla datur via ad alium vesicæ cognoscendum universalior; certior, licet errorem etiam sub quibusdam casibus admittere possit. Hypogastrii intumescencia, renitentia non observantur in hac specie, nisi persistit satis diu urinae suppressio. Calculi in vesica remanentis augmentum inevitabile; pressio, attritus in vesicam, acris calculorum urina, irritationi, doloribus vividis, inflammationi, suppurationi; ulceri vesicæ anam præbent. Is-

churia huiusmodi ad tempus sagatur, mutata corporis positura, repulso per catheterem calculo, cuius radicalis curatio, vel ex lithotomia, repetenda, vel juxta *VVhite*, *Lieutaud* aliosque gravissimos viros, quibus contradicit *Clarissim. de Haen*, ex aquæ calis & saponis usu diuturno. Palliativam methodem sistant diluentia; lenientia, mucilaginoso, oleoso, opiata, lithontripicum *VVhittianum*, & ex *Clar. de Haen* uræ uris pulvis.

20. *Ischuria (cystopastica) a sphincteris vesicæ spasmo* Mercati de morbo intern. cur. lib. IV. cap. 22. Sebaf. Nafii specul. method. med. part. II. pag. 267. Nenterii de Ischur. Schachtii, Gorteri, Gaubii, Varandæ, loc. citat. A.

Cognoscitur hæc species ex signis ischuriæ veræ genericis, urethræ libertate, & spasmis sphincteris præsentia. Constrictionis huiusce spasmoidice, quæ nunc idiopathica est, nunc vero symptomatice, notitia eruitur ex perinæi exploratione, quod durum apparet, dolore ad vesicæ colum, ei simili, qui ex calculo ibidem impactu solet accidere, diverso tamen in eo quod continuus sit in hac specie; nusquam accedat copiosa mictio, & cathetere aut candela immixta exasperetur; ex intestini resti condolentia, ex mictione stillantia, dolore colli vesicæ continuo, acerbissimo stipata, sub violenta omnium potentiarum urinarum expellentium actione, tandem ex causa, ut ex pleniora, ex suppressis catamenii, hæmorrhoidibus, ex ictu, punctura, soluta unitate huius partis minus bene tractatis. Curationem subministrant methodus antispasmodica, opiata antispasmodica, & catheteris prudens immixtio.

Ad hanc speciem referatur ischuria quæ colicam, ileum, entericidem comitatur; *Morgagni Epist. XXXIV. 8.*

21. *Ischuria (cystoplegica) a vesicæ paralyse* Lieutaud compend. medic. de Ischur. Zacut. Lusitan. ex Galeno Hist. 140. Mangeti. Biblioth. Medic. pract. tom. IV. Serane. Thes. pro Reg. Cathedr. Hollerii de morb. intern. cap. 47. Amat. Lusitan. cent. IV. cur. 10. Pringie, *Essais d'Edinbourg*. tom. 3. art. 32. A.

Locum habet hæc species, siue vesicam teneat flupor, anæsthesia, siue musculares ipsius fibræ paracinesia perfecta vel imperfecta resolvantur; siue concurret utrumque vitii genus. Hanc cognosces notis ischuriæ veræ genericis, urethræ libertate, & signis vesicæ torpore, paralyticum indignantibus; hæc ultima eruantur ex prægressu, qualia sunt ictus, lapsus in columnam vertebralem, luxatio vertebrarum, medullæ spinalis vulnus, protuberantiæ nervos in ea parte afficientes, vitia in locis humidis, mortæ in aquis frigidioribus, applicata ad vesicæ regionem, alterius mali gratia, prædicia frigidissima, affectus paranoici, soporosi; ex ætate senili, ex absentia doloris & sensus ab urina excitandi in vesica repleta, & distensa; ex passium aliarum ignavia, frigiditate, resolutione; ex mictione talem, nixum validum similem & præ-

primis hypogastrii pressionem subsequente; ex deficientibus ischuriæ cytoplegmaticæ notis. Valent signa huiusmodi in ischuria nervorum vesicæ sensorium tatum, vel sensoriorum simul & motoriorum resolutioni natales debente; si vero afficiuntur dumtaxat nervi motorii, & modo tradito charactere expungenda venit absentia doloris & sensus, ab urina excitandi in vesica repleta ac distensa, quæ sub hac circumstantia & dolet & ab urinz stimulo molestat. Causam ischuriæ a vesicæ torpore inducit, dysuriam diuturnam & gradatè crescentem urinz paucitatem tandem excipientis, in viro sexagenario fluxum hæmorrhoidalem diu passio a muliercula perperam cohibitu, nobiscum pro sua humanitate communicavit *clar. Chapot*. Dysuriz tempore ægro tumebat ac dolebat prolata, hypogastrium tenebat protuberantia circumscripta, dura, indolens, pro scirrho artis peritis imponens, urinz quotidie parim in vesica resistantia & sensum collectæ natales debens, educto per catheterem lotio evanida, brevi dein reditura; urina difficilior, parcius in dies fluente, accessit demum ischuria; cessante penitus urethræ ardore ac dolore, assiduo catheteris usu per duas menses citra ullum sensum exonerata est vesica; quibus elapsis tandem supervenit febris acuta exacerbens, qua die undecimo soluta est ischuria & redit nativa urinz excretio. Prædicia sunt in hac specie gravi quidem, aut non semel curata, catheterismus repetitus, remedia antiparalytica varia, interna & externa; inter externa eminent thermorum Belliucanarum aqua, lutum, quibus fovebitur hypogastrium, perineum, nec non earundem aquarum purarum aut aqua simplicia plus minus temperatarum facta in vesicam injectio; cum vitio chirurgico natales debet ischuria; huiusmodi modo memoratis addenda venit vitii topici specialis thesapeia.

22. *Ischuria (polyrica) a vesicæ latio diuturno cohibito distensa*. Halleri Prælect. in Boetiauv. Tom. II. §. 384. pag. 336. Foresti. Lib. XXV. observ. 14. Nenter. de ischuria; Parmi Libr. XVI. cap. 48. Sennert. Pract. Lib. III. part. VIII. sect. 1. cap. 4. Etmulleri, Rivetti, Varandæ de ischur.

Hanc ischuriæ speciem in quam incidunt, qui negotiis, loco, verecundia ab urina fundenda arcentur, ipsamque sponte diutius cohibent, siliunt character ischuriæ veræ genericus, voluntaria urinz cohibitio ex ægri relatu accipienda, dolor ad vesicam maximus, assiduus ad urinam fundendam stimulus, subsequente frustraneo conatu, mictio ex hypogastrii summe distensione pressione succedens, causam absentia quibus aliæ ortum debent ischuriæ vesicalis species. Gravis est hæc urinz suppressio, nisi prompte malo obviam eatur, vesicæ atonia, contractionis defectu, inflammatione, abscessu, gangræna terminari solita. Curatio ex præcedenti specie & cystica intelligitur. Fœtus in officio uteri longiores moras necens apud mulieres disto-

eice parturientes facilem inducit ischuriam ex Riolano. *Vide speciel* 28. *varietatum* 3am.

23. *Ischuria (cystopica) vesicalis purulenta* Felic. Plateri Mantill. obs. 29. Camerac. Ephem. Nat. Curios. Yom. II. Zacuti Lusitani ex Galeno. Hist. Medic. princip. hist. 148. Hollerii de morb. intern. c. 47. Sebati. Nafii Specul. method. med. part. II. p. 167. André des maladies de l'urethre observ. 16. Vandermonde Journ. de Med. Tom. IX. A.

Hæc species quæ a vesicæ apostemate, ulcere proficitur, in plurimis convenit cum ischuria nephropica; ab ea vero discrepat notis ischuriz veræ genericis, nec non signis purulentiz vesicæ hærentis. Ab ulcere renum distinguitur vesicæ ulcus loco doloris ad vesicæ collum, in pube; perinæo, perficiendi, tactu, mictione, corporis inflexi erectione exasperandi, doloris ejusdem gradu majori, continuate, sede protuberantiz in præneo, si hæc addit etiam observandæ, cupiditate & difficultate urinæ moribus, renelmo, erectione penis frequenti, urina pus minus cruentum, minus cum ipsa commixtum ac confusum, graveolentius, citra locum, aut ante ipsum quandoque prodians, & nonnunquam squamas furtiveas ac membranulas velente. Potest etiam hæc species renum, imo & aliarum partium apostemati, ulceri deberi; si nempe materies purulenta copiosa, tenax, vesicæ collum occludat ipsi impacta, quod apostematiz & ulcers prædictorum signis nec non generico ischuriz veræ characteribus dignoscet. Vix sanescit præter tim in ætate protracta vesicæ ulcus quod fugata ope catheteris nec non absurgentium attenuantibus maritorum ore assumptum & vesicæ injectionum ischuria, remediis in renum purulentia propositis impugandum venit, additis repetitis per catheterem injectionibus edulcorantibus deterfivis.

24. *Ischuria (cythromboides) vesicalis a sanguinis grumo*, Claudini Consult. 141. Febric. Hildani Cent. III. observ. 66. Forelli Libr. XXV. obs. 20. Zacuti Lusitani ex Galeno Hist. Med. princip. hist. 145. & ejusdem Prax. Med. admirab. Lib. II. cap. 65. Mercati de morb. intern. cur. cap. 12. A.

Hanc speciem indigat hæmaturia prævia prægressæ causæ in ischuria nephrothromboides assignatæ, gravissima symptomata sub eadem specie memorata. Ischuriz veræ signa generica, urina, sub catheteris ad usque vesicæ collum libere addigendi immisione, fluens parva copia, & cum sanguinis ramentis, os catheteris educti cruentatum. Curationem suppeditant catheterismus, radiaca, & quæ sanguinem valent solvere epota, injecta, applicata. *Vide Mercatum, Forestum, Zacutum, &c.*

25. *Ischuria (cythoplogmatica) vesicalis a mucæ* Mercati loc. cit. Schacht. Instit. Med. præct. I. VIII. cap. 9. Erenmulleri de ischur. vesicæ. Amati Lusitani Cent. VI. cur. 11. Zacuti Lusitani Prax. Medic. admirab. lib. II. observ. 64. Boneti ex Thom. Bartolino de urin. suppress. observ. 17. A.

Ex urina turbida mucus refertur ante excretæ, ex viræ genere alimenta recipientem crassa, viscidæ; ex prægressis morbis pituitosis, ex temperamento simili, verbo ex lignis diatheseos pituitosæ in ischuria neurophlegmatica memoratis; ex urethræ perversione, & ex notis ischuriz veræ genericis cognoscitur hæc species, remediis stimulantibus, incidentibus & catheterismo curanda.

26. *Ischuria (cythoplogica) a vesicæ ectopia. (a) Herniosa, seu a cystocèle*, Verdier. Mem. de l'Acad. de Chirurg. Tom. II. observ. 4. 6. 9. 10. 14. Felic. Plater. observ. pag. 830. (b) *Proptæla, seu ab exocyste*, Verdier ex Noel lib. citat. obs. 15. A.

Comitatur hæc species vesicæ urinariæ herniam, & tunica ipsius interioris prolapsum. Igitur, exultantibus ischuriz vesicalis causis aliis, hujus diagnosim subministrant urethræ perversione, & ischuriz veræ, nec non cystocelæ vel exocystes signa. Binæ hujusce ectopiz notas exhibent Verdier, Salzmanni, Dappeli Differentiationes de vesicæ urinariæ hern. seu de cystocèle; exinde etiam ischuriz cythoplogice petenda curatio.

27. *Ischuria (cythoplogica) vesicalis ab intestino recto, scybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abscessu, hæmorrhoidibus turgentibus* Dodonæi Observ. Medic. cap. 47. Schenck. lib. III. de ischur. observ. 6. VVeßperi Dissert. de apopl. pag. 391. Vandermonde Journ. de Med. Tom. IX. pag. 261. Boneti Sepulchret. de urin. suppress. observ. 18. §. 4. Schacht. Gaudii loc. citat. A.

Signa ischuriz veræ generica, intestini recti conditio varia, cum symptomatibus vitia ipsius modo memorata stipare solitis, urethræ perversione; causarum ischurias alias vesicales inducentium absentia hanc speciem determinant, ex principis in nomenclatura recentis hanc ægre eruitur varia quæ ischuriz hujuscemodi competit curatio, in malo consumtiori perita catheteris immisione opus est. *Vide historias allegatas.*

28. *Ischuria (hystero-cystica) vesicalis ab utero, (a) Gravida*, Nordmann. Dissert. de Ischur. gravidar. Mauriceau lib. I. cap. XV. Roderici a Castro Lib. II. cap. XV. (b) *Parturiente*, Bonetti ex Riolano de urin. suppress. Vandermonde ex Daran, Journ. de Med. tom. V. (c) *Hydropica*, Hippocrat. de morb. lib. 12. Sennerti Pract. Libr. IV. part. I. sect. II. cap. X. XI. Schenck. Libr. IV. de mol. fals. Schachtii, Gaudii loc. citat. (d) *Tumoris distensio*, Gaudii, Schachtii, loco citat. Sennerti ibidem ac supra capite XIII. Knoefelli E. N. G. ann. IV. (e) *Prociduo*, Nordmannus Dissert. citata & Sabatieri Memorie de l'Acad. de Chirurg. Tom. III. Sennerti ibidem, ac supra capite XVI. A.

Uterus fortis, mola, sanguine, sero, flatu distensus, inflammatione, scirrhus, cancro dilatatus, prolapsus, inversione & sede nativa emortuus, facta in vesicæ collum, & quandoque etiam in urethram pressione, ischuriz hujuscemodi

modi anam præbet. Cognoscitur hæc species notis ischuriæ veræ genericis, graviditatis præsentia, partu imminente, hydrometra; protuberantiarum uterinarum, hysterophtosios, verbo memoratorum uteri affectuum signis, tandem cæsarum defectu ischuriæ vesicales alias inferentiam. Ischuriæ a graviditate prospicit fetus horizontalis & reclinatus, abdominis ab ossibus pubis ope manuum remotio, elevatio, & his non proficientibus, catheterismus assiduus ad imminuentem usque partum continuatus. In ischuria quam facit parius laboriosus diuturnior urget profecto, lotii educendi necessitas: verum oblat catheteris vulgaris in vesicam agendi difficultas, impossibilitas: in his rerum angustiis cum bonis ægræ rebus in catheteris metallici locum candelam tubulosam suffecerunt *Daran* & *Leuret*. In ischuria ab hysterophtosi præsidio sunt decubitus, uteri positio, in sede nativæ firmatio. Vide *Sabatier*, *Puzos*, *Leuret*, &c. Secunda & tertia huiusce speciei varietas catheterismus & affectuum uteri memoratorum curationem expostulat, apud *Sennertum*, *Mercatum*, *Astrucium* de mulierum morbis legendam.

29. Ischuria (arreturum) urethrocyfica a menstruis in vagina retentis. Amyand Transact. Philos. ann. 1732 num. 442. art. 8. pag. 45. Schenck lib. IV. de part. genit. mulier. observ. 9. Heister. Chirurg. Tom. II. pag. 951. Astruc. de morbis mulier. Tom. I. lib. 1. cap. 5. A.

Notæ ischuriæ veræ genericæ, sanguinis uterini retentio in vagina per membranam, per carnem crassam ac densam, per parietum vaginæ, caruncularum myriformium, laborum vulvæ in feriorum concretionem clausa, hanc speciem designant. Fortior coactio ope earum substantiæ densioris difficulter curatur, clausuris vaginæ reliquis, aut sanguinis congeelli vis, aut coitus, aut chirurgiæ medentur; partium concretarum separatione, membranæ præterse sectione, sanguini retentio via referatur, & ischuria inde oriunda tollitur. Vide *Heisterum* & *Astrucium* loc. citat.

Aliz præter memoratas, apud Auctores occurrunt ischuriæ vesicales species; ut ischuria a tumoribus vesicæ glandulosis & sphincteris ipsius callositate *Reislii* Eph. Nat. Cur. Dec. 11. an. 2. Ischuria a carunculis & resoluta renum substantia oriundis, & vesicæ obstructibus *Schenckii* ex *Hierac. Sasonia*, lib. 3. de ren. carunculis. Ischuria ab inersatione vesicæ calculosa *Schachtii* de ischuria. Ischuria a protuberantiis intra vesicam enatis, ipsiusque collum claudensibus *Boneri Sepulchre. de urin. suppress. passim*. (Huc ischuria a vesicæ fungo *Sebachii*, ischuria a vesicæ varicibus *eiusdem*, ischuria a tumore insolito & vesicæ infernx parietibus intus enato *Magillii Effais d'Edimbourg. Tom. IV. &c.* Ischuria a vesica in se ipsam per intestinum inversa *Fouberri Mem. de l'Acad. de Chirurg. Tom. II. pag. 37*. Ischuria a vesicularum seminalium protuberantia *Scirrhouea Gaubii*, *Pathol. 5. 810*. Ischuria ab steatomate vesicæ

adjacente, huiusque collum premente *Bartholini cent. 1. hist. 23. &c.* quas omnes niillas facimus brevitate consulentes.

30. Ischuria paradoxæ, Morgagni Epistol. Le Clerc Journ. de Med. Juill. 1755. p. 11. L.

Est hæc species ischuriæ in qua successively distenditur hypogastrium, crescente tumore magis ac magis fursum, eoque duro, ab urina haud dubie intra vesicam cumulara, & interea, non solum per intervalla sed fere stillatim fluentibus urinis per urethram, quæ observatio apud *Morgagni* iterata clare evincit ischuriæ characterem, non ab urinz pressione, sed ab hypogastrii tumore repetendam esse. In casu *Clar. de Clerc*. non sufficienter fluebant urinæ, quia vesicæ orificium seu collum induratum partim veicæ effluxui resistebat, ratione cujus resistente, veicæ reactionis vi dilatabatur in dies: sic cum aqua in tracheam magna vi iniecit pulmones continuo intumescunt, licet undequaque ex eorum superficie aquæ rivuli prorumpant.

Ischuria urethrales.

31. Ischuria (perinaalis) urethrali a perinaali tumore Galeni lib. de affect. loc. & ex eo Zaccut. Lubitan. Histor. 149. Vandermonde ex *Daran* Journ. de Med. Tom. V. pag. 291. Tulp. Observ. medic. Lib. III. Cap. X. Foresti Lib. XXVI. observ. 2. A.

Perinæum inflammatione per istum, lapsum, aut aliam quamlibet causam inducta tumens, apostemate, exerecencia, aut alio duriori tumore tentatur, urethræ principium premendo, hanc speciem indicat, in subiecto aliarum vesicalis ischuriæ causam immuni cognoscendum ex notis ischuriæ veræ genericis & perinæi protuberantia varia. Speciei huiusce varietas inflammatoria postulat venæ sectiones, laxantia assiduo applicata, balnea, hypogastrii pressionem; tandem catheterem, ac præparatis candelam *Daran* tubulosam. Varietati apostematose competit abscessus agertio, absterio, ciatrificatio; graviores certe sunt varietates sarcomatica & scirrhouea catheterismo & affectus chirurgici congrua tractatione debellandæ.

32. Ischuria (urethrolithica) a calculo urethrae in passu *Schmidii* Eph. Nat. Cur. Decad. I. ann. VII. observ. 80. *Vinckleri* ibidem Tom. VI. observ. 34. *Zacuti* Lubitan. Præx. Med. admittab. lib. 11. observ. 66. 67. 68. *Tulp. Observ. medic. Lib. III. cap. 8*. *Boneri Sepulchre. de urin. suppressi* observ. 14. *Bartholini Cent. IV. capit. 5*. *Heisteri Chirurg. Tom. III. pag. 839. A.*

Noscitur hæc species ischuriæ veræ characterem generico, constitutione: calculosa, dolore maxime ad urethram & penem, urethræ intumescencia, imperviatione, canalis huiusce concretatione, qua quid duri palpato obicitur, immisione catheteris, antequam in vesicæ collum pervenerit corpus offendenti solidum, &c.

li. 8y.

si stylo ferreo percussatur, subargutum. Curatur autem venæ sectione, anodynis, laxantibus, epotis, applicatis, iniectionis, balneis, leni penis expressione, suctu, specillo, uncinulo, & his non succedentibus facta supra calculum firmatum sectione, cujus celebrandæ ac percussandæ methodum vide apud *Hæsternum loc. cit.* Ischuriam a calculo intra rectum latente memorat *Journ. de Med. de Vandermonde Septemb. 1758. p. 261.*

Ex ischuriarum cythrophlegmaticæ, cythromphoboidis, & cythrophicæ diagnosi, atque urethræ imperviatione intelliguntur sequentes ischuriæ urethralis species, scilicet.

33. *Ischuria (urethrophlegmatica).* Ischuria a mucosæ urethræ infarcente, Boneti Sepulchr. & Medic. Septentrion. Mangeti Biblioth. Medic. Practicæ. Amati Lusitani Cent. V. obs. 71. Forelli Libr. XXV. observ. 25. Varandæ de ischuria. Lud. Apini Eph. Nat. Cur. Decad. III. ann. III. observ. 69. A.

34. *Ischuria (urethromphoboides) a sanguinis grumo urethram opplente,* Boneti Medic. Septentrion. de ischuria & Sepulchr. de urin. suppress. observ. xi. Forelli Libr. XXV. observ. 25. &c. A.

35. *Ischuria (urethrophica) a pure urethram obstruente,* Boneti Medic. Septentrion. de ischuria. Forelli Scholio modo citato; Boerhaave Præfat. aphrod. &c. &c. A.

Ischuriam ab abcessu inter vesicam & rectum posito urethram premente refert *Vandermonde Journ. de Med. Septemb. 1758. pag. 263.*

Urethralis hujusmodi ischuriæ eadem admittunt auxiliorum genera quæ ischuriis competunt vesicalibus a causa simili oriundis.

36. *Ischuria (urethromyomeres) a membrana in urethram impacta.* Hist. de l'Ac. R. des Sc. ann. 1714. hist. pag. 22. A.

Viro summa urinæ difficultate vexato, & catheterismum pluries passio; catheter, qui plus minus ab urethra eductus nigrescebat, cum membranzæ fragmento quondam extractus est. Triduo post pensavit æger quidpiam urethram obturans, & e balani orificio prodians, quod avulsit digitis arreptum; membrane tunc fragmentum aliud. Haud ita diu dum ad mingendum summe allaborabat; intra breve tempus tria alia membranzæ fragmenta ejecit, quæ duos membranzæ vesicam interne obversientes trientes efficere visa sunt; revera fuerunt illius membranzæ partes fragmenta hujusce modi, quibus emissis libere fluxit urina nullo unquam tincta immixto sanguine. Virum dein detinuit levis urinæ incontinentia. Similium membranzarum per urethram excretarum, quamvis citra ischuriam mentionem injiciunt *Villifusus, Felix Platerus, Schenchi, Fabric, Hillanus, &c.*

37. *Ischuria (urethremielica) urethralis vermiformis,* Joan. Petr. Albrecht. Vide Boneti Medicinam Septentrionalem de urin. c. 31. & Mangeti Biblioth. Medic. pract. Tom. IV. de morb. urin. spectant. Vandermonde Journ. de Med.

Septembre 1758. pag. 245. Joan. Rhodii Centur. 3. observ. 36. Collect. Acad. Tom. 3. pag. 497. obs. 77. A.

Plura verum et vesicæ urinaria cum lotio excludorum exempla reperire est apud Auctores. Sequentem ischuriæ et verne urethræ opplenti inductæ causam memorat *Albrechtus*. Septimus Jun erat dies, quo militem excruciatum omnimoda urinæ retentio cum summis circa umbilicum doloribus, regionis hypogastricæ tensione & abdominis tumore acitico non abluim. Nihil profecerunt quæ diebus sequentibus tum interne, tum externe adhibita sunt remedia. De catheter in vesicam immittendo cogitabatur cum æger post multos conatus, laboreque per urethram vermenem ejecit vivum, crassit'e calami scitptorii, & trium digitorum longitudine, redeuntis prorsum excernendi lori facultate, quod per aliquot dies sanguine mixtum, sincerum tandem emissum est. Rarissimæ hujusce ischuriæ eventu potius quam certa nota cognoscendæ curationi suffectus sumus.

38. *Ischuria (urethritica) ab urethra inflammatione* Hildani Cent. IV. observ. 54. Forelli de interc. urin. judicis, Lib. III. cap. 3. versus finem; Varandæ de aff. trib. ren. & vesic. cap. viii. Boneti Medic. Septentrion. de ischuria cap. 2. n. 2. Goulard des maladies de l'urèthre; Heisteri Chirurg. Tom. 2. pag. 838. A.

Generales inflammationis cnuise, gonorrhœa, catheterismus rudior, devius, faucians, aut frequentior, licet artificiosus, candela aciores immixta, litus mercurialis in urethram urgente dysuria gonorrhœa, &c. hanc speciem accersunt, notis ischuriæ veræ genericis, urethræ imperviatione, signis inflammationis generalibus, nimirum dolore, calore, tensione, febre, &c. & causa prævia cognoscendam. Curatur hæc species methodo antiphlogistica; cathetere, non statim quidem adhibendo; verum inflammatione paululum temperata, aliquoties per dies singulos sensim immittendo, demum paracentesi ad pyrenzum vel supra pubem, si antiphlogistica omni genera malum aspernetur, nec catheteri in vesicam aditus pateat.

39. *Ischuria (carunculosa) a morbis,* ut vocant, *urethra,* Amati Lusitani Cent. IV. cur. 19. Cent. V. cur. 48. Sharp Recherches critic. cap. iv. Goulard des maladies de l'urèthre; Heisteri Chirurg. Tom. II. pag. 834. André des maladies de l'urèthre, passim. A.

Morbi, ut vocant, urethræ, sunt spongiosi sui textus intumescens, hujusce canalis varices, ulcera, cicatrices, contractio, collostitas, fungos, duplicaturæ membranzæ, verumontani, intumescens spongiosa, scirrhus, glandularum urethræ lacunatum, Cooverianarum, Littreianæ, prostratæ tumores, ulcus, collostitas. His omnibus non solum angustatur, verum etiam tandem præcluditur urethra. Ischuriam hinc enatam signis cognosce ischuriæ veræ genericis; urethræ imperviatione, seu plenaria obstruptione, signorum ischuriæ urethralis phlegmaticæ pul-

rulentam, grumofam & præprimis calculofam indigentium abfentia; quibus omnibus præcefferunt dysuria, ftanguria, flum urinx tenuæ, flexuofum, gradaria fuppreffionis urinx accelfio, caruncula minoris cathetere, aut candela olim facta detectio, & utplurimum gonorrhœa virulenta. In ifchuria hujufcemodi varietate quam facit proftatæ affectus fymphilitis expertus, ex glandulæ illius intumefcentia eo in cafu femper præfente, urethræ principium fumme ardeante, & digito in anum immiffo optime percipienda potiffimum eruitur diagnofis. Curatur gravis hæc ifchuria candelis fimplicibus & maxime compofitis, ut Daranienfis, Andreanis, Goulardianis Sharpianis, quæ fi non facis cito urinam eliciane, infiftenda eft velicæ paracentefis in perinæo, & præprimis fupra pubem, (fectio urethræ lithotonix urethrali fimilis in quibufdam cafibus locum poteft invenire) lozio per cannulam fingulis diebus educto, continuatur candelarum ufus, donec debita urethræ reftituta fuerit libertas. Vide *Sharp Recherches critiques &c.* & *D. Perierii Differtationem de bradyfpermatismo ad fpeciem primam*. Monuiffe fupervacuum eft fymptomatibus urgentioribus pro re nata per auxilia congrua occurrendum effe dum chirurgia paratur, ut tentatur obicem urethralium cora. Affectum proftatæ qui veneri non funt curationem certe difficillimam prætermittimus, ex inflammationis, apoflematis, fcirrhii, therapia petendam.

40. *Ifchuria (hydrocalodes) ab urethra rupta in fcrotum hians* Joan. Lud. Apini Mifcellan. Natur. Curiof. Decad. III. ann. III. obferv. 68. A.

Vir fupino in terram lapfu inter femineum cum tefticulis & fcroto graviter impiegit, diffracto arboris arunco, inſequentibus ifchuria, atque ingenti fcroti tumore, quod die 3. adeo increverat, ut pilei capacitate non interaffet, colore atro fuſſum; intumuerat etiam horrendum in modum penis gyris tortuoſis, ut in hydropicis folet, in fe reflexus. Remedia varia ad ſolvendum ſanguinis grumum, qui ifchuriæ hujufce adjuſtor primum credebatur, & ad demulcendam fibrarum violentia externa læſarum criſipationem ineus & extus adhibita ſunt 4. verum irrita opera, fcroti tumore ad ſenſum auctiori, & ægro, quoties urina exitum urgeret, miſere ejulante, atque ardorem in fcrotum deſcendentem conqueſſo. Suſpicio tunc fuit urinam ex urethra rupta in fcrotum colligi, idque eo magis, quod digitem explorantem in perinæo ad penis radicem, ubi urethram falvis exterioribus ruptam fuiſſe oportet, æger ferre non potuerit. Itaque ſine mora cautis ſimul & profundis ſcarificationibus incidebatur fcrotum; effluebat illico liquoris ſeroſi odorem urinoſum ſpirantis copia, ſanguinis vero nihil. Imponebantur linimenta calida ſpirituofis & antiſphaceloſis madida; lætus rubere & ſero ad vim non exiguum exſtillante notabiliter demefcere cepit fcrotum, per quod omnem uri-

nam externi & quidem ſine notabili dolore die 5. certo conſtabat; vulnerarias injeſtiones in urethram factas, & digeſſiva ſcroto applicata ita ſauſtus ſequabatur exitus ut die 10. dimidium urinx per viam ſolitam, reliquum vero per ſcrotum efflueret, quæ tandem omnis per urethram die 21. emiſſa eſt. Vide citatum Auctorem.

41. *Ifchuria (cryptica) a penis intra corpus retractione*. Frid. Hoffmanni conſult. de morbis abdomin. Caf. 105. An.

De penis intra corpus occultatione. obſervationem ſiſtunt *Paulus de Sorbait & Joannes Schmidius*. Hujus qui ifchuria junctæ ſequens exemplum legitur apud *Hoffmannum*. Vir. 30. annos natus, litterarum amantiffimus, alvi tardioris, de ingigni artuum, pedum maxime frigore per æſtatem etiam aſſigente, atque per hyemem non niſi fortiori corporis motum depellendo, anno ſere integro conqueſtus, deinceps obſervabat, quod, ſi hiemali tempore in frigidiori loco diu commoratus eſſet, aut ſi crebrius ipſi deſcendiſſet alvus, ob colem intta corpus retractionem ac ſere proſus occultatum, urinam non prius emittere valeret, quam donec poſt aliquam corporis exercitacionem naturalem ſitum penis recuperaffet. Plura vide apud *Auctorem citatum*.

42. *Ifchuria (peridſmica) a vinculo ſtriſſiori peni injeſto*, Boneti Medic. Septentrion. de Ifchuria cap. 1. n. VIII. A.

Pueruloſo filo ad radicem balni circumligato paraphimofim ſibi excitare in Noſocomio generali Monſpelienſi pluries obſervavi; quin etiam exinde colem tranſverſum ſenſim ac penitus ſciſum vidi, nulla labe inſequeret. Pueri quidam qui lectum ſolent commingere & ideo acerbis a parentibus excipiuntur, verborum declinandorum cauſa, injeſto peni arctiori vinculo, ifchuriam ſibi comparant referente *Boneto*, ſoluta pronitus ligatura fugandam.

44. *Ifchuria (phimofica) urethralis, a phimofi*, Horſtii tom. II. lib. IV. pag. 274. Goulard des maladies de l'urethre, Heiſterii Chirurg. tom. II. pag. 818. Bonet. Sepulchr. de ifchur. obſ. XV. &c. A.

Phimofis a præputio native vel per coalitum non patente; phimofis a præputio inflammatorie vel aphlogæ mirum in modum incruiſtato citra concretionem; phimofis a præputii cum balano concretionem ad urethræ oriſcium, imo & etiam intra ipſum facta, hoc ultimum in ſenibus obſervante *D. Serres Chirurgo Monſpelienſi dexterrimo*, hanc ifchuriæ ſpeciem excitant de facili ſane diagnoscendam. Phimofeos pro varia ipſius ſpecie, atque ita ifchuriæ exinde ſoboleſcentis curatio obtinetur per laxantia, reſolventia, diſcutientia, mercurialia &c. & per ſectionem chirurgicam variam. Vide *Auctorem Chirurgiam*.

45. *Ifchuria (apſidalis) ab urethra clauſura*, Heiſterii Chirurg. tom. II. pag. 818. & 951. Horſtii tom. II. obſerv. 55. Joann. VVieri obſerv. pag. 221. Boneti Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. obſerv. XV.

XV. Schol. & Medic. Septentrion. de ischur. cap. 2. §. VI. A.

Hanc ischuriam speciem faciunt, 1. parietum urethrae in sui tractu vel in extremo coarctatus adventitius, aut congenitus; 2. canalis hujusce exteriori obturatio per membranam adnatam; 3. laborum vulvae concretio plenaria. Cadit in scilicet quod sexum tantum ultimum vitii genus, reliqua vero in utrumque. Quoties malum urethrae extremæ hæret, vel obicitur, facillima est ischuria hujusce diagnosi, difficius quidem ob tinenda, si urethrae interiora coarctata teneat, circa quod vide *Bonisi Medicinam Septentrionalem loco citato*. Curationem quilibet speciei hujusce varietati accommodatam non trademus; monuisse satis erit ab Auctoribus allegatis varia indicari media quibus chirurgus ut plurimum novit urethrae partem concretionem nativam obturatam referat, coarctata vulvae labia separare, aut saltem si gravissimæ tollendæ veniant concretiones, artificialem aperturam in viarum naturalium locum sufficere.

Alias ischuriae urethralis species, ut Ischuriam urethralem suppletam *Horsii tom. II. ob serv. 55.*; Ischuriam a colicis distorsione *Gaubii Pathol.* Ischuriam a penis musculis ejusdem *ibidem* &c. nihil moræ manu de tabula tollimus.

ORDO QUARTUS.

TUBERAE.

Extuberantia Felic. Plateri.

Si superficiei corporis deformetur oboreis tumores firmi, duri, pertinacissimi, ut accidunt in scrophula & cancro, vel partibus ossibus inaequaliter excrecentibus, ut in rachitide, tumores hosce frigidos, constantes, firmos, tubera vocamus, modo sat notabiles sunt ut morbis accenseri queant, secus ut verrucas ad vitia amandamus.

Felic. Platerus, nostrae Monspeliensis Facultatis quondam præclaram fidus, primus ausus est novam Nosologiam condere & methodum symptomatice alii præmonstrare; is autem hanc ultimam Classem in ordines quinque distribuit nominis satis apte respondentes, scilicet in deformationes, discolorationes, extuberantias, fœdationes & consumptiones.

XX. RACHITIS; Rachitis; Rickets.

Cognoscitur in infancibus a tumore flaccido capitis & faciei, a cute laxa, a tumore abdominis, musculorum macilentia, proeuberantia epiphyllum, venarum arteriarumque magnitudine, collo flexili, capite notante, pigritia ad ambulandum, ingenii præmature acumine, sensuum sincero exercitio, fame & digestionem ferme illis.

1. *Rachitis nodosa*; *Rachitis incipiens* Boerrha-

ve 1485. *Le Nouage*, Puzos Malaïes des enfants chap. 7. *Ægii Novis, Rachitiques*.

Hujus signa sunt, 1. phyconia, seu abdominis intumescencia; 2. asthenia seu infirmitas totius corporis, quietis, amor, motus, vel progressus averlatio; 3. dentitionis tarditas; 4. pedum, genuum, corporum crassities insolita, capitis moles major; 5. lumborum debilitas, instabilitas, ob erutum & tibiarum laxitatem; 6. voracitas cum macie partium carnosarum, &c.

Rachitis Britannica differt a nodosa quod ætate provectiones & dentitionem jam passos ferè biennies afficiat, acumen ignis præmaturum, progressus impotentiam aliaque signa ostendat suo loco relata, non itaque diversa species, nisi quod ratione ætatis alium victum, aliam curam exigat. Principia sunt, 1. hereditarium vitium a parentibus, venere, ætate exhauritis, cacochymis, sphepticis; 2. nutriti isdem vitiis effecta, vini potatrix, lactis inops, pulcem, vinum, cerevisiam alumnio propinans, cupidias saccharatas offerens, graviora dum lactat; 3. maturior ablactatio, convulsiones prægressæ, dentitio difficilis, progressus involuntarius, cum epiphyses nondum firmatæ sunt. Circa nonum vel decimum ætatis annum rachitis solvitur primum, & deincepsque adolescente corpore iterum nodus, ut ajunt, expeditur, id est tumores articulum imminuuntur & crescit corpus; illa autem nodorum solutio in quibusdam diarrhoea, vel alio symptomate notatur.

Cura vix ulla medicaminibus expectanda, sed ab aeris & regiminis ætatisque mutatione; aer itaque statim mutandus; si lac nutritis vetus sit aut viscosum, altera nutriti adhibenda; si ablactatus infans fuerit, ueatur ossis, jusculis, pane bene fementato, non vero pultibus ex farina & lacte paratis; aquam potet aliquot tincturæ martis guttis alteratam, levi Rhei tinctura aquosa etiam identidem utatur, semel in mense purgetur syrupo de cichorio composito; nodosi viri leviter fricentur cum oleo aromatico & vino rubro: insolatio tecto capite in quibusdam regionibus laudatur, a præmature incessu caveatur; in sella perforata vel in lectulo, capite ope pulvinaris crecto, sedeat. Quomodo differat hic morbus a cachexia scrophulosa, vulgo *charrette*, quacum nomine Gallico sæpe confunditur, suo loco videatur.

2. *Rachitis Britannica*; *Rachitis Glissonii*, Daverny Malad. des os tom. 2. pag. 288. *Ægii Novis*. *Rickets* vel *Riquets* primum innotuit in Occidentali Angliæ parte circa annum 1540.

Oritur circa sextum ætatis mensem, & ad tertium annum ut plurimum perseverat, rarius ad sextum, rarissime ad duodecimum, rarissime totam vitam comitatur. Caput Rachiticis majus solito, facies plena & carnea; ingenium præcox, judicium ætate majus; cutis in reliquo corpore laxa, rugosa, musculi flaccidi; abdomen crassum, tensum, hepate & liene magnis,

ventriculo & intestinis flatu distensis; glandulae mesenterii ut in atrophiam rachiticam tumidae, pedus a lateribus compressus, sternum prominente, angustum, unde dyspnœa, pulmones rubri, scirrhosi; thymus & glandulae œsophagi tumunt; serum in thorace effunditur, cretbrum sæpe molle ut medulla spinalis. Serum in sinibus; carnes albidæ, flaccidæ, decolores; cruor aquosus, fluxilis; ossa cranii, artuumque teneriora, flexilia; claviculae incurvæ, humerus cubitus & radius intorsum flexi, ossa carpi, metacarpi, digitorum tumunt, femur retrorsum incurvum, condylus inæternus non magis protuberat quam externus, collum femoris ferme horizontaliter; tibia & peronæum extorsum curvantur, nec tibia perpendiculariter infidet astragalo; per extorsum disijcitur, adeoque a linea directionis gravium recedit, hinc claudicatio anatina seu ad dextram & alternatim ad sinistram partem facta animum instat. Epiphyse tumunt, unde cæstærum extrema nodosa, intervalla angustiora, latitudo major, dorsum fornicatum; spina antice incurva, unde collum breve & humeris immersum, columna vertebralis ponderè depressa, quandoque circa lumbos inflexa, hinc gibbifixa; ossa innominata intus flexa, unde pelvis angusta. Ossium substantia mollis, superficie inæqualis, cuberosa, in crustata, porosa, foraminulis saniem rubram fundentibus si premantur, colore griseo, levia, teneriora, fragilia, turgida; hinc quæ cubica erant sphaeroidea videntur; medulla abundantior, sed fluidior. Germia dentium abortiunt, quia rachitis eodem quo fit prima dentitio tempore, supervenit; pauci rachitici circa decimum ætatis annum videntur qui non sint edentuli.

Rachiticum virus in ætate provecta suboritur suadet arthritide rachitica.

Ossa artuum sunt in statu sano paululum incurva, & ex eadem parte numerosiores sunt musculi; illa nativa curvatura in cachecticis augecur; unde major evadit in cruribus quam in brachiis.

Principia rachitidis sunt, 1. cibus crassius qualis pauperum, lac vitiosus; 2. morbi graves prægressi, maxime dentitio difficilis, eclampsia; 3. virus quo serum copiosius acre evadit, quo ossa remollescunt. Quo citius accedit rachitis, seu quo juniores aggreditur, eo pejor est; apud infirmos curvatura ossium serius perleverat; qui ante octavum annum non sanantur, tota vite infirmi remanent; quo curvatura artuum major, eo difficilior & gravior morbus; si scabies rachitidis superveniat, bonum; puellæ quæ ad decimum circiter annum rachitice fuerunt, difficilior pariunt ob pelvis angustiam.

Indicantur ea medicamina quæ digestionem corrigunt, serum superfluum intestinorum & renum via evacuant, cathartica roborantia, diuretica quæ fluida crassa leviter attenuant, maxime si scrophulosum virus accesserit, cavendum a motu musculari, in lecto quiescendum quandiu ossa molliora sunt; vide *Borhaave de rachitide*. Laudantur lac chalybeatum, nec non pulvis hederæ

terrestris; vide atrophiam rachiticam; imprimè consulari Sydenhamus.

3. *Rachitis strumosa*; La *netionne scrophuleuse* Giffon. de rachitide. C.

Ex est quæ cum glandularum colli, aut mesenterii obstructione conjungitur, nec non quæ a parentibus syphilide infectis ortum ducit, in qua lacticia & æthiops mineralis, vel increturius dulcis cum aliis maritanda sunt.

Pulvis hederæ terrestris per novem dies ad grana scx laudatur.

4. *Rachitis Calmueana*, Histoire des Voyages.

Calmucii juxta mare Caspium habitant, illis facies lata & depressa, oculi quatuor vel quinque digitis transversis ab invicem distant, & minimi sunt; ita simi ut pronas duotantum sint f ramina; genua interorlum, pedes vero extorsum veigunt.

Vagelista in Sibiria, & *Daghestani* eadem forma gaudent uqa Calmuci.

Rachitidis spurie nomine Sydenham intellexit atrophiam rachiticam, cap. 5. de febribus intermitt. pag. 59.

Curam pro rachitide vera simplicissimam is proponit, scilicet potum roborantem ex vino, vel cerevisia in qua infusa sunt herbe absintii, centaurei minoris, chamædrys, scordii, hyperici, virgæ auræ; & unguentum ex hoc vino & axungia paratum, quo abdomen & artus sero & mane illinantur per mensem & ultra, abstinendo a repetitis catharticis.

5. *Rachitis Polonica*, Vide Stabel. de Plica Polonica dissert. histor. 11. observ. 8. a scabie Fr. Hoffmanni III. 408. C.

Cognoscitur ex doloribus arthriticis vagis, tumoribus strumosis colli, tuberculis, & exostosis variis, ossium fragilitate, nonnumquam superveniente gibbositate apud pilulos familiari, unguitibus lividis, incurvis, scabris, deciduis, fracturis spontaneis, quæ omnia diversis historiis confirmat Auctor.

Remedium est plicæ evolutio, origo hujus imprudens abscissio, medicamentum ex lycopodi decocto, si plicam iterum evolvete queat.

6. *Rachitis elephantia*.

Observabitur olim in elephantiasi inverteata, ut testantur descriptiones hujus morbi lepræ Arabibus dicti apud Gilbertum Anglum, & Gordonium, nec non in elephantiasi Javanensi, quam Cleyerus descripsit, imo iconibus delineavit.

6. *Rachitis a castratione*; Agri castrati.

Castratio fit apud lialos testiculorum extractione aut contritione: illos eunuchos, istos thlibias vocant Justiperiti: ætas apta est circiter annus sextus; operatio vitæ innocua est, modo sub debito regimine per quadraginta dies castratus, in senectute deservat. Pueri huius se submitunt operationi ut vocem canoram obtineant & personam theatro utilem agere possint, ast castrati, cum puberes evadere, rachitidis speciem statimur insanabilem; scilicet genua ipsis intumescunt, crura divaricantur, dorsum amplum quasi gibbosum evadit, facies altera sexagesimum

ætatis.

vetatis annum flavescens luridaque est; imberbes semper sunt, pingues, ipsis vox acuta, magis suavis quam foemina, ad senium perstat. Castrati in scena agunt personam marium & foeminarum, immunes putantur ab herniis, non a libine. Hæc operatio, summorum Ponticum quibusdam bullis prohibita, toleratur.

XYI. SCROPHULA, J. Allen Synopsis;

Scrophula & Struma cæterorum Auctorum; *Chenirades* Græcorum; *Kings-evil* Anglis; *les Escrouelles*. Ægri *Scrophulosi*, Gallice *Scrophuleux*; *Escrouelleux*, *Glandes*. *Farcineux*.

Cognoscitur ex strumarum proveniunt in collo, mesenterio; aliisque locis, labii superioris, natiq;e crassitie solito majori, facie turgida, &c.

Struma vero sunt singuli illi tumores sphaeroides, duri, cuti concolores, indolentes, veræ lupiez, seu intra tunicam humore pingui, crasso tactæ.

Scrophula itaq;e est concurfus diversorum symptomatum, quorum præcipuum est strumarum in collo proveniunt.

Scrophulosi majorem cæteris pueris ingenii vividitatem, & præmaturam intellectus vim obtinere consueverunt; morbus hic statim sine ulla fere mutatione permanet usque ad virilem ætatem, quo tempore recidit, & tunc robustiores, æque ab aliis morbis frequentius immunes sunt scrophulosi, observant J. *Quincy Effat asche Evil*.

Pendit hic morbus a quadam vitio lymphæ glandulas conglobatas irritantis, quod ab ortu contractum non evanescit, nisi cum adolescentis vires digestivæ adauctæ hoc vitium corrigere valuerint.

Illæ glandulæ scirrhoræ sub duplici facie videntur, scilicet sunt vel integræ, vel suppuratæ; integræ quidem nascuntur, & sine ulla erosione diu permanent; ast vel sponte, vel male tractatæ suppurantur, & his sanatis cicatrices foræ per totum vitæ decursum collum deturpant.

Huic morbo sues & feles obnoxiosæ esse vulgo færent; interea sues minus scrophulæ quam chalasi sunt expostæ, & ideo non scrophulosi Gallis, sed leprosi, *Ladres* vulgo nominantur.

1. *Scrophula vulgaris*, VVarthoni Adenograph. cap. 40. *Les Escrouelles propterea dicitur*. L.

Cognoscuntur ex tumoribus duris, pisi, fabæ, cassanæve magnitudine concatenatis, cuti concoloribus nisi inflammantur, quæ non solum collum, maxillamq;e ambiunt; sed etiam sæpe ad axillas, inguina, & intus per mesenterium diffunduntur: hæ indolentes sunt, mobiles, vel fixæ, aggestæ, cum labii potissimum superioris, natiq;e crassitie, genarum ad aures turgescencia; pueris familiares, in adultis evanescentes, nisi cicatrix superstes sit, rarissime in foeminis quinquagenariis revertentes.

Hic morbus est sæpius congenitus, quandoque hæreditarius; frequens est apud eos quorum pa-

rentes syphilide fuerunt infecti, nec non apud pauperes qui cibis crassis utuntur, & locis humidis inhabitant; per se vix lædit functiones, sed non raro vel admotis remediis suppurantibus, vel ob pravam sanguinis constitutionem strumæ suppurant, quod non nisi difficulter & lentissime fit, & tunc hecticam sibi adiungunt comitem; periculum autem certum inferunt illæ strumæ, quæ pulmones aliq;ue viscera infarciunt; certe maxima pars phthisimum est de scrophulorum numero; scrophulosi pueri in Nosocomiis morbis multis insaniabilibus sunt obnoxii, ut asciti, diarrhæis, hecticæ.

Virus scrophulosum vetus & peioris indolis ulcerata in diversis corporis partibus inducit pertinacia, fordida, digitos non raro carie afficit, articulos aggreditur, & eos in tumores atrolicis, unde ancyloses, præarthrocacæ, infinitaq;e alia mala sepius insanabilia, ita ut strumæ, seu tubercula colli sint exigua pars totius morbi scrophulæ dicti. Scrophula dividi debet in occultam, seu non suppuratam, & in exulceratam, quæ quandoq;e diversas corporis partes foras ulcibus deturpat; verum ejus morbi & specierum utrumque valde frequentium nulla datur hæcenus fidelis & accurata historia.

Curatio sæpius est noxia, aut saltem frustranea; noxia, si per externa medicamina suppurantia, aut quod pejus est caustica, aut demum per excisionem tentetur; inde etenim uberius strumæ progrediuntur, acrius inflammantur, pertinacius exulcerantur. Frustranea est, quandoquidem, si strumæ simplices sint, non exulceratæ, eas attingere vanum est, saltem cum successu temporis dum adolescit corpus, ipsæ sponte diffluunt.

Necessaria est tamen curatio; si acris sit lymphæ, si suppuratæ sint strumæ, si eo usque indurata & tumida, ut circulationi noceant, deglutitioni obstant, febrem excitent; si cariosa evaserint ossa; si alcera serpant; ea quidem auxilii chirurgici indigent, simulq;e medicamentis internis sanguinem leviter incidentibus & edulcorantibus; si vero occultæ sint, sufficit vere & autumnio juscula leviter incidentia præscribere ex radicibus scilicet aperientibus, herbis antiscorbuticis, asellis, martialibus, adhibere pulverem ammonii lævigatissimum more *illust. Geoffroy*, & demum lac diu usurpare. Nuptæ compertum est longum usum extracti cicutz, seu conii maculati ad grana pauca, nec non potum quotidianum aquæ marinæ esse summa in hoc morbo remedia.

Extractum cicutz sumitur initio ad grana ij, sensum adaugendo dosim uno grano, modo nec cardinalgia, nec vertigo accedant; in quo casu eadem dosis continuatur, & his accidentibus clapsis rursus augetur, ita ut ad drachmam unam quovis die sumendam dosim quandoque assurgat; cætera extracta venenata gulam exsiccant, quod cicuta non efficit. Serum aquæ marinæ & foliis abŭnthii fovere utilissimum est.

Scro-

3. *Scrophula fugax*; *Serama* VVarthoni Adenograph. Gallico *Glandes*. Ægri *Glandis*. L.

Tales sunt infantes triennes, aut quinquennes cachectici, in quorum collo glandulæ parvæ, maxillares præsertim, sed non concatenatæ, leviter tument, aut indurefcunt parumper, maxime si tinea repressa fuerit, si otorrhœa, seu feri effluxus ex antribus imminutus fuerit, si frigido æri infantes expositi fuerint; illæ vero glandulæ identidem evanescunt, mox revertuntur, nequaquam stipantur tumore pallido labiorum aut genarum, nec ophthalmia scrophulosa, nec carie ossium; verbo alterius omnino est indolis illa species, & merito a priori distinguenda venit. Curatur cibus epeptis, exercitio quale huic ætati convenit, paulillo vini in potu, levibus aperientibus, ut infusio ferri in aqua, pulvere guayaci vel chinæ ad grana sex per menses in ossa deglutito; an differat hic morbus a scrophula mesenterica examinare periti. Si a represso auriæ fluxu, aut a siccata tinea benigna procedant illi tumores, illi fluxus ope unguenti digestivi, vel foliis betæ admotis restituendus est.

3. *Scrophula farcimen*. *Le Farcin*. Ægri *Farcinoux* Gallis dicuntur. C.

Morbus est equis familiaris, chronicus & contagiosus, in quo erumpunt tumores alii majores, duriores, scirrhusi qui venarum majorum iter sequuntur; alii vero minores (parvi sponte, sed tarde suppurantes, unde ulcera verminosa, fœtida, cancrofa, phlegmatorrhagiam, fistulam, & talem non raro excitantia).

Hæc lues quæ veneno singulari tribuenda videtur, ut scrophuloso, syphilitico, &c. vulgo tribuitur erroribus in usu præsidiorum sanitatis, ut exercitiis violentis fervente æstate, pabulo copiosiori dato equis, macie & calore debilitatis, a venæ, graminique recens cæsis, &c. Dividitur farcimen ratione gradus in benignum & malignum.

a. *Farcimen benignum*. *Farcin volant*, *benin*.

Pustulæ dorsum, collum & caput obsident, suntque minores, pauciores, quarum alix erumpunt, dum ceteræ sponte exsiccantur.

Indicantur remedia sanguinis viscositatem, & acrimoniæ corrigentia, præmissis elysmatibus emollientibus; victus erit edulcorans, potus albus ex farina & fursure; addetur cibo aquila alba, & demum ad diaphoretica deveniatur, quibus exsiccabuntur pustulæ, & resolvuntur tumores scirrhusi.

b. *Farcimen malignum*. *Farcin malin*, *cordé*, *indurécit*, *chancreux*, *bisfurque*, &c.

Est illud quod partes corporis obsident, ulcera fœtida, & juxta venas majores tumores chordam nodosam referentes inducit, cui non raro jungitur phlegmatorrhagia, & pedum posteriorum phlegmatia elephantina.

Hæc species maxime contagiosa judicatur; cavendum ne equus ulcera sua lambat, removendus est ab aliis omnibus jumentis; præmissis phlebotomiis & catharticis, ac dixta humectant, perfusa

sudorifica adhibebitur; inde ad æthiopem & cinabarium progreditur Hippiter. Tumores scirrhusi applicabitur emplastrum emolliens, unguentum de althea, & præmissis iterum remediis generalibus lithargyrosim levissimum tentare consilium erit; interea ulcera sordida sunt decoctis detergentibus eluenda, putrida & verminosa antiseptis, imo causticis oppugnanda, tibiæ elephantina tumidæ linteis tegendæ, decoctum hordei cum melle injicitur in nares. Si phlegmatorrhagia adsit, sæpius uber in pedibus suppurato sponte accedens a morbo liberat; pulvis viperinus curæ finem imponit. Vide plura in *Encyclopædia* relata a *Clariss. Bengelat*, qui in Nofocomio equis destituito Hippiteriam summa cum laude Lugduni promovit.

4. *Scrophula mesenterica*; An *Rachitis strumosa*? *La Charrie* Puzos *Maladies des enfants*, chap. 8. Ægri dicuntur *Enfants en charrie*. C.

Cognoscitur 1. pallore; 2. morositate, seu fastidio universalis; 3. inappetentia; 4. physiconia, seu abdominis intumescencia; 5. sæcum sætore insolito.

Post mortem inveniuntur viscera omnia infarcta, glandulæ mesenterii tumidæ, epiploon solum liquefacto adipe, ascites & hydrothorax in agone, aut statim a morte effusus; in ultimo gradu hujus morbi accedit phlegmatia pedum, ac potissimum manuum oedema, mortis prodromus.

A vulgari scrophula differt hic morbus ratione ætatis minoris, sedis glandularum tumidarum, non in collo, sed in mesenterio, pallore faciei, cum scrophulosis sæpius sine coloratis, faciem turgidulam & coloratam præbentes.

Principia hujus cachexiæ sunt ortus ex patre, vel matre valetudinariis, aut syphilitic male curata infirmatis; videntur familiæ quarum proles mascula optime valet, feminea vero hac scrophula laborat; sunt inantes qui hoc morbo convalescunt, cum decimum circiter annum attingere: utplurimum vitæ genus roborans, ut rusticatio, usus vini, infusum leve cinnamoni, ferri rubiginosi, hunc morbum præcævet, aut curat; utile tamen est, si suspicio sit syphilidis in parentibus, præparata mercurialia, ut aquilam albam identidem intus adhibere, pulverem radicis chinæ ad grana sex quotidie cum ossa deglutere, saltem per hyemem, & identidem aqua rheï, & syrupo de cichorio composito uti, ut tonus partibus restitatur, lymphæ visciditas solvatur, adeoque ejus acrimonia per vias urinæ eluetur.

5. *Scrophula Americana* Russel de usu aquæ marinæ pag. 133. C.

Est ea species quæ tumoribus scirrhusi colli cum Europæa convenit, aut fungosis, nigrisque excrefcenciis capitis in pericranio radicatis, ac frambæiam imitantibus ab illa discrepat. Pueri Jamaïensis collum tumoribus scrophulosis ubique scatebat, caput etiam tumoribus fungosis, colore fusco, nigricante, mitum in modum obductum erat; tumorum radices in

*peri-

pericranium se profunde inferebant, eorumque capitella moliuscula adinsit spongiz erant foraminulenta, ac levissimo tactu cruorem fundebant. Præmissa phlebotomia applicatur unguentum e piee liquida confectum; dein adhibeatur æthiops vegetabilis, & potetur quotidie aqua marina ad cyathum unum, vel duos, ita ut alvum laxam efficiat, contineturque per menses; hac ratione tumores capitis & colli discussi sunt.

Non solum in Americana, sed etiam in vulgari scrophula cum summo successu usurpatur potus aquæ marinæ a parva dosi incipiendo, & quotidie dein ad libram fumendo per menses aliquot, qua methodo, ducit *Russell*, apud nostrates *Clariss. Doctor Cusson* scrophulosos sanavit. Vide *Ruselli aphorismos*.

6. *Scrophula periodica. Maladie singulière*, observè par M. Petit Med. & par M. de Makey Chirurg. Journ. de Medec. 1758. pag. 38. & 317. L.

Est species farcininis hominibus propria, in qua tumores carnosii, dolentes, quandoque rubri, plurimi, in diversis partibus, facie, v. g. pudendis, a pisi magnitudine ad magnitudinem nuclei intra aliquot dies excreverunt; dein vero sine suppuratione sensim retrocedunt, flavescente cute, & omnino resolvuntur, suo tempore redituri sine ullo alio incommodo; hoc autem malum plures annos perseverat, & sine suspitione syphilidis sanatum fuit ope hydrargyroseos a D. Perle, frustra tentatis antea diversis remediis.

7. *Scrophula chalasii; Chalasosis* Græcor. *Scrophula leprosa* Gilberti Angli de lepra; *Ladrole des poros* Liger.

Cognoscitur ex tuberculis nigris, albis, luteis, pistiformibus sub lingua, in toto ore, collo corpore. Incipit ab stupore & somnolentia, animal vix pedibus insistit posticis, sæpe ad radieem sunt cruentæ. Vidi pluries in carnibus eorum porcorum glandulas, piso minores densissimas, albas, duras, sebacea materie turgidas, adeoque strumosas, carnibus infixas.

Veterinarii sanguinem e cauda suis educi, nitidam stipulam subterni, & sæpius corpus lavari jubent.

Hac specie scrophulæ laborabant elephantiaci homines, teste *Gilberto*, *Gordonio*, aliisque, maxime vero qui elephantiasin legissima erant afflictis; erant enim glandulosi in toto corpore, & maxime in lingua.

8. *Scrophula Moluccana. Le Farcin des Moinques*.

Tophi, gummæta, & ulcera in Insula Amboyna & Molucis præcipue endemia, Belgis *Amboynense pokan*.

Sine congressu venereo erumpunt in facie, brachiis & crutibus tophi, seu tumores duri primum, & scirrhosi, & tam crebri per universum corpus, quam clavi & verrucæ oriuntur *Sauvages Nosologia Methodica. Tom. II.*

in manibus & pedibus in Belgio; si vero ulcerari contingat, materiem lentam & gummosam reddunt, tam acrem & mordacem, ut profunda & eava ulcera inde oriuntur cum labiis callosis & inversis; sædum & deforme malum cum syphilide conveniens, nisi quod doloris tanti non adsint, nec caries in ossibus tam facile oriatur nisi per curantis incuriam; hic affectus oritur ex vaporibus falsis aeris, usu piscium, pane sagou, vino de palma, cui etiam tribui debet berberia.

XXII. CARCINOMA, a *carcinos* cancer; & nomen ulcus depascens; *Cancer ulcère; ulcère charveteux* ou *cancereux*.

Carcinoma morbus est gravis, cujus præcipuum symptoma est cancer exulceratus, vel ulcus sordidum, labiis duris everfis, scirrhosis, per intervalla lancinantibus doloribus discrucians, quibus se adiungunt ichot sanguinolentus, excreverunt fungosæ, venæ varicosæ in vicinia glandulæ induratae adjacentes, & hæctica febris.

Sedes huius ulceris est in omnibus partibus glandulosi tactu exquisito præditis, ut lingua, labiis, genis, oculis, collo, mammis, utero, pene, &c. minime in cerebro, pulmone, hepate, liene, &c. Licet omne carcinoma a cancro occulto primum incepisse credatur, non minus verum est illud in lingua, ore, oculo, ex ulcere primum ab ægro quandoque animadverti; in mammis; dum intus latet; tumor durus, lancinans extus oculis rubet, prurit acerrime, introrsum deprimitur dum viciniae tument, dein faciem fundit, exulceratur. Sæpe tumores scirrhosi, verrucæ indolentes, cum labes cancrofa latet in sanguine, si escharoticis aut etiam cultro vexentur, post aliquod tempus, nullo cancro prægresso, carcinomata evadunt, seu ulcera cancrofa ostendunt.

Principium progænum carcinomatia vulgo censetur virus proprium cujus agendi modus ex nullis principis mechanicis intelligitur, adeoque theoria huius morbi est obscurissima, & medela ex antidotis, non vero remediis rationalibus, expectanda; interea si missa sanguinis accurate a viru illo expurgata fuerit, licet pars affecta sanari mechanice nequeat, corpus ab hoc tumore tuto per excisionem chirurgicam liberari potest, de quibus consultantur Opera Chirurgica.

Expurgata massa sanguinis a viru quovis acri per usum jusculorum ex pullis, ranis, testudinibus, cum astacis, asellis, radicibus graminis, fragariz, solis symbrii aquatice, cicchorit, taraxaci, interpositis lenibus carthartics, postea utendum sero lactis, nec non lacticiis, quibus assuesieri potest stomachus, diutissime usurpandis, potissimum dicta lactea, estate balneis domesticis, aquis acidulis Alesiensibus, Hieuzetensibus; iterum autumno jusculis, sero lactis, lacte asisigo utendum: quibus peractis vel

T. • ope-

operatio Chirurgica instituitur, si tumor coctis, glandulis vicinis non adhæreat, si febricula absit, si habitus corporis restitutus sit, secus ad specifica deveniendum est, quæ diversa pro varia carcinomati specie.

1. Carcinoma vulgare. C.

Est illud quod a nullo alio viru fovetur, saltem a syphilitico immune est, & multo rarius diffusiuique sanatur; vulgo pro chronico & insanabili habetur. Specifica nuper usurpata sunt extracta stramonii, belladonæ, hyoscyami nigri, albi, napelli, cicutæ, & phytolacæ, nec non plumbago & pulvis de Gray dictus.

In carcinomate crustaceo labia & nares dudum afficiente, præmissis frustra litibus mercurialibus in viro vinoso, vidi feliciter adhibitum extus oleum olivarum, in quo recens infusa erant folia contrita plumbaginis Europæ; eschara intra quindecim dies delapsa æger ut plurimum sanatur. Vide historiam a me olim traditam *Hist. de l'Acad. R. de Sci. Ann. 1743*. An illud *Carcinoma crustaceum, noli me tangere* vulgo dictum, species diversa a carcinomate glandulas conglomeratas obidente, iudicent alii.

Pulvis de Gray dictus est ex planta quadam corrosiva ignota, forte Daphnes specie, contrita; circa carcinoma cuditur sulcus ope lapidis infernalis, & elapsa eschara adspersigitur quotidie hic sulcus dicto pulvere, inde fit ut tumor sensim a basi sua sejungatur, tandemque decidat; modo tamen carnes non crescant ultra sulcum, ut mihi prima vice experimenti accidit; hunc pulverem ab Anglis emergunt Sueci magno pretio, plantam vero non revelarunt.

Extractum foliorum atropæ belladonæ primus Cl. *Lambert* intus adhibuit, incipiendo a grani quadrante & sensim augendo, quod quandoque successit, & feliciter a Cl. *Barluc* iteratum fuit: *Journ. de Med. Janu. 1761. & Mars 1757*.

Extractum conii maculati, vulgo cicutæ, ab Ill. *Spark* cum successu in multis regionibus, apud nos frustra, fuit usurpatum, incipiendo ab uno alterove grano, sensim augendo ad drachmam, & extus foliorum decoctum applicando.

Extractum stramonii multo vehementius est & a grani tertia parte incunda dosis, secus vertigines tenebrosas inducit.

Extractum foliorum hyoscyami nigri a granis duobus, sensim augendo ad scrupulos, apud nos viz quidquam præstitit, & multo utilius adhibitum fuit extractum foliorum hyoscyami albi, quod a triente grani initio adhibendum est, & quotidie repetendum, sensim aucta dosi, usquequo siccitatem narium & gutturis cum dysphagia producat, ac per menses continuandum; huius interventu uteri cancri sanari sunt.

Extractum foliorum & caulis aconiti, napelli, cuius grana duo cum sacchari drachmis duabus feruntur: huius mixturæ dosis a gr. vj. ad xij, vel plura extenditur; eo usus est in carcinomate Ill. *Lebmacher*.

Folia phytolacæ Americanæ apud nos in hoc-

tis obvia tuto carcinomati applicantur; eorum etiam extractum nuper intus adversus hunc morbum adhibuere Medici, quorum tentaminum eventum expectamus; hæctenus utut saporum salis ammoniaci habeat, vim sedativam obtinere videtur.

Utitissimum ex his medicaminibus & tutissimum est extractum foliorum cicutæ, & apud nos hyoscyami albi, atque in litibus usu bis vidimus novos tumores cancriformes prius inconspicuos expectari, ut a decocto illiptum dulcameræ quandoque bubones venerei latente evolvuntur; quis fuerit huius decocti successus in gravissimo morbo Nemaui a nobis observato tradidit *Clariss. Rameau D. M. Histoire de l'Academ. R. des Sciences, ann. 1760*. Venena vegetabilia sunt itaque medicamina in morbis huiusmodi insanabilibus; sed virus scabiosum, variolosum in eundem censum revocandum esse nullum est dubium, ut probant quæ de anæsthesia melancholica retulimus.

De cura vulgaris Carcinomati consulantur Auctores.

2. Carcinoma syphiliticum, Cambuca Paracelsi. C.

Vidi quadraginta abhinc annis in muliere Aleliensi virus venerei experta, & mammarum carcinoma capite infantili majus dudum gestante, hunc tumorem exulceratum ad pugni magnitudinem cito rediisse usu hydrargyroseos, quam *celeberrimus Medicus Professor Drisdier* præscripserat, verum non omnino sanatum est carcinoma & ad excisionem deveniendum fuit. Verum nuper cum duo cancri intra mammas adolescentulæ dudum syphiliticæ in usu extracti hyoscyami albi prorupissent ad ovi gallinæ magnitudinem cum dolore lancinanti & glandulis duris tuberosis ad axillam extensis, post tres menses adhibito spirito antivenereo hosce cancras, nec non ulcera gutturis, dolores nocturnos, &c. omnino evanuisse vidi: unde inferendum puto cancras esse diversæ indolis adeoque speciei a vulgaribus quos nunquam mercurialibus remediis solis sanatos esse audivimus.

XXXIII. LEONTIASIS.

Hoc nomine intellexerunt Medici veteres morbum qui terrorem respicientibus incutit, ut leo, nec non qui humanam figuram ita mutat, ut ferinæ aliquatenus similis sit, quod non solum de elephantiasi, verum & de sequentibus dici potest.

1. *Leontiasis hystrix*; Afcanis *Journ. de Med. Mars 1756*. Philosophic. Transaction *Skoane* num. 424. *Æger The porcupine-man, le Porcupin*.

Observata est in Anglo; cuius caput in omnibus locis aeri non expositis horrescebat setis rigidis, pellucidis, septem lineas longis, duas vel tres crassis quovis autumnio deciduis. Is peperit quinque filios eodem morbo affectos.

2. *Leony*.

2. *Leontiasis corniculata* Ash Jour. de Medec. 1756. & Sloane Philosoph. Transact. num. 424. & anno 1685. Georg. Franci de Cornutis ; Du Ronceau Journ. de Medec. Fevr. 1761. pag. 145.

Anno 1685. visum est corpus Annæ Jacson apud Anglos variis corniculis horridum. Et nuper D. Ash Secretarius Academia Dublinensis memoravit puellam quæ in omnibus articulationibus gerebat excrecentias corniculatas, initio vervecosas, dein ossificatas. Centenas cornuum in corpore humano succrescentium historias vide Journ. de Medec. loc. citat. ; plurima vero in basi ulcere cancroso erant stipata ; vidi ossiculum nucis magnitudine ex medio femore extractum nulli ossi adherens.

3. *Leontiasis vitulina*. Vide Vandermonde Journ. de Medec. Novembre 1756. cum iconc.

Est morbus congenitus quo diversæ faciei partes sine dolore, ac coloris mutatione monstruose protuberant, ut vituli, vel alterius bruti rictum & caput referant ; sed de his legatur *Ambrosius Parvus de monstris*.

XXIV. MALIS ; *Pessio bovina* vulgo ; *Malis hypodermatis* Lancii part. 3. de bovilla peste ; *la Clavelle*.

Morbus est in quo insecta vermiformia, vel larvæ insectorum ut plurimum ex tumoribus, abscessibusve corporis humani prodeunt, vel in ejus ulceribus nidulantur.

Insecta sunt vermiformia, seu apoda, & ideo a pediculis phthiriazum comitantibus distinguuntur. Larvæ sunt formæ insectorum quas inducunt statim ac ex ovis exclusæ sunt, tunc ut plurimum sunt pedibus destitutæ, molles, edaces, & exuta pelle ultimam formam perfecti animalis adipiscuntur. Muscæ carnæ anno recens elapso postulas variolæ sere omnes in partibus aeri expositis pertulerant, unde nascebantur larvæ albidæ hordei grano similes, vermiformes, quæ in singulis pustulis maturis reperiebantur. *Clariss. Doct. Razus* has larvas vitro inclusit per aliquot dies, quæ in totidem muscæ carnariæ mutatae sunt. Ex simili origine pendunt vermes in ulceribus sordidis neglectis, æstate potissimum, toties reperti ; æstivante etiam hyeme apud Lappones, *Illustr. Linnæ* observante ; oestrus rangiferinus cervos rangiferos infestat, & eorum cutim perforans in ipso vulnere sua ova deponit, ubi larvæ tuto calideque hybernare queant, unde hi cervi non pauci frigidum emanciantur, & pereunt. Apud nos oestrus narum subit nares ovium & caprarum, atque in harum sinibus frontalibus ova deponit ; simile quid sævientie peste Alexiæ anno 1720. sæpius & centenis hominibus accidit, quippe sumpto ad prophylaxim emetico sere omnes magnam copiam larvarum hordei grano similium vomitu rejiciebant. Notum est lanionibus per æstatem inve-

niri in ductu choledochi ovium quædam insecta pollicem longa, lata, alba, apoda, tanquæ similia, quæ sunt larvæ insectorum volatiliū horum pecorum anum subeuntium ; sed nil vulgaris & Pastoribus familiaris cognitum quam quod oestrus bovinus dorsum boum aculeo pertundat, ibique ova sua deponat, boves etiam pinguiores eligens, atque inde excitantur tumores qui suo tempore in suppuratum venientes novis oestris exitum præbent, inde vero ortum nomen *pessiois bovina* huic generi morbi dudum inditum.

1. *Malis cornipedum* Ligeri, *la Clavelle*, ou *la Clavanne*, L.

Pecoribus lanigeris frequens est morbus ; in toto sere corpore nascuntur furunculi, clavi Gallis dicti, unde nomen *Clavelle*, in quorum cavitate, dum suppurantur, vernis est ; morbus contagiosus censetur.

Curat. Incidentur illi furunculi intacto tamén vermiculo, & infundatur in vulnus sebum candellæ fusum.

Quandoque observamus furunculos in hominibus numerosos & sere epidemicos, nec tamen vermiculti latent in tumore suppurato, nisi pro verme habeatur stercus fibrosus albus, qui vulgo *Bourbillon* Chirurgis dicitur, aut nisi ita sordidum sit ulcus, & æger sui negligens, ut muscas in his ulceribus sua ova deponere patiatur.

Insecta autem illa sunt vel muscæ carnariæ vel Hippoboscæ aptera, vel oestri capitis. Vide *Ill. Linnæus de nexa Insectorum*.

Quid affectionis bovina nomine inter hominum morbos numeratæ sibi velint Arabes (vide *Freind histor. Medic. de Astia*) non satis capio ; hoc solum novi quod quidam homines tumoribus in diversis corporis locis detenti sint, quibus suppuratis vermes in pure nidulantes sunt inventi ; & huncce morbum Uetzæ ante triginta annos observatum fuisse mihi retulit *Cl. Lesèvre Medicus Doct. Uetersens*.

2. *Malis vermiformis* Vide Saltzmanii de Verme narium, Argentinz 1723.

Anno 1718. in nolosocium Argentinense delatus est adolescens cui per magnam corporis partem vermiculti alii minores, alii majores sub cute cuniculos egere & tantum non totum corpus consumplere ; oculi sinistri pinguendo ab ipsis tota absumpta erat ; in inguine, in poplite magna carnis portio erat vorata horrendo & commiseratione dignissimo spectaculo.

In cadavere aperto cunctisque visceribus nullus vermis inventus est.

3. *Malis Americana*, Dellon Voyage aux Indes ; *Bicho* Brasiliensibus ; *Chiques* Americanis ; Linnæi de miraculis insectorum pag. 323. *pulex cauda furcata*.

Infectalum via conspicuum in locis sordidis & juxta muros frequens, hominum pedes egreditur, cutis poros subit, sæpius sub unguibus latet, sine ullo dolore, nec obstant cal-

cei, sed pedes nudos numerosiora obdident illa insectula, intra dies quindecim ita crescunt in cute sub epidermide ut pisi magnitudinem acquirant, & quo majora sunt eo difficilius eruantur, partes his obfessæ exulcerantur, eroduntur, nisi maturius insecta auferantur, singulis epim diebus ea venari consuevit est; ulcera illa ita corrosiva sunt ut pluribus Nigritis pedes ex carnes ossa nuda videantur; acicula avelluntur insecta nigritantia, vel pulvere tabaci enecantur, dein medicamentis ceterisvis & epuloticis vulgaribus ulcera sanantur, juxta D. *Virgilium* a quo historiam *Franchæ* Americane accepi. Insectum *Chique* dictum, verus est pulex colore, magnitudine & figura, qui ubique in pulvere latitat cum tempestas est sicca, verum accedente pluvia vel tempestate humida hoc insectum interit & nullibi reperitur, Nigritæque ab eo sunt immunes; hoc sæpius inter ungues pedum & indifferminat in omnes corporis partes se insinuat, ibi vero statim non injucundam titillationem excitat, ast cum epidermidem perforavit, pruritus valde molestus exurgit; qui calcis utuntur, ut Europæi, minus infestamur quam Nigritæ nudipedes & pigri. Hoc insectum intra tres, quatuorve dies crescit ad magnitudinem pisi, & quod erat castaneæ coloris, jam est sub forma cocci vel testæ coriaceæ albæ, sphaerica, granulis vel seminibus albis setæ; hæc testæ firmiter adhæret cuti ut kermes ilici, unde suspicor esse cocci speciem & feminam, quæ cum gravida est parti immobilis adhæret, interea disrupta hæc testæ, nulla vidit *Virgilius* exclusa ex his ovibus insecta; ubi hæret testæ, ulcus couditur.

Curatio facilis est, nam ubi pauca sunt hæc insecta, singula ope aciculæ, vel cultri acuti auferuntur, avelluntur, & ulcus tabaci combusti cineribus adspargitur; ubi vero sunt numerosa hæc insecta, v. gr. totum pedem obdidentia, linteum in pissico, vulgo *Gondren*, intingitur, quo pars affecta involvitur; cito insecta separantur & deinceps lapedio adhibito æger liberatur ab hoc incommodo.

4. *Malis acridophagorum*, *Drak Koyade autour du monde*.

Juxta *Æthiopiæ* gens *acridophaga* sic nominata quod locustis tantum vescitur, quas vere colligunt, siccant, & salitas servant. Hoc unicuique in desertis nutrimentum obtinent. Nigriti sunt macilentæ, veloces, parvi, nec ultra quadragesimum annum vivunt; hæc scilicet ætate intra eorum carnes generantur insecta, ex quibus pruritus vividus sentitur; insecta numerosa adeo sunt, ut his corpus odorem fœcat; hæc vero insecta ipsi abdomen, dein pectus, aliaque partes ad ossa usque devorant.

5. *Malis a crinonibus* *Etmulleri*; *Crinones*, *Morbis pilæris* *Horslii*; *Setæ*, *Comedones*, *Dracunculus nostras*, *Crinones*, &c. quibuldam *Nostratis* *Mascleus*.

Hic affectus apud nos familiaris corripit infantes paucis ab ortu diebus; cutis scilicet

dorsi, brachiorum, crurum perforatur fœtis densis, nigricantibus, lineam longis, rigidisculis, confertis, seu vix lineæ intervallo disticis, frictione ex oleo magis conspicuæ evadunt ille setæ porcinis similes; pueruli ejulant, vigilant, quidam emaciantur; alii etiam convelluntur, læ fugere recusant, febriunt; obstrictæ solent alternis diebus vel oleo & saliva madidam manum adhibere, qua cutem leviter fricent, ut illæ setæ excutiantur, vel paxillo farinæ in aqua tepida solutæ eos infantulos sæpius eluere, dein linteis siccis abstergere; harum vero setarum exortus intra primum ætatis mensem ter, vel quater revertitur; setæ in dies nigriores evadunt, dein delabuntur. Si credamus *Horsliæ* ætate provocatoris, ut biennes, huic affectui sunt expoliti.

6. *Malis dracunculus* *Pæth. Method.* *Colebrilla* *Americanis*; *Dracunculus Persarum* *Kempferi* fasc. 3. observat. 4. *Ver de Guinée* male confunditur a *Sennerto* cum crinonibus infantum. *Dracunculæ* Græcis; Vide *Vesicii* exercit. de vena *Medinensi*. *Nervus Medinensis*, seu *Iræ Medini* *Avicennæ*, male vena *Medini* *Carmentis*; *Gallis* *Dragonæ*; *Ichon* *Guineensium*; *Pejank* & *Ivare* *Persis*.

Vere vermis est quem vivum bis extraxit *Kempferus*, pallide albicans, tener, teres, cordæ citharæ crassioris finilis, costello barbato, pilis tenuissimis, cum puncto atricoloris & oris vestigio quodam, in cauda etiam punctum foraminis est instar ani, longitudo varia est, ad pedes plures extenditur.

Patria est terra aënuosa, torrens, cælum intemperatum, solum arenosum, sterile, salsum, aqua destitutum, ubi aqua ex cisternis nascitur, eaque sæpe impura, verminosa bibitur, nascuntur eo frequentius, quo ætas est siccior; hospitat in carnibus maxime in textu celluloso a genibus usque ad pedem frequentissime, rarius in scroto, lumbis, brachiis, sæpius musculorum flexus sequitur, & quod pejus, ossa pedum amplectitur, unde non nisi difficillime extrahitur; nunc est solitarius, nunc plures in eodem homine habitant.

Ephemera extensa est nuncia illius in lucem prodire cum partibus pulvis rubedine & tumore; postmodum exurgit pulvis pisi magnitudine, tener, aquosus, pellucidus, non raro atricolor, quæ post alterum diem rupta, profluit costellum vermis, sensim erumpens, & vix ante decimum diem extrahendus omnino, ex scroto & suris facile, ex pede vix intra 20. dies extrahi potest cum tabo quotidie copioso, & magno agri dolore, ac incommodo; sæpe peregrinantibus per annum in corpore latitat, sine alio incommodo quam dolore partis affectæ.

Curatio. Emplastro emollienti tumor maturatur; comprehensa vermis portio circa ligulam, pulicaris longitudinis rotatur, & epithemate recinetur ne intus recedat, bis in dies ulcus a pure liberatur, & vermis trahitur, cavendo a forti aut subita

nes tractione, quæ dolores atroces, & vermis ruptionem efficeret, unde dolores longi usquequo novum exitum sibi pariet: vermis; extracto vermis, ulcus facillime curatur: sunt qui frigida affusa quotidie illud curant.

Carthaginenses in America eadem malo sunt obnoxii, ut refert *D. Anon. de Illon*. Incipit a phlegmone cruris, tibiz, vel brachii, quæ suppurantibus emollita dat draconum, quem tamen inanimatum putat Auctor, quemque Incolæ *Colebrilla* vocant; hunc morbum dracontiasm vocat *Cocchi Bagni de Pisa*.

7. *Malis præcens*.

Vulgo *Bites rouges des Savannes* apud Martinicanos, sunt infecta ricinis prioribus similia, sed in pratis *Savannes* dictis reperiunda, & capite rubro insignia, illa cibis hominum, rostro brutorum adhærent, & intolerabilem pruritus excitant. Occidunt decocto foliorum vigis, aurantiorum, herbarum odoriferarum, præcipue *Mombain* arboris.

8. *Malis VVestphaliensis; Die-varen* vulgo; *Morbus novus VVestphalis endemicus* Schenkii lib. 6. pag. 99. 10 species C.

Hic morbus circa annum 1596. referente *Hanrico a Bra*, VVestphaliæ, Geldriam, Frisiamque affligebat endemicæ; hic se probebat cum vagis doloribus, potissimum dorſi & lumborum, sed celeri motu omnes partes nunc has, nunc illas pervadentibus dolor erat exedens quasi a vermiculis depascentibus; prima species erat cum tumore circa articulos qui ibi diu perseverabat, maculas & lituras scorbuticæ similes proferens; hi tumores suppurati ulcus potissimum circa pedes malignum relinquebant, ex quo vermiculi ascaridibus similes educabantur.

De cura vide *Schenckium*.

9. *Malis Transylvanica* Heurnii Epist. ad Foetium; *Dievaren marasmodium* & *dievaren podagrica-scorbutica* Henr. a Bra apud Schenkium.

Differt a rheumatismo saltatorio per exitum vermiculorum seu ascaridum, qui in dievaren ex genum fistulis, aut cum urinis ejiciuntur, si fides Authoribus habetur.

Hæc species Transylvaniæ endemia erat eodem tempore, & a priori discrepabat, 1. ex eo quod nullum tumorem inferret; 2. quod maciem corporis adduceret veluti marasmodium; 3. quod aliquali membrorum impotentia stiparetur; 4. quod vermiculi casorum vermiculis similes cum urinis exiererentur; de cætero dolores in utraque specie noctu exacerbabantur, febris nulla, aut lenta, alvus obstructa.

10. *Malis furialis*. Vide Systema naturæ Animalium Illust. Linnæi gen. 245. animal cœcya, Linnæi Gen. Mosbor. 257. A.

Cognoscitur ex stigmatæ exiguo, fusco, & dolore dirissimo, quem insectum vermiforme, tenuissimum, duas lineas longum, furia infernalis dictum, carnem subiens procreat: vide *Linnæi Amen. Academ. Tom. 3. p. 322*. illud insectum apud Suecos ex æthere delabitur, &

Sauvages Nosologia Methodica. Tom. II.

tum in hominum tum in jumentorum corpora momento citius penetrat, & tam diros dolores excitant ob aculeos suos reflexos corpori appressos quibus ciliatum est, ut miseri homines quandoque intra quadrantem occidantur; sunt qui diurnis resistunt. Fennones lac nuper coagulatam parti vulneratæ adjuvant, & dolor remittit, ac insectum foras prurumpit; alii cultero locum confodiunt, & illud furiosum animal extrahunt.

XXV. FRAMBÆSIA; *Yavv* Guineensium; *Epian* vel *Plan* Americanorum.

Est morbus contagiosus apud Guineenses & Americanos endemicus, aliquando congenitus, ut asserit de Carabib *Pat. Labat*, cuius præcipuum symptoma est frequens exortus fungorum rubi idæi fructus colore, figuræque referentium, unde nomen Africanum *Yavv*, quod idem sonat ac frambæsia; his symptomatis se adiungunt ulcera dysepulæta, exolofes, caries, anchyloses, macies.

Si accuratis descriptionibus fides sit, dantur hujus morbi duæ species, altera Africana *Yavv* dicta, altera Americana *Plan* vel *Epian* nuncupata, quam solus inter Auctores cognitos memorat *Laba Voyage en Amerique*, & *D. Chénier de Med.*

L. *Frambæsia Guineensis* Essais d'Edinburg. To. VI. *Yavv* vulgo. Guineensium. C.

Est morbus Guineæ endemicus, infantibus & adolescentibus familiaris, maxime apud Nigritas; contagiosus est, & qui semel eum expertus est, ab eo dein vivit immunis. Incipit a maculis capite aciculæ non majoribus, quæ in dies incrementum, & protuberant; tunc vero epidermis ex illis delabitur, & eschæra alba apparet, ex qua sanguis exiguus; ruber enascitur, qui dolore & magnitudine, ac figura granulosa imitatur bacani rubi idæi, vel mori; pilli nigri si fuerint in vicinia albescunt; ultimum incrementum adipiscuntur hi fungi intra duos, tres, vel quatuor menses. Omnibus partibus hi fungi innascuntur, sed præsertim inguinibus pudendis, ano, faciei, axillis; quo plures, eo minores; quo pauciores, eo majores sunt. Nultum aliud incommodum experitur æger quam ex sorditie horum fungorum, quibus est sensus, sed non dolorificus. Inter fungos est quidam maximus seu princeps; ille solus, aliis fugatis per usum aquilæ albæ, resistit, ille escharoticis est erodendus.

Curatur hæc morbus unguento mercuriali, vel usu aquilæ albæ; seu ea mercurialia non prius tunc usurpanda quam cum totum suum incrementum adepti sunt fungi; si vero maturius adhibeantur, superveniunt dolores nocturni, caries, exolofes; dilapsis usu mercurii omnibus fungis minoribus princeps fungorum escharoticis est sanandus.

Hæc affectus a syphilide est diversus, ut patet ex ejus historia, licet ut scabies, aliæque genera, hydrargyrosi feliciter curari possint.

T 3

2. Fram-

2. *Frambæsia Americana*; *Le Plan*, ou *Epian*. *Ægri Pianiffes*. C.

Pian apud Nigritas baccam fragraræ significat, unde nomen morbi, cuius præcipuum symptoma est exortus fungosarum crescentiarum; colore, figura, consistentia & sæpius mole has baccas referentium; alterum symptoma est ulcus sordidum, a quo morbus incipit; quodque vulgo Mater Pianorum, Indice *mamapian*; nuncupatur; tertium symptoma *craba* dicitur, & est exoratio plantæ pedum vel palmæ manuum, quæ duplicis est speciei, unde dividitur in *crabam viridem* & *secam*.

Morbus hic est chronicus, contagiosus & periculofus, Nigritis multo frequentius quam Europæis seu Albis familiaris. Chirurgus Monsperliensis *D. Virgile*, qui in Insula Hispaniola seu *S. Domingo* duodecim annos artem exercuit, quique multa millia Pianitarum curare fategit, frequentia mecum de hoc morbo communicavit.

Hic morbus ortum ducit ab ulcere pollicem vel manum circiter extenso, statim superficiali, mucoso, quod a vulgari ulcere vix differt, nisi quod pertinacior sit, nec remediis vulgaribus cedat. Hoc ulcus ubique corporis indiscriminatim, sed frequentius tibiis innascitur; deinde vero ocius, seriusve per totam superficiem corporis plus, minusve numerosi sobolescunt, fungi, qui vel minimi sunt variolose pustulæ magnitudine, & tunc ita numerosi sunt, ut faciem & totam cutem qui procul aspiceret, variolam videre sibi videretur; quandoque pauciores sunt & multo majores, ita ut quidam nucis magnitudinem attingant. Hi vero fungi sive minores, sive majores sunt coloris rosei, vel pallide rubri, granulosi, seu papillis exasperati, mucro rufescentis continuo madidi; nulli ulcri, sed cuti adhærentes; quo pauciores sunt eo ut plurimum benigniores; si tantum septem vel octo prodeant, utcumque deinceps æger adhibitis remediis convalescat, metus est ne morbus latitans pejor revertatur, unde Nigritis mos est horum pianorum exortum uberius soderiferis excitare.

Craba viridis sunt amplæ excoriationes sub pedibus vel in manibus exortæ, pertinaces, nullo tumore, sed eodem colore, eadem forma præditæ, ac si masculus omnino nudus esset; humidæ sunt, sensu exquisito præditæ, & Nigritis, qui pedibus nudis gradiuntur, valde molestæ, marginibus cute lacera terminatis. Crabæ sicæ dicitæ differunt a viridibus, quod in iisdem locis caro sit coriacea sicca, doleus tamen, aspera & albescent quasi farinosa & virgata.

Ulcus *mamapian* dictum, sensum carnes excavat, erodit, & ossa vicina, morbo inveterato, carie, exfoliosi; articulos vicinos ankylosi, doloribusque noctu recrudescens afficit; illa ulcera sunt mucosa, pallida, a nullo caustico escharam admittentia nullo piano, id est, fungo onusta, in quo maxime discrepat a morbo

yavu Guineensem, quem *D. Virgile* nunquam vidit, licet ex omnibus Africæ regionibus millemos Nigritas advenientes viderit.

Hoc commune est utrique morbo quod semel sanatus, sanitas per tres menses petteverante, homo deinceps ab hoc morbo immunis vivat; nulla febris acuta hunc morborum comitatur; verum ex hoc neglecto morbo, vel non sanato sequitur sæpe macies insignis, phthisique accedente lienteria lethalis: in inveterato ulcera nova & excoriationes crabæ dicitæ sobolescunt.

Contagiosus est hic morbus, quippe primo si eodem lecto utatur sanus & pianista, maxime vero si coitus fiat, serpit ab infecto ad sanum hæc virulentia, interea tamen nulla accedunt syphilitidis recentis symptomata, qualia sunt ulcuscula, porri, veruæ, bobones, gonorrhœa, &c. nec pudendis potius quam aliis partibus innascitur *mamapian*; unde evidens est morbum hunc a syphilide diversum esse. Alter contagii modus isque frequentior est muscarum interventus; si etenim musca quæ pianistæ ulcri insedit ad sanum deveniat; ejusque vulnuscule cuicumque forte insideat, illud vulnuscule antea simplex & purum in *matrem pianorum* vertitur; dein fungi non in ulcere, sed in facie, brachiis, trunco, aliisque sobolescunt.

Curatio hujus morbi nulla hæctenus certa habetur; Nigritæ fuliginem lebetum æneorum cum succo limonum diluunt, & ope spatulæ hoc magna ulcri & fungi applicant; crabæ sicæ, rigidas, tensas & doleutes sebo unguunt; has & virides pulvere scoriarum ferri, vulgo *marchser*, vitrioli, aluminis, fuliginæque cum spiritu nitri commixta, tanquam unguento deliniant, simili-que modo ulcus *mamapian* dictum curare conantur.

D. Virgile adhibitis octoginta balneis, deinde vero decem pomatæ mercurialis uncias, & ultra duos menses in hydrargyrosi detentis agris paucis sanitatem restituit. Anglus quidam Medicus in viginti quatuor aquæ fontanæ libris infundebat duodecim falfæparillæ uncias, duodecimque sacchari rufescentis libras; hæc soli pec quindecim dies in vase vitreo probe clauso exponi curabat; deinde vero hujus ptisanæ cyathum quater in die agris offerebat, omni alio potu interdixit; hoc medicamentum cæteris omnibus antecelluit, & *Goedrinck* dicitur.

Quidam in *Sara* dicitæ solutionis mercurii in spiritu nitri factæ septem, vel octo guttas ptisanæ de falfæparilla libris duabus admiscebat, & hanc ptisanam pianistis bibendam præbebat, is hujus ope multos quidem sanavit, æst multo plures & vivis eripuit, & ad phthisim deduxit; hoc vero remediū genus valde affine videtur specifico antivenereo *Illust. Baronis van Söwviten*, scilicet sublimato corrosivo, cui tamen succellu impar est.

Descriptio hujus morbi a *P. Labat* scripta minime huic convenire videtur, cum dicit easque in toto corpore, pustulas crusta flavescente testas, renitentes indolentes, extremi digiti cras-

gi crassitie, per totum corpus dispersas, quarum alie suppurant, alie sicce sunt & farinose.

ORDO QUINTUS.

IMPETIGINES.

Hic Ordo. continet morbos cutaneos; chronicos, sæpius contagiosos & virulentos, qui ea ratione lues nominari consuevere, ut lues *sypilitica*, *scorbatica*; verum lues nomen etiam tuberibus inditum est, unde lues *rachitica*, *scrophulosa canerosa* nomen habent. Sub duplici statu successively strages sua edunt omnes illi morbi, scilicet occulto & manifesto, aut ut rectius loquar, vel in illis cutis est *integerrima*, vel est *exulcerata*, aut crustosa, ut exanthematicis phlegmasiis accidit, quæ ratione pyrexiz acutæ tantum ab hacce classi removendæ sunt; de cætero eutanæ & contagiosæ, vel saltem epidemicæ vulgo censentur, ut pestis variola, rubella, ita ut convalescentium ab his morbis status impetiginibus apprimè similis videatur.

Hoc est ferè commune omnibus in morbis; ut sanis subjectis inserti vulgo. inoculationis via communicari possint. Pendent itaque a seminio quodam, seu *virus*, quod humorum massam fermenti instar potest ita mutare, ut idem morbus in inoculato producat. Quanto cum successu variola inferatur, hoc nostro ævo factis notum est; alii morbus pecorum cutaneus varioloso affinis, forte idem etiam ovibus feliciter fuit. inoculatus apud Carcalionenses; hæc inoculatio morbum ferè omnibus imminentem, aut semel experiendum & periculosum, si spontaneus accesserit, reddit innoxium; alii quandoque inferuntur alii morbi cutanei, ut horum exortu a gravioribus morbis æger liberetur; sic cum a tinea, scabie, herpette repressis superveniunt anasarca, phthisis, alii graves morbi non raro profuit prioribus morbis viam parasse, ut iterum in cute efflorescerent. Sic *Il-lustr.* Deidrid scabiosi indusium induendum feliciter præscripsit hydropicis quos nulla alia via morti eripuit.

Ut. singularis indolis venenum hisce morbis contagiosis originem præbet, ita singularia antidota, quæ summi Numini est providentia, horum plurimis sanandis apta sunt, ut *scabiei* sulphur, hydrargyrum, *sypilitidi* hydrargyrum, coris carulea. Lobelia cardinalis, guayacum officinale, calaguala, &c. *scorbuto* citrus medica, cochlearia officinalis; *cancro* conium maculatum, atropa bellidonna; horum etiam multis. solanum dulcamara, smilax china, smilax salsaparilla, &c. profuere.

Horum antidotorum moleculæ virulenti principii moleculis adherent ob aliqualem tum congruentiam, tum affinitatem, seu gravitatis. specificæ similitudinem, ex qua adunatio

ne resultat mixtum innoxium, aut quod cum humore quodam excrementicio nuptum foras e corpore amandatur. Sic sublimatus corrosivus multo hydrargyro saturatus ab in medicamentum salubre, quod prius erat venenum atrocissimum.

Hæc diversa virulentiz genera sopiuntur, aut mitigantur medicamentis edulcorantibus & diluentibus; sic sypillis, scabies, cancer, scrophulas, &c. repetitis balneis domesticis, nec non lactis usu diuturno sedantur, unde conjunctivus virus. aqueo vehiculo dilutum cum urinis & sudore partim excerni, aut ejus moleculas salinas, acres lactis macilagine obvolvi.

Horumque morborum plurimi novi sunt, & ex exteris regionibus ad nos. allati, vel adhaecum exotici. *Advena* sunt apud nos sypillis, scorbuto, rachitis; *Indigena* scrophula, cancer, scabies, tinea; *Exotica* sunt strambælia, elephantiasis, lepra, trichomia, &c.

Fere omnes illi morbi, si excipiamus eos quorum cognita est antidotus, insanabiles sunt, aut pertinacissimi: phlegmasiz exanthematicæ quem semel dimiserit ferè nunquam iterum impetunt. Sic qui a peste, rubella, variola convalescere, nunquam, aut ferè nunquam hos morbos incurrunt; verum non eadem est prærogativa eorum qui sypilitide, scabie, scorbuto, aliisque impetigibus affecti sunt; pluries enim eodem morbo labore possunt.

XXVI. SYPHILIS. *Verale.*

Qui post impuram concubitum laborant ulcusculis genitalium sæpius gonorrhææ suppressæ succedentibus, vel bubone, cruribus, condylomatibus circa vulvam, podicemve, dein pustulis per cutem dispersis, rubro-lividis, medio exulceratis, vel crustosis, ac successu temporis doloribus nocturnis, faucium, narium ulceribus, &c. illi sypilitide vel recenti, vel inveterata laborant.

Si vero desint hæc mala eutanæ, & virus lactendo, osculando, concumbendo, sine coitu, quovis modo susceptum fuerit, sint autem alia symptomata, ut. osteocopus, ophthalmia, hæctica, leucorrhœa, phthisis, &c. hi morbi sypilitici, aut veneri quidem nominantur, alii improprie sypilitidis nomine insigniuntur, licet a viru venereo pendeant.

Nec existimandum est morbos qui ab eodem principio subulescent, si in diversis organa resideant, ejusdem generis esse; concedunt enim omnes Medici peripneumoniam, hepatitidem, nephritidem esse morbos diversorum generum, aut ab eodem principio, seu inflammatoria sanguinis diathesi, dependant, defectu ejus distinctionis, nullam ideam fixam sypilitidis, nullam hysteriz, scabiei, &c. definitionem tradere possibile est.

Sypilis diversa apud diversas gentes syno-

nima obtinuit; Vide *Prolegomena Tomi primi* pag. 29. Nomen oritur a *syn* cum, & *philco* amo, seu ab amore mutuo. Morbus est novus ab Infula *St. Domingus* in Europam delatus; Hispani ex America reduces ad obsidionem Neapolis pervenit, eam mercem inde per Europam diffundere anno circiter 1496. Ratione analogie hujus morbi cum aliis cutaneis. *Berengarius Carpensis* ad Hydrargyrum huic applicandum inductus fuit.

Cum *Cheyneus* adhuc juvenis percepisset modum vere mechanicum cum quo hydrargyrum sanguini mixtum ejus partes viscosas dissolvit; is symptelicum virus lympham in foccos viscidos, crassos inspissare finxit, eique proprietati commentitiz hujus virus totam vim ascripsit; *Astrucius* vero illud virus acidum corrosivum supposuit, & exemplo sublimati corrosivi, qui addito multo hydrargyro mutatur in sal innoxium, exstilmavit virus venereum simili modo per hydrargyrosim extingui.

Hactenus nobis cognitam speciem syphilidis tantum descripsimus, vanerea scilicet; verum sunt & aliz species exoticæ non satis accurate descriptæ, quæ ab hoc genus attingere videntur, quæque ab hac differunt ex eo quod more syphilidis nostratis inveteratæ genitalia non afficiant.

1. *Syphilis venerea; Lues Venerea Astrucii; Scabies venerea Lockeri; Venæ communes. A.*

Ea est quæ sæpius ab impuro concubitu oriunda gonorrhææ intempestive suppressæ super venit, ulcuscula, phimosis, testis tumorem, bubones, ficos, cristas, &c. dum recens est, excitat; deinceps vero pustulas crustosas passim in toto corpore, varos, seu coronam veneris in fronte, ulcera in facibus & naribus, gummata, & caries in ossibus capitis, dolores noctu exacerbantes cum hæctica, aliæque symptomata his connexa producit.

Differt hæc syphilis ab elephantiasi ex eo quod syphilis initio genitalia afficiat; utraque quidem ossa carie afficit, contagiosa est, tororem oris & narium ob harum partium ulcera inducit, sed in syphilide non deficit sensus tactus in partibus. Differt a lepra quod sint in lepra verrucæ vel tubercula dura, crustacea, sicca, corymbosa, digiti crassitie per faciem & corpus dispecta, quadoque genitalia initio afficiat hæc syphilis, non vero lepra. Limites inter has diversas impetigines assignare difficile est; tum quia lepra & elephantiasis raro hodie videntur, tum quia diversæ illarum virulentæ non raro mixtæ aut combinatæ reperiuntur in eodem subiecto.

Ad curandam syphilidem anticodus hujusce virus ita est administranda, ut pacate totam sanguinis massam subeat, maxime vasa lymphatica ac ossa penetret, & sine ulla sensibili evacuatione virus corrigit seu extinguat, quod ut obtineatur & parca dosi in-

terpositisque moris illa administranda, ac ea auxilia præmittenda sunt, quæ sanguinis ferorem, acrimoniam, viscositatem, solidorumque erectissimum emendant; quo autem virus est antiquius, & sua indole acris, efficaciusve, eo magis hisce cautelis insistentium est: dentur ejus virulentiz aliæ aliis aciores aut obolatiores, ut si virus syphilidis cum scorbutico, herpetico, scrophuloso combinetur, atque quo diutius corpori adhæsit, eo altius ut ajunt in partes cartilagineas & ossas sese infinuat, ex quibus difficiliter eradicari potest.

Hodie tutissima methodus sanandæ syphilidis est hydrargyrosim, id est, litus mercurialis seu inunctio pomatæ Neapolitanæ, quæ paratur ex uncis tribus hydrargyri purissimi in terebinthina pauxillo extincti, & exempli gratia uncis sex accurate per attricum commixtis: præmissa phlebotomia, & catharsis; hæc recentis syphilide contaminatus & u'cuscula canchres dicta, bubonem, vel alterum symptoma patiens quotidie balneum tepidum domesticum semel vel bis ingreditur; præmissis viginti aut trigena balneis, & si opus sit fuscis refrigerantibus, iterum mediantem altera phlebotomia & sequente catharsis, ad litus mercuriales paratur; illi vero litus sunt in tota cute, excepto capite & parte antica pectoris ac abdominis, nisi ibi loci fuerint virus localis indicia: ad topicos corporis inunctionem pomatæ unciaz circiter octo vel novem adhiberi consuevere, quolibet inunctio a drachmis duabus ad sex pomatæ Neapolitanæ ascendit, & inter utramque, dies una, duæ, vel tres interponuntur, ita ut si vel pyrexia vel oris calor, rubedo, pyralismus, accedant, majores moræ aut parior pomatæ dosis adhibeantur, nullum autem est nisi tardius aut temporis impensu periculum, si majores moræ sint & doses minores; a nimia vero festinatione gravia possunt induci symptomata, ut cynanche cum lingue tumore & exertione, dysenteria, pyrexia, acuta, cum pyralismo, unde hydrargyrum foras e corpore elabitur, & inanis luditur opera. Prima die calide inungitur drachmis duabus, vel pluribus pes alteruter per semi-horam, dein udone tegitur, tertia die alter pes similiter inungitur post triduum tibia similiter una, post triduum altera, tibialibus similiter induenda & ita procedendo ad femora, nates, dorsum, brachia, ita ut eadem siccæ cutis extensio singulis vicibus inungatur, & lineis, inguilibusve ad morbi finem non deponendis tegatur, nisi symptomata grave superveniens jussit. Interea hæc eadem aeris temperatura fruatur, quæ vere vel autumnio dari consuevit, & utatur dicta mediocri, humefactante ac refrigerante, largo scilicet posu ex decocto hordei & quater in die lacte vaccino vel puro vel forma ossæ cum pane aut cum oryza cocto: si vero.

fibris

febris accesserit aut festinet nimium Medicus in usu hydrargyrosos, maxime cum aliquantulum cura præcelsit, jussulis cremoribusque tantum utendum est; atque hunc methodo, & inunctionibus insistentium usquequo symptomata syphilidis evanuerint, ne gonorrhœa, ulcuscula, bubones, phimois, fici, dolores &c. si quæ vero sint obstinatiora quæ chirurgicam opem requirant, ut phimois, bubo suppurans, verruæ, pori, operationes durante ipsa hydrargyrosi instituendæ sunt: vetum sunt morbi syphilitici, qui etiam sanata syphilide perseverant quandoque, ut gonorrhœa, exostoses, paralytes, cophoses, elthoepi, qui propriis remediis deinceps sunt impugnandi; si illito toto corpore, syphilis non evanescat, in linteis hydrargyrosi inunctis aliquandiu quiescere ager, & his irritis, iterum ad novos litus contigiat; demum sanato vulgo phlebotomia & cathartici iterum adhibere mox est; inde balneo eluendo & pristino sanorum regimini restitendus est ager.

Est & hodie altera methodus minime spernenda quæ a Keisero inventa consistit in usu pilularum ex sale quodam mercuriali hæstentis attractum confecturam quæ quotidie vorantur aucto in dies numero, per mensem unum & semissem; illa quidem methodus nec præparationes sediosas, nec ægrum cubiculo calido constanter incarcerationi supponit, atque licet oris phlogosum passim exierit, in multis circumstantiis priori videtur vel æquiparanda, vel anteposenda, si longior usus ejus felices & constantes successus confirmet.

Verum de syphilidis & syphiliticorum morborum cura absolutissimus illustrissimè Astrucii liber de hac venerea est consulendus; hic enim summa rerum capita tantum attingere nobis licet, ne in molem nimiam liber excrescat.

Aliæ syphilidis species a venerea differunt quod non afficiant genitalia, verum viri venereum lactendo, osculando susceptum geniculis etiam pareit, & non minus syphilidem procreat hydrargyrosi curanda; hujus itaque diagnosi obscura manet, aut vix scripsi potest dilucidari, sunt enim in praxi plurima quæ longo usu & acuti instinctu cognoscuntur, nec ullis tetminis accurate definiuntur.

In syphilide ulcera & caries ac exostoses inducente sepe inveterata, confecti sæpissime remedium illustrissimè van Swieten, seu mercurius sublimatus corrosivus, cujus grana sex in duodecim spiritus vini uncis solvantur, & hic spiritus vini ad cochleam unum aut alterum sumitur superbibendo decoctum emolliens, ut radicis althææ; hoc semel in die vel bis per menses continuatur, eodemque spiritu vini ulcera eluuntur. Hoc remedium genus plus valet in syphilide inveterata, cariosa scilicet & exulcerata quam in recenti, & valde affine est remedio frambezæ Americane dum in Insula Hispaniola usitato.

In syphilide exulcerata, cariola, quæ hydrargyrosam ac trages Keiseri elusit convenit usus

sublimati corrosivi inote Seviereniano; quibus irritis diarræ albæ, jussulis incalcentibus & diluentibus insistentium; juvat tamen quandoque panaceam, pitulas mercuriales, ligna sudorifica similiaque experiri antequam pro insanabili æger derelinquatur.

2. Syphilidis Polonica. Vide Stabel. de plicæ histor. 14m.

A viri trichomatidis latente oriuntur phænomena quæ viri venereo incauti facile adscribunt, ut doloris lancinantes capitis & artuum, continuo per annum torquentes, in naribus & fancisbus ulcuscula fordida, nec non nodi & tubercula dura in manibus; pedibusque dispersa; si vero in his casibus adhibeatur hydrargyrosi malum pejus evadit, ossa narium cariosa evadunt, fauces, avula putredine exceduntur; sudor foetidus & capite emanat, inquinamenti venerei nulla est suspicio, imaginatio vitatur, appetitus depravatur, ungues scabi evadunt.

Curatur hic morbus medicaminibus plicam latentem a matre sæpius in utero mutuatam, evolvensibus, ut sudoribus, catharticis ineis, extus vero decocto lycopodii, quo caput fovetur.

Hoc virus quandoque per annos multos latet in sanguine ut venereum, deinde neglectum symptomata plura venereæ syphilidis affinia inducit, ut ungulum lapsum, marasimum, narium erosionem, cephalæas, syngnum, aniaurosim nec non apoplexiam, quæ omnia quandoque contagio suscipiuntur mala ut accidit pharnacopolæ cujus historiam refert Stabel. dissert. citrata histor. 22. maxime si plicæ fuerit abscissa. A viru plicoso ut a Racheico hunc luxationes, fracturæ, carie diversorum ossium, vide Stabel. dissert. histor. 12. & undecima.

Ista species syphilidis contagiosa est, & a concubitu cum plicosis, nec non jure hereditatis a parentibus in prolem transfertur; differt tamen maxime a syphilide venerea, quippe ejus virus in liquoribus seminalibus minime sedet, nec per coitum propagatur, nec genitalia afficit, sed ut viri venereum antiquum ossa corrumpit, dolores ossium eriat, ossa cariosa & fragilia reddit.

3. Syphilis Indica: Lues Indica Guill. Pisonis; Bubas Hispanis; Mla Brasilianis.

Licet cum syphilide Europæa in quibusdam conveniat tum accidentibus tum curatione, ab ea tamen maxime differt; hæc non tantum ab impuro coitu & hereditate, sed ex leviori atactu nec non ex alimento fetido, falso, & potiusque rancido & corrupto oritur, facilius curatur, citiusque contaminat, apud Afros, Americanos, advenas, indigenasque infestat.

Curatur decoctis salseparillæ & caareba, præmissis balneis; si negligatur, dolores imo caries inducit. Ulcera pura, sed ab Europæis pro incurabilibus derelicta, curata vidit Piso unguentis quorum basis erat succus tabaci cum camphora & spiritu vini.

De syphilide Indica, Molucana, Americana, vix certi quidquam proficere possunt, cum Medicina in hisce-

merfas inflammet & epidermidem auferat, mellullam osium liquefaciat.

Cruor in cute effusus maculas lividas, nigraeve efficiens resolvitur; unde si incipiant flavescere maculae in ambitu, niox color diluatur, bonum signum est.

Curae genericae. Indicantur, s. ea auxilia quae liberam humorum putridorum excretionem juvant per alvum, renes, cutem, ne ab hujus virus stagnatione major & acrior corruptio fiat; s. ea auxilia quae hujus virus correctionem diluendo, edulcorando, vel specificis destruendo, moliri possunt.

Auxilia dietetica. Victus sit ex vegetabilibus recentibus quibuscunque, aut si possibile est ex acetariis refrigerantibus & acidis, sed copiose assiduo sumptis; inter oleracea laudantur lactuca, endivia, brassica, avena, hordeum; inter acida praestant limones, citri, aurantia, grossularia, acetosa, portulaca, pyracum, pomaceum, vinum album; inter edulcorantia lacticia omnia, cremores ex oryza, avena, hordeo, sagou, panis triticeus, bene coctus, carnes recentes.

Inter acra capra, allium, porrum, fumarum, sylimbrum aquaticum, cochlearia officinarum, armoracia, synapi, cardaminum, beccabunga, sedum minus, rapianum, menianthes; optimum est vesci egrotantes jusculis & ossis ex carne juniorum animalium, aut quavis recenti s. non salita, fumove exsiccata, cum multis vegetabilibus, partim acidis, aut alkaliescentibus, partim insipidis & oleraceis.

Auxilia gymnastica. Aget aerem humidum, frigidumque vitet, jaceat in locis siccis; aere calido, vestimentis non humidis utatur, exercitio moderato fruatur, omni ope perspirationem restituat; ad hunc finem animae tranquillitas, libertas, latitudo maxime conducunt.

Auxilia chirurgica hic nulla fere sunt, phlebotomia valde noxia est in scorbuto inveterato pessima.

Auxilia pharmaceutica optima ex vegetabilibus instar alimentorum assumptis repetuntur; aut in diversis morbis scorbuticis diversa sunt; maxime vero conducunt quae alvi laxitatem excitant; ut tamarindi, pruna, apozemata, juscula ex oleraceis, cremor tartari, quae perspirationem juvant, ut aqua picata, *Le can de goudron*, decoctum juniorum ramorum abietis piccae; quae urinas movent, ut oxymel scillicium, quod parca dosi, sed pluries in die assumptum, ita ut intra diem uncia una circiter hauriatur, quo exitio medicamine alvus laxatur, dolores mitigantur, omnes excretionem juvantur.

Narcotica nocent maxime, utcumque dolores fuviant; vires enim prosternunt, cruorem dissolvunt; metallica omnia vitanda, imprimis hydrargyrum, ferrum, antimonium; nocent & cathartica foreia, aut mediocria, sola profunt ecceproetica.

Ad os eluendum oleum vitrioli ad guttas decem ter in die in vehiculo, & gargarismus hoc oleo acidulatus praestant ceteris; deinde profunt,

fuccus limonium, aurantiorum, folia cochleariae, sylimbrum aquaticum, &c. vide *Stomacacem*. Alternis vero sudor proteritur initio sumendo bis, vel ter in die grana 12. pilularum scilliticarum, vel bolum ex theriaca & camphora, superbibendo psisanam ex lignis sudorificis; haec remedia sedato etiam morbo diu sunt continuanda, ut recidiva vitetur.

Lactis potissimum caprini serum, sale polychresto parva dosi addito, succis anisobuticis medicatum, optime convenit ad sanguinem lixivio acri per renes depurandum; postea vero lac integrum reliquis edulcorat.

Balnea tepida plantis aromaticis incoctis, modo nullus sit haemorrhagiae metus, diaphoreticum juvant, humores diluunt, & stupis vulgo ad sudorem eliciendum adhibitis, praestant; ex scorbutis sequentibus quatuor frigidi, quintus calidus & dolorificus est.

d. Scorbutus lividus Abraham. Nitzsch. tract. theoretico-practico de scorbuto exercituum Russici 1747.

Hac species notatur magnis vibicibus nigrescentibus circa tibias & articulos, non circa palpebras, & in ipso albo oculorum, oculi tument, rubent, & ophthalmia rheumati laborant; gingivae valde tument; decolorantur, remollescent, expressae fundunt ichorem flavum, foetidum; parotides tument; urina intense rubet; cutis vibicibus obscuris, subrubris, vel lividis virgata cum febre & acutis doloribus, hujus speciei character est. Viguit vero V Viburgi & Petropoli annis 1735. & 1733.

e. Scorbutus petechialis Abrah. Nitzsch.

Maculae magis atro rubrae, dein brunneae & subflavae, exiguae lentes, vel petechiae referunt; hinc dolor cutis quae in parte tibiarum antica, & circa malleolos his afficitur; interea genua a vibicibus subrubris non sunt immunia; harum partium tumor & dolor, ac pulsus frequentia crescunt pari passu quo macularum rubedo intenditur, gingivae minus spongiosae quam in scorbuto livido, aut superius excoriatae, urinae rubrae, genas intus obident verrucosae tubercula, quandoque fungosa, quarum alia versus fauces producta; sputa frequentiora, anhelitus foetidior, erostaphitis musculus infra zygoma quandoque tumet, nunquam vero parotides; viguit in castris Ust-Samarz anno 1737.

f. Scorbutus pallidus Abrah. Nitzsch. Dux varietates.

Nulla in hac specie sunt maculae, viget phlegmatia pallida, quae sensim flavescit auriginis instar, dum viget lymphae ranciditas, adeps febi instar induratur; tunc autem brachia & tibiae mire tument & indurantur; observantur supra manus & tibias concretiones tophaceae; genae magis inflantur, genus magis contracta, gingivae minus molles, minusque putridae, quandoque ex angulo mandibulae inferioris excresecunt, fungi, maxillae invicem apprimuntur, parotidibus, erostaphitis & mastoideis simul quatuor-

quandoque induratis; hinc *scorbutus pallidus* appellatur.

Cum vero serum vapidum in textu celluloso cumulat, anasarca scorbutica est; si in pulmonibus, asthma & hydrothorax scorbuticus; si in abdomine, ascites; si intestinis, diarrhœa, æque cum acrior evadit hæc lymphæ, dolores erodentes spasmus dirissimos inducit; et non videntur magis quam ubi coelæ sterno junguntur; hinc dira pleurodyne caries costæ ita corrumpit, ut ipsæ cedant a cartilaginibus, unde quidam strepitus inter respirandum, sed prius asthma spasmodicum, suffocans, diarrhœa colliquativa, & vomitiosa, vel ascites lethalis; hæc species *scorbutus pallidus maritimus* dicitur; in genere vero scorbutus pallidus alius est diuturnior, cum tota æstate, & usque ad autumnii finem perduret. Tophaceus observabat Borgo in Finlandia 1741. & maritici Aboz 1743.

g. *Scorbutus ruber* Abrah. Nitzsch.

Debilitas extrema, cutis admodum rubra, genæ tumidæ & pendulæ, cachexia profunda, gingivæ maxime fungosæ, putres, foetidæ, purulentæ, genus contracta; hæc species etiam lenta in castris Ust-Samaræ observata.

h. *Scorbutus calidus* Abrah. Nitzsch.

Nulla intumescencia, corpus potius macilentum, gingivæ nec fungosæ, nec foetidæ, sed calentes admodum, ita dolent & turgent, ut levem tactum æger non toleret, dolores non ita fixi ac in scorbuticis frigidis; æger continuo querulus statum suum suspirando deplorat, febre exacerbante anomala affigitur, dolores vagi nunc dorsum dimittunt, & dimidium caput vel integrum, necnon collum & dentes exeruciat, vel illico intra vel extra thoracem se propitius orthopnoeam & pleurodynem excitat: si vero fixi sint, abdomen colicis, nephralgia, ischuria & spasmi extrema torquet; genæ valde rigida, & contracta, minus tamen tumida & inflata quam in scorbuticis frigidis, nullæ maculæ; urinæ demum ac febris hæc, speciem distinguunt; urinæ scilicet sedimentum crassum & arenulosum, atque pellucula tenuis, alba, adiposa, supernatans. Observez VViburgi est hæc species.

XXVIII. ELEPHANTIASIS; *Elephas* Levreii lib. 6. Plinii hist. natur. lib. 26. cap. 1. *Elephantus morbus* & *Elephantiasis* Aretæi de morbis diuturnis lib. 2. cap. 13. *Lepra Arabum* vulgo, *Ladrie*. Ejus varietates *Satiriasmi* ac *Leontiasis* nomine insigniuntur. *Ægri Elephantiaci*. Gall. *Ladris*, *Elephantique*.

Morbus est *Ægypti* endemius, nunc in Europa exolevis, chronicus, contagiosus, cujus symptomata characteristica sunt, 1. cutis elephantina, dura, undulosa, hic & illic crassa, rugosa; rimosa, aspera, asneria, nigricans, pilis destituta; 2. Rupor, auribesia potissimum in tibis, manibusque acus puncturam vix sentiensibus; 3. deformitas faciei hor-

renda, genæ atrorubæ, rugæ frontis leoninæ, aspectus fixus, oculi rotundi, nasus refusus, nares foetidæ, crassæ, intus obstruæ, rictus satyrorum; mentum complanatum. Hiis adde vocem nasalem raucam, mores dolosos, malos, somnia terrificæ, gravitatem corporis, pustulas siccas & vitiligines, scissuras, seu thalades in pedibus, ætatem vomeris, glandulosam dispositionem, urinam junctorum, atque bene multa apud *Gordanium*, *Marcellum Donatum*, aliosque autopsas invenienda.

Hæc morbus uti syphilis, aliique hujus ordinis, cum inveteravit exulceratur, ossa cariola redditæ cum foetore horrendo, mediantibus his miasmatis contagiosus est, ulcere & carie delabuntur extremæ partes, ut digitus pedum, manuumque.

t. *Elephantiasis Orientalis*, *Morbus sancti Lazari* Aretæi de morbis diuturnis cap. 13. Profer. Alpini de morbis *Ægyptiorum*; *Lepra Arabum*. C.

Ea est quæ ex oriente, tempore migrationum in Palæstinam Religionis causa instituta, in Europam secunda vice allata fuit, & ducentis abhinc annis exolevit; ea vero minime a lue syphilitica ortum duxisse censenda erat, cum hæc lue tunc temporis nondum in Orientem, nec in Europam irrepisset.

Hanc tribuit *Alpinus* piscibus lutulentis quibus vesceretur *Ægyptii*, iisque salinis, & aquæ canosæ quam potabant. Symptomata hujus morbi alia in incubatione, alia in vigore, alia in fine. 1. *Elephantiasis* occultæ signa sunt, juxta *Gordanium Professorem Maspallensem*, color faciei rubens, vergens ad nigredinem, anhelitus immutatio, vox raucescens, capilli graciliores & rariotes, perspiratio & anhelitus subfoetidi, mores melancholici, mali, dolosi, somnia terrificæ, ephialtes, in quibusdam pustulæ scabiosæ, & morphæa per totum corpus, scorditas cutis, sed nondum corrupta figura corporis, æger non est judicandus ad separationem, seu mittendus ad *Lazaretum*, sed est fortissime comminandus.

2. Signa infallibilia manifestæ elephantiascos sunt dephatio supercilliorum, eorum crassities rotunditas oculorum, dilatio narium exterius, & coarctatio interioris cum dyspnœa, accedit vox nasal, color faciei luridus, lucidusque, vergens ad fuscedinem mortificatam, terribilis aspectus faciei, fixus intuitus, gracilitas & contractio lobi aurium; ex concursu aliquot signorum æger elephantiacus judicatur; sunt autem plura minus constantia, v. gr. pustulæ & excrecentiæ, consumptio musculorum, potissimum illius qui est inter pollicem & indicem, insensibilitas extrenitatum, scissuræ & infectiones cutis, contenta in sanguine nigra, terrea, aspera & atrofosa, & multa alia ab *Auctoribus* relata.

3. Signa levis inveteratæ sunt corrosio & casus vqnic-

vomeris, unde nasus deprimitur; rhagades pedum & manuum, eorumque casus: crassities labiorum; dispositio corporis glandulosa, qualis in subitis leprosis; dispnoea, & vox raucoquua, caerulea; faciei aspectus terribilis, colorque niger, pulsus occultus, parvus: his addit *Gilbertus* cutem lucidam & firmam ad instar corii politi, distortionem juncturarum, facilem refrigerationem cutis, ejus insensibilitatem, aut stuporem cum sensu fornicationis; nasi, oris, oculorum distortionem, veneris appetitum ardentem. Plures hujus morbi varietates, ut si Arabibus credamus, sunt species quarum nomina & signa ex *Gilberto Anglo* mutabimur *Joëo* lepræ elephantiasim nominando.

3. *Elephantiasis legitima*; *Lepra elephantia* *Gilberti* compend. medic. lib. 7. fol. 1337. Species in portu Martigues Gallo Provincie hodiernum endemia. Journ. de Med. Aout 1765. p. 558.

Melastherus seu color faciei & totius corporis lividus, nigricans, ruborve turbidus, seu maculosus ex levi do causa accedens. Aspectus horridus, oculis rotundis, palpebris corrugatis, cutis universalis dura, squalida. Anæsthesia major quam in reliquis speciebus. Scrophula copiosa, strumis duris, lingua granulosa. Aëri tristis, famelici, constipati, cute unctuosus. Supercilia arcuata, nares contractæ. Manus, eoræ, pedes nodosi, musculi consumpti, pustulæ duræ, turpes maculæ, verrucæ nigrae. Labia, nares, frons rugis exarata. Impotentes sunt ad gradiendum & ad opera solita. Fissuræ & separationes crebrae. Urina glauca & tenuis, sanguis niger & densus.

3. *Elephantiasis leonina*. *Lepra leonina* *Gilberti* Angli; affinis est lepræ allopicæ dictæ, procedit a regimine calidiori, ut piperatis, alliatis, vino, &c. C.

Adest supercilliorum depilatio; facies ac totum corpus flavescit ac rubet; est dolor pungitivus in palpebris, oculorum instabilitas, tremulus motus ac rotunditas; nares sunt contractæ ac compressæ; vox est gracilis & aspera quasi cancellorum; rhagades labiorum, crepatura cutis ac omnium juncturarum in manibus, pedibusque separatio; pedibusque separatio, cutis diversis maculis adinstar leonum est variegata; gingivarum adest corrosio ac eruentatio a levi pressione, ægri sunt sibilundi, clamosi, veneri addicti, iracundiores cæteris; pectoris constrictionem, eorporis fragilitatem, veneris strictionem patiuntur.

Impetigo, serpigo, morphæa rubra vel crocea accedunt, ea inveterascente corroduntur extrema, sanguis fluxilis est, difficulter coagulabilis, progressus morbi est celerior quam aliarum specierum cura eadem ac allopicæ lepræ.

4. *Elephantiasis tyria*. *Lepra tyria* *Gilberti*. C. Dicitur a tyro serpente, quia in hac cutis facile deponitur, cito enim putrescit cutis & caro nadjacens; adscribitur piscibus & bestis corruptis; hanc præcedit pallor faciei, morphæa alba; facies est lucida, supercillium, & mentum pilis carent, nullo sudore diffuunt, oculi parvi sunt,

facies fursuracea, cutis humida, squalida, rugosa, unctuosus, alvus laxa; ægri debiles subumida est facies, nasus crassius, crassa supercilia, palpebræ inversæ, oculis deinceps lachrymosis, nares oppilatae, gingivæ & labia putrescunt, extremitates digitorum manuum & pedum incrassantur, putrescunt, crepant, finduntur, cadunt, pustulæ abundantes, excretaiones & narium enunctiones plurimæ, a scalpui cusulvis partis quasi farina, ac fursur excutitur, cruor est aquosus, glandulæ molles oriuntur, &c.

5. *Elephantiasis alopecia*. *Lepra alopecia* *Gilberti*; *alopecia* Græcis, *alopez* vulpes, cui, ait Auctor, supercilia glabra sunt.

Præcedit color faciei ex livido citrino & rubro variegatus, facile mutabilis in pallorem; adest morphæa rubra, sudores multi foetidi, maxime circa pedes & axillas, oculi obliqui, lachrymosi, rubore suffusi, palpebræ invertuntur & incrassantur, nares obstructæ & depressæ forsent, & gingivæ sanies emanat, imo ex cunctis, ubivis scalpatur; cutis mihi dura, lucida, quasi oleo illita, urina rubra & pinguis.

Ex hac historia sequitur multas fuisse species diversorum morborum qui a viru elephantiacosovebantur, quas in hoc opere censimus, quia vix unquam hodie observantur, ut sunt ex prima classe vitiligio, herpes, oedema, verruca, exanthema, loxarthrus; ex quarta strabismus, nyctagmus; ex quinta, dispnoea; ex sexta anoxia anæsthesia, paraphonia, asthenia; ex septima albor, lassitudo, stupor, pruritus; ex octava, satyriasis, panophobia; ex nona stomaceæ, epiphora, scrophula, syphilis, scorbutus, lepra, alopecia, ophiatis, aurigo, & melastherus, ita ut nullum sit virus, si syphiliticum excipiamus, quod pluribus diversis morbis ansam præbeat, unde a magnitudine *elephantia*, a violentia *Herculeus morbus* fuit nuncupatus.

6. *Elephantiasis syphilitica* Domini Raymond. Traité des Maladies qu'il est dangereux de guerir, pag. 357. C.

Est ea quæ a viru venereo pendet, ac per hydrargyrosim sanari potest.

Mulier quinquagenaria, temperamenti melancholici, habebat oculos solito turgidiores & rubros cum debili visu, nulla cilia, nec supercilia, labia crassa, tumida, voem debilem & raucam, nasum depressum, nares patulas, humorem foetidum exsillantem, frontem rugosam, caput omnino calvum, incellum gravem & tardum a sex circiter mensibus, cum pulsu parvo, debili profundo, auditu obscuro, lobis aurium solito crassioribus, cute omnino glabra sine pilis, lucida, crassa, aspera, inæquali, pluribus in locis indurata, aliquali pruritu in toto corpore, aghestia, anhelitu foetido, capitis gravitate, somno sufficienti, alvo libera; maritus syphilide laboraverat, & hoc solum morbi principium incurari in uxore poterat. Unde adhibita hydrargyrosi intra duos menses ea mulier

omni-

omnino convaluit, cutis molliem, caput capitulos suos, visus & auditus suam acutiem recuperant.

Quod autem elephantiasis orientalis altius indolis sit, nec a viru syphilitico pendeat, confirmat altera D. Raymond observatio qua docet mulierem Massiliensem quæ in Insula Cypro elephantiasim contraxerat hydrargyrosi caute adhibita minime sublevarat fuisse, & eum symptomatis vere elephantiasis post aliquot annos obisse.

7. *Elephantiasis Javanensis* Andr. Cleyeri Ephemerid. Naturæ Curiosor. decad. 2. ann. 1. 1683. Collect. Acad. Tom. 3. pag. 532.

Hic morbus novus est in Insula Java, ab anno 1660. Tribuitur usui piscium salitorum, piperis, & radicum ari immoderatissimo.

1. Incipit a tumore tardigrado sed enormi aurum, nec non digitorum, manuum ac pedum, qui & faciem & brachia & crura aggressi hominis figuram mire deturpant, tumores extremorum sensim crescunt, suppurant, & carie ossa corrumpunt, quæ caries in viciniam serpit, nisi pars amputetur; illi tumores sunt duri, scrophulosi, magni. 2. In talis est anæsthesia tanta ut acubus perforari nil sentiant. 3. Similis est sensus abolitio in maculis lividis per cutem respersis, inde sequitur capillorum, barbæ, superciliorum defluviu, quod tamen non omnibus accidit.

Ex icone addita hominis eo morbo affecti melius quam ex descriptione cognosci potest hic mirus morbus, qui ob faciei deturpationem tumores scrophulosos, cariosos & maculas lividas nec non anæsthesiam ad elephantiasim accedit, ab ea vtro discrepat ratione mollietatis nativæ cutis; forte novum genus constituit quod genus morbi sit & quæ remedia conveniant in Insula in qua syphilis est febre vulgarior quærit *Illust. Cleyeri*. Respondeo sublimatum corrosivum more Syvietiano & pilulas de conio maculato more Storckii tentari posse.

8. *Elephantiasis simulata* Ambros. Paræi lib. 24. cap. 18.

Verisimilis mendicis præ templi foribus merces suas explicabat, ricam nempe, dololum lignum, & crepitacula quæ elephantiaci manibus concutere soliti erant; facies illi crassioribus pustulis, rubro-lividis conspersa asurgebat; illæ pustulæ ex glutine fabrilis erant effusæ; vocem rauam edebat, laneo collari fauces constringebat ut colorem faciei atro rubrum sibi conciliaret. Paræi frater dolum suspicatus est, & magistratibus mendicium tradidit, qui eum flagris a tortore cadendum judicarent; tortor vero per jocum non verebatur eum graviter cadere qui elephantiacum professus nil sentiret.

9. *Elephantiasis Indica* Couzier Journ. de Med. Decemb. 1757. C.

In Insula Mascarina nullus morbus magis est isto formidandus simulque incurabilis.

Incipit a maculis psululorum tumidis diversis eo-

loris, nunc flavis, nunc rubellis, alias lividis & diversis partibus simul; in habitu corporis multæ glandulæ tument, ægro tamen de cætero vigente. Sensim phalanges pedum & manuum multum intumescunt, unde digitorum usus amittitur. Supervenient in toto corpore tubercula dura, nec adherentia nec dolentia, quæ crescunt & in pedibus brachiisque potissimum exulcerantur, & hæc ulcera cancrofa videntur, excepto quod non dolent; digiti pedum, manuumque hinc exedi & destitui solent; jam coryza ægrotum adortur, radix nasi incrassatur, ibi ossa cariosa sunt, unde sanies foetidissima emanat, labia intumescunt; frons, eilia, palpebræ elevantur, facies abt. in larvam horrendam. Macies marasmodica totius corporis ad unguitur, cutis arida, aspera tactu, callis, maculisque lividis vel nigris respersa, scelerum involvit. Cum ulcera numerosissima, aspectu cancrofa, corpus totum obidente, nulla functio exercetur, inappetentia, agrypnia, cardialgia, nausea continuz eum tormentibus, demum sine pulsus mutatione, mori. Sanguis initio eductus optimus videtur, at prope morbo nigricat consistentia gelatinæ corruptæ; puellæ hunc morbum ante pubertatem experientes impotenter catamenia carent. Morbus a parentibus in prolem & nutritibus in alumnos serpit, aliunde contagii expers.

Curæ. Utuntur Indi cathartics repetitis, emeticis drasticis, hydrargyrum in potu & liu, cum sudorificis omnigenis; his auxiliis depuratur cutis, maculæ quædam evanescent, quædamque tubercula, sed inde peritior atque velocior evadit morbus; causticis etiam maculæ & aperientiæ calidis intrus sumptis tubercula tolluntur, sed ulcera callosa magis evadunt, totaque pars sensum amittit.

Melius est ad vitandum morbum abstinere ab alimentis calidis, liquoribus spirituosus, at utendum diluentibus sabbacis initio, iusculis aperientibus atque lenibus cathartics.

XXIX. LEPROSA: *Lepra* Græcorum, non Arabum; *la lepre*.

Cognoscitur ex pustulis verrucosis, duris, erasilis, vel squamis siccis in corymbis dispositis, per faciem & corpus dispersis cum pruritu harum pustularum: quædam exulcerantur & dein crustacæ evadunt; hinc lepra humida dicitur, si prævaleat illarum numerus; secus, sicca aut arida vocatur.

1. *Lepra Græcorum, lepra ordinaria.*

Cognoscitur ex duris surfuracisque tuberculis, verrucosis, seu verrucas crassas referentibus subrubentibus, sine dolore faciem, manus, totum quandoque corpus afficientibus, quæ sensu carent, vicinia tamen pruriginosa; sæpius cutis vicina est subordematosa, sensu fere destituta, tibiz phlegmaria tumet; hic morbus apud nostrates vix unquam videtur, nisi ægri ex Hispania, ex Oriente, aut ex America

huc

huc accesserint: Chronicus est, & sanatu difficilissimus.

Hydragyrosis hunc morbum exasperat, licet quandoque syphilidis suspicio sit; curatur felicius iusculis ex serpente vulgari seu colubro natrice; vel iuscula paranda ex pullis viperarum carne signatis.

Eum morbum etiam aggredi possumus ope boliorum ex calomelani grani sex, camphoræ grano uno, fiat bolus ex conserva rosarum sexta quaque nocte sumendum, superbibendo potionem cathartica vulgarem; diebus vero ab hoc bolo vacuis fiat bolus ex carnis viperinæ scrupulo uno, camphoræ grano uno cum conserva rosarum sumendum hora somni, dein aquæ marinæ semilibram sequenti mane potabit æger, qua methodo intra mensem lepras aridas sanavit Russellus.

Mentagra Plinii nihil aliud est quam hæc lepra mentum & faciem afficiens.

2. *Lepra ichthyosif* Aët. *Lipix* 1688. pag. 617. *impetigo excoercativa & albaras nigra* Avicennæ, Tom. 2. pagin. 244. *Scalpart.* Centur. II. Observat. 36. Hoffmann. *disquisit.* pag. 138. Vater *Philosoph.* Transact. num. 140. Buffon *Histoir.* natur. Tom. II. pagin. 507. des Maladies du Paraguay, Haller *Phyhol.* Tom. V. pag. 13. L.

Est ea in qua diversæ corporis partes teguntur squamis siccis, albidis, successive superincumbentibus, eodem ordine ac modo quo squamæ piscium: illæ, observante *Davero*, amplæ sunt, & circulo rubro cinctæ apud Asiaticos.

Juxta *Avicennam*, *albaras nigra* nominatur, „impetigo excoercativa & est scabiositas acci-
dens cuti, aspera, vehemens, & facit squamas
„sicut sunt piscium, cum pruritu; & est de an-
„tecedentibus lepram, & est cum malicia. *Avi-*
„*cenna* cap. 9. de morbo.

In observatione ichthyosif Aët. *Lipiensium* æger non solum squamis piscium instar testus erat, sed etiam piscium odorem spargebat.

3. *Lepra Indica* Boerhaave consult. 43. *Impetigo Americana* Guill. Pisonis cap. 18. *Empigo* Luthranis. C.

Cutis hic illic crustacea, squamosa; crustæ articulos & caput præcipue invadunt, de cætero passim in tota cute conspicuæ, & si scalpantur, ichorem album emittunt. Hæc specie a pueritia per octodecim annos laborabant mulier in Barbarabonibus Insulis nata, hysteralgia & leucorrhœa affecta cum doloribus vagis totius corporis, præcipue capitis; noctes illi inquietæ, calores subri invadentes & recedentes; frigoris impatiens vultus olim vegetus, dein pallido-flavus, debilitas crescens, saburra pituitosa in ventriculo.

Curatio. Abstulit venere & bacco, usâ lactiniis, oleibz farinosis, nulla carne; mitiora antiscorbutica, obtundentia sumpsit; dein usu calomelani & hydrargyroseo passa pyralissimum, inde crustis liberabatur cutis, dein per mensem usâ est decoctio lignorum & corticis ulmi, medicamentis viperinis, pulveribus testaceis, sed hyeme repul-

sulavit morbus; vere sequente pyralissimum exciatus mercurialibus, inde recuperata aquas Scarburienfes potavit, in mari balnea sumpsit, hyeme vero reversum est malum. Ad dictam lætæam vere confugit, aquas & balnea Bathonica intra mensem adhibuit, sed rursus post sex menses lepra rediit.

Boerhaave tunc præscripsit frictions ex pannis asperis fumo sulphuris accensî penetratis, ubique corporis: interea triduo ante novilunium & plenilunium perurgeat sic: *Æthiopsis mineralis* grana 1x, resinæ jalappæ, gr. 1v, sacchari, gr. 111; scammoni, gran. v. sibi diaphoretici, gran. xiv. fiat pulvis tenuissimus: vespere vero cathartism sequente, sumat aquæ melissæ, unc. 11; spiritus viæ Matthioli, drachm. 11, syrupi diacodii, drachm. vi; tincturæ succini, gutt. 1x. cæteris vero mensibus diebus quotidie ter sorbeat singulis vicibus uncias v. decocti ex radicis bardanæ recent. unc. tv & graminis unc. 111; eryngii, unc. 11; lapathi acuti, drachm. 11; scabiosæ recentis, n. 1; corpus exerceat, abstineat a salis, fumo induratis; & maxime a pinguibus ut lardo.

4. *Lepra Asturiensis* Thierry apud Vendemon. de Journ. de Med. May 1755. pag. 337. *Mal de Rosa* Hispanis. C.

Est lepra scorbutica, endemia apud Asturienses, cum tremore capitis & trunci partis superioris, cicatrice manuum & pedum coloris rosæ, collari herpetico, aliisque diris symptomatis.

Potissimum symptoma, quod *la Rosa* vocant Hispani, est crusta acida, nigricans, scabra, rhagadibus variis sulcata, valde dolorifica, visu horrenda, & foetidissima, cujus sedes est in parte supina manuum vel pedum, non raro in brachis, cubito, capite, abdomine, huic sunt valde obnoxii Asturienses, qui in valibus præalti humidis, soli ferè perpervius habitant: vere accedit hæc crusta incipiens: a rubore aspero, dein crustaceo; æstæte crustæ delabuntur, superflua vestigia cicatricosa, glabra, rubella, rosacea, pilis nuda, infra cutis libellam depressa, lucida, cicatricis ambusta partis æmula, hæc vestigia per vitam perseverant, crustæ vero quolibet vere revertuntur & plures simul partes afficiunt. 2. Alterum symptoma non infrequens est collare seu crusta cinereo-flavescens, duos digitos lata, & collo dependens, & bifariam divaricata, cum appendice juxta sternum descendente. 3. Tercium symptoma est tremor capitis & trunci continuus, instar arundinis vento agitatæ. 4. Ardor oris dolorificus. 5. Lingua fœdida. 6. Ptyæxæ laborum. 7. Cardialgia a debilitate stomachi. 8. Asthenia universalis, non tamen læso affigens, gravativa, potissimum in cruribus, unde inertia. 9. Calor læti ipsi intolerabilis est, frigus tamen eos minime juvat, mæror est continuus; sine

sine ratione & mentis compotes clamant quandoque & vociferantur.

Hæcenus symptomata omnibus ferme ægris communia retulimus, rariora vero sunt paraphrosyne fugax, sensus alterutrius jactura, ut agnoscit, anæsthesia partialis, crustæ, ulcera, erysipelata in diversis locis præter assignata, febres anomale, somnus inquietus, cutis decolor & primus gradus elephantiazeos.

Morbus terminatur ascite, serophulis, vel atrophia; ac ætate supervenit non raro melancholia errabunda, quæ in desperationem conjiciens ipsi sæpe lethalis est.

Incurabilis censetur hic morbus: juvat tamen 1. diæta lactea; 2. butyrum intus & extus adhibitum; 3. pilulæ ex croco martis, æthiopo mercuriali, antimonio crudo & balsamis; 4. interposita cathartica: hæc refert testis *Illust. Thierry D. M. Paris.*

5. *Lepra Herpetica, Dartres encroûtées, lepre humide.*

Cognoscitur ex herpetibus crustaceis, squamosis, albis, hyeme majoribus, & suppurantibus, noctu intolerabiliter prurientibus, brachia ambo usque ad carpum, ambo femora, tibiasque usque ad pedes quandoque tegentibus; scalpiti cruentantur hæc lepra; poplites & cubiti vix flecti possunt, præcellerunt non raro tinea malignæ.

Adversus hunc morbum valet hic processus euratoriis: 1. vena secetur; 2. cathartici instituantur; 3. juscula decem fumantur cum ranis & uncia una ac semisse carnis colubri natricis, beccabungæ & cardamini solis; 4. ingreditur æger balneum per decem dies iterandum, bibendo libram seri lactis; 5. iterato purgatus juscula priora repetet, 6. & iterum purgatus balnea iteret; 7. juscula dein ex testudine & cancri cum silymbrio & cichorio sumat, 8. jusculis finitibus purgetur & balneis utatur; 9. post sufficiens intervallum aquas sulphureas Euzetenses per novem dies sumat, easque post octiduum iteret, & si ea methodus non suffecerit, ad litus mercuriales deveniendum erit.

6. *Lepra malum mortuum; Malum mortuum* Gordonii liliun path. 1. rubric. 3. Attritici de tumoribus lib. 1. pag. 401. *Le mal mort. L.*

Cognoscitur ex pustulis crustosis, magnis, fœdis, sine sanie, cum quadam insensibilitate & turpi aspectu, in coxis & tibiis frequentius evenientibus. *Gordon.*

Mihi apparuit sub forma postularum monete majoris aut minoris magnitudine, in brachiis, femoribus, raro in facie: hæc pustulæ lineam & ultra crassæ, sunt siccæ, distanterissimæ ab invicem, crustosæ, obscuri coloris, sine dolore, fixæ, pertinacissimæ, viz pruriginosæ, his elapsis cutis infra est granulosa, non exulcerata, rubra.

Immerito hic morbus inter herpes crustaceos habetur, lepræ magis affinis est. Religiøsæ orphanotrophii Montpelienfis, sine ullis causticis, hunc morbum sanare consueverunt,

eodem modo quo sanatur tinea maligna, scilicet per picationem seu dropacismum.

XXX. SCABIES; *Psora Græcis; Itch Anglis; Regne Occitanis; Gale.*

Cognoscitur ex pustulis exiguis, lentis aut grani milii circiter magnitudine, scalpendo ruptis, & dein crustosis, insigniter prurientibus, manus potissimum infestantibus, contagiosis.

Hæc lues incipit in digitis, eorumque intersticiis; adsunt phlyctænæ seu vesiculæ acri sero plenæ, rubellæ, calentes, quibus per scalpum ruptis succedunt crustæ siccæ cum exiguis rhagadibus & pruritu importuno; si pustulæ una aut altera linea in diametro non sint minores & discedet, scabies est *humida vulgaris*; si grano milii circiter æquales, densæ, dolentissimæ, intensius rubræ, scabies est *canina vel herpetica*.

Hic affectus vel sponte oritur & partes frigori expositas, ut manus, genua, cubitum potissimum afficit; inde per corpus dispergitur; sæpius contagio immediato suscipitur, sordidis, rusticis, montium incolis & juvenibus familiaris.

Differt a pruritu per pustulas; in pruritu enim ad summum cutis est leviter aspera, non pustulis exca. Differt a lepra quod tubercula crustosa, verrucosa, multo latiora, & altiora potissimum in facie, eaque hic illic sparsa, vel squamosas pustulas gerat leprosus.

Scabies utrumque pruritu molestissima sit, nullum vitæ periculum importat; maxime si topica sit, nec sanguinem alte infecerit virus; imo datur scabies critica & salutaris in morbis gravioribus, ac apud Indos scabiosi a pluribus aliis morbis immunes sunt; inoculata graves quosdam morbos sanat.

1. *Scabies humida, benigna* Frid. Hoffmanni T. II. p. 426. *Gale commune ou bouton. L.*

Pustulis hic & illic in digitis, carpo, intersticiis digitorum, initio rubellis, dein scalpiti assiduo quæsi pruritus imperat humidis, cognoscitur. Noctu pruritus acior est cum calore, æger ungulibus partem quandoque cruentat, unde dolor.

Scabies illa vel spontanea est ab immunditie, retenta perspiratione & regimine calidiori, ut salsamentis orunda, eaque viru suo sanguinem inficit, diutiusque resistit, vel est acquisita contactu scilicet scabioforum induriorum, chirothecarum gestatione, concubitu, eaque facilius abigitur.

Curatur utraque litu ex unguento sulphuris, verum prior exigat ut præmittantur phlebotomizæ, cathartici & juscula diluentia & diuretica ex radicibus lapathi, enulæ campanæ, foliis silymbrii aquatici, fumarizæ, chærophylli &c. ino si æger sit macilentus & temperamenti calidi, præmittatur usus seri lactis per viginti dies, dein inungatur partitis vicibus eorum

cor-

corpus excepto capite, ita ut intra sex dies vespere lectum petiturus hos opus absolvat.

Sulphuris vivi uncias tres bulliant cum olei olivaeum libris duabus & semisse ad quartæ partis consumptionem, huic linimento adde, si lubet, natri drachmas quatuor, succi citri uncias duas.

Interea aer frigidiore vitandus, inducia vero imo vestes ita fœrent a sulphure, ut vix tolerari possint, atque his etiam mutatis, odor per mentem alias vestes infundit: de cætero tuta est hæc curandi methodus. Altera non minus tuta methodus a clariss. Chirurgo Mœspel. D. Goulard evulgata in libro cui titulus: *traité des effets des préparations du plomb* pag. 297. scilicet fero & mane eluat æger partes affectas aqua sale saturni, vel, ut ait ipse, saturni extracto tincta seu dealbata; & post quatuor vel quinque dies, eruptione finita, aquæ ejusdem libris duabus salis marini semi-uncia addatur & lotio continuetur, qua sola methodo, sine fœtore, sine periculo intra decem circiter dies scabies humida & canina evanescunt.

Tertia methodus est eadem quæ ad syphilidem adhibetur; pomata scilicet mercuriali inungitur corpus, parietis vicibus, præmiis phlebotomia & cathartici, verum nisi æger balneis; jusculisque præparatus fuerit, sæpe pyralismus supervenit, & si aeri frigido se exponat, tremorem, pallorem aliaque gravia incommoda incurrit.

2. Scabies critica. Gale critique.

Ea est quæ sponte morbis tum acutis, tum chronicis superveniens, eos solvit, natura scilicet pravos humores morbosos ad cutem amandante; quam speciem minime repercutere decet, sed correctæ opæ dietæ & medicaminum internorum sanguinis acrimonia, demum remediis specificis supra assignatis curare.

3. Scabies canina. Gale de chien, fœche; Grattelle. L.

Est ea cujus pustulæ sunt miliares & confertæ, cum rhagadibus & crustis siccis exiguis.

Ea est priori pertinacior & molestior; a sanguinis acrimonia singulari fovetur, atque ut hyeme luxuriat, ita dissciliter hac tempestate sanatur, expectanda sæpe est æstas ut curetur: in hunc finem post phlebotomiam & cathartism usurpanda sunt balnea domestica cum jusculis diureticis & diluentibus, dein serum lactis succo sylvæstri, echinei vel fumarie alteratum diu est adhibendum antequam ad externa eveniamus.

Virus scabiosum topicis aggredi, ut suadet Helmontius, non satis edulcorato sanguine, periculosum est, inde enim superveniunt morbi convulsivi, febres variz, dyspnoea, cachexia, ascites, anasarca, deliria, hæmaturia nigricans, quæ cuncta debellantur resumpta scabie, ex consilio Zucati Lusitani & Etmulleri, quod hic gestando indusium scabiosi non lotum.

4. Scabies herpetica. Gale dartreuse. L.

Savages Nosologia Methodica Tom. II.

Cognoscitur ex signi herpetis & scabiei simul concurrentibus, seu ex confluentibus, in amplos corymbos coeuntibus, papulis pruriginosis, rubris, quæ squamas albas, farinaceas deponunt, de quo vide *Herpetem*, *Class. I. gen. 7.*

Illa species exigit remedia interna aëscorbatica diu usurpata, cum balneis, fero lactis, lacte ipso; demum aqua saturni per plures dies eluunt partes affectæ; quo facto adhibetur angustum ex auxungie porcine libris duabus, sulphuris vivi uncias quatuor, aluminis & extracti saturnini dilui ana uncias duabus, misce, illinatur bis in die; vel denique pustulæ extracto saturni putore tangantur opo penicilli.

5. Scabies scorbatica Balthazar. Timæi lib. 4. cal. 15. C.

Valde dubium est utrum detur hæc species a prioribus distincta, de qua ne verbum profert eruditus in hisce Lind: imo scorbutum scabiei infusione sanari docet J. Iperen *Acta Soc. Harlem. Tom. IV. p. 367.*

6. Scabies Indica Bontii c. 17. Herpes seu impetigo Indica, Courap indigenis dicta, Bontii.

Ea ut plurimum alas, pectus, inguina, faciem, imo quandoque totum corpus, occupat cum pruritu intolerabili, adeo ut ægri a scalpando dies & noctes manus abstinere nequeant, hanc voluptatem acerba poenitentia sequitur, dolor enim sequitur acer, & indurata partibus excoriatis adhærentia sine crustarum laceratione avelli nequeunt: deformis, scabra ac furfuracea cutis est: sed hoc affectu detenti ab aliis gravibus morbis immunes sunt, unde hujus cura vulgo negligitur.

Cura. Pramittatur cathartici repetita, interpositis jusculis diluentibus, diureticis, refrigerantibus, dein ad topicum sequens deveniatur, ex ferruginis uncia una, sulphuris drachma semisse, cum succo basilici, hant pastilli quibus in aceto dissolutis illinantur partes scabiosæ.

Vel opii drachma una & semis, calcis vivæ ex conchyliis ustis scrupuli duo, fricentur in marmore cum succo pomi amoris: usus abrasilis crustis herpetis illinat, ad eadem confert succo limonis cum rutia aut cerussa, quo solo topico præmissa unica cathartici Bontius se ipsum curavit. Confert etiam oleum benzoini adjecto nitro, vel momento sublimati corrosivi.

Puella quæ a nutrice syphilidem contraxerat cum lacte, pustulis & ulceribus affligebatur, nono ætatis anno salivationem ex mercurio passa sanata videbatur, aut rediit scabies syphilitica, & decimum octavum ætatis annum adepta sanata fuit opo pilularum de cicuta, quantum quinque vel sex grana ter de die sumebat; ea decocto cicutæ cum sapone utebatur; identidem jalappa intervenit purgabat; sic intra quatuor menses sanata fuit. *Locher pag. 106.*

7. Scabies catamenialis, Melch. Fribe Collect. Acad. T. III. p. 122. L.

Puella quolibet mense, cum menstrua suppressa erumpere debissent, scabie tentabatur, quo tempore

porre elapso, exsiccatis pustulis, convalescebat: demum sumptis medicaminibus sanguini depurando aptis & catharticis, nec non bis secta pedis vena; per medicamenta apposita restitutus est menstruum fluxus, & tunc puella, quæ syphilide laborare a vicinis putabatur, sanata est.

8. *Scabies felina*, Georg. VVollg. VVedellii Collect. Acad. Tom. III. pag. 156. L.

Per duos annos in VVestphalia vixit inter feles epidemica scabies quæ in quorundam miliarium spatio hanc animantium speciem fere destruxit; hæc caput ad collum usque tantum obsidebat, oculi macula quadam, visum tamen non præpediente, erant affecti, dein vero suppuratione absolvebantur: omnes feles durante hoc morbo foxallenti erant, nec nisi ad pabulum captandum evigilabant; morbus contagiosus erat; interea qui scotum custodiebantur ab hoc immunes non erant: paucissimi oleo balneæ uncti evaserunt.

III. *Equæ Linnaeus* observavit scabiem pecorum lepræ affinem ob tuberculorum crassitiem & duritiem, quæ fovebatur ab insectis intra tubercula latentibus: hæc vero insecta erant *fasciæ* Syll. *Natura*: idam III. *Author* existimat cum *D. Deidier*, *Vercellano*, aliisque, scabies, lepras, aliaque impetiginum genera ab acaris, aliisve infectis produci.

9. *Scabies morumorum*, Ephem. Nat. Cur. D. II. Ann. I. obs. 128.

10. *Scabies critica*, Ephem. Nat. Cur. in *emphysemate*, Dec. I. Ann. II. obs. 146. in *menorrhagia immunda*, Dec. II. Ann. IV. obs. 307. in *dyssenteria*, Dec. II. Ann. X. obs. 130. in *melancholia*, Dec. III. Ann. V. obs. 16. Fr. Hoffmanni p. 263. in *ischia*, Dec. III. Ann. VI. obs. 27. in *rheumatismo*, Fr. Hoffmanni de doloribus, p. 320. §. 12, in *epilepsia*, Fr. Hoffmanni de Epil. p. 13.

11. *Scabies vermicularis*, Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. p. 37.

Ea est quæ a sironibus cutem excavantibus produciatur, quam frequentissimam putat *D. Linnaeus*; vide Ephem. Nat. Cur. Cent. XI. obs. 21, ea erat humida. In scabie, lepra, herpetibus inveteratis nihil efficacius est longo usu extracti hyoscyami vel cicute inter sumpti.

XXXI. *TINEA*: *Teigne*.

Arabibus Sahasati ficum & Sahasati humidum. Græcis psyraxia, lichen, eleydia, aschor. Latinis crusta, lactea, ignis volaticus, serri, tinea, porrigio, &c. Nostribus signa, seu volage, rasque, rache, debarde &c.

Cognoscitur ex crustis & exulcerationibus eorum faciei, tum capillitii, usque vel faciei vel humidis.

Incipiunt hi affectus a pustulis vel vesiculis capitis vel faciei diversicoloribus, quæ ruptæ exulcerantur & in crustas diversicolores, humidæ, vel siccas abeunt; illæ omnes pustulæ con-

fluunt in ambos corymbos quibus magna pars tum faciei, tum capillitii deforatur.

Speciem characteres cernores desiderantur. Sedes est in corymbis seu glandulis sebaceis cutis, in quibus secernitur unguentum cuti delinendum aptum, illud in capillitio copiosum, crassum, furfuraceum est, *strigmentum* dictum, quia frigitur seu pedine evectitur, Gallice *crasse*; in facie vero illud est oleosum, tenuius. Incipimus a duabus tinea benignis.

1. *Tinea lactea*; *Acholes* Græcis, *lactumina*, *crusta lactea* Latinis; Occitanis *signe*; *crouse de lait*; L.

Hæc species omnium mitissima, frontem; temporaque obidet ut tinea volatica, sed infantibus tantum annuis, bimivæ accidit, dum lacte utuntur, unde crusta lactea vocatur. Incipit a phlyctænis seu vesiculis numerosis oleoso succo turgidis, coherentibus, albis, deinde flavescens; illæ vesiculæ exsiccatæ, corrugatæ fundunt paucum humorem concolorem, blandum, qui exsiccatæ crustas efficit easque vel siccas vel humidas, albescentes vel flavas, raro brunneas; adeit pruritus, unde scalpendo infans has crustas avellit, his abietis, cutis subitanea manet nuda, aut non raro raris foraminibus circularibus perforata, unde fluit humor viscidus iterum in crustas abeunt. Sanato morbo cutis illibata manet.

Serpit quandoque tinea lactea in partem capitis politam, aures, mentum, collum, imo in totum corpus; huic obnoxii sunt alumni pingues, qui succo abundante lacteo, qui nutrites voraces, pingues, lacte turgidas sugunt; accidit hic etiam affectus pueri seminio scrophuloso ut nondum evoluto fœtis, aut quorum sanguis acrimonia peccat ac errores nutritis iracundæ, vino deditæ, scrophulose &c.

Hic morbus ablactato infante, mutata nutritrice, & lacte juniori, tenuiori, minus butyroso adhibito sanari consuevit; his infantibus senior est & difficilior denitio, alvus scior, rachitis sæpius imminet; nisi imprudenter repereatur eruptio, nec quidquam agendum nisi acrimonia humorum stipetur, nimiumque in exteris corporis partes serpat; nutritrix in hoc casu eligenda junior, lac minus butyrosus, serosus, blandius, vel victu humectante nutritis edulcorandum, diluendum; alumnus identidem cum syrupo de dichorio composito vel florum perficæ purgabitur, somnus syrupo de papavere conciliabitur, pruritus oleo amygdalarum illito compescetur, abstinendum a tutia, cerussa, ne repereatur morbus, fluxus reperculsus folii betæ faciei, capitive admotis renovabitur, &c.

2. *Tinea volatica*, seu volage. L.

Lieben Græcis, *vitiligo* & *mentagra* quibusdam, maxime dum mento inhæret. *Sahasati* Arabum; *ignis folivestris* ignis volaticus vulgo.

Accidit infantibus semeltribus, denitio proxima, raro etiam septennibus dum primi dentes elabuntur novique succrescunt, quandoque hanc ætatem prætergressis; oriuntur in labiis

his ac mento vesiculæ gregales & corymbosæ, quasi verrucæ pure turgidæ, ex quibus serum purulentum dimittit; his elapsis, cutis substriata, erysipelatosa, mucosa, parum rimosa videtur; hic affectus herpetibus crustaceis affinis est, & ratione sedis ad tinea attinet: hoc sanato morbo nulla vesigia in cute supersunt cum sola epidermis læsa sit.

Morbus periculo vacat nisi incaute repercutiatur; inde enim ophthalmia, cophosis, dynochus, diarrhœa, imo phthisis, ut ex repressa tinea lactea, oriri possint; fluxus vero reperculsus revocatur appposito emplastro pulvere cantharidum adperso, vel compensatur cathari identidem adhibita aut cusa occipitis fontanella.

Regimen humectans & blandum procedente ætate morbum tollit, interea si acrior sit materies, jussulis, fero lactis, lacte, balneis utendum est, imo ad usum millepedum, cancrorum, martialis, aquilæ alba deveniendum est; inter topica usitatissimum apud nos est scorie ferri pulverata vulgo *maicher*; laudatur etiam oleum ex papyro, linteum, imo tritico combustum, & intra catinos suffocato, oleum olivarum cum pulparadicis lapathi vel axungia suilla eadem pulpa commixta; lapsum crustarum promouet cataplasma e foliis betæ & oleo liliorum vel cremor lactis, vel ceratum Caleni. *Astrucius*. Jam ad tinea malignas deveniamus.

3. *Tinea favosa Astrucii*; *Keira* Græcorum, *Meliceris* Aetii lib. 6. an *Meliceris* Celsi lib. 5. cap. 28. *Favi* Latiporum; *Kerion* Gorræi definit. *Tinea humida a rayon de miel*; *Rachis humide*, *debord*.

Distinguitur ab omnibus aliis speciebus parvis abscessibus apice albis, corio capillitis vix altioribus, piso non majoribus, qui citra ullam prægressam inflammationem in capite efformantur, facile & sponte vel levi digitorum pressione crepant & fundunt veluti pultem albo-flavescentem, quæ exsiccata squamas griseas relinquit; hinc similis est alveolis savi melle albedo turgidis, unde tinea favina vel favosa dicta est, totum capillarium hisce savis vel crustis sæpe est defœdatur.

Propter sordiditatem & purulentæ putredinem acerrime fortet caput tinea affictum, & ob peccationis defectum pediculi generantur, inde pruritus & scalptus dirissimus, inde pervigilium, macies, quandoque cum hætica, faciei pallore, quod de sequentibus speciebus maxime intelligendum.

4. *Tinea fœosa Astrucii* tom. 1. pag. 380. *Teigne fœuense*. L.

Est pariter humida & a favosa discrepat in quod non foveolis purulentis sint excrecentiæ turgidæ prunis subrotundis, flavis quæ hæcūm granis imitatur, unde nomen.

5. *Tinea humida. Sabasati humidum*. *Teigne humide simpl.* Astrucii ibidem. L.

Incipit a vehiculis ut in herpete miliari; quæ in solo capillitio ad capillorum radices observantur, densissimæ, raro supercilia & mentum

attingunt; illæ vesiculæ humore corrosivo sciant, citoque abeunt in ulcera totum fere caput obidentia, hinc capillorum delapsus, quasi a tinea insecto erosi fuissent; differt hæc species a favosa & fœosa defectu savorum & granorum quæ in illis observantur; omnes tres humidæ sunt, unde differunt a sequentibus quæ siccæ & casatu difficiliores sunt.

Ad curandam tineam humidam non raro sufficit capillitio tonso caput abstergere ope mellis, cataplasmati instar appositi, quod post sex horas circiter auferetur & iterum his aut ter novum mel applicatur, & sic crustæ auferuntur; si vero cuticula rubeat, teneriorve sit, sufficit bis aut ter applicuisse butyrum, vel cremorem lactis: cutis sic deterfa sanatur & capilli dein succrescunt, quod vix aut raro accidit in tinea sicca quæ proprie apud nos *Rasque* nuncupatur.

In curatione tinea sicca seu malignæ, si quoddam virus syphiliticum, scrophulosumve lateat, illi prius occurrendum est remediis propriis, deinde vero si sola sit acrimonia sanguinis, ea corrigenda jussulis diluentibus, lenientibus, diureticis, additis etiam preparatis mercurialibus; phlebotomia & catharsis identidem repetuntur; in macilentis balnea, serum lactis, lac ipsum ante curam radicalem præscribuntur, quibus præmissis ad topica deveniendum est. Necessaria est in hoc morbo pilorum eradicatio, quæ sit ope picis suæ quæ linteæ obducuntur; hæc vero in diversa loramenta divisa applicantur calide capillitio tonso & per octo dies relinquuntur, illa cuti capillitioque fortiter adherent & post octiduum avelluntur; verum antea removende sunt omnes crustæ, ut in tinea humida ope urinae, vel butyri, mellis, vel ceræ, vel soliorum symplicis in axungia suilla decoctorum, eaque semel vel bis capiti per horas viginti quatuor imponi debent; salsa avulsione emplastri, regitur caput vel unguento sancti Ludovici in Nosocomis cognitum, vel solis betæ butyro oblitis, quod iteratur per aliquot dies, usquequo inflammatio vel irritatio compeſcantur.

Sedata omnino inflammatione eluitur caput urina calida vel decocto brassicæ rubræ, aut fumarizæ, radicem lapathi, enulæ campanæ, imo e lixivio cinerum leviori, & dein ulcera curantur quotidie appositis plumaculis, digestivo unguento onustis, deinceps vero solo balsamo Arceæ, pars capillitii quæ coloris est rosei sanationis sperg proxima facit, ac quæ abbescit vel nigricat diutius restitit aut sanata revertitur.

Itaque hæc ultima loca regenda sunt unguentis acrioribus, ut balsamo viridi vel fusco, quod ingreditur basilicum & præcipitum rubrum; si quæ sint excrecentiæ, ut in lupina, esse forficibus sunt refecandæ vel præcipitatum rubro, imo lapide infernali sunt erodendæ.

Cum tinea cicatrice obducitur, cathartica identidem præscribenda sunt; in hac curatione

tempeſtas mitis eſt eligenda, ſæpe etenim vidi ſupervenire tuſſim, ſebrem ephemeram, & non raro anafarca, quibus non ita facile liberantur tineaſi, dimiſſo ad aliud tempus tinea curandæ negotio.

6. *Tinea porriginofa* Aſtruc. tom. 1. pag. 381. *Pityriaſis* Pauli Æginetæ. *Purpurifca* Gilberti Angli. *Porrigo* multis. *Tinea ſurfuracea* Sennerti. *Taigne de ſon ou farineuſe*; 1. *Rache farineuſe*. L.

Eſt ea cujus exacerationes rimas quaſdam altas tantummodo eundem eaſque ſiccas & calloſas, continuoque ſcætant ſurſu albeſcentem copioſo, & inter peſtinandum deciduo. Juſcula e colubris & lotio ex urina ſuccceſſit *Zacuto*.

7. *Tinea cruſtacea* Aſtruc ibid. *Taigne crouteuſe*; 2. *Rache ſèche*. L.

Ea eſt cujus ulcera cruſtis cinereis nigricantibus vel lividis & ſœdiſſimis teſta ſunt.

8. *Tinea lupina* Aſtruc. *Taigne lupineuſe ou ecailleuſe*; 3. *Rache ſèche*. L.

Eſt ea ſicca tinea que gerit ulcera ſquamis & callis incræſſatis, lupinorum vel ciccerum inſtar capiat, marginata.

Tineaſi ſortent capite, ſæpe pediculis obſidentur, ſcalpſu ſquamæ avellunt & caput cruentant, vix dormiunt, macilenti, pallidi, tabidi evadunt, ephemera ſæpe tentantur; reſtreſſa frigore tinea poſſimum pilis eradiciſis incidunt plures in anafarcam initio febre ſipſaram.

9. *Tinea ſyphilitica* Heiſterii Chirurg. part. 2. lib. 5. cap. 10. *Scabies venerea capitis*; *Rache veroleuſe*. C.

Ea ſpecies eſt cruſtacea, alba, ſarinoſa circa tempora & frontem, tum coronæ veneris, ſeu varorum ſerie in ambitu frontis, nec non cum herpete ſarinoſo aurium; atque ſi malum inveteratum ſit, cum tophiſ & gummatibus infra eum in diverſa capitis partibus.

In hac ſpecie non ſolum requiruntur remedia ſyphilitici propria antequam topica adhibeantur; verum inter ipſa topica prudens litus mercurialis ſæpe neceſſarius eſt.

O R D O S E X T U S.

ICTERICITÆ.

Deſcoloratione Plateri; *Cachexia icterica* Prid. Hoffmann.

Sunt morbi quorum præcipuum ſymptoma in conſtanti coloris nativi mutatione conſiſtit. *Ictericis* vulgo vocantur, & icteri ſtavi, albi, virides, nigri &c.

Theoria colorum primaria ſeu Nevvtoniana horum diverſitatem repetit a molecularum pollicis millioneſimarum craſſitie & denſitate, verum a ſenſibus remotior ea eſt, quam ut præxi medicæ poſſit applicari, adeoque ad humoris in cute prædominantis colorem tum nativum tum alteratum conſuegit ut icteritiarum cauſas intelligamus: ex lymphaticorum & ſanguineorum vaſculorum proportionem ſana pendet color roſeus cutis, fibrarum vero omnino, emſanguineus color eſt

albus ut ſclerotici, quod inteſtinalium, muſculorumque conſtanti elutriatione comprobatur; ſi humor quem glandulæ ſebacæ cutis effundunt exſiccetur, ſole torreatur aut prava ſanguinis craſi vieietur, color nativus immutatur & in luridum, liveſcentem, flavum, brunneum abit, quod in morbis huiusce claſſis & poſſimum hujus ordinis familiare eſt.

Rubefcit cutis in phlegmaſi, quia cum cruor ſoliſo majori vi impellatur in vaſa ultima, in lymphatica ſubie, cætera dilatatur, unde proportio nariva colorum mutatur, ſeu ruber horumce vaſculorum color prædominium tenet. In hydropibus, ut anafarca pallor occupat artus, ſeu albeſcit cutis, quia non eſt ſanguini vis ſufficiens ut ad minima utque vaſcula cutis perveniat, hinc color albus nativus cutis & lymphæ prædominatur. In aurigine etiam languet vis truliva cordis, ſanguinis ad cutanea vaſa vix pertingit, aliunde vero lymphæ eſt bilis colore perſuſa; unde flavus vel luteus color eminet.

Pallor in omnibus ſere chronicis cachecticis obſervatur, quia robur ſacratæ vitalis in omnibus languet, unde cruor non ſufficiens vi accedit ad vaſcula cutis, ut ea ſubire poſſit; ſed per paulo patentiores venas ad cor revertitur, quæ cum venæ non ſint pellucidæ ad inſtar minimarum, rubore ſuo cutem non ſuffundunt; quare vero tam facile venas majusculas cruor ſubeat, non ita vero minimas? ratio eſt quia aſſiſtus quos fluida patiuntur in tubulis ſunt reciproce ut eorum diametri, & quod globulorum cruoris diameter eſt major diametro globulorum lymphæ atque ſuæ diviſioni hi globuli reſiſtunt aliquantulum; unde patet quod vi que ſufficit ad trudendum globulorum cruoris indiviſum per vaſ majus, inſufficiens ſit ad illum trudendum per vaſ multo minus, eumque in minores globulos dividendum: hæc theoria firmatur experimentis hydrodynamicis, quibus conſtat quantitatē fluidorum quæ ex eadem altitudine delabens tranſit per vaſa capillaria diverſæ diametri eſſe in ratione triplicata diametrorum; quod certe non accidit niſi ubi vaſa ſunt capillaria; cum itaque ab eadem vi trudente quantitas adeo exigua ſubeat vaſa capillaria minima, evidens eſt multo majorem eſſe minimorum quam majusculorum vaſorum reſiſtentiam ab aſſiſtu oriundam.

Ex his patet cur vel languente vi vitali pallescit illico facies ut in terrore, metu, ſyncope; cur etiam eſcēſcente anguſta capillarum, ut a frigore, cutis illico pallescat; cur denum in chronicis cachecticis pallor ſit ſymptoma familiariffimum.

Eſt & aliud ſymptoma chloroſi, aurigini inveteratæ, omnibus hydropibus tum partialibus tum univerſalibus familiare, quod leucophlegmatiam *Plateri*, nos vero phlogmatiam nominavimus, ſcilicet in his omnibus morbis, ſi inveteraſcant, extrema imatument ædenatoſe, id eſt cum mollicie; ſi vero ſubito fiat tumor, ut in anafarca ſubitanea, tumor eſt quidem albus, ſed ſimul firmus; horum veto phænomena.

notum theoria vulgaris falsa mihi videtur. Ut rationem eorum intelligamus observandum est arteria non solum tenuioribus, sed laxioribus partibus esse præditas qua proportionem a corde recedunt, seu in capillares tubos tum sanguiferos, tum lymphaticos dividuntur; vis autem fluidorum adversus arteriarum parietes, seu pressio lateralis continuo simul decrevit magis ac magis, ita ut quæ in aorte trunco erat maxima & septem pedum altitudini æqualis, in venalis sit minima & saltem duodecies minor; sanguis ergo & lymphæ intra minima vascula minime premittuntur suorum vasorum & liberrimeque versus majores venas progreditur: verum si quædam pars omnium ramorum ejusdem arterie obstruatur, quod in hac classe vulgo accidit, tunc pressio lateralis sanguinis in sua vasa augetur, quia hærens sanguis experitur pressionem subsequenti columnæ, quod non accidit quando uniformi cum subsequenti passu progreditur: hinc itaque fit ut a retro cumuleatur, & si omnes fere rami obstructi sint, tunc pressio lateralis in illis vasis non minor est quam in trunco ipsomet arterie. Cum itaque illa vasa capillaria sint tenuiora, vel laxiora trunco arterioso, præmananturque tamen non minus quam ipse trunco a fluido contento, illa mire diduci & intumescere necessum est, cum intumescencia vasis sit proportionalis pressioni laterali, quam intus patitur, & ejus extensibilitati seu tenuitati & laxitati parietum.

Ex his intelligitur hærente quomodocumque fluido in minimis vasis, illud majori vi pressuræ esse vasorum suorum parietes, quanto majorem a subsequente sanguine experitur pressionem, & quanto minus ab hac pressione id in venas promovetur.

Hinc etiam patet cur lymphæ, in cellulosi textus cavitatibus hærens, illum textum distendat, ita ut in anasarca subito facta tumor cutis sit albus simul & firmus, quippe firmitas textus cellulosi a cute coercati respondeat pressioni majori quam lymphæ illic congestæ experitur a retrosequenti fluido; cum vero successu temporis ipsius cutis textus siccior evasit per moram lymphæ serum suum dimittentis, tunc expansio textus cellularis non coercetur, & elasticitate cutis depedita tumor est mollis & vere œdematosus.

Quorundam vero partes infimæ magis turgescant, ut pedes vespere & facies mane: vulgo putant Medici hoc pendere ex pressione quam venæ ab aquis in abdomine effusis experiuntur, unde fit, aiunt, ut nec sanguis nec lymphæ possint ex extremis reverti ad eorundem quantitatem qua ad extrema deveniant. Verum ubi nullus est ascites, ut in chlorosis, idem accidit & alia de causa deducendum est; cum viget vis vitalis cordis, vis gravitatis, lymphæ vix alla est, si cum vi trulivæ cordis confertur, adeoque vis vitalis lympham & cruorem expedit circumducit; verum si vis vitalis minuitur decrevit, ut in longis morbis, sero simul abundan-

te in sanguine, tunc vis gravitatis lymphæ non evanescit ad vim cordis collata, quippe respective ad statum sanum major evadit, & tunc temporis ea regit fluida in quibus vis trulivæ cordis imminuta est, inde itaque fit ut lymphæ in partes internas & decliviores abundantius feratur quam ut per vim cordis reduci queat ad superiora; lymphæ itaque per noctem defluit in partes decliviores, ut in manus, lumbos, faciem & post stationem diurnam pedes & tibias distendit.

Textum autem cellularis ubique corporis obvis viam præbet huic lymphæ serosæ, quæ fibras successive emollit, unde debilitas major, anorexia, aliæque mala fere insanabilia, quibus chronici morbi terminantur.

XXXII. AURIGO: *Illeus Ictericus Hippocratis de intestin. affect. pag. 556. Fossii: Icterus flavus; Icterus viridis; Morbus argenteus flavus: Morbus regius; Ictericus flavus; Anglis Jaundies; Occitanis Esturisses; Gallice Jaunisse,*

Est sclerotice primum; deinceps vero totius cutis, color flavus; aut ejus vitoris, quem Gallice *feuille morte* appellant.

Unde differt a melasistice, cujus color est fuliginosus, atrolivus, aut ex viridi nigricans, ac patitur vete ater; dicitur aurigo a colore aureo. In chlorosi cachexia dicta sordus, obfcurus luteus est sæpe cutis color, *bazanne*, sed sclerotica albidissima remanet, unde ab aurigine discrepat.

Auriginis symptomata sunt color luteus in albo oculo, in temporibus, collo, dein in toto corpore, imò in ipsius caribibus & ossibus; si inveterata sit, urina crocea, faeces griseæ, alvus tarda, pigritia, animi languor, visus obscuro, ac raro omnium objectorum apparet flavedo, teste *Hoffmanno*, pruritus & ariditas cutis; sæpius præcellere hepatalgia flatulentia, & in cadavere quandoque obices effusio & excretionis bilis oppositi, ac calculi cystici reperiuntur.

Hujus morbi species aliæ chronice, aliæ acutæ, dantur auriginis aliis morbis supervenientes, fere criticæ, sæpe fugaces, symptomatice Neoterice dictæ, aliæ constantes primordiales, seu vere morbose præopathice.

Principium auriginis est obstructio vasorum biliarum, & bilis refluxus in sanguinem; ille vero refluxus fluidi adhucdum tenuis, seu liquidioris minime repugnat legibus circulationis quæ a legibus motus non differunt juxta quas bilis debet eo deferri, ubi minor est resistentia, si undequaque prematur; minorem quandoque esse resistentiam in refluxu, quam in influxu, dum vasa secretoria obstruuntur, & hepar membrana spasmodice contracta premitur, facile intelligitur. Hunc morum retrogradum in ultimis vasis, quo cruor & lymphæ ex venulis in arterias repellitur, observari sæpius ope microscopii in mesenterio vivorum anima-

lium; an vero humor flavus, non biliosus, seu in hepate minime elaboratus gigni possit in sanguine dubitant plurimi, licet similis in aurum cerumine, & in statu morbofo in cryptis palpebrarum, in lingua, femine, pure, aliisque humoribus observetur cetera ullius bilis indicium; omnia sere ecchymomata antequam resolvantur & lividis flava evadunt, nec quisquam in his bilem incusare voluerit.

Huius generis plures sunt species quæ propriam medellam exposulant; multiplex adeo malum, ait *Mead*, multiplicem curationem exposulat. Sic juxta ipsum datur aurigo frigida nobis dicta, in qua feces sunt albæ, alvus constipata, & metus est ne æger in phlegmariam delabatur; huic competunt calida aperientia, saponacea & thababarina, thermæ, &c. In specie vero nobis calida dicta feces sunt squidæ, biliosæ, acres, metus est ne æger in tabem abeat; & diluentia, serum lactis, sedantia, acidulæ, quandoque lac ipsum, conveniunt.

1. *Aurigo febrilis* Sydenham cap. 1. sect. 5. A.

Est ea non quæ hepatitidi, nec quæ intermittenti, sed quæ febri continuæ, & sæpius tritæophyæ, seu febri biliosæ supervenit, sive critice, sive, ut aiunt, symptomaticæ.

Ea autem cognoscitur ex eo quod primis tribus diebus non accidat, sed subsequentibus; si a quarto ad septimum, mali est omnis, seu symptomatica habetur; si vero septimo, nono, undecimo, aut decimo quarto, salubris est, seu critica.

Cognoscitur etiam ex eo quod in illa nec alvus sit adstricta, nec feces griseæ, ut in aliis, sed biliosæ; nulla proinde incusari potest durationem beliferorum obstructio, aut constrictio, sed sed bilis copia, & activitas major.

In hac specie alternatim præscribenda cathartica & levia aperientia hepatica dicta, inter quæ laudantur decoctum radicis frigaræ cum pasulis, larga apoxemata ex cichorio, endivia, taraxaco, agrimonia, anserina additis si lubet floribus hyperici, calendulæ, croco, cremore tartari, aut tartaro violato.

In aurigine salubri quæ sub declinationem morbi accidit, ægrum lecto detineri, ut facilius perspiret, suadet tantum Sydenhamus.

Auriginem quæ ante septimum diem in acutis contingit, minime perniciosam esse testatur *Averboes* lib. 4. *Colliger* cap. 43. Confirmat ipse *Hellertius*, & constat ex *Epidem. ipsius Hippocratis*, modo tamen superveniat hæmorrhagia, vel sudor, &c. Vide de his *Schenckium* lib. 3.

2. *Aurigo accidentalis; Jauuisse critique & symptomaticæ*. D.

Ea est quæ morbis acutis supervenit, & sux est; accidit intermittentibus ope kinkinz suppressis, observante Ramazzino. Talem vidi in terçiana carotica dicta, quæ septima die supervenit critica & salutaris fuit, ac præscripto cathartico intra triduum evanuit.

Quæ vero hepatitidi conjungitur singularem meretur attentionem, & præxia acuta stipatur,

de qua alibi; accidentali annumeranda est quæ a gravi iracundia pronascitur, de qua legatur *Frid. Hoffmannus*; item & quæ a commotione facta per catharticum, aut emeticum, ob striduram spasmodicam ductus cholodochi, quæque facile & cito medicamentis debellatur.

Gravida sub gestationis finem aurigo quandoque invadit, quæ tempestiva sanguinis resolutione facile supplantur.

Eo etiam referri debet aurigo quæ io febribus, cetera hepatitidem supervenit, de qua *Hippocratis*, lib. 4. *aphor. 64.* „Quibuscumque per febrim die septimo, aut nono, aut undecimo, aut „decimo quarto, aurigo incidit, bonum & salutare est, nisi dextrum hypochondrium obduerit.

Illæ omnes anrignes accidentales lenibus catharticis tolluntur, utinæ crocæ fluxu copioso excitato, & sine notabili hepatis obstructione producantur.

Aurigo critica in pleuritide biliosa septimo accedens die. *Foresti observ.* 36. lib. 16.

3. *Aurigo Indica* Bonetii lib. II. cap. 8. Med. monita pag. 163. Couzier Journ. de Med. Decembr. 1757. C.

In Mascariæ Insula incolæ procera & decenti statura gaudent, sed omnes colore luto, vel aurigine habituali afficiuntur, & quovis morbo perierint, semper vitiosus reperitur hepatis status. Calor excedens, immodicus vini, sacchari, aut vini, mellis, ac caffè usus est ne incusandus? Hybridæ apud *Martinicenses*, vulgo *les Metis*, utcumque bene se habeant, quoniam Indi vel Indæ proles sunt, quorum color est obscure luteus, flavos habent oculos. *Labat Voyag. d'Amérig. Mexicani* colore leonino, vel obscure flavo donantur. In Insula *Lophao*, juxta Insulam Timor, color faciei est aurichalceus, seu cupri lutei, capilli nigri, effusi. In nova *Guinea* color cutis est brunneo-flavus, statura giganteæ, vigor, agilitas magna; nudi sunt nisi quod solum genitalia tegit; mulieribus mammæ ad umbilicum descendunt, coitus coram cœtu celebratur, nullum cultum servant. Apud *Moluccanos* viri colorem pomi cydonii, sed paulo obscuriorem habent, oculos magnos, supercilia longa, capillos diffusos; mulieres veso sunt albæ. *Maldiveenses* colorem olivaceum, cutem pilosam, corpus nudum habent, excepto cingulo pagne dicto; sed plures mulieres albæ sunt. *Slaveses* habent faciem rhombæam, oculos parvos, conjunctivam luteam, labia crassa pallido colore tincta, dentes nigros ob bethel quod continuo masticant, faciem brunneam rubro distinctam, nasum brevem, aures longas, pendulas. Magnates pedes & tibias creruleo tingunt.

4. *Aurigo a venenis* Ettmulleri; *Cachexia istorica* Tom. I. p. 263. Mprell. Donati Hist. Medic. mirab. lib. I. cap. 7. a fungus, vide Choleram; ex *araneorum mersu* Joel Prax. de venenis. p. 226. ex *viperæ mersu*, Zacuti Lusitan. Lib. V. Med. Princip. histor. 29. Chiracius viperæ demor-

demorsus hanc aurigitem passus est, Haller Com. in Boerhaave Inst. Med. p. 797. a thetide leporina, Marthiol. de lepore marino: a morsu canis rabidi, Bartholini Cent. III. hist. 4. a morsu feluri Ephemer. Nat. Curios. Dec. II. Ann. IX. Obs. 188. A.

Pathematia animi hos morsus comitantia aurigini excitandæ apta esse suadent observationes auriginis a meris pathematibus excitatæ, ut ab Ira River. centur. 2. observ. 9. a tristitia, nuncio gravit. Helmont. sextupl. digest. Act. Med. Hafnia vol. 3. Item fere tellantur curationes auriginis quæ a pathematis suam tantum energiam habent; ut curata aurigo a pediculis vivis assumptis Ephem. Cur. Dec. 2. urina in acervum formicarum emissa, applicata lucio piseæ ad serobiculum cordis, alique curæ sympatheticæ in Ephem. Nat. legendæ.

Auriginem a morsu viperæ oriunda Mead tribuit spasmodicæ constrictioni cystidis felleæ, & canalis choledochi in illo casu demulcenda bilis acrimonia, & convulsivi motus anodynus, narcoticis sedandi. Vide Mead mechanica accedunt ad possum, assat 1. ejusque monita pagin. 159.

Galenus observavit Imperatoris servum qui viperas venari solebat ab hoc animali demorsum, viridi, poraceo colore totum corpus persutum habuisse. Galenus de locis affectis lib. 5. cap. 8.

Lanzoni (Act. Physic. obs. 96.) observavit hominem in manu dextra a felle demorsum, insigni dolore & tumore manus correptum tuisse, quibus aurigo successit quæ per quadraginta dies duravit; & in altero quam canis mormoderat, eundem morbum pertinacem observavit Ill. van-Svieten, op. 916.

5. Aurigo plethorica; A gravidate ven-Svieten in aphor. 950. Icterus a plethora Frid. Hoffmanni de cachexia ictérica obs. 3. A mensum suppressio in Ephem. Nat. Cur. Dec. 1. ann. 4. L.

Inter principia auriginis primarium est plethora, seu major sanguinis & humorum, quam natura fert, copia; cum enim circulatio sanguinis per hepar sit tardior quam in aliis partibus, quippe cum sit in vena porta jam retardatus, eum a mole nimia sanguinis cordi resistentiam offerenti ulterius in hepate retardari, & ipsum sanguinem infissari necellum est, unde supprimitur bilis excretio.

Inter plethoræ principia non solum vita defecit, victus opiparus, sed & suppressio evacuationum solitarum, ut catameniorum, & graviditas etiam accenseri debet; hæc vero species phlebotomias dilucentibus, diætaque severiori, ac exercitio cedere consuevit.

6. Aurigo ab obstructione Boneti Sepulchr. obs. 1. 4. 11. 13. 25. 30. appendic. 6. Foresti observ. 20. Amat. Centur. 4. observ. 83. C.

Ea est in qua sensibilibus est hepatis obstructio, resistentia vel diuresis sine tamen calculis cysticis, sine febre, quæque a bilis crassitie, spissitudine censetur pendere: hæc nauseam & gastrodyniam inducit. Si lobus anticus he-

patiz, & juxta Veteres, si pars hepatis concava afficiatur, ea hepatalgia apyreta stipatur. Nausea autem vel est a distractione ventriculi sympathica, vel a cacochylia biliola eum onerante.

In primo casu emetica minime conveniunt, sed phlebotomia, quam dolor hepatis indicat, videtur præmitenda, dein lenia cathartica & aperientia sunt præscribenda. Si vero nullus sit dolor hepatis, ne quidem a pressione hypochondrii, & tamen sint nausæ, præcesserit error in victu, indicantur emetica sed lenia; nam a fortibus non raro hepar inflammatur, & si sint calculi in cystide fellea, illi ab emetico incurantur possent dolores atroces, seu hepatalgiam calculosam & periculosam inferre.

Ille aurigo potest subdividi in calidam & frigidam. Calida est quæ a calidis medicaminibus exasperatur ob siccitatem & acrimoniam humorum, tensionem & erectissimum solidorum, alii calorem & acedinem. In hæc conveniunt juscula diluentia cum pullo, plantis eiehoraceis, ut cicchorii, endivie, taraxaco, serum lactis leviter chalybeatum, atellis onustum, eum fuceo sylmbrii, cicchorii, &c. aquæ acidulæ.

Verum in aurigine frigida in qua nullus dolor hepatis, temperamentum pituitosum, pulsus mollis & tardus, possunt adhiberi pitæne, juscula, aliaque medicamina fortiora, bili spissæ resolvendæ aptiora, quo spectant balloetes & marrubi albi verticilli in jusculo, radices bruscæ, asparagi, martialis, aquæ thermales, sapo etiam ad plures drachmas deglutitis.

7. Aurigo purulenta Boneti Sepulchr. obs. 22. 23. 25. Foresti observ. 10. lib. 19. Van-Svieten in aphor. 934. C.

Ea est species quæ ab hepate suppurato, ulceroso apostemate, vel vomica affecto dependet, quam in Indiis Orientalibus familiarem memorat Bonetus, lib. 11. cap. 8. de qua. Speciatim agit Ill. Mead in Montis pag. 163.

Præcedunt signa hepatitis non resolutæ, adeoque pyrexia acuta, dolor hypochondrii dexteri cum tensione; ventriculi dolor, nausea, &c. succedit hectica, mæles; morbus chronicus est, & sæpe lethalis; ab ulcere totum jejur quandoque absumitur. Inveni in hoc casu hepar excavatum & fæctum, massa flavescens crassa, ovis interitis simili; nulla salutis spes est, nisi abscessus extrorsum vergens aperitur, & inde pus foras emittatur, quæ operatio aliquoties successit. Vide Hepatalgiam apostematosam. Columbus, lib. 4. cap. 8.

8. Aurigo febriosa, seu a febris intermittente Etemuller. pag. 264. Icterus periodicus Frid. Hoffmann. obs. 5.

Ea illa species quæ per periodos recurrit cum febris intermittenti. Fœmina quadragena per annum laborabat hæc specie, quæ quolibet die solis cum paroxysmo febris, scilicet frigore, sigere, dein calore & vomitionibus.

revertatur; aurigo per biduum durabae, & singulis hebdomadis revertatur; eam vero a veneno febris intermittens eradicat. 2. *Class.* 2. pag. 339. oriori exilimo.

Aurigo quartanæ succedens est omnium frequentissima. De aurigine quartanam suppressam subsequente vide Junckerum de illero, cautela 19.

Aurigo intermittentibus autumnalibus sæpe succedit & a longo usu kinkina etiam pendere videtur, observante Ill. van-Svieten des Malad. des armées pag. 100. & 106. oculi scilicet flavescent, gastrodynia urget, urinæ luteæ, vomitio a pastu, hypochondria indurantur, dolent; tunc abstinendum a kinkina, & adhibendum oxymel scilliti cum, cujus scilicet uncias duas cum salis polychrestii drachmis duabus, tartari violeti drachma una, aquæ communis uncis octo, spiritus menthae uncia semisse, misce; hujus mixturæ cochlearia quatuor tertia quaque hora bibat æger, superbibendo decoctum radicem recentium graminis, & taraxaci cum toto in fero lactis addito mellis pauxillo, utur febris inde reverti consueverit; sumat etiam æger saponis Veneti drachmam semissem fero & mane.

9. *Aurigo calculosa* Boneti Sepulchret. obsi 8. 9. 22. 23. 25. &c. *litteræ a colica convulsiva* Mead Monita, pag. 149. *litteræ a spasmo* Frid. Hoffmanni §. 1. a *colica biliosa spasmodica*, id. observ. 1. a *colica biliosa* de Meyserey numero 419. C.

Est neco quidem judicio illa species quam calculi cystici excirant, dum natura eos interdum intra canalem choledochum trudere conatur; si enim ab his conatibus absterneatur natura, nullus nec dolor, nec aurigo supervenit. Secto cadavere Consilarii D. Maurin invenimus centenos calculos pisiformes in cystide fellea, qui nec auriginem, nec dolorem ullum unquam creaverant; is autem abierat dysuria calculosa; verum dolorum spasmodicorum, qui in hepatalgia calculosa vigent, atrocitas, pertinacia & periodicus recursus cum aurigine, hunc morbum declarant; dolores illi in scrobiculo cordis versus hepares vehementes sunt, simulque ad musculos thoracis extenduntur; illi utplurimum excruciant paucis a pastu horis, cum bilem ad duodenum mitti opus est. Hujus curationem vide in hepatalgia calculosa.

Frid. Hoffmannus & Mead existimant sine calculis etiam a colica stultentia, convulsiva ab ira, a viperæ morfu, validam & subitanam fieri constrictionem spasmodicam ductuum biliferorum; unde refluxus bilis in sanguinem, atque in hac specie phlebotomias, anodyna & diluentia convenire putant.

10. *Aurigo typhodes* Lining. Journ. de Medec. May 1758. pag. 408. vide Typhum idem rodem *Class.* 2.

Morbus est in Carolina meridionali, aliisque Americæ plagis endemicus, cujus primum stadium occupat ephemeræ trium dierum, dierum, secundum

stadium tertiumque exiit auriginem cum febre maligna conjunctam maxime lethifera.

11. *Aurigo hepatica* Boerhaave de hepaticide aphor. 914. Fernelli Pathol. A.

Est illa species quæ cum febre acuta noctu exacerbante, dolore, tumore, vel tensione in hypochondrio dextro, sæpe tulli, dolore scrobiculi cordis, aliquali dyspnoea, &c. accidit; illius species plures numerat Boerhaave quæ tantum sunt varietates. Maxime discrepat ab aurigine illa quæ vel quarta circiter die vel post septimanam supervenit trioxophyæ ardenti seu febris biliosa, quæque a nobis inter fugaces accensetur; sed quicquid contrarium suadeat Boerhaave, ratissima est, ut notat Fernellus, & e decem hepaticidibus vix una aurigine stipatur.

Curatio eadem est ac hepaticidis, seu exigite phlebotomias repetitis, potum diluentem leviter resolventem & lenes cathartes, si vero sanata hepaticide superfit aut subsequatur aurigo alia omnino species est.

12. *Aurigo Neophytorum* Juncker deistero & Van-Svieten aphor. 950. Ettmuller Valetudinar. infantil. pag. 113. L.

In recens natis infantibus facile curabilis aurigo accidit; ob meconium intestina insarciens, impeditur bilis effluxus in duodenum, unde aurigo; quandoque etiam in lactentibus colostrum calcosum eundem effectum inducit. Saponis Veneti scrupulum in aquæ uncis tribus dilutus, addendo unciam syrupi cicchorii cum rheo, si coelestiat detur sæpius de die, solvit hæc concretæ, ablegit blanda intestini viscera, & tumuli hanc saburram per alvum expellit, aut leni cathartico saburra illa cum bile evacuat.

13. *Aurigo hysterica* Sydenhami de colica hysterica, capit. 3. sectio. 4. *a colica hysterica* Sydenhami, Raulin des maladies vaporeuses pag. 17.

Illæ species paroxysmo gastrodyniæ hysteriæ non raro supervenit, sed intra paucos dies sponte evanescit; idem accidit in colica hypochondriaca; si vero moras neccat, adhibeatur apozoma sequeus.

Recipe radicem rubiæ, entumæ, ana unciam unam; chelidoni majoris cum toto & summis annis absinthii ana manipuli unum 2. coque in equalibus partibus vini rhenani & aquæ fontanae ad libram unam, in colatura dissolve syrupi da quinq; radicibus uncias duas; fiat apozoma de quo capias libram semissem calide nunc & fero usquequo convalescit.

Juxta ill. Raulin, illa species non nisi hystericiis longo morbo debilitatis, hystericalias aut ileum hystericum passis, accidit cum summa animi & corporis prostratione; nam a ductus choledochi spasmodica constrictione uti putat Frid. Hoffmann? Exemplum procellus curatori in aurigine ab obstructione: Initium ducat phlebotomia, deinceps semiunctia vini emetici cum oleo amygdalarum uncia una aut altera, succedat p^{re}multus.

maiores dies potus copiosus ex decocto radicum fragariæ, acetosæ, alrhæzæ, glycyrrhizæ: incoquendus in quovis jusculo manipulus endiviæ, cichorii, alfinæ, cætherophylli, acetosæ, betæ: in alterutro ex his jusculis adde cremoris tartari drachmam unam, nitri grana xv.: vespere clystima laxans, & postea purgandum cum salis Epsomien- sis & syrapi de rosâ pallidis ana uncia una, vel cum folliculis fennæ & tamarindis: si resistat morbus, ad aquas acidulas ferrugineas devenias: in temperamentis frigidis, pituitosis, maxime si quartana continuax præcesserit, quod frequenter accidit; aquæ thermales per triduum propinandæ, juscula in quibus verticillus marrubii albi aut etiam ballotes incoctus sit specifica censentur observante Dr. *Banx Medico Niemans. percelleri*; elixirium vitrioli, terra foliata tartari ab aliis laudantur. In aurigine epidemica quæ Genæ vigebat in exercitu Hispanico *Comes Ponticelli Archiater* absumi jussit, eorum qui sult in urbe saponem, ipsum etiam quo facies a barbitonforibus delinitur, & sic sanata est illa epidemia; vulgo nimis indulgetur emeticis, eatharticis acerbis, & aperientibus calidis, ubi diluenda sufficiunt.

Sydenhamus in aurigine vulgari præscribit catharticum quarro quoque die repetendum, & diebus intermediis electuarium ex conserva abstin- thii, corticis aurantiorum, angelicæ conditæ, nucis moschæ conditæ, pulveris ari & chalybis, extracto gentianæ, cremore tartari & croco cum aquis mineralibus. Profunde & pilulæ Ruffi ad grana xxx. quæ aloes partes quatuor, myrrhæ duas, croci unam recipiunt.

14. *Aurigo rachialgia*, Cl. Bonté Journ. de Med. Nuv. 1761. Janv. 1664. p. 41. De Meys- rex n. 439.

Est symptoma rachialgia vegetalis, nec non febrilis & saturninæ: fugax est, & curatur a- pozematis ex plantis hepaticis, deinceps acidulis, aut. sero lactis succo fumariz alterato.

XXXIII. MELASICTERUS; *Melas icterus* Græcis recentioribus, *Melanchlorus* Fernellii Pa- thol. *Ictericus nigra* & *viridis*, Foresti obs. 23. lib. XIII. *Icterus niger* Auctorum. *Ictere noir*.

Est morbus ut plurimum diuturnus, apyretus, qui currem fere universam colore nigro, vel dis- fuso vel guttato & maculoso deturpat.

In melanchloro, ait *Fernellius*, coloris flos pro vivido obscurus primum, deinde sublividus & subniger, nulla evidenti occasione apparet; corpus quidem minus quam in aurigine ingraves- cit, mens tamen magis imaginibus perturbat- ur, quæ metus & morositæ plenæ sunt; nec defectio, nec usina de nativo statu manifeste decedit.

1. *Melasicterus diversicolor*. *Ephem. Nat. Cur.* cent. 5. obl. 41. pag. 61. C.

Virâ est: aurigo tota facie ad guttur *viridi*, dextra corporis parte *atra*, sinistra vero *flava*, una vero modo *atra*, modo *viridis* exercebantur.

Auriginem totam viridem vide in chlorosi.

Auriginem dimidii corporis cum hemiplegia, *Ephem. Nat. Cur. centur. 3. & 4. observ. 64.*

2. *Melasicterus a veneno*, Marcell. Donac. lib. 1. cap. 9.

A scorpionis ictu oritur, & totum corpus ma- culis nigris confpergitur, quod de scorpis regio- num calidarum valet; de Bononiensi agro agit *Donatus*. In nostris regionibus hæc infecta vene- no carent, quidquid in contrarium afferat illi. *Maupertuis Mem. de l'Acad.*

3. *Melasicterus periodicus*; *livor solius corporis periodicus* recurrens Mangeti Biblioth. Med. præf. de cutis morbis pag. 844.

Accidit infanti nnius anni bene valenti mense Februario derepente, sine ulla præcedente causa, toto corpore ictu livido, non aliter ac si strangularetur, integra tamen mente, sine ullo sensu doloris, nisi quod caput parum inclinaret ac si somnolentus esset, cum antea infans ille acclam- plex fuisse obnoxius quoties nutrix menstrua ex- periebatur, præscripsit *Raygers* pulverem Mar- chionis cum speciebus de hyacintho & antimo- nio diaphorantico in aqua cerasorum nigrorum; livor ille evanuit, æst æternis diebus eadem ho- ra livor tertia, quarta, quinta vice rediit, mi- nor tamen & sine ullo frigore, quod ultra ho- ram perseverabat, sed adhibita catharsi & itera- to priori medicamine, æger sanatus est. An e- clamplex, an a tertiaz febris veneno?

4. *Melasicterus albus* Collect. Academ. rom. 3. pag. 332. An *melas* Celli lib. 5. cap. ultimo f. *Morphea nigra* Carol. Ræger. *Datre noires*. C.

Cognoscitur ex maculis subrotundis, nigris, planis, glabris nec prurientibus, nec dolorifi- cis per totum corpus dispersis; hæ maculæ intra noctem accedunt. In duabus puellis has obser- vavit *Raygers*, aque eas pro scorbuticis habuit, quas spiritu cochlearis in syrupo fumariz præ- scripto, intusque sumendo facile fugavit. Cur vero herpetem nigrum has vocat non intelligo. Hic affectus a morphæa Arabum multisfarium dis- crepat, fugax enim est, nec maculæ sunt: cute depressiores, nec pilis albis obnox; exque omnes aciculæ tula quatuor fundunt; differt v. extensione macularum & colore a phenyymo pun- ctato.

In hoc differt albus niger a morphæa nigra: seu albaras nigra Arabum, quod in hac vitiligi- nis specie sunt excoriatio & squamæ, quæ in al- pho nigro non sunt. *Sennert. de vitilagine lib. 5.*

5. *Melasicterus scorbuticus*; *icterus niger scorbu- ticus* Boerhaave Conf. 16. *Blak-leg* Anglorum. C.

Vide arthritidem scorbuticam, class. VII. & ca- tochum scorbuticum, class. IV.

Vel totum corpus nigrescit, ac in casu *Sennertii* seu *Eugalerii*, vel nigrescunt tantum tibiz, eaque maculis lividis nigre distinctæ, unde no- men *Blak-leg*, quod idem sonat ac tibiz ni- gra.

Facies ad nigrum vergit, residui corporis eo- lor intense flavescit aut nigricat, in facibus nullæ flavem.

fluendo, uisna saturate biliosa, anorexia comes, sanguini extracto crusta tenax, phlegmatica biliosa adhæret, h' adduntur scorbuti signa, ut maculæ lividæ amplæ in cruribus, excretio cruoris meri per anum sine diarrhœa, oris spurcicies, gingivæ molles. Desinere solet hic morbus in ascitem scorbuticum; & asцитis tussis sicca, dein hæmoptysi leni, polydipsia, aliisque symptomatibus stipata cito in mortem ducit, tumore abdominis fluctuoso & pedum œdemate præsertim ascitem denuntiantibus.

Cura. Hic profunt eathartica septimanatim repetita ex rheo & manna, syrupo de cichorio, si alvus libera sit; fortiora vero, si resistat; iuscula aperientia balneo maris parata, si æger jam debilis sit, eaque ingrediuntur carnis vitulinæ tralleolatum sextæ unc. xxv. rhei, tartari vitriolati, aut salis mirabilis Glauberi, limaturæ ferri, ac pareire bravæ, ana drach. 1. radicem cichorii, apii, lapsæthiacuti, ana, drach. 1. foliorum cochleariæ, cichorii, ex omnibus manipul. 11. aquæ cyathum 1. fiat secundum artem jusculum quovis mane per xx. dies iterandum, interposito cathartico.

6. *Melasisferus spleneticus*, Boneti Sepulchret. observ. 3. a Vesalio. *lilernus niger* Sennerti de morbis splenis. C.

Est ea species quæ hypochondrii sinistri tensione, tumore, dolore gravatissimo patitur, & quæ juxta omnes Veteres & non paucos neotericos censetur pendere a vitio lienis.

Zacutus refert etiam quemdam melasisfero defunctum caruisse liene, & inde deducit quare atra bilis, in liene congeri solita, hujus defectu per corpus respersa fuerit. *Zacut. præx. obs. 13. lib. 3.*

6. *Melasisferus hepaticus*, *lilernus niger* a viri. hepatis Manget. Biblioth. Medic. pract. pagin. 10360 Piater. tract. 3. cap. 2. lib. 1. Boneti Sepulchret. observ. 28. C.

Est illa species quæ incipit ab aurigine, & in qua oculi adhuc dum intense flavi & quasi colicis fuliginosi sunt, licet cutis nigredine infusatur, urinx sint coloris caffè. Talem describit Ill.

Svoolsten in aphor. 950. quæ per duodecim annos duravit, pertinaci usque succi graminis fert lactis verno tempore, æstivis mensibus aquis Spadanis, hyeme magna copia saponis veneti cum melle, tandem incepit solvi impasta hepatis metere, & secutus fuit alvus fluxus per integros sex menses durans cum levamine omnium symptomatum; evacuabatur autem materia argillacea, olidissima, granulis asperis, parvis, calculosis undique respersa, vires bono victu sustinebantur, & sic perfecte sanata est ægra.

Similem curavimus ægrum ill. Professore Juris D. Necker Genevensis, qui toto corpore niger & visu horrendus huc appulit: postissime vero medicamina quibus intra duos menses sanatus fuit, fuisse iuscula in balneo maris parata ex vitulina carne, foliis cichorii, symyris cum then, croco martis, millepedibus, sale glaucria-

no, interpositis sero lactis chalybeato & lenibus catharticis.

8. *Melasisferus Indicus*.

In Philippinis, qui vocantur *Bsayas*, incolæ nigri sunt, æst colore magis atro ex cocco & moscho tinguntur, ut mulieribus placeant.

Zeilanenses nigri sunt & deformes.

In Regno Loango Africæ homines nascuntur albi, sed intra duos dies nigri evadunt, oculi grisei, capilli aurei, si cominus aspiciantur, cadaverosus est color, & oculi immobiles, infici; noctu æst lumen lunæ clare vident, interdum obcæcantur: hos *Albinos* vocant Lusitani; *Negres blancs* Galli.

In insula Hispaniola Nigræ servi ex diversis Africa regionibus orundi numerantur plurimi, illi omnes nigricant, æst qui vocantur *Bamboras* rufescunt, qui *Congos arada*, & *Senegalli* intensius nigricant, singulos tamen distinguunt intensitas, gradus, vel nitor coloris: horum vero color minus nitidus, magis dilutus evadit ex febre, chlorosi, anasarca, & ex colore dilutiori ægritudines illæ facile dignoscuntur; cicatrices a variola relicte albescunt, pustulæ vero durante inflammatione dilutius nigricant. Errant qui plegmonis robedinem ejus symptomatibus essentialibus ascribunt.

In nova Hollandia color est nigerrimus, ut apud Guineenses, os magnum, nasus refinus, labia crassa; oculi semper clausi ut arceant noxam culicum, nulli dentes in maxilla superiore, viri imberbes ut femine, & facies omnibus deformis, præterea Ichthyophagi sunt, nullis vegetabilibus vescuntur. *Dampier Voyages: vide Aurige 3^a.*

XXXIV. PHENIGMUS. *lilere rouge*.

Est morbus apyretus cutis rubedine diffusa maculata virgata vel punctata notatus.

Differt itaque a purpura scarlatina, rubcola, aliisque phlegmaticis exanthematicis, quod nulla febre stipetur. A gutta rosea, herpete, pernionis, aliisque vitiiis maculosis, quod magnam cutis partem obducit.

1. *Phenigmus petechialis; Purpura apyretica* Clariss. Cuslon differt. de purpura. L.

Est exortus macularum purpurearum in universa cute, qualis in purpura sine pruritu, tumore, alioque symptomate. Differt a pulicum morfu quod in maculis phenigmi non fit puncturæ vestigium, ut in pulicum, apum moribus, quos delet cataplasma ex farina, aceto & oxmelite. Hunc æstum vidi aliquoties in pueris ob calorem æstivum nasci sine ulla notabili functionum lésione, & potu refrigerante ac dein levi catharisi adhibita intra paucos dies, evanescere. *Illustr. vero Professor H. Hagenow* similem observavit in tribus mulieribus, quas quidem ille morbus defœdabat, sed alium de nullatenus molestabat, quique intra aliquot dies sponte recessit. *Sachsus* observavit in femina maculas roseas diffusas undecunque, quarum.

tum nonnullæ sanguinem plorabant, & in puero to similes, sine sanguinis stititidio, ambæ antiscorbuticæ cesserunt. Vide *Acta Phys. Med. Nat. Cur.* 1757. pag. 386.

2. *Phænigmus Indicus.*

In Insulis Philippinis Indi sunt ærorubri, & ut pulchriores videantur plebei, dentes colore nigro inficiunt; æ nobiliores matronæ eos lamina aurea obducunt, testudum corpus colore nigro pingitur, & quo plures figuras an eo delineant, eo nobiliores & animosiores censentur, unde ab Hispanis *pintados* seu picti nuncupantur.

Paragones, qui degunt circa Fretum Magellanicum, colorem cupri rubri nativum habent; idem est color in Insula Nicobar juxta Sumatra. *Dampier*.

3. *Phænigmus a vernice.* Dubalde histor. Sinæ pag. 317. A.

Apud Sinenses qui ex arbore *Rhus vernix* Linn. dicta vernicem Sinensem extrahunt, si ejus halitus excipiant, intra viginti quatuor horas colore rubro universali inficiuntur, quasi erysipellaceo; accedit faciei deformitas, cutis asperitas leprosa; timas agit cutis multis in locis, & multum inde serum effluit; demum cutis exsiccata, forte epidermis, delabitur, novaque fucetescit. An erysipelas sit hic morbus ignoro.

Curantur cathartico hydragogo, balneis calidis in decocto foliorum abietis, corticum castaneorum cum nitro & basella, hujus decocti etiam stupæ adhibentur, & basellæ cinis vinis cutis inspergitur.

4. *Phænigmus a venenis* Illustr. Hambergæi, de narcoticis differt. A.

Est intensa tubedo totius corporis diffusa vel continua quæ illico supervenit a venenis quibusdam narcoticis, & 1. quidem *Ill. Hambergæi* alique observant eos qui baccas atropæ belladonæ voraverant incidere in rubedinem purpuream totius corporis, citra calorem ac febrem, quæ rubedo assumpto emetico intra paucos dies evanescebat; hoc accidit filio janitoris Horti Regii Monspelientis, atque confirmat opinionem *Ill. Hambergæi*, qui putat a narcoticis ita dissolvi cruorem ut facile subeat vasa cutis lymphatica.

Idem morbus accidit *A Bias juxta Agarham* toti familiæ futoris, ab esu hepatis frigi piscis, qui vulgo *Carus marinus*, Ichthyologus *squains canicula* dicitur; quatuor diversæ ætatis assumpto hoc hepate caro correpti per bilinguam triduumve jacuere, & rubore purpureo intensissimo perfusi fuere, ex quo profundo sopore excitati puerum persectebant, & epidermis totius corporis, ne exceptis pedibus manibusque, in magnas, amplasque membranas a corpore separata abiit. Agarham accessit paulo post, hos quatuor accessivi, examinavi, & ipse ex maris pede & ex uxoris manibus detraxi chitothecas cutaneas, quas secro & qui vero plus hujus escæ voraverant, diutius dormierunt quam qui minus; puella non in toto corpore desquamata abscissum in eare passa est.

5. *Phænigmus plebeticus.* B.

Plethora *Ill. Linnæi*, quæ pendet a boni humoris abundantia, si tanquam morbus spectetur, habet pro potissimum symptomate rubedinem corporis & potissimum faciei, cum dyspnœa & pigritia, seu inertia ad agendum: sed nobis plethora pro diversorum morborum principio, non pro morbo habetur, quia nullo symptomate constanti stipatur.

XXXV. CHLOROSIS, Sennerti qui falsè nomen Hippocrati tribuit; *Chloresina* Hippocratis VI. Epidem. obscuro significatu; *Illeis* Avicennæ; *Febri alba* & *Virginum obstructiones* Mercati; *Cachexia* Plateri de Discoloratione; *Morbus virgineus* & *Febri alba* Rod. a Castro Lib. II. cap. 5. Sennerti Lib. VI. Sect. 3. cap. 2. *Fædi* comarum Ballonii de morbis virginum; *Febri amaroria* Langii; *læteritia alba*, vel *lætern albus* Ettmulleri. Gallice *Ghlorosis*, *pales couleurs*.

Chlorosis est morbus cujus præcipuum symptoma est pallor faciei cum æthenia habituali.

Plures species hinc duobus symptomatis addunt quandam vesaniam singularem, ut picam, malaciam, polydipsiam, melancholiam, panophobiam &c. quæ vulgo chloroses proprie dicuntur; aliz vero nulla vesania stipantur, & palliores vulgo dicuntur; sed non dantur inter has limites quibus accurate distingui queant; sunt qui *cachexia* nomine ultimum chlorosum gradum designant, verum phlegmatiam aut anasarcam hoc nomine intelligunt; & *cachexia*, ut patet ex *Gorral* definitione, pro omnibus hujusce classis ordinibus designandis passim adhibita videtur apud Veteres.

Color pallidus pendet ex eo quod lymphæ in valis cutaneis prædominentur, ita ut cruoris color præ illa evanescat, vel ex eo quod epidermis opacior radios rubros cruoris subeus repentis non transmittat, quod fere eodem recidit.

Pallor est vel albus, vel cinereus, vel fuscus, cereus, luridus, & diversas hæc colorum commisturas verbis exprimere difficillimum est; ut itaque dum cutis flavescit vel ut ajunt viridescit, distinguitur chlorosis ab aurigine & melastictero, sclerotico color observandus est, qui albilimus est in chlorosi necumque cutis sit lurida, aut flavus vel fuliginosus in aurigine & melastictero.

Chlorosis vera.

Sunt illæ quæ ut plurimum appetitu ciborum, potuum, venieris, vel quadam singulari & heteroclita æstivatione stipantur; recens elapso sæculo unica hujus morbi species erat cognita, quæ chlorosis virginea est, seu febris alba vulgo dicitur, virginibus viro maturis familiaris, quæque menstriali seu catameniorum emanationi aut suppressioni tribuitur, verum observatio quoti-

diana docet ipsos infantes in cunis chlorosi cum pica laborare; dantur & mulieres ubertim menstruatz quæ simili morbo cum pica ægrosant; dantur denique viri, ut observat *Bonetus*, vere in hoc significatu chlorotici, adeoque si huius vocis significatus restringeretur, ut in scholis vulgo fit, plurimæ huius species ignotæ vel exclusæ forent, aut nova genera citra necessitatem condenda manerent.

r. *Chlorosis Virginea; Fædi colores virginum* Ballonii de morbis virginum. *Pales couleurs de filles.* L.

Est ea species quæ puellæ-puberibus ex menostasi accidit cum pica. *Menostasia*, est catameniorum emanatio, imminutio, aut suppressio, seu mensium stasis. Pica vero chlorotum illam comitans est sæpius pica absorbentium, ut mortarii, gyphi, humi, carbonum, vel pica condimentorum, ut acetii, succi limonium, salis &c. vide *Classen* viii.

Chlorotice pallent, & in intenso & inveterato morbo flavescent ac luridæ sunt, oculis tamen albidissimis, unde ab autiginosis discrepant; pulsus in illis frequens est & parvus, unde morbus impropiè *febris alba*, dictus, sed vires vitales sunt minores solito, adeoque non mutata est proportio inter illas & vires musculares, quod ad febrem ponendam requiritur. Respiratio in illis est difficilis, si paulisper moveantur, maxime si scalas ascendant, si currant, si conatus edant, quia tunc temporis a muscularis contractis sanguis ubertim in pulmones irruit, eosque infarcit, quem tamen pari passu pulmo debilius compressus a muscularibus non potest cordi sinistro erogare, hinc palpitantes cordis, quas etiam vel levissimum pathema excitat. Debilitas vero musculorum pendet & a plethora seu mole movenda majori, & a laxitate systematis solidorum; systema vero illud laxius est quia sero sanguinis retenti, eoque abundantiori & retardato ejus textus elasticitas minuitur: hinc pigritia ad motum, hinc amor somni & vita deses, sedentaria; hinc saltidium omnium oblectationum quæ exercitio obviuntur, ut ambulationis, rusticationis, cantus &c. hinc anor solitudinis, morositatis; defectu exercitii & ob viciam sanguinis & succorum gastricorum crasim quæ serosa vel mucosa sit; fames imminuitur; appetitus vero, qui non alimenta in genere, sed sapores scaturit, Gallice *l'appetit*, depravatur, quia saliva serosa gustui non artidet nisi condimentis acutetur, aut absorbentibus ejus facultates corrigatur, si mucosa sit; cum alimenta consueta non ardent ad insuffata confugiunt, hinc progrediente morbo crescit plethora seu cacochymia facta ex thrombo purpureo viscoso, crasso, male elaborato & ex sero copioso, flavescente; crescit anorexia, digestiones multiplici titulo viciantur, humores excrementitii retentii crasim sanguinis in dies pejorem reddunt, laxantur solida, textus cellularis turgit hoc sero vinoso, debilitatur cor cum omnibus aliis musculari, hinc pallor plumbeus, cereus color, quem viridescen-

tem quidam nuncupant, tumescunt vespere pedes; vestigium calceorum & digitorum prementium retinent, mane palpebræ tumet & livescunt, sed adhuc carnes v. g. genæ sunt turgidulæ non marcidæ.

Cum vero eo usque procedat morbus ut genæ sint pendulæ, flaccidæ, labra attenuata, pallida, extrema ordematose tumeant tota die, digestiones omnino visculæ, color plumbeus, fuscus &c. hic chlorosus gradus jam *cachexia* a Neotericis vocatur, & ægræ *cachexia* dicuntur in quavis chlorosæ specie.

Hic morbus ita evidenter pendet a menostasi ut restituito catameniorum fluxu evanescat; interea duplex est varietas menostasiæ, in praxi distinguenda; vel enim t. ea initio stipatur solidorum tensione, erechthismo, fluidorum siccitate & acri viscositate, & in hoc casu in morbo recenti nequaquam ad statum cachecticum pervento, emmenagoga debent diluentibus temperari, phlebotomia & catharsis præscripitis, juscula leviter incidentia ex radicibus fragaræ, graminis, foliis sclopendræ, capillorum veneris, addita pauca dosi martis, debent præscribi; mox sæpius ad fœniculæ, serum lactis & lac asinum deveniendum est.

Si vero ægra sit temperamenti pituitosi, frigidi, paulo fortiora & calidiora medicamina sensum sunt adhibenda, ut major dosis præparationum martialium, radices aperientes brusei, ononidis, asparagi, de quibus consulantur processus euratortii *Ill. Jacobi Lazærne*, & *Ger. Fitzgérald de morbis mulierum* cap. 1.

Sæpius hic morbus usu limaturæ ferri intra primum offæ coherat, vel potu assiduo aquæ ferratæ, ut ajunt, sanari consuevit; interdicens vero est omnino usus condimentorum & terreorum, quibus hæ virgines delectantur, atque exercitium est suadendum.

2. *Chlorosis amatoria. Febris amatoria* Langii. L.

Est prioris varietas quæ puellis amore percitis afficit, cum gravi melancholia, solitudinis amore, moerore continuo, & continua de objecto cupido meditatione; ea chlorosis stipatur etiam ut plurimum menostasi; aut ea mensium emanatio potius huic supervenit, quam pallorem præcedit, atque temperamento melancholico stipatur, proindeque primus curandi processus in chlorosi virginea descriptus magis convenit quam secundus, & præterea matrimonium ceteris omnibus remediis longe præstat. Vide *Nymphomaniam, salacitatem* dictam *Class.* 8. pag. 343.

2. *Chlorosis a menorrhagia. Chlorosis muliebris a menstruatione difficili* Aitruce de Chlorosi, tom. 2. pag. 2. & 43. spec. 2.^a *Pales couleurs des femmes.* C.

Ea est quæ mulieres annuum quadragesimum prætergressas, quæque laboriosam menstruationem patiuntur, adori consuevit, sæpius cum uberiori sanguinis effluxu menstuo, appetitus depravatione, phlegmatia, torpore corporis, seu pigritia & debilitate inaliuetis, atque ciborum sfluctorum faldio.

Menorrhagia seu viscosa & morbofa catameniorum effluxio involvit catamenia doloribus hystericalis filpata, five parca, five folite quantitate, & catamenia profusa five dolorifica, five non dolorifica; in his omnibus casibus, potissimum vero cum menorrhagia est hystericalis, supervenit chlorosis cum moreore, & morositate multiplici, solitudinis amore, exercitii aversatione, ciborum noxiorum appetitu, pigritia insolita, cedemate pedum, somnolentia, quæ nunquam ipsis expleta videtur, perrigilo conjuncta; aut somnis inæqualibus & irregularibus; atque quoties menstrua accedunt, illa initio indolentia sunt, at secunda, tertiave die doloribus assiduis irrequietis crurum, narium, femorum, lumborum, uteri, vaginæ, itipantur, ita ut illi dolores subito ex una parte in alteram ferantur, uterus intumescat, mox detumescat, a tactu doleat, dum tumet, simulque eo majores sint dolores, quo plus sanguinis effluit; his adde sensum ardoris in vagina, jectigationes continuas corporis, quæ omnia imminuto fluxu impetu evanescunt; at sæpe fluxus sanguinis excipitur a fluxu seroso, seu a leucorrhœa quæ plures dies perseverat, & identidem cruenta est, unde misera mulier debilis, pallida, ad levissimum motum anhelosa, oedematosa, infans, cibos averfans, singulis mensibus in pejorem statum abitura est, nisi succurratur.

Hic morbus pertinacissimus est, & sere eas comitatur usquequo ætas ad advenit quæ naturalis catameniorum accedit cessatio; non satis apud Auctores descriptus reperitur; vulgo exigit rusticationem tanquam præstantissimum remedium; deinde vero exiguum dosi præparatorum martialium cum jusculis refrigerantibus, levis antihysterici; nam affectus hysterici his malis sæpe accedunt; si vero stomachus lacti possit assuescere, nil eo melius judicavimus; & hujus specialis historia & curatio desiderantur.

3. *Chlorosis gravidarum* Astrucii spec. 31. L. Ea est quæ primis tribus graviditatis mensibus accedit cum malacia, seu appetitu absurdorum, & solitorum alimentorum aversione; malacia vero ad plura alia extenditur, quam ad alimenta; etenim in hoc morbo mens debilis & morosa ad stultitiam usque, non raro diversa appetit, vel averfat, minimis repulsis exardescit, cum furore cupita sectatur. Vide *Picam* 3m. *Class. VIII.* Sæpius gravidæ quæ prius tabaco, caffè, vino delectabantur, jam ea averfantur; quæ haec, clupeas, similiae averfabantur, jam perditæ appetunt; quæ erant ferri animo, jam a levissimis occasionibus turbantur; de cetero pallent, ad levem ambulationem anhelosæ sunt, torpidæ & graves, næstæ & morosæ; verum nec ab alimentis abstinere sere laduntur, sed his denegatis pejor habent, ubi valet aphorismus *Hippocratis*: alimenta paulo pejora, sed jucunda, melioribus, sed ingratis sunt antependa. Hic affectus spon- te circa quartum, mensem evanescere consuevit;

at accedente ætate quæ catamenia cessatura sunt, non raro inducit chlorosim a menorrhagia dictam.

4. *Chlorosis infantum*. Vide *Phisconiam* infantum. C.

Est ille pallor qui infantibus est familiaris, cum pica absorbentium laborant, quo quidem morbo nihil est vulgarius; quippe innumeri sunt qui ab ineunabulis solet humum, mortarium, gypsum vorare, quippe inde pallidi, meridi, imo naciienti evadunt, & simul phisconia & adæphagia laborant; cum itaque ad chlorosim requiratur tantum pallor & pica, cur huic generi non accenseretur hic morbus, non video: curatur ut phisconia infantum maris & rhei usu.

Chlorosis spuria, seu pallores.

Sunt illæ quæ nulla pica, malaciave fiuntur, & pallores Boneti dicuntur; vide *Stipulehret. rom. 3. pag. 533.* & *Cachexia Felic. Plater. discolorationis genera*; talis est pallor fugax a frigore, a terrore, aliisque, qui syncopem, asphyxiam comitantur, nec non qui a morbo convalescentibus accidunt. Pallor est symptoma omnium sere cachexiarum, maxime vero tabis, ascitis, anasarca, phlegmarie, scorbuti, syphilidis, tinea malignæ, eleoscos, &c. nec non alvifluxum, sanguifluxum, & rachialgiæ ac melancholiz.

5. *Chlorosis verminosa* Plateri observat. lib. 3. C.

Illæ fovetur a copiosis lumbricis intra primas vias.

6. *Chlorosis viridis* Petr. Fabri Curat. 71. C.

An viror erat: verus qualis herbarum recentium, an vero hoc nomine intelligat cum plurimis colorem luteum, *couleur de fenille morte*, inquirendum restat. Vulgo plebs virorem tribuit fecibus alvini, spuiis phthisicorum, cum mihi tantum flavus color observatur. Color ille flavescens, sordide brunneus, est symptoma ascitis, tabis, hæticæ, melancholiz, necrosis Soloniensis aliorumque morborum chronicorum dum inveterascunt.

7. *Chlorosis ab hydrothorace*. Vide Boneti *Sopulehret. rom. 3. pag. 555. & 556. num. 1. 4. 20. 22. de pallore*.

Ille pallor non nisi ex cadværis apertura hydrothoraci, aut pulmonum oedematis fuit adscriptus; si enim hydrothorax cognosceretur, tunc pallor tanquam ejus symptoma habendus esset; in his autem casibus chloroticus albesceat. Discoloratio vero plumbea ac fusca spleneticos & hypochondriacos non raro inficit.

8. *Chlorosis maculosa*; *Leuco* Galen. 3. de symptomat. causis; *Leuco* Celsi; *Elephantiasis alba* Plin. lib. 25. cap. 5. *Morbus Dolorum Mexurial. var. lect. libr. 3. cap. 18.*

Est morbus ejus præcipuum symptoma sunt macula ampla per totum fere corpus dispersæ, non squamosæ, ut in morphæa alba, sed glabræ & coloris vere albidæ, qualis est estreorum; his adde pilos albos, pectoris & colli tumorem, doloresque exiguos, sine febre, illæ maculæ albidæ faciem potissimum deturpabant apud Delios, referente Æschine, qui hunc morbum contagiosum & pestiferum dicit; hic vero morbus hodie est ignotus.

9. *Chlorosis Carthagenica* M. d'Ulloa Histoire d'un Voyage en Amérique. L.

Carthagini in America calor atmospheræ est fere semper idem qui Parisiis diebus canicularibus; hyem dicitur tempus quod a Majo ad finem Novembris extenditur; major æstas vocatur ab initio Decembris ad finem Aprilis, quo tempore ventis flantibus calor mitior est; æstas minor est circa festum S. Joannis, tunc per mensem cessant pluvie; perspiratio ibi magna, continua, unde incolæ colorem adeo pallidum & lividum habent, ut a morbo gravi convalescere videantur; phisiones etiam molles, debiles, vox quoque tarda; de cetero bene valent: Europæi huc accedentes post tres, vel quatuor menses hunc pallorem contrahunt.

Asserunt etiam multi Tarbellis, seu Dax endemium esse pallorem, quem tribuunt vaporibus calidis, quos thermæ in media urbe sitæ, & ad solem & ultra gradum fervidæ, continuo fundunt.

11. *Chlorosis Bengualensis* Merolla Voyage a Angola.

In Regno Benguala apud Africanos color hominum est non minus pallidus ac mortuorum apud nos; ille vero pallor tribuitur aeris gravitati, & ut ajunt, malignitati; imo vox eorum debilis est & tremula; ædus nos qui oppida maris vicina habitant, pallidi sunt, & phisicones venis atroceruleis per abdomen sparbis, unde vocantur vulgo *veupes bleus*, & quantis sæpissime laborant; hoc vero tribuitur & aeri & paludibus fetidis æstale exhalanti, & aquis cœnosis quibus utuntur.

Apud Darianos in America fere pallor endemicus a calore dependet, ut apud Carthagenicos, & unde procedat apud Cambayenses in Asia, ignoro.

12. *Chlorosis rachialgica* Ramazzini de morbis Artium cap. 1. & 2. Strack Journ. de Med. Avril 1665.

Est pallor qui insicit metalli-fossore, inauratores, &c. quique potissimum invadit cum tremore eos qui hydragrogum patientes, se frigori exponunt, in quo casu decoctum radicis chinæ & bardanæ utilissimum est. Hæc chlorosis flava vel olivaceum colorem referens in facie est unum ex signis pathognomonicis Rachialgiæ arthriticiæ D. Strack, quæ curatur numerosis balneis, antimoni pulvere tenuissimo, & decoctis sudoriferis.

ORDO SEPTIMUS.

CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Seu qua prioribus affines sunt, ita tamen ut inordinibus prægressis non facile locum obtineant.

XXXVI. PHTHIRIASIS, Maladie phtiriale.

COGNOSCITUR ab exortu insectorum pediculus affinnus ex diversis corporis partibus, quas pruriginem, ulcuscusque descedant, aut puncturis pruritu discernant.

Dicitur phtiriasis Græcis, Latinis *morbus pedicularis*. Insecta hominem frequentius infestantia sunt pediculus, pulex & acarus, quæ supra corpus humanum hospitantur, & aptera sunt; quæ vero intra corpus hospitant, sunt gordius medicamentis, furia infernalis, lunibricus humanus, ascaris recti, fasciola hepatica, fasciola intestinalis, hirudo stagnalis, tania vulgaris, tania solium, & tania lata; extus dirigant non alia insecta, & potissimum viscæ, apes, culices, tabani, scorpiones, scolopendriæ, cimices, nepæ, dytisci, &c. Phtiriasis autem ut vulgo pediculus solia tribuatur, quandoque multis aliis insectis tribuenda, unde diversæ species morbi.

5. *Phtiriasis pedicularis*. La maladie phtiriale. L.

Est ea quæ vel capillitium, vel etiam totum corpus infestat, & a veris pediculis excitatur.

Pediculus est insectum apterum pedibus sex, oculis duobus, aculeo in ore, antennis longitudine thoracis, abdomine depresso sublobato; species est pediculus humanus Linnæi, qui in capite frequentius habitat, & per vestes diffunditur; hujus ova, seu larvæ lentes nominantur; nidulatur in capillitio ubi pruritus excitat, pustulas eudit, fetorem, sorditiemque capiti conciliat, cum porriginem. *Perrigo*, seu furfuraria est congeries squamularum grisearum, seu materiei unguinosæ pulverulentæ, quæ fecerunt in glandulis sebaceis capitis, quæque ob pectinationis defectum cumulat in capite, & crustam sordidam, sordidam, sub pectine sursum forma delatentem constituit; ibi vero pediculi tui hospitantur, & prolem copiosam nutriunt; illi oris aculeo quem exerunt cutim pungunt, & vulnuculi peripheriam albam faciunt, forte quia inibi solum cruorem exsurgunt; & contra vulnus a pulice infistum, rubet, quia sanguinem e vas vulneratis effluentem non exsurgit, sed lympham; corpus pediculi est totum hispidum, quibus villis verosimiliter pruritus excitatur.

Phtiriasis solius capitis est infantibus familiaris; & facile frequenti pectinatione curatur; verum apud eos qui indubis tantum lanæ utuntur, nec ea frequenter mutant, nasci et pediculorum per vestes repentium progenies, &c. oritur.

opus est non solum caput pectine expurgare, sed etiam medicaminibus insperli illud & vestes mundare. Laudatur in hoc casu pulvis hordei caustici, quod *eryadilla* vulgo audit, item pulvis seminum *Delphini staphysagria* &c.

Phthiriasis olim inter morbos pœnales habebatur, quo extinctio ferunt plurimos. Vide *Schenckum*, *Camerarium*, *Plempium*, &c.

2. *Phthiriasis interna*; *Phthiriasis furesta* Mangeri Bibliothecæ de morbis pilorum; *Vermine Interne*. C.

Ea est in qua vel soli pediculi e diversis corporis locis exsurgunt, ut ex oculis, naribus, ore, cum urina, sputo, fecibus, unde ægri misere torqueantur, emaciatur, & pereunt, vel in qua præter pediculos diversa alia insecta ex omnibus corporis locis supradictis prodeunt, ut amicus meus Ill. *Lesfèvre*, *Academ. Regia Scient. Par. & Uteria medicinarum faciens* observabat; illi ægro anno 1718. & 1719. quotidie prodibant ex oculis, auribus, podice, urethra, vulnere phlebotomizæ, pediculi, pulices, forficulæ, araneolæ, lumbrici, fearabzoli, quorum icones mecum communicabat amicus: Varia tentata sunt remedia, & demum ad litus mercuriales verum est: æger per quindecim dies pyralissimum passus, immunis eo tempore fuit ab insectis; verum finita hydatargyrosi insecta successively redierunt, unde æger infomnis, emaciatus, debilitatus demum obiit.

Mangerus. teleret Chirurgum Genovensem ista de per annos excruciatum in eodem femore sinistro passum esse eruptionem myriadis pediculorum, a quibus & a dolore liberatus est usu thermarum Aqueusum in Sabaudia.

3. *Phthiriasis inguinalis*. L.

Ea est quæ fovetur a pediculis pubis, quos vulgo *morpiones* & *platulas*, vel *partas* nominant; illi catervatim cutis pubis, imo supercilii, capitiq; adhxrent, & pruritus molestissimum excitant; at partes non exulcerant, & facile ope seminis staphisagriz, pulveris tabaci, aut unguenti mercurialis occiduntur, palpebris hoc affectu capitis possunt applicari vel acetum scilliticum, in quo pauculum oleos sit dissolutum, aut oleum spicæ, &c.

XXXVII. TRICHOMA Jachii, a *rix*, & *coma* caesaries, capillitium; *Plica Polonica* Sternigellii; *plica* a capillorum complicatione, vox equivoca, adeoque nomen D. Jachii melius est; *Plica Belgarum* Schenkii; *Kolsum* ac *Kolsuk* Polonis; *Coledon* ac *Gods*, vel *Gose* aliis; *VVichel-moff* Germanis; la *Plice* ou *Plique* Gallis Ægri *Porripques*.

Trichoma est morbus contagiosus, chronicus, Polonis endemius, cujus præcipuum symptoma est capillorum confusio, ac in cirros & funiculos diversæ figuræ, ac longitudinis conglutinati, ac concretionis.

Hujus morbi seminum ex India Orientali per Tartaros circa annum 1687. contagio in Poloniam, Silchiam, Hungariam, vicinæque loca translatum fuit: G. Frid. *Sabel*, *Dissert. de plica*. Hala 1714.

Distinguendi sunt morbi a viru plicoso oriundi, & trichoma ipsunmet; morbi plicosi, quos Polonici cognominantur, sunt tum acuti ut pleuritis, apoplexia, hæmoptysis, &c. tum chronici ut syphilis, rachitis, cephalæa, aliæque multæ divertorum generum species.

Cognoscitur trichoma, si manifestum sit, ex capillorum in unum vel bluris tophos convolutione, vel cotumdem in cirros viscosos, funiculos crassos elongatione, involutione. Si occultum, 1. ex hereditaria dispositione, quippe hic morbus a parentibus in prolem sic transferitur: 2. a contagio per pileolorum inquinatum gestationem, concubitum & sudorem: 3. per partium pilosarum examen, ut iniquis, potissimum capitis; in pilis enim pudendorum quandoque cirri plicosi nascuntur. Memorabilis est casus a J. *Paterfon Hain* in *Astor. Societ. Londinensis* relatus: 4. phantasia depravatio & potissimum appetitus errores attendendi sunt, unde adagium: *sub plica latet plica*: 5. sudores capitis, viscerum, glutinosi, capillitii spurcietes, & orti in illo furfures; 6. unguum incurvatio, scabrities, color mutatus, lividitas, corruptio.

Plica seu capillitii citroli eruptio est species excretionis salubris quæ partes internæ a viru latente perniciosissimo liberantur; illud quidem virus quandoque diutissime latet in corpore, ut venereum, veluti sopitum, & innocuum; sed sæpe strages edi eo majores, 1. quo partes affectæ nobiliores sunt & sensitivæ magis; 2. quo major humorum visciditas & acrimonia cum eo concurrat; 3. eum partes solidæ & potissimum cartilagineæ vel ossæ eo inciduntur, tunc enim nulla tere spes reconvalescentiæ.

Hæc plicæ evolutio, excretiove, utcumque morbosa sit, est apud inquinatos summe utilis, adeoque juvanda & omni ope promovenda; nihil est autem perniciosius quam capillos plicatos rescicare, ejus plicæ excretionem frigore incaute suscepto, oleosis aut viscosis admotis reprimere, ejus exortum turbare.

Erravit Doctor quidam Scoto Britannus & *Chiræus*, qui procul a Polonia degentes, eum affectum pro simplici capillorum neglectorum spurcietie habuerunt, quasi pectinando possent avetiri & curari, imo qui scitum & non observatum esse morbum contendunt. Hos solide confutant *Schulzeus*, *Pastorius*, *Srabellus*.

1. *Trichoma cirrosum*. Plica major vulgo. *Plique en cordons*, *plique male*. C.

Est species omnium vulgarissima, minus noxia, quæ distinguitur ex eo quod capilli in funiculos prælongos conjuncti & agglutinati sunt.

Symptomata ejus prænuuntia sunt, 1. pallor faciei; æsthenia ab articulationum laxitate; 3. dolores capitis, seu cephalæa Polonica; 4. dolo-

dolores omnium artuum potissimum in articulis, pedibus, manibus, seu arthritis Polonica; super-venit 5. syngismus, 6. convulsio; 7. contractura; 8. rachitis, cum ossium fragilitate.

Symptomata salubria quibus priora tollentur, sunt 1. plicæ eruptio; 2. phthiriasis cum fœtore, porrigine; 3. demum alopecia; 4. an cruorem fundant derafi capilli vundum constat, 5. ea vero critica plicæ excretio non sit febri, sed post longum tempus absolvitur. Cognoscitur vero perfecta, cum omnia symptomata interna evanescent, & capilli sponte desubunt, deinceps iterum nascituri; ætenuis vero, seu ante perfectam illam crinem, eos refecare periculum est; quandoque cirros per totam vitam gestare consuevit.

2. *Trichema villosum*; *Plica femina* Schuley, Collect. Academ. Tom. 3. pag. 285. *Plica femella*. C.

Ea cognoscitur ex tophis villosis in quibus modo omnino inexplicabili capilli complicantur, si ve dispersi sint illi tophi, quales vidi, si ve coacti in mitram seu bierretum quo totum caput tegitur. Vide *Philosoph. Transact. Abridg. Vol. VI. fig. 73.* ubi icon plicæ istius, capilli trium ibi delineatum, erat quatuor ulnas longum, palmum latum, & duos pollices crassum. Femina Polona quæ eam plicam per 50. annos gesserat, toto hoc tempore arthritis Polonica cum contracturâ laborans, in marasum incidit.

Hæc species respecto capillitio dioriora invenit symptomata, potissimum vero unguium excrescentiam mirabilem cum scabietate & nigredine, ita ut illi ungues cornua hircina referant, hi demum ungues delabuntur, sed iterum sanato morbo revertuntur.

Curatio exigit 1. ut a phlebotomia, imo a cathartici saltém acris abstinant; 2. Ut potius diluens leviter diaphoreticus adhibeatur, ut dentur decocta salassas, salseparillæ, lapathi, quibus fluxiles & blandities humoribus concilietur. 3. Mercurialis perniciose semper fuerunt, ex *Schulzæto*, licet ab affinitate syphilidis veneræ indicari videantur. 4. Ut plicæ exitus promoveatur, nihil est præstantius quam fovere caput decocto tepido lycopodii clavati *Zinnæ*, quod ideo apud Polonos *plicaria* nominatur, vel hujus defectu laudantur radices lupuli, acanthi, folia sempervivi majoris, &c. Licet dum plica erumpit, cathartica, emetica, phlebotomia sint noxia; interea & emetica & cathartici mitibus & phlebotomia utendum est in morbis plicosis, seu a viru tum latente, tum pressio oriundis. Superstitiosa vero est plicæ transplantatio, & vana plura medicamina a *Bonfiglio*, *Sperlingio* & *Binningero* laudata.

De cura morborum plicosorum videantur historia horum morborum a *Srabellio* relatæ.

An diversæ species quoad curam sint diversæ, uti sint quoad symptomata, & prognosim ignoro.

2. *Trichema Polonicum*; *Plica* vulgo, *Carthen-feri Principia Patholog. 1758. Tom. I.*

Ex Tartaria & Ucraina in Lithuaniam & Poloniam promanasse anno 1287. inde in Silesiam & Hungariam irrepsisse, testatur *Erndel*. Cognoscitur potissimum ex capillorum complicatione, quæ molem dolorificam cuculliformem repræsentat, statim & una nocte se prodit; flocci hic & illic apparent ex capillis convolutis, hi flocci adunantur, adunati quandoque ad ulnas producantur; pannum erasum villosum cucullus ille refert.

Plura alia symptomata rachitica, scrophulosa, syphilitica, phthiratica syndromen efformant. Initio scilicet amphimerina lenta, tumores scrophulosi in diversis locis, artuum lordoses, contracturæ, ulcera, ungues pedum, manuque incrassati, curvatura spinæ ossium, fragilitas, spasmi tendinum, dolores arthritici extremorum, occipitis, spinæ dorsæ, cutis lividis, ophthalmiæ, phthiriasis, tinea; demum accedente capillorum convolutione, velut crîsi sublevarur æger a symptomatibus præfatis quæ cito remittuntur.

Principia hujus morbi sunt abusus aquæ vitæ, alimenta acris & viscosa, & incredibilibus horum populorum sordities. Raro in exteros transiit hic morbus. Vidi tamen Andusæ Capitaneum D. Bezesse, qui e Polonia redux in patriam, tres plicæ floccos adspexit, quos ætente examinavi; flocculi erant ex capillis mini, me incrassatis, ultra radicem invicem adunatis in tophum, hos tophos a quibus nullum incommodum sentiebat usque ad mortem caute servabat septuagennarius.

Therapia; si tophi illi capillorum omnino & omnes subito tondentur, cito omnia symptomata etiam adaucta revertuntur, imo cæcitas, aut apoplexia vel phthisis accedunt; capilli quidem repullulant & complicantur iterum, sed hæc ad ægri levamen non sufficiunt, nili mentente *Fifebero* synochus accedat, quæ humores peccantes absumat & morbum sanat.

Medicamina quæ indicata videntur, ut evacuantia per os & alvum, diuretica, sudorifica, mercurialia, nocent maxime, nec morbum minuunt.

Unicum prodest medicamentum, scilicet lycopodium, cujus decoctum intus & extus adhibetur, potu, clymate, balneo; sunt qui laudant etiam decoctum acanthi mollis, quod, addito panis fermento, accecat: additis rosmarino, salvia, aliisque plantis aromaticis, decoctum illud potus forma adhibetur.

Consultatur *Erndel Varavia physice illustrata; Historia naturalis Polonia; Raczinsky Jacob Professoris Erfordiani dissert. de trichemate; Bachstromi dissert. de plica Hafnia 1725.*

Diversa esse symptomata plicæ eruptionem antecedentia pro diversis hujus morbi speciebus refert *Carthenfer*; ut quænam sint illæ species ignoro.

XXXVIII. ALOPECIA; *Ophiasis* Græcis; Gallis *Pelade*, *Alopecie*.

Alopecia ab *Ἀλωπῆ* vulpes, quasi morbus vulpinus. Genus est morbi cunctis animalibus communis, in quo pili animantium, capilli hominum, plumæ volatilium epidemisque omnium decidunt; in avibus & quadrupedibus dicitur *la muse*; huic morbo homines silvestres vulgo *les Sauvages*, & ii qui pilosi undequaque sunt, obnoxii esse possunt. Cum vero tantum sinciput occupat alopecia, calvitias nominatur, vulgo *la Bhaquette*, cum epidermis decedit, *pelade*.

1. *Alopecia simplex. Desinitium capillorum.* Sennerti. L.

1. Quibus per tabem vel phthisin capilli defluunt, hi alvi fluxu superveniente moriuntur *Hippocr. aphor. l. 6. & cæc. 436*. Illud symptoma rutilæ ratione emendari potest.

2. Accidit & casus capillorum a febre acuta, synocho ut vulgo dicitur maligna; convalescentibus ad hanc speciem plura sudent *Jatrolypæ*, ut sicut adstringentes, cutem corroborantes ex vino rubro eum decocto solvæ, rore marino &c. lotus ex aqua Reginz Hungariz, ex phlegmate ab aqua vitæ accensa residuo; adeps viperinus; succi rapum, ac scillæ, præscribuntur.

3. Accidit alopecia singularis sincipitis seu calvities senibus, ab aridura & siccitate bulborum capillorum; malum illud immediate est.

4. Cum a redundante sero, seu a laxitate pororum cutaneorum accidit, quod ex temperie phlegmatica dignoscitur, exsiccatia externa ut supra dicta, item frequens pectinatio, caraclysmus aquarum thermalium, tum cathartica interius usurpata, eaque phlegmagoga a *Galeno* feliciter adhiberi solent.

2. *Alopecia syphilitica* Nicol. Heinssii; Verduc Patholog. C.

In hac specie non solum capitis, sed & totius corporis capilli decidunt; causa hujus est obstru-ctio radicularum capillorum a veneno syphilitico, vel leproso; dignoscitur signis hifce morbis propriis; curatur litu mercurialis conjunctis fotibus capitis ex decocto emollienti radicum lapathi, foliorum malvæ; & præmissa post catharsim lactea dextra; altera methodus est per sudorifica, sed minus tutæ.

3. *Alopecia volatilium Liger, la Muse.*

Aves hoc affectu laborantes mortæ sunt, cibos non appetunt, his eriguntur plumæ, quas ob pruritus rostro avellunt & excutunt. Serius nasi pulli circa Septembrem huic obnoxii sunt, pluresque moriuntur. Ad curam, aviarium sulphure accenso imbuendum, frigus vitandum, aves itaque Soli sunt exponendæ, oleo & decocto cumini, lupinorum ungendæ, eluendæ.

4. *Alopecia areata seu Area* Jonstonsi. L.

1. Illa est species in qua per areas tantum capilli deficiunt, alia alopeciz nomen retinet, sub qualibet figura dilatatus, in barba & capillo sit, *Sauvages Nosologia Methodica. Tom. II.*

in qualibet ætate, &c. eaque difficilis curatur, si locus fricatus cito non rubescit, si inveteratum malum sit, si densa cutis, subpinguis & ex toto elabra; secus facilius curatur; cura ut sequentis. Hæc est symptoma tinearum, phthiriascos, elephantiascos &c.

2. Alia quæ *ophiasis* dicitur, incipit ab occipitio, duorum digitorum longitudinem non excedit, ad aures duobus capiti bus serpit, quibusdam etiam ad frontem, donec duo se capita in priorem partem committant, infantes maxime afficit; in ea etiam cuti superficialiter excoriatur, color ejus mutatur & si pungatur, serofus sanguis exi-; eutatur humoris viscosi evacuatione per purgantia & apophlegmatismos, ejusdem humoris, dum in fluxu est, repulsione per adstringentia, ut est ladanum in oleo mastiches dissolutum, deterfione per abrotanum, radices arundinis istas, dein per sinapi, nallurtium, adipem urinum.

Ophiosm adu in puero sere trimo observo, cujus symptomata sunt cuticulæ capitis & totius cutis desquamatio cum asperitate, & squamulis farinosis albis, capillorum lapsu, atrophia, pervigilio continuo & anxietate irrequieta; nulli sunt crinones, nullus apparet pruritus, nisi quod insans vel sibi pone aures sapissime fricat, cutim & contrectat; nulla cutis rubedo præcessit, tussis vero comes est, fænes inconstans, alvus quandoque laxior, vomitio a cibis paululum dyspepsis, rubedo alterutris genæ, febricula anomala. Mensis est a quo hic morbus incipit; noctes integras eum infantem in cunis agitare necessum est; macies in dies crevit; præmissa catharsi ex manna & syrupo de ciehoria ana uncia una, eaque post usum jusculorum diluentium repetita, præscripti usum lactis, vespere syrupo papaveris dosim, & lienum cutis ex oleo; deinde vero his iræis lotionem cutis repetitam ex aqua cum farinæ paulillo.

Dicitur ophiosis a Græco *ophis* serpens, ob desquamationem cutis. Vide *Gorrai definitiones*. Ophiosis est etiam symptoma pruritus, scabiei, lepræ, erysipelatis, rubellæ, morphæ nigre, herpetis, purpuræ crminosæ, atrophie a crinonibus, his vel ter accidit pueris recens natis, seu intra primos menses; phthiricos etiam non raro afficit, an genus distinctum constituat inquirent, & determinent Nosologi; hanc *Gottus* ad alopeciam refert.

3. Alia leprosa est & incurabilis nec hodie sere cognita, sed eodem recidit, quæ syphiliticam causam agnoscit, & curatur ut syphilitis.

4. *Alopecia porriginosa, Phthiriasis* Hippocr. *la Pythiriasis*. L.

2. *Porrigo & furfuratio* Sennerti; ea est species morbi in qua non solum pili deficiunt, sed cutis pilosa desquamatur; hoc hominibus in capite tantum accidit. Curatur præmissis catharticis & jusculis aperientibus, per discussionem & deterfionem cum pauculo adstringentium decoctum cicenum & malvæ hic locum habet.

b Si vero ut canibus & ovibus evenit, ex scabie vel herpette accidat, curatur lotionē ex abſinthio, ſotu ex oleo cadino, decoctio calido ſudorifico, unctioe ex oleo cum ſulphure, litu mercuriali &c.

Vide *Tineam*, *lichenes* &c. quorum alopecia eſt ſymptoma, & poſiſſimum phthiriſiſm.

XXXIX. ELCOSIS; Morbus Lazari Frid. Hofmanni; *Vermhaden* Germanis; *Ulcere exulceratione*.

Ulcus eſt ſolutio continuū in partibus mollibus cum ſubſtantia diſſolutione a cauſis erodentibus, phlyſia facta.

Caries eſt ſolutio continuū in partibus oſſis cartilagineiſve, facta a cauſis putrefacientibus vel erodentibus cum nativi coloris & textus mutatione.

Si cutis, partefque cute denudatæ patiuntur ulcera, carieſve, numero, extenſione, duratione aliſque ſymptomatis notabiles, morbus inde exurgens *Elcoſis* vocatur, ægri vero *exulcerati*. *Lazari*, Gallice *ulceres*, *converts de playes ou d'ulceres*.

Si ulcera oſſibus iſtis adhaereant, oſſa colorem nativum mutant, eroduntur, carioſa evadunt; quædam intumefcunt ſeu exoſtoſi aſſiciuntur; in omnibus hiſ cauſis ægri ærophii, macilentii, imo hectica accedente tabidi ſunt; hic vero morbus gravitate, frequentia, periculo, ſeu pertinacia ſua apprimè meretur locum inter eos, qui Medicorum curæ committuntur, dum ulcus in abſtracto, ut fieri ſolet, ſpectatum viciis ſeu aſſectibus chirurgicis tantum ſolet accenſeri.

In elcoſi cutis corporiſque deformitas, ſcæditas ob ſolutionem continuū, ſcretorem, decolorationem; datur & ſymptomatum concurſus, ut ſcretoris, fluxus ichoris, tabi, ſaniei, ſæpius cum carie, exoſtoſi, callis, fungis; aliunde obſtinata morbi duratio, periculum vitæ impendens illum eacheſtricia, chronicis adſcribunt; huius vero ſpecies plurimæ ſunt & poſiſſimum a viſpulentia quorumvis exanthematomæ cutorum tubum & impetiginum ſorventur; horior itaque chirurgicæ peritoſi medicos ut genus hoc, ut par eſt, elaborent, quod tantum hic raptim delineamus: Vide Fr. Hofmann. c. 6. de *pustulis* &c. p. 426. T. III.

1. *Elcoſis fiſtuloſa; Fiſtules, abſces fiſtuloſæ*.

C. Ortum ducit ab apoſtemate ſæpius neglecto, cognoscitur ex parvo foramine cutis, in ſinum internum cavernoſum ampliore terminato, oris ut plurimum calloſis, unde ſæpius ichor purulentus exſtillat, a ſuppuratione viſceris aut partis internæ cuiuſvis reſiduus, adeoque eſt ſequela morbi cuiuſvis inflammatoriſ ſuppurati, aut phlegmones, ſurunculi, bubonis &c. in oculis creat epiphoram purulentam; in podice fiſtula aut vocatur, & eulciacm purulentam excitat; in empremate, phthiſi, tabe, diverſas corporis partes perforat; ſequitur etiam in artubus vulnera virulen-

ta, vulnera quæ cariem oſſis excitant, maxime ſi glans plumbea vel corpus quodvis peregrinum in ſundo hæreat.

Curatio apud *Heiſterum*, *Platnerum* &c. inquiratur. Poſiſſimum ſcopus eſt ut puri liber exitus pateſcat, ut ſordes putridæ eluantur, aeris accellus arceatur, ut antiſepticis putredo præcaveatur, caries ſi quæ ſit deſtruiatur, & bona ſanæque cicatrix inducatur.

2. *Elcoſis varioloſa*, *Petie Maladie des os* tom. 2. pag. 401. & 481. C.

Eſt exulceratio ut plurimum in genubus, earis, aliſve articulis exorta cum carie & pedarthrocæ, a viru varioloſo, ſanatis variolis malignis, reſidua. In variola, ait *Petie*, ſuperveniunt apoſtemata in quibus quam ciſſime fluctatio percipitur, iſſque apertiſ oſſa detecta tumida & ſæpe carioſa reperiuntur, quia ichor infra periosteum aut in ipſo oſſium textu latuit hic aſſectus tabem aut anafarcam lethalem in ſerre conſuevit.

3. *Elcoſis Herpetica, ulcera ſerpiginosa* Heiſteri *ulceret dartreus*. C.

Sunt ea quæ intus rubra, calida, ſicca, rodentia, in vicinia ſunt herpette, eryſipelaceo tumore, puſtulis obſita, cum pruritu ſerino: unde differunt ab ſcorbuticis quæ pruritu & puſtulis carent.

Illa ſuccedunt morbis cutaneis magna ſanguinis acredine, ſingulari, herpetica ſtipatis, nec ſanari poſſunt niſi præmiſſis catharticis diureticis & edulcorantibus maſſa ſanguinis correctæ fuerit; ulcus dein ipſum eſt leniſſimis unguentis, ut cerato Galeni, & ſimul præparatis ſaturinis, ut albo Rhaſis, diapompholyge trahendum, ſæpius decocto emolliente radicem althææ, ſoliorum malvæ, aquis acidulis eluendum.

4. *Elcoſis ſerophuloſa, Ulceret ſerophuleux*. C.

Illa ſunt ut plurimum ſordida, humida, cum tumore labiorum pallido, craſſo, pus vero mucoſum copioſum fundunt, non raro in oſſibus contiguis exoſtoſes, caries comites habent, digiti pedum, manuum hiſ ſæpius inſeſtantur.

Vide ſigna apud *Petie*, *Meld. des os* tom. 2. p. 480. ubi *des exoſtoſes ſerophuleuxes*.

Curatio exigit diætam & pharmaciam internam, qualis in ſerophula, nec non chirurgiam & pharmaciam externam, de qua conſultatur *Petie* pag. 493. & *Heiſterus* lib. 5. de *ulceribus*. Vide etiam *Ruſſellum* de uſu aquæ marinæ pag. 121. ubi de carie ſerophuloſa, & *Storr* de *cicuta*, ac *Nil. van Swieten* de ſpiritu antivenereo hic convenientiſſimo.

5. *Elcoſis hydropum, Ulceres ædemateux, hæmæux*. C.

Sunt ulcera ut plurimum tibiſ hydropum innascentia; oriuntur itaque in anafarca, phlegmatia, aſcite, aliſque morbis huius ordinis; initium ſumunt a phlyctænis ſeu ampullis aqua plenis, quæ crepant & multum ſerum exſtillant: vicinia ulceris eſt livida maculata: ſimplex datur excoriation quæ non pus, ſed ichorem

rem serotum diutissime fundit, & quæ in junioribus robustis bene constitutis quandoque morbum priorem solvit, at in debilibus, senibus dudum cachecticis grangranam quandoque & mortem accelerat. Huic ulceri occasionem præbet vel leve vulnus, vel scarificatio arte facta.

Summa itaque prudentia opus est ut si uti lis sit hæc fontanella, non refecerit maturius, inde enim hydrops recrudesceret, & ne in gangrenam abeat. Hæc elcosis rheumatismi crissis est.

6. *Elcosis scorbutica, ulcera scorbutica.* Lind. de scorbuto : *Noma tibiarum* Ill. Linnæi Gen. Morb. 251. C.

Ulceræ scorbutica fundunt saniem tenuem, foetidam, cruore tinctam, deinde adest cruor coagulatus, putris, ulceri agglutinatus, carnes hæc crusta tectæ, molles, spongiosæ, putridæ; margines ulceris lividi tumidi, carnis spongiosis infra cutem enatis facti; si comprimatur ulcus, gangræna imminet; violacea semper œdematosa, dolorifica, & fundo succrevisit fungus hepatis vitulini carni similis, qui utcumque refecerit iterum mire excrescit; hoc reflecto periculo sus sanguinis fluxus supervenit, hæc ulcera diu perstant ossibus intacta: tibia porissimum afficiunt apud Suecos maritimos, ab erysipellate ortum sumunt, variis foraminibus dehiscunt, pertinacissima sunt,

Escharotica in hoc casu inutilia sunt; mercatoria, quæ in aliis ulceribus profunt, hic periculi plena sunt; hæc ulcera a levissima contusione sobolescunt.

7. *Elcosis syphilitica, Ulcera venerea.* Petit tom. 2. pag. 458. Heister cap. 4. de ulceribus venereis. C.

Ea sapissime caput afficiunt, prægressis tophis, quibus dolores nocturni, exulcerationes, caries laminarum cranii superveniunt, nec non adoriuntur extrema inferiora, ubi exostoses in spina tibia, osteocopi, deinde caries, medullæ corruptio, robres aliæque mala se comites addunt, in perenne ægri supplicium.

Elcosis syphilitica & exostosis ejus frequens comes sæpe supervenit antiquæ syphilidi imperite curatæ, sive quia non sufficientes præparationes instituit, sive antea hydrargyriolum, sive quia pyralismus excitatus fuit, unde hydrargyrum & curior: elapsum est, sive quia non sufficiens dosis hydrargyri, nec sufficienti tempore litus adhibiti sunt, imo debellata vii syphilitica exulceres non raro perstant; Corruptaque medulla ossium, sunt caries, ulcera, quæ vix unquam sanari possunt, & æger tandem tabe absumitur. Vide *Petium loco citato pag. 393. Astrucum de lue venerea lib. 4. cap. 10. §. 9.*

Apud Angolenses morbus est endemicus Boissidius, quo aff. & cum dris doloribus patiuntur iacturam p. dum, manuum, nasi, aurium &c. an vero sit elcosis syphilitica non satis liquet. Vide Dapper Histoire des Voyages.

8. *Elcosis cancerosa, Ulcera chancreux.* G.

Illa sunt duplicis varietatis; vel enim funt superficialia, crustosa, *ficca*, qualia non raro labia nareque deturpant, & *noli me tangere* vulgo dicuntur, ea vero dolore lancinante, carnum duritie, scabritie, & mali pertinacitate produnt; si intra nares vel os serpent, ibi *humida*, foetidaque sunt. Vel ea cancrorum fungum, parotidum, oculorum, aliarumque partium tenerissimum tumores ambiunt, seu funt ipsi tumores exulcerati, labiis extorsorum versis, tuberosis, foetidis, atro rubeutibus, sanique acrem suppeditant, unde æger pervigilio, hectica & tabe sensim absumitur, & illa sunt ulcera carcinomæ, humida, phagedenica &c.

In ambobus balnea, serum lactis, lac pro omni alimento, juscula edulcorantia & pullis, ranis conveniunt. In prima varietate cum successu vidililum oleum olivæ intra quod infusa fuerant paralia plumbaginis, ipsa die infusionis illinitur pars cancerosa hoc oleo, & deinceps per quindecim dies semel quotidie iteratur ille litus; dolor a litu atrox excitatur, quousque ad septimam diem increvit, dein vero quotidie decima sexta die eschara nigra crassa absoluta est, & sponte delabitur; cutis substrata tenera est, sed integerrima, & sic æger sanatur.

In ulcere cancroso humido nuper celebratur apud Suecos & Anglos pulvis D. Guy, atroviridis, arcanus, quo inspergitur quotidie sulcus ope lapidis infernalis in cancri peripheria cufus usque quo separat tumor excidat; hunc pulverem adhibere suscepi in cancro mammaræ, sed frustra, sulcus enim carnis fungosis quotidie excrescentibus oblietabatur.

Methodum palliativam curandi hujus ulceris passim Auctores referunt; usum citatæ seu extractum conii maculati celebrat *Stækelius*, at nullus apud nos ejus adhucdum fuit successus; atropa belladonna & folia phytolacæ Berolini leudata extus admovenda majorem spem faciunt.

9. *Elcosis gangranosa* A. non est hujus generis quippe chirurgicorum morborum numera adscribi non potest.

Curatio Elcoscos exigit 1. ut crasis vitiosa sanguinis & humorum corrigatur per remedia generalia, ut cathartica, diuretica, edulcorantia, & per specifica ut antiscrophulosa, antiscorbutica, prout a virus scrophuloso, scorbuticoe fovetur ulcera. 2. Ut vitium topicum quod ulceris cicatricem impedit removeatur, illud vero vitium topicum est sinuositates, callositates, caries latens, siccatas, foetiditas & mucositas ulceris: sublati scilicet impedimenti vasa tum animalium, tum vegetabilium facile vegetant, crescunt, & sic vulnera ac ulcera cicatrice obducuntur; cicatrix itaque non est opus naturæ seu illius principii sentientis, & moventis quod animalium tutelæ & medellæ invigilat, quippe in plantis in quibus illud principium deest, vegetatio adeoque vulnervm, ulcerumque sanatio pariter succedit ac in animalibus.

nimalibus, ut experimentis D. Du Hamel constat.

Sinuofitas ulceris est carities ejus major quam est orificium; illi sinus a pure, vel phlyce, vel mechanice cunduntur in textu cellulari, proindeque in muscularum, tendinumque interstitiis; pus scilicet gravitate sua cellulas imas subit, muscularum ambientium pressione novas sibi vias cudit, ac erodendo, laxando, putrefaciendo cuniculos, cavernulasque extendit & augeat; in his sinibus calore & mora pus majorem in dies putredinem, fetorem & vim corrosivam adipiscitur; unde summi momenti est illi sufficientem & liberum in loco decliviori exitum parare, ac quotidie pus illud expurgare; hoc præstant peritæ excisiones carniū succrescentium, quæ orificium minuant, callorum erosiones, aperturæ ex adverso artus apostomatosis factæ, deligationses bis in die institutæ, puris ex sinibus expressiones, situs effluxui puris commodus in artu agro servandus, quies hujus partis, ne pressione pus vias sibi aliorum cudit.

Callositas labiorum ulceris in diuturnis sinibus accedit ex eo quod aeris accessu partes excrescant, turundis, candelulis, firmioribus compressis densentur, apprimantur; eodem aeris accessu putrefactio puris acceleratur, ruidior deligationse, frequentiori & rudi deterfione colligamenti purulenti, succrescens de novo caro dura, callosa, & ad excrescendum minus apta evadit; ergo satius est suspensa manu ulcera mundare, injectionibus leniter detergentibus uti & pus e sinibus evertere; calli vero vel emolliuntur, post leves scarificationes, appositis emplastris, & iterum institutis scarificationibus usquequo suppuratio callum auferat; vel emolliuntur appositis turundis ex sapone vulgari factis, & in sinu per noctem derelictis; vel denum utendum lapide infernali, qui escharam excirat & phlogosum, unde suppuratio & calli destructio; de quibus consultantur Chirurghi.

Caries nascenti ex ossis decoloratione, periossei separatione cognoscitur: *perfecta* ossis ulcus est, vel fragilitas & erosio; alia ossis laminas tantum exedit, altera in cavum medullare penetrat, & medullam inflammat, suppurat putrefacit; quoties in fundo vulneris est os cariosum, frustra tentatur ulceris sanatio; nunquam firma caro succrescit, ichor ex carioso osse promanans carnes erodit, emollit, & cicatricem impedit; ergo cariei prius est medendum partem ossis cultris, malleolis, scalpris auferendo, residuum corrosivis ac septicis, imo igne actuali destruendo, usquequo succedat exfoliatio, seu partis teredinosa nigra in minima, vel majuscula fragmenta diviso, a supposito sano esse separatio.

Siccitas, rubedo & phlogosis ulceris facile cognoscuntur; dolore, pruritu, calore stipantur; ea impediunt carnis excrescentiam, adeoque indicant scomediam emollientia, humectantia, ex decocto plantarum vulnerariarum, lotiones ex

aquis aculeis, ex decocto hordei, oryzae, portum similem, juscula refrigerantia.

Mucositas, fordities & puredo ulceris cognoscuntur ex abundantia puris viscoli, serosi, fetidi, carnibus mollioribus, pallidis, fungosis; si negligantur hæc ulcera porissimum æstare, muscæ carniarum in his ova sua deponunt, quibus exclusis larvæ vermiformes in ulcere nidulantur; hoc vitium avertitur frequenti deterfione, lotionibus ex decocto plantarum amarorum, succo resinoso gaudentium, unguentis, resina & balsamo scateantibus, præparatis saturninis forma pulveris adspersis, aut unguentis viride æris recipientibus; nec non fungi cultero tescantur, aut alumine usque exeduntur.

In elcisi cancroso, terophuloso, syphilitico, aliisque nullum salubrium auxilium quam usus internus extracti cicutæ, id est conit macerati Linzi; hujus extracti analysis ab Ill. Roberto Langier instituta dedit fere tertiam partem, tum spiritus alkalinus volatilis, tum salis ejusdem indolis, evaporato per coctionem spiritu rectore virulento placent.

Hujus extracti in pillulas redacti grana 10. 12. 14. mane & vespere deglutuntur; ascendendo sensim ad majorem dosim, ut 30. gr. & raro ad drachmam unam; hoc vero medicamen per menses continuandum, interea dum ulcus decocto folliculorum bis de die oblinitur, cum vel sine melle rosaceo, & aliquot guttis spiritus salis.

Nisce folis medicaminibus & congrua Chirurgi opera Ill. Loeherns Medicus Vienneus non solum ulcera cancroso, scrophulosa, cacothetæ quamplurima sanata vidit, sed etiam scrophulam, carcinomata, contracturam arthriticam, arthritidem venericam, scabiem venericam, phthirim scrophulosam, phisicniam &c. sanavit. In juvenibus celerior est effectus quam in annosis; dosis granorum 14. sæpius sufficit.

10. *Elcisi Ægyptiaca*: Tarbo Ægyptiorum.

Apud Ægyptios, ut mihi retulit Illust. Pery, Doff. Med. Anglus, recens ex Ægypto redux, viget morbus endemius, Tarbo dictus, qui pedum, manuumque exulceratione, atque doloribus atrocibus est insignitus, quique successu temporis articulorum affectorum successivum lapsum inducit; addit intermittentes febres fere nullas in hac regione; aut scorbutos plurimos observari.

XL. *GANGRÆNA*, *Gangrene humide*; cujus ultimus gradus *Sphacelus* quibusdam dicitur.

Plura successiva signa gangrænæ præsentem denotant; 1. mors partis, seu ejus anesthesia; immobilitas, frigus; 2. textus facilis laceratu; 3. color lividus, griseus, deinde nigricans; 4. dissolutio putrida cum fetore cadaveroso.

Diffræpat a necrosi; 1. infarctu tumido, 2. putrida dissoluzione: color ex roseo nativo mutatur in atro-rubrum, vel pallidum, deinde

lividum, & ac denique nigricantem, vel cinerium.

Calor natus mitis abit in frigidum gelidum. Consistentia elastica mollis abit in flaccidam, lacerabilem, dissolutam. Motus proprius omnis est vel muscularum, vel arteriarum; motus muscularis partis gangrenosæ cessant, licet pars tota ut manus motum habeat a vicinis muscularis, ut a muscularis ulnæ; pulsatio vero arteriarum quandoque subsistit, quandoque evanescit in parte gangrenosa.

Demum octus, serius gangrenosa pars foetet, putrescit, dissolvitur, quod in necrosi non accidit.

Gangrænæ primus gradus vulgo a Medicis Scholasticis *gangraena* proprie dicitur, & partis mors definitur, in qua tantum adest tendentia; & dispositio proxima ad putrefactionem; verum nomina morborum generica non debent mutari pro diversis eorum gradibus; fecus triplicandus esset eorum numerus. Partes omnes molles, & potissimum fluidæ animalium, maxime vero excrementitiæ, cruor etiam sponte tendunt ad putredinem, a qua, durante sanitate, immunes fluunt, per novam chyli acescentis admixtionem, continuam humorum resolutionem, & putrescentium excretionem, adeoque sudorum circulationem, docet Physiologia potissimum Stahlia. Adeoque ubi fluida extra, vel intra vasa hærent, nec depurantur, ea tanto citius putrescunt, quo magis alkaliescentia sunt quo acriori colori exposita, & aeri pervia, nisi viscositas, siccitasque motum intestinum præfectorum impediatur, docent experientia culmaria.

Putrefactio itaque, seu molecularum sulphurearum volatilium, & alkalinarum volatilium salium accessus, & lucta nutua est causa efficiens gangrænæ, ubicumque solita ejus impedimenta deficiunt.

Principia vero gangrænæ sunt quæ fluidorum depurationem impediunt; eorumque motui putredinoso favent, si tamen necrosim excipiamus, quæ alterius indolis videtur esse, adeoque diversum genus constituere debet.

Gangræna supponit fluida resolutioni apta, non vero glutinosa, adiposa, febacea; maxime vero cruoris in vasis congestionem; ejus vero principia diversas species distinguunt.

1. *Gangræna a contusione* D. Quesnay cap. 2. de gangræna, pag. 1. A.

In carnibus valde contusis vasa tenerrima lacerantur, fluida in textum cellularem delapsa coagulantur, cætera in textu vasorum intercepta hærent, hinc putredinis initium; alit natura hos obices superata majore nisu cruorem in has partes impellit, unde affluxus, infarctus, phlogosis, dolor obscurus, nervis scilicet a contusione solutis; mediante calose acceleratur vel suppuratio, vel putredo gangrænosa.

Contusionem sæpe comitatur *commotio* nervorum, unde eorum *stupor*; inde interceptus fluidi nervi irradiatio vivifica, inde laxitas partis

major, & novum gangrænæ principium, maxime si commotione per osseam compagem ad cerebrum perventa delirium accedat; unde fit ut natura opus tum resolutionis, tum suppuracionis negligat; inde flasis putrefactiva ulterius progreditur.

Si vero vulnus addit, adeoque aeris accessus, si vulnus a scopeto carnes alius penetrat sinuque eadat, ex quibus fluida vitiosa difficile elabuntur, ibique fit summa vasorum destructio, & fluidorum ignea acrimonia, inde principii conjunctis hinc gangrænæ celeriter depascens. Tabum etenim gangrænolum vasa vicina emortua subiens, insicit, corrumpit; nil enim ad carnes dissolvendas & fluida corrumpenda aptius, nisi vis vitalis quæ suppuracionem molitur, hoc tabum expellat, & contagii effectum arceat; ut a pomu putri pomum contiguum, ita a dente carioso dens vicinus, & caro sphacelatæ continua sphacelo insicitur, vasis capillaribus tabum veluti fugentibus, nisi fluido in circulum ex adverso truso replentur, erythema ita tumidum cum textu carniū pastaceo, sine tensione, sine calore notabili cito livescit, vulnera consula ambit, circulo rubro sensim a centro recedente, & gangrænâ designante.

2. *Gangræna ab infiltratione* D. Quesnay p. 1. c. vi. A.

Quoties intra textum cellularem, in adipis locum succedit lymphæ, serum, pus, lac, lochia aliuse humor facile putrescibilis, toties intumescencia mollis, flaccida, vix dolens, infiltrationi tribuitur, quæ a quadruplici principio dependet; scilicet 1. a laxitate prævia partis infarciendæ; 2. a copia fluidi infarturi; 3. ab obstrukcione vasorum sanguiferorum ut plurimum erysipelatosa; 4. vel a venarum strangulatione tum per externam pressionem, tum per spasmodicam contractionem quam inducit irritatio.

Hæc infiltratio phlegmæ, scorbuticis, convalescentibus plures hæmorrhagias, diarrhœas, phlebotomias passis, morbis chronicis cum amphimerina junctis, ulceribus, erysipelatibus a magna tensione ortis, vulneribus venenatis, lactis & lochiorum refluxibus, hydropicis morbis, &c. supervenit; quoties enim cruor venas difficius subit, & a retro pellitur, toties ibi stagnans in extremis arteriis sanguineis lymphatica deducit, & lymphaticus humor, quo onustus est, uberius subit textum cellularem, ex quo vix reverti potest in circulationis vias; adeps quidem inibi lente progrediens a putredine immunis ferme est, utpote viscidus; verum humores feroci ibi stagnantes solida relaxant, & si calor accedat & acrimonia, demum putrescunt; & gangrænâ excitant.

3. *Gangræna ab strangulatione*, D. Quesnay, c. 1. & xi. A.

Si vasa sanguifera, tum venosa, tum potissimum arteriosa ab aponeurosis, membranis, calyptrivæ, ligaturis, compressionibus, nervo-

rum vulneribus acri irritante quovis, coarctentur, languet statim circulatio inter ligaturam & cor, & in ramis vicinis; unde gangræna, quam præcedit infarctus tumidus rubor: & phlogosi fugaci stipatus, si venæ sint strangulatæ; hinc textus flaccidus, elapsa inflammatione mollescens, pallaceus; si vero arteriæ sint strangulatæ ut in vulnere cranii, fasciæ latæ, vel nullus tumor extus appareat, sed tantum mollescit, pallor rapide crescentes, vel tumor inflammatorius, tensivus initio, sed cito in flaccidum œdemā terminatus, & deinceps sphacelus ab stagnante cruoris & lymphæ in textu celluloso decubitus.

Si ligaturæ tantum venas coarctent, inde tumor maximus & ab infarctu gangræna; si ligatura simul arterias coarctet, gangræna etiam sicca potest oriri. Idem præstare possunt tumores in inguinibus, & axillis positi; inde enim pressus venis tumor magnus, pressus vero arteriis atrophia & necrosis; vulnera sunt vel puncturæ, vel incisiones, vel contusiones vel lacerationes, quæ nervos tendinesque afficiunt.

Puncturæ a clavis, acubus, stylis, spinis trachini, aculeis raiæ, ononidis, &c. si nervos aut etiam fibras nervæ attingant, non vero transversum fecerint, si aponeuroses irritent, eadem die sine infarctu tumido notabili, partium vicinarum gangrænam ab strangulatione inducunt, quam accelerant spirituosa & aromatica, tollunt profundæ incisiones, quæ laxant textum, sedant olea tepida.

Verum si gangræna non nisi post quatuor vel sex dies a punctura se prodit, strangulatio tunc oritur a causa physica, scilicet a fluído quod in fundo vulneris corruptum membranas irritat, & inde strangulatio gangrænam late diffundens; perperam illæ gangrænx tribuuntur degenerationi humorum, cacochymix, veneno.

4. *Gangræna a veneno* D. Quesnay cap. 12. A. Inter venenatos serpentes sola viperæ apud Gallos debet reponi, nec aliud est vere venenatum animal, si vesperi & apem excipias. Quidquid de aliorum hujuscæ regionis serpentum veneno traditur, error est plebis; soli serpentes duobus dentibus in maxilla superiore armati, venenum in morfu gerunt.

Viperæ manum momorderat hominis; qui vulnus illico suxit, ast lingua ei, referente *Parsio*, multum intumuit, vix loqui poterat, inde in syncope lapsus fere moriebat; brachium ad scapulam usque emphysematose tumuit cum dolore. Alter quem viperæ caput abscessum pupugerat cardialgia affectus, dein pressionem pectoris ante & pone, quasi ferreis vestibus victus esset, expertus, cum cum pedes sustinere recusarent, decessit est in lectum, ubi difficillime respirabat; accessit magnum frigus per horas duodecim, pulvere viperino calor rediit, sudore oborto brachium enormiter intumuit cum toto latere ad umbilicum usque; accessit nigra ecchymosis in illis partibus, embrochationes spirituosæ & theria-

cales per tres septimanas usurpatæ morbum sustulerunt.

Aliæ viperæ morbis magna debilitas, syncope, sudores, frigidi, vomitus, ardor viscerum quandoque superveniunt, neglectis remediis pars demorfa & vicinæ gangrænescent, nisi mors gangrænam prævertat: alcali volatile est ibi specificum.

5. *Gangræna ab inflammatione* D. Quesnay c. 4. Inflammationes gangrænam inducunt tum ratione infarctus systrophici, tum ratione strangulationis vasorum a nervis & aponeurosis irritatis; præstant idem inflammationes puræ intensissimæ quæ suppurantibus acribus petraçantur.

Inflammationes *malignæ* primo aspectu videntur arthipelacæ, parum tumidæ, sed tactu frigidæ, & veluti duræ, sine ulla elasticitate aut tensione, adactio scalpello nullus fere sensus, accedunt pustulæ lividæ, pulsus sensim minuitur, mors accedit; hæc inflammationes *mortuæ* nuncupat D. Quesnay.

Inflammationes *cansica*, quales in anthrace observantur, quæ licet lapsu escharæ sicæ & nigre accidente suppuratione feliciter quandoque terminentur, alias tamen carnes ad usque ossa corrumpunt, ut anthracis illi quos observavit *Perous*, & *malum ardentium* vocant Franciæ Historiographi.

Inflammationes *erysipelatose* acres gangrænam altam inducunt, nam ardor inflammatorius alius pendit a principis mechanici fru valido anteriorum & fluidorum attritu, alius a physicis, scilicet a caustica humorum accredine ex quâ physiciæ erysipelatibus adnascuntur, calor urens adest; interea pars consentitiam œdematofam cito adipiscitur & gangræna late serpit.

Demum inflammatio per nimium infarctum accessit gangrænam quæ cum magno tumore demum livescente & remollescente stipata sit, distinguitur ab inflammatione maligna, gangræna immet si tumor deprimitur, rubedo obscuratur, calor extinguitur, elasticitas evanescat, carnes pallacæ, compactæ fiant, dolor abeat.

6. *Gangræna ex ambuisione* D. Quesnay, c. 16. Pars ipsamque profunde ambusta sphacelo sicco seu necrosi afficitur, carnes vicinæ ob influxum sanguinis & systrophicam inflammationem, gangrænam patiuntur cum dolore atroci, pustuloso, quandoque erysipelate.

7. *Gangræna a gelu* D. Quesnay, cap. 18. *Gangræna a frigore nimio* Vandermonde Journ. de Med. Juin. 1758. A.

Ille sphacelus incipit a dolore frigorifico atroci, quem sequitur stupor, pallor, aridura partium, potissimum extremorum ut pedum, manuum; mentula, nasi &c. quæ partes dein œdematose intumescunt cum motus impotentia; & demum gangræna etiam supervenit.

Adolescens cum pedibus nudis per nivem ites fecisset, dolores atroces pedum sensit, in No-

foco.

urores, si ossibus infideant, ad usque incisio-
nes penetrante debent. 3. Deum sensibilibus par-
tis irritatæ tollenda est; quod præstent caustica
ut oleum terebinthinæ, caryophyllorum, cinna-
momi, aut alterum oleum destillatum ex planta
aromatizata; sic oleo terebinthinæ curatus est Ca-
rolus. Nonus a *Parce*; sic curantur odontalgie
curiosæ: si vero ea non sufficiunt, oleum etiam
fervidum adhibendum est, quod *La Peyronie* ad-
hibuit in punctura tendinis *Principis de Dombes*,
tendines vero majores ut & nervi puncti tum
oleo fervido, tum excisione curantur.

Ubi gangræna a *morfu viperæ* metuenda est,
debet pars dentibus viperæ, tanquam duabus
aculeis, puncta, sine scarificationibus assuetis,
soveri vino vel aqua vitæ in qua dissoluta sit
etheriacæ drachma, simulque theriacæ ad drach-
mam unam semel vel bis usurpari, qua sola
methodo omnes sanare consueverat *Chirurgus La
Motte*.

Inflammationes malignæ seu gangrænosæ vel ab
externa, vel ab interna causa pendunt; si ab in-
terna pendeant, nunquam juvant scarificationes
ad vivum usque protensæ.

Rursus inflammationes a causa interna sunt
vel externæ vel internæ; internæ pendunt a prin-
cipio deleterio fluidis commixto, quod phlebo-
tomizæ tollere nequeant, adeoque phlebotomizæ
vix unquam in illis conveniunt; solum per-
fugium est in antidotis, cardiacis, alexipharmacis,
sed ita prompte hæ inflammationes internæ, so-
pito dolore, abeunt in gangrænam, ut nulli re-
medio locus superfit.

Externæ vero *Inflammationes gangrænosæ* non ita
certo mortem inferunt: dantur enim gangrænz
criticæ, & quæ criticæ non sunt, sæpe non
ultra partis inflammatæ limites sese extendunt,
imò abortu suppuratione in marginibus sponte
quandoque segregantur a vivis carnibus. Caven-
dum tamen ne tabum putre, quod efformatur,
repat in vicinas partes, quod in inflammationi-
bus gangrænosæ per infarctum ortis metuendum,
multo minus in gangrænis siccis, vel inflammatio-
nibus causticis quales sunt erysipelata, escha-
rotica, anthraces, crustæ gangrænosæ, &c.

Ad suppurationem promovendam in mortuis
illis inflammationibus, intus & extus usurpan-
da sunt quæ calorem & stimulum procreant,
topica sunt apertissima resolventia & diaphoretica
æthusa, non raro sinapismi facti ex semen-
to, camphora, sale ammoniaco, sinapis semine,
cum aquis spirituosus & oleis essentialibus æ-
thereis.

Si vero jam gangræna adsit, sperandum est,
si fixi jam sint limites ejus, si margins inflam-
mati suppurationi se accingant; tunc partes
mortuæ scalpello incidendæ vel excidendæ in-
tactis vivis; si vero cessante gangrænz progressu
nulla sit suppurationis spes, spiritu nitri de-
bent partes mortuæ comburi, ut vivæ ad sup-
purandum excitentur, & tabum putre destruat.

In erysipelatibus gangrænosæ infarctus est maxi-

mus vel valde extensus, horum vero cura crä-
git 1. ut carniæ mortuorum phlyctænis, macu-
lis lividis obitatur, infarctus solvatur, 2. ut ha-
rum carniæ succi a putredine immunes servean-
tur, condiantur; 3. ut carnes vicinæ stimulentur
ad suppurandum; 4. ad promovendam opæ sup-
purationis mortuorum separationem a vivis.

Anciputrida quæ ibi conveniunt sunt 1. ac-
tuum, spiritus salis, sulphuris, vitrioli aqua di-
luta, salia neutra, imprimis sal ammoniacum. 2.
Spiritus terebinthinæ, essentia Rabel, spiri-
tus nitri anaticis spiritus vini partibus dulci-
ficatus. 3. Sal inarminus, nitrum. 4. Resinæ &
balsama, terebinthina, myrrha, camphora, sty-
rax, pix. 5. Vinum, aqua vitæ spiritus vini. 6.
Esiccantia balsamica, ut myrrha, colophone,
aloe, resina. 7. Rodentia urentia, ut oleum ser-
vans, ferrum candens, æugo, spiritus nitri hy-
dragyro foetus, aqua phagadenica.

Furunculii majores fumæ dolorifici non inci-
dendi sunt quandoque crudi & dolentes nisi in pe-
rinzro vel vulva siti sunt, tunc enim metus est,
ne pus sibi sinus eudat & expectanda sup-
puratio quæ concreta solvat, & crassamentum ma-
turet.

Erysipelata caustica quæ crustaceam escharam
faciunt, pendunt a vi materiz lapidem caustici-
cum emulantis; harum crustarum separatio pa-
riter debet promoveri per olea emollientia &
digestiva, ut ceratum Galeni, si eschara crassior
sit, ea incidenda, & ubi secedunt, avellenda
fragmenta; vitanda spirituosæ actiosa: juvant
tantum topica resolventia, anodyna.

Anthraces eodem modo tractandi, vitanda
sunt, irritantia, monente etiam *Parce*, lenia
emollientia & suppurationibus eligenda; tantum
apex enortuosus oleo ferventi vel aqua forti com-
burendus, dein expectanda suppuratio; recar-
datur etiam escharæ putredo opæ spiritus tere-
binthinæ, essentia Rabel, spiritus nitri dulci-
ficati cum spiritu vini, sed caustica tutiora
sunt.

In *ambustione* quæ cutem tantum erodit, non
vero ultra penetrat, dolor & pertinacia maio-
res sunt quam ubi carnes ipse comburantur,
quippe secretoria cutis irritata fundunt serum
acre & copiosum, quo affectus perennat adhi-
bitis unctuosus. 1. Antequam infarctus, vel tu-
mor excitentur, igneæ partes extrorsum ducen-
dæ solutione vitrioli, atramento, spermate sa-
narum, albumine ovi, nuce gallarum, vulne-
rariis, astrigentibus herbis. 2. Accedente in-
farctu indicantur emollientia, laxantia, adipo-
sa, unctuosæ, olea, butyrum. 3. Si inflamma-
tio adveniat his missis, fomcna ex aqua tepida,
mucilagine, lacticia, farinosa usurpantur,
& propter fixitatem doloris adduntur anodyna. 4.
Quandoque anodyna paululum volatilia ad-
hibentur, ut camphora, flores sambuci, folia
tabaci, hypofissiani, sapo, stercus avium, &c. si
dolor mitior sit expe coctæ vel trix con-
veniunt. 5. Cum pars ambusta suppuravit,

ncua

nem putrem suppediat, antiseptica; ut vinum, aqua viæ, nitrum, sal marinus indicantur.

Periti sunt qui tamdiu utuntur solo vino; quamdiu propter sensibilitatem non licet aquam viæ addere, mox puram admoovere, usque ad integram sanationem. Juvat non raro folia viridida tabaci, vel, hec apponere, & super splenâ vino madida applicare, quæ sic vulneri non adhaerent.

Si frigori vel gelu debeatur sphacelus, amputatio non est instituenda quamdiu nulla est dissolutio putris, quæ sola viciniam inficit, & in vivo instituenda est amputatio, non in mortua carne. Pars congelata statim nive vel aqua frigida est confricanda, ne subito regelascendo crepent vasa; interea cardiaca sudorifica intus usurpanda.

Si a putredine antecedenti humorum in vicinis partibus ortum duxerit gangræna, vel ea pendet a dissolutione massæ sanguineæ, & in hoc casu de ægro conclamatum est; vel pendet a peculiari acrimonia venenata, adversus quam dantur specifica antidota, ut in syphilide, scorbuto, scabie, & tunc illa antidota usurpanda sunt; si ab ulcere putrido oriatur, tunc adhibenda sunt antiseptica fortiora, ut 1. balsamica, quale est oleum creberrimæ; 2. Salina, ut sal marinum; nitrum, sal ammoniacum, pulverata & magna doâ adpersa; 3. Escarotica ut acidum nitri dulcificatum, aqua Rabel, imo oleum bullicans, unguentum Ægyptiacum, viride æris, aqua phagedænica, subtilissima corrosiva, &c. inde fit echyra quæ carne putredine defendit, usquequo suppurationem partem sphacelofam a sana sepe traverit; non tamen negligenda intus alexiparmaca.

XXI. NECROSIS, l'Ergot; le Feu St. Antoine, la Gangrène sèche, le mal des ardeurs,

Morbus est chronicus, in quo artus, ut pedes, manuvæ, post stuporem & dolorem, ut plurimum sine tumore arescunt, exsiccantur, & sensu, motuque amissis sponte ut plurimum a corpore secedunt.

Differt a gangræna, 1. quod in gangræna fit tumor ut plurimum inflammatorius; 2. quod pars gangrænosa in putredinosam mollitiem sordidissimam vergat; 3. & quod citam mortem intenet; necrosis vero partes mumix siccæ similes reddat vix fortidas, nisi ubi mortuum a vivo separatur, ut per menses divexat. Differt ab arthritide scorbutica quacum convenit ratione dolorum, quod in arthritide illa sine stomacacis signa, dolor noctu urgentior sit, nec artus excidant.

Species hujus generis a nemine distincte traditæ sunt, excepta necrosis ustilaginea, de qua nuper Cl. Salerni plura docuit; ceteris primus fere Ill. Quésnay in eximio tractatu de gangræna sicca tantum delineavit.

Sanguis viscosissimus, tenax, nigricans, & c.

siccitate ad putrescendum ineptus, simulque in extremis partibus hærens, sero per calorem, ventilationem, diaphoreticum evaporato, hujus morbi est materia morbosica, inde stupor, dolor livido, siccitas, mors partis, atque in limitibus superveniens suppuratione gangrænosa, corruptio tendinum & ligamentorum sine ullo dolore, artuum nigrum, siccum, mortuum a vivo segregat.

1. Necrosis ustilaginea, l'Ergot. C.

Vide Histo. de l'Acad. R. des Sc. ann. 1740-1748. 1752. & le second volume des Mémoires des Etrangers ann. 1745. a Cl. Salerni; Aîda Lipsia 1708. a Langio & 1751. pag. 634. item Commentaries Lipsia Ludovigil an. 1757. pag. 72. & 601. Illustriss. Quésnay, de gangræna sicca, pag. 355. & 407.

An sit idem cum malo ardentium? vide Mazzerai, Histo. de France ann. 1090. licet morbus ardentium cum arthritide scorbutica magis affinis videatur.

Utiligo vulgo *secals cornutum*. Gallice *ergot*, & *saige ergot*, de quo scripsit. Motliras Comm. Lipsia anno 1752. pag. 634. vocatur illud secale, cujus spicæ gerunt aliquot grana, sex vel septem lineas longa, cornuta, extus nigra, intus alba, Germanis *Brant* & *Marrhenko* dicta, ab ustilagine nigella dicta diversissima; nam in ustilagine tritici, avenæ; semen est intus higrum & pulverulentum, non corniculatum. Secalis cornuti proventus uber est annis pluviosis, & in agris paludosis, quales sunt Soloniæ juxta Aureliam, inde forte Secalonia. Lemis dictæ, & agri Biesensis, Vastiniensis, Bucercentis Provincie his morbus epidemicè grassatur, scilicet quoties deficiente tritico abundat hoc secale, quo pauperes panem conficere coguntur; unde viget epidemia statim post metum usque ad hyemem; plures marces quam feminas adoritur, & sæpius apud Solonienses pedibus quam manibus nocet; forte quia in locis humidis illa laborare consueverunt.

Illam morbi species sine febre, sine tumore, pedes vel manus aggreditur, doloribus intensis itipatur, colorem nigerrimum & siccitatem suam partibus conciliat, ac demum post plures menses artum mortuum a corpore segregat; vi si sunt trunci cruribus orbei, alii uno crure & uno brachio, rarissimi ambobus cruribus & brachiis mutilati; pluries accidit ut digiti pedum insecti excidant, paucissimis extremus natus delabitur. Agri Solonienses in Nofocomium Aurelianense deferuntur, ubi observati sunt a Chirurgo Noëlio, & nuper ab Illustrissimo Medico Salerni.

Incipit morbus a lassitudine, sine febre, sine inflammatione; raro rubent partes extremæ; facies vero, totaque cutis pallor ac livescit, ventet induratur & tumet, mens hebes est, & hebetudo crescit cum morbo; urina & feces rite secedunt faeces tandem, sunt fortidæ; corpus emaciatur; pedes & manus stupore afficiuntur, cum dolore deinde punctiori, qui

qui cum atrox est, pulsus frequentiam fugacem cum sudore capiti, & epigastrii excitat; secus pulsus est parvus, & ita debilis, ut vix percipi queat; appetitus interea non deficit, ab alimentis calidis laeduntur & sudant, raro accidit dolorem pedum, manuumque esse urentem & rubore stipatum, quod solum refert *Noëlius*. Verum tamen est hosce dolores atroces miscere, si artus aeri frigido exponantur; interea frigescunt & pallent aëri, difficulter se movent, dolor sensim surgit a pedibus ad tibiam, crus, &c. a manibus ad ulnam, humerum, quæ partes successively excruciantur, & ita nigrescunt, at si sumo fuissent indurata; tunc vero cum nigrescunt, cessat dolor patitis, immo sensus & pars mortua est, sed sicca, non foetens; cutis vi detur corrugata, quasi, ait *Noëlius*, diu in aqua frigida sterilet. Necrosis illa demum silitur in tarso, tibia, genu, &c. & tunc linea quædam cuditur superans vivum a mortuo, qualis cuditur ope lapidis infernalis, illa sola linea humida est, putris & fetida; sensum per frustra aut artus integri mortui, carbonis instat nigræ, a vivo fegregantur, aliquandiu vero hærens ligamentis, tendinibus, lacinia nonnumquam omnia dissolutis. Si imperite cataplasmata maturantia applicentur, acceleratur lapsus artuum, sed cum periculo, quippe gangrænascit etiam pars viva; vero opus soli naturæ committatur, ægri quidem artu truncantur, sed sine dolore, sine ulla hæmorrhagia, & sine mutilati per menses dies & annos vivunt.

Quare nulla sit hæmorrhagia, etiam dum crura ex acetabulis coxendicis separantur? quia sanguis est niger, viscidus & veluti succus, talis enim ferme exit e vena, cum initio morbi secatur ad dolores sedandos, tenacitas sanguinis quodque ea est, ut non facilius secetur cultro quam ipsa caro indurata; e centum & viginti quibus artus a Chirurgis fuerunt amputati, vix quinque ultra sex menses supersunt; æst qui opus naturæ commiserunt, plures multo evaserunt.

Hoc fecale cornutum anitibus, ac procellis datum ab ipsis statim respuunt; hoc tamen urgente fame, & cum sursu mixto utentia animalia instat hominum male afficiuntur, & enecantur.

De cura huiusce morbi consultantur. *Ill. Quesnay, Salerni, Sharp*. In summa succerit dixille initio indicari parvam dosim theriacæ, upam, alteramve phlebotomiam, solum ex aqua vitæ camphorata; æst cum pars induruit, & nigrocerem contraxit, fugienda maturantia; ubi exulceratur, sola entiseptica & excruciantia conveniunt, oleum terebinthinæ, pulvis ex sale marino, vi triolo, ac demum expectandum donec pars sponte excidat; kinkinæ in gangræna utilissimæ usum in necrosi damnat *Sharp*.

2. *Necrosis a vitæ Illust. Quesnay* de gangræna sicca, pag. 362. *Hildanus*, centur. 4. observat. 92. C.

Virus est humor venenatus in animali ipso,

quod laborat genitus, vel ab alio communicatus, unde a venenis per vulnus immixtis aut ab alio tegno petitis differt; hæc refert virus venereum, scorbuticum, arthriticum, herpeticum, cancerosum, &c.

Virus quod necrosim inducit debet vel sanguinem ita inficere ut in extremis partibus coaguletur, excrucietur, vel ut vasa ita corrugentur, ut exulceræ sicceque carnes evadant; debet itaque idem efficere intus quod extus parant caustica, ut lapsus infernalis; quippe in escharam mutari debent partes quæ necrosi afficiuntur; in senibus illa mutatio tanto facilius contingit, quo sanguis ad siccitatem & viscositatem magis est pronus.

Senex 72. annos natus podagricus mense Augusto frigus quoddam molestem ac stuporem in pede persensit, sine ullo dolore & tumore vel minimo; de his minime sollicitus fuit, tandem aucto stupore per ejusque digiti lividi deinceps nigri evaserunt, & necrosis sensim sese patefacere, sensimque versus genua serpente visa est. *Hildanus*, accersit mensis Septembris, pedem & crus ad suram usque sphacelatum instat carbonis nigrum, frigidum, & supra modum siccum, extenuatumque repetit: De cætero nullus dolor, inquietudo sere nulla, somnus, fames, pulsus pro more. Rogatur adstantes *Hildanus* ut crus amputaret, quod peritus ille Chirurgus recusavit, & cum quidam barbitonsor deinceps crus amputasset, gangræna serpsit cito in femur & truncum, quæ prius steterat, ac æger intra paucos dies temeritatis illius culpam luit.

Differt itaque illa species necrososæ ab usilagine ratione originis, & ratione symptomatum seu doloris defectu, de cætero eadem est cura, scilicet ommissa.

3. *Necrosis febrilis*, *Lamotte*, observat. 208. ad 302. C.

Ea est quæ typho potissimum, febrisque aliis malignis dictis supervenit, symptomatice aut critique, ut ajunt; illa veto non solum pedes, sed potissimum coxycem, narem & femore adoritur, & differt. a gangræna ex eo quod sicca sit, cum gangræna dissolutionem putridam comitem habeat, præterea sine ullo dolore progreditur, distinguitur vero a priori per febrem comitem.

Hæc vulgo tribuitur vel sordidit in qua hæc partes ob alii & urinæ fluxum obnoxie sunt, sed cum etiam pedes, ab immunditie illa immunes, quandoque necrosi afficiantur, vix illud principum potest admitti; pressioni etiam tribuitur, quippe his partibus in typho per mensem incumbit æger, & reapse pressio illa escharas siccas non raro in partibus pelvis eminentioribus excitat; verum & vidi internas, externasque semperum partes in eo casu solum aut primario affici, quod nec pressioni, nec immunditiei erat ascribendum, maxime vero cupi necrosis primis febris diebus supervenit, nec sordes nec decubitus incursari possunt, ut patet ex observationibus citatis.

Sanguinem in febris triplo viscosiorem evadere quam in sanitate probant experimenta *Cl. Langrish*, adeoque si concurrat simul materia febrilis inspissata, ut in typho, facile concipitur occasione decubitus in valis cutaneis coccygis, vicinisque illum hæsurum esse, & ratione licetatis necrosim inducturum.

Hic affectus ita lethalis venesit ut *Hildanus* nullum per quadraginta annos evasisse quæ curæ commissum profiteatur, verum hæc lethalitas videtur potius curæ olim adhibitz quam morbi gravitatis tribuenda, ut docent *Cl. Lamotte* observationes repetitz; constat enim ex illis nihil esse perniciosius in hac specie necrosos quam mortuas & putidas partes exsiccatas forcipibus auferre; inde enim sphacelus humidus evadit & ulterius ad aeris accessum serpit, quin fugiendæ sunt etiam simplices scarificationes, pars tantum est tegenda unguento de styrace, vel unguifacitio, & si sit excoriata vel exulcerata, unguento *Ægyptiaco*, & expectandum donec febris remiserit vel cessaverit, tunc enim lapsus carniū putridarum sponte accidit & tuto potest solitis medicamentis adjuvari. Vide de his *Cl. Quisnay* de cura gangrænae sicca pag. 383.

4. *Necrosis scorbutica*, *Tulpii* Lib. 3. cap. 38. *Du Plessis* Journ. de Med. Avril 1757. pag. 341. Vide *Melassiterum scorbuticum* a quo differt tantum coloris defectu.

5. *Necrosis epidemica* *D. Boucher* Journ. de Med. 1764. p. 377. 396. 504. A.

Morbis erat epidemicus apud Flandros annis 1749. & 1750. pauperes extra urbem, in aere nebuloso solummodo humido degentes devastans, post varios coloris & frigoris vicissitudines, bellicque ærumnas: tres erant hæc epidemiz periodi.

1. *Periodus*. Contrahitur spasmodice musculorum tibias, brachia retrahentium, quandoque amborum simul, cum doloribus acutis, sæpe urentibus, per intervalla remittentibus. Rarius præcesserant dolores vagi dorsi, lumborum, quidem in extremis artubus hærebant, cæteris functionibus, ut pulsu, fame, vix mutatis: hæc periodus ad duas tresve septimanas extendebatur.

2. *Periodus*, decem diebus terminanda, notata erat stupore vel fremitu obscuro artus affecti, cum sensatione frigoris fere glacialis, qui sensus incipiebat a partibus primis contractis & desinebat in pedes vel manus; inde artuum gravitas, movendi impotentia, anæsthesia, sed restituito calore dolores reviviscebant, membra erant pallida, frigida, crassè rugosa, pars macilentæ, macies totum corpus dein afficiebat: pauperrimi, a primæ periodi symptomatis immunes, secundam tantum, sed tanto diutius, experiebantur.

3. *Periodus*. Pars affecta stupore & frigore livescerebat, mox nigricabat: quibusdam calor atrocior, quandoque cum sensu caloris urentis & forma erythematidis phlegmonidis, aliis cum sensu obscuro; quibus prima periodus desuerat, nigredo artuum nullo inflammationis signo præ-

ludebat; quibus vero præludebat erythema, phlyctænæ non raro assurgebant, sub quibus pars erat omnino sphacelosa, muscularis & ipso perfloso putrefactis: pulsus erat tunc debilis, prostratio virium magna, oculi languidi, facies marcida, rugosa, deformis & senilis. Necrosi quæ a digitis inceperat sensim ad earum vel tarsum accedebat, raro ultra cubitum aut genu reptans: denum gradum sistebat necrosi & tunc pulvis vigor paulatim resurgebat: linea suppurans mortuum a vivo determinabat, & sensim artus mortuus, siccus, eruore nigro, viscoso factus delabebatur, extremo osse arido & inflat carbonis nigro: artus necrosi affectus siccissimus, nigricans, odoris expers, mumiz artui similis erat.

Quibus vero calor inflammatorius præcesserat, febris etiam supererat, quæ moderata non noccebat, sed violenta funestum mali exitum accelerabat.

Hujus morbi seminum est mixta quoddam sanguinem coagulans, unde præmissis phlebotomiis ex quibus pulvis prius languidus resurgebat, diluentia, diluolventia aromaticis, spiritibus, anæstheticis juncta, intus sumpta, proderant; lapsus spontaneus artuum erat expectandus, aut nulla horum amputatio instituenda erat, nisi cum natura mortuum a vivo separasset.

6. *Necrosis Infantilis*.

Morbis est novus, seu nullibi descriptus, frequens tamen apud infantes quinquennos, potissimum in orphanotrophio; illis vel in gena, vel in vulva apud puellas, supervenit, sine febre, macula rubra vel livescens, sine dolore, tumore, calore, quæ acu pertusa non dolet, post paucos dies sponte læceratur a levissimo tactu, sine ulla sanguinis vel alterius humoris effusione: sensim vicinæ carnes, gingivæ v. gr. eroduntur, pulsu, fame, cæteris vix mutatis, & intra paucos dies fato cedunt, omnino absumtis, nigris, siccis, vel vulva eodem modo rufa.

Pluribus scorbuticis superveniebat ad genam ulcus exiguum, album, in ambitu durum, quod neglectum livefcebant, nigredine & fœtore accedent, unde tota gena perforata, erosa, dentes in conspectum se probebant; hujus ulceris indolentis, gangrænosus, siccus, progressus sistit spiritus vitrioli. Similes casus vidi plures, sed gena sine ulcere statim livefcebant, altero die perforata, sine dolore, inappetentia, febre debilitate, interiora oris patefaciebant, letho intra paucos dies subsequente: idem vidi apud virgunculas in vulva: *Penpart Hist. de l'Acad. R. des Sc. 1699. pag. 575.*

Huc etiam posset referri Necrosis a compressione, cujus exempla profert *Cl. Quisnay* ex *Hildano* & *Boerhaave* petita, forte & aliæ species; verum satius est hoc argumentum peritis Chirurgis elucidandum relinquere. Nobis fuisset in hoc genere aliisque bene multis novam viam tradendæ & illustrandæ Nosologie indicatæ; singulorum generum elaboratio non est opus unius hominis nec forte unius sæculi.

CLASSES MORBORUM

ÆTIOLOGICÆ.

Scientia principiorum, a quibus morbi dependent, est *aitiologia* nosologiz. Dispositio morborum secundum affinittatem principiorum & causarum a quibus dependent vocatur *methodus* morborum *aitiologica* juxta quam morbi qui a similibus principiis dependent, conjunguntur, & qui a diversis separantur; inde tunc classes exsurgunt quot diversa sunt principiorum genera: ea quidem numerosissima sunt, verum tamen maxima morborum pars ad viginti quinque genera principiorum, totidemque morborum classes commode reducitur. Horum principiorum alia sunt *physica* quoad agendi modum, ut venena, virus, miasmata, &c. . . alia ex *legibus mechanicis* agere videntur, ut tumores, calculi, vermes, conformationes vitiosæ, sanguis, pituita; serum, flatus; denum sunt principia *meralia* hypermechanica, quorum actio ex psychologia aliquatenus intelligitur, ut naturæ conatus, spasmi, dolores, pathemata animæ, &c.

Eatenus vero ea censentur principia morborum, quatenus ex illis intelligimus hos vel illos morbos esse possibiles: nulla alia est conexio inter principia & morbos; & quam sæpius erramus in iudicio, cum, ex eo quod illud præcesserit morbum, illud alterius esse principium inferimus; hoc scilicet sophisma, *post hoc ergo propter hoc*, in Medicina vulgarissimum est.

Accurta cognitio symptomatum, organorum quibus insident, legum physiologicarum juxta quas functiones, qualitates & excretionem per illa organa sunt, & denum dogmatum physico mechanicorum ex quibus vis & energia horum principiorum concipitur, potest mentem Medici dirigere in veritatis indagatione, & nos inducere ad cognoscendum num datus morbus huic vel alteri principio sit adscribendus: Attamen his auxiliis adjuti summi Medici quotidie errant, ut patet ex eorum in praxi dissidio; si hîdem quibusdam adhibeamus, omnes fere morbi a *saburra* dependent; juxta alios *plethora* est omnium fere principiorum; suat qui a vermibus eos deducunt; tunc qui a *salibus acido vel alkali*; non pauci a *spisso & acri* omnes chronicos derivant; a *spasmo & atonia* Baglivi; a *circulatione vitiosa* Deiderus; a *pituita* Schneiderus; a *sero* Carolus Piso; a *flatibus* Polybus morborum illiadem, ut olim ab humerum *quaterlone Galenus*, & a solo *visto solidorum* plures Neoterici deducere amant. Non minus tamen verum est eatenus felicem esse therapejam, quatenus Medicum origo morbi non scelerit, ut ait Celsus, adeoque causam & principium morbi curandi cognoscere apprimè utile est, imo necessarium; verum in hoc experientia fallax & judicium difficile.

Illustriss. Archiepiscopus Senæ triginta consultationes scriptas viderat a totidem peritissimis Medicis circa eundem morbum, quem spissitudini sanguinis tribuebant, & neuter verum attingebat: secto enim cadavere, facile consenterunt omnes omnia symptomata aneurysmati interno esse tribuenda. Similem errorem trium perceleberrimæ Italicæ Medicorum, circa morbum viri præclari quem simul invasebant, *Ill. Morgagni* enarrat; neuter verum morbi principium etiam conjectando præfenserat.

Si viri anatomix, physices & mechanices periti, hujus sæculi præclari inventis eruditi, singularum morbum accurate perpendentes eumque diuturnum attente considerantes, circa ejus principium a vero aberrant; quid expectandum erat ab Antiquis, qui omnes morbos ejusdem generis ab hoc vel illo principio pendere a cathedra docebant; & verbi gratia, omnem tertianam a bile, quartanam a melancholia, catarrhum a pituita, vomitum a saburra, nephralgiam a calculo repetendum esse? Quid censendum de illustribus etiam Neotericis qui omnem morbum chronicum ab spisso & acri humore pendere pronunciant & huic theoziz suam praxim adoptant? Ex sequentibus specierum enumerationibus evidenter patebit nullum esse morbi genus quod a diversis principiis non pendeat, seu cujus diversæ species a diversis principiis non sint repetendæ diversamque medendi methodum non exposculent? Sit vomitus in exemplo, licet ejus causa sit in omnibus speciebus eadem, scilicet conatus naturæ quæ, mediante vi stomachi expultrice, materies in eo contentas foras per os eliminat, nihilominus natura ad hanc stomachi contractionem excitatur, nunc a saburra cruda, qua semel eiecta morbus evanescit; vel a saburra putri, vel biliosa, vel viscosa; quibus rejectis remanent non raro fomites in sanguine, hepate, colo, stomacho, diversis auxiliis impugnandi; vel vomitus ille fovetur a veneno quod labe constanti afficit stomachum; vel ab ulcere, quod curandum superest; vel a phlogosi ventriculi, quæ, nedum emetica & cathartica indicet, ab illis exacerbatur; vel a vermibus qui specificis remediis tantum cedunt; vel a metastasi humoris excrementitii, ut urinx, puris, feri, cui humoris exitus nativus parandus est; vel a plethora vasorum ventriculi quæ vel menostasis vel vicini visceris obstructio, vel nimis ciborum euchymorum ingurgitatio sustinet; vel pendet a mechanica pressione quem stomacho insert cartilago xiphoidæ deprella, pancreas tumidum, jecur induratum, vel ipsa gastrocele; mitto loqui de vomitu sympathico quem ictus capiti inflicti ex-

citatur.

citæ, de vomitu marino quem succussio navis aut rhedæ determinat, de hysterico quem antipathia aut abditus etiam principium creat.

Quibus positis quid censendum de therapeia quam viri aliunde oculatissimi quotidie in scriptis suis proponunt, in qua duas vel tres tantum vomitus species curandas siliunt ratione totidem principiorum a quibus illas excitari putant, quasi omnis vomitus ab hac vel illa saburra penderet, & fere omnis vomitorii vel cathartici curandus foret: in quo quidem consentientes habent omnes fere veteres artis antilites, qui errore mortalibus pernicioso cum ipsis laborant: quid enim est perniciosius quam emetica indiscriminatim adhibere in vomitu quovis, ut nephralgico, ulceroso, phlogistico, hysterico, gastrico, marino, &c. in quibus ea certe veneni instar agere omnibus cordatis viris haud dubium videbatur: doctrina itaque causarum & principiorum, si fallax sit, funestissima est, eoque magis perniciofa quo ad plures morbi species extenditur: si enim quis in praxi ignoret verum principium unius vomitus, & in nephralgico emeticum prescribat, ille unum tantummodo ægroque in vitæ discrimen adducet: alii si omnem vomitum a saburra pendere docuerit, is tot ægros vomentes in idem periculum conjiciet, quot sunt diversi vomitus in quibus summam perniciem necessario inferunt: aut in quibus diversissima & ad curam necessaria juxta hanc ætiologiam omittentur, ut phlebotomia, limonata, salia neutra, opiatica, balnea, quies, antihelminthica, chirurgica operatio, &c.

Verum dati morbi principium cognoscere est certe in praxi omnino utile, imo necessarium: illud itaque est indagandum: sed tanto periculosius est illud ignorare, in eo inveniendo errare, falsis dogmatis circumventum esse: falsum autem est illud dogma quod ab obscuris ad clara, a minus cognitis ad magis certa sit procedendum: principia morbi sunt minus clara, minus evidenter quam morbus ipse seu quam symptomatum illum constituentium concursus, ergo methodus ætiologica, quæ a principii & causis abditis nos deducere debet ad morbi cognitionem, fallax est & erronea, multoque tutior est via quæ initium dedit a symptomatis sensuum ope compertis, ex quum cognitione deinceps, tanquam firma basi, assurgere possimus ad ejus morbi individui oblatum principium. Evolvite omnes litros scholasticos de vomitu, nullibi fere invenietis signa vel symptomata vomitus gastrocelici, hysterici, gastrici, &c. designantia, quorum tamen fidelis & sagax descriptio & diagnosi ad ad eos dignoscendos ita utilis est, ut ex hac fere sola quænam sint indicationes curativæ luceat: mince tumor a partu crescens inter abdominis musculos, isque circumscriptus, quem ex signis cognoscimus esse a Monacho prolapsus vel herniosus, nonne vel medicinx tyro vomitum inde oriundum esse judicabit & artificiosa repo-

sitione curandum concludet; sed si nullus Auctor in scriptis eum de hujus speciei vel existentia vel signis monuerit, is hunc morbum, sensibus, ut ut obviu, non agnoscat, summo ægrotantis detrimento: & tanto magis ab eo cognoscendo alienus erit, quo majorem adhibuerit fidem suis Magistris docentibus omnem vomitum a saburra pendere, & vomitum in genere vomitorii esse impugnandum.

Has classes morborum ætiologicas ideo sistimus, ut cuicque pateat nullum esse morbi genus cujus species ad diversa principia non attingat, adeoque ut deleatur illa præjudicata opinio, omne genus morbi uni vel alteri tantum principio tribuendum esse; ex his etiam classibus apparebit ab eodem principio diversos morbos exoriri, pro ut diversas corporis partes illud afficiat, majori vel minori doli, tempore, agit, aut diversa est recipientis dispositio; ita ut ex cognito principio vix possibile sit morbum inde eventurum præfigere: difficultas autem eo major est quo major numerus est circumstantiarum in eodem modo concurrentium, unde ancipites hærimus utri ex his tribuendus sit morbus. Si quis vomitu dixeret, dubium est an voracitati prægressæ, an vitiisæ assumptorum qualitatæ, an prææ digestionis, an cephalalgicæ comitantæ, an bili per vomitionem rejectæ, an sanguinis copix ventriculæ gravanti, &c. hic effectus tribuendus sit: quid vero nos ab his ambagibus ericabit? fida & sagax historia symptomatum cuicque speciei convenientium; licet enim quævis species a principio ejus denominetur, ut vomitus gastrocelicus, marinus, &c. non ideo necessum est absolute ut cognoscamus quomodo hocce principium agat in ejus morbi productione, modo ex signis & historia quid in eo casu agendum sit fugiamus sciamus: perinde est, v. gr. utrum sciam aut ignorem quomodo stomachi phlogosis inducit vomitum, licet hoc scire utilissimum sit, modo sciam quod dum adest epigastrii sensibilitas exquisita, dolor & calor, sitis, pulsus frequens & durus, sanguis extractus coriacea crusta tectus, &c. in hoc morbo repetitam phlebotomiam, aquam puli & diartam tenuissimam ægro sanando sufficere; emetica vero & cathartica acia perniciofa esse: aut licet mera principii cognitio historica sæpe sufficiat ad curandum morbum, etiam si ignorem connexionem hujus cum symptomatibus, nihilominus hujus principii cognitio philosophica est multo ad praxim utilior quam historica: utinam æque certa foret!

Nullam speciem morbi accensere volui, nisi quam aliqua constans observatio confirmavit, & ideo cum suo epitheto insignatam volui, tanquam testimonium veritatis, v. g. dum vomitum urinosum voco, his verbis intelligo eos vomitus, quorum descriptiones & historias tradit Hallerus, aut referunt Auctores ab illo citati in *Physiologia majoris* Tom. II. pagin. 371. qui sunt vomitus nephralgici, ischuriosi, &c. Utrum reapse urina, in nephritide iturica retenta,

in sanguinem refluat, inde in stomacho fecenatur, nihil ad me; modo sciam fide historię in eo casu vomitum, non emeticis, nec catharticis, sed remediis adversus nephralgiam aut ischuriam indicatis debellandum esse; ideo Anthores precipuos citatos volui, ne tyrones, Professorum dogmatibus, ut pete compendiosis, fessiliter adhaereant, & ut rem penitus in Authoribus examinare ac omnes circumstantias indagare queant, ne in verba Magistri jurent, nec in originibus historiarum inquirendis hęreant, ne demum morbos possibiles tantum pro realibus sibi oblatos putent, quod in scholis frequentius evenit apud Aitiologicos, quibus sufficit ut morbus sit possibilis, ad hoc ut cum inter morbos annumerent.

Nomina trivialia morborum, qualia hic si simus, id tantum usus habent, quod ob brevitatem sint recentia facilia & comoda, minime vero sola quid significant, adeoque semper inquirendus est significatus quem ipsi definitione addita tribuimus, quod de nominibus Classum etiam intelligendum.

Curare est satagere ut status morbosus in meliorem, & si fieri possit, in sanum mutetur; *curatio* alia est *palliativa*, quę tantummodo morbi causam tollit; *radicalis*, quę simul & causam & principium ejus proximum ac proegnum auferit.

Certum est ex Pathologia causam veram & effectricem maximę partis morborum esse eorum quo principium morbi vel corrigere vel tollere amandare natura contendit; sic vomitionis causa est ille conatus naturę qui stomachi contractione antiperistaltica, concurrente pylori actione & muscularum epigastricorum, ac diaphragmatis simultanea contractione, absolviunt; hanc causam tollit qui vires contractivas sufflaminat aut sensum stomachi obtundit; sed hæc curatio palliativa est & ut plurimum insida vel inania, aut tantum momentanea: sic prophylactice in cholera a veneno narcoticis vomitionem suspendimus.

Principium morbi proximum est illud ex quo intelligimus naturam immediate ad hunc producendum determinari; sic venenarum deglutitum est principium vomitus vel cholera, quatenus intelligimus ex ejus actione in stomachum naturę sanitatis tueriem ad illius expulsionem insurgere, & hunc finem organa huic scopo destinata in motum agere. *Curatio radicalis* est itaque illa quę principium morbi proximum materiale removere aut corrigere nititur.

Curatio quatuor auxiliis absolviunt, scilicet *diæticis*, *gymnasticis chirurgicis* & *pharmaceuticis*, quę auxilia partim a natura partim ab arte adhibentur: unde sequitur duplicem esse curationem, *naturalem* scilicet & *artificialem*, quarum mutua conspiratio medela vel levamen obtinetur.

Auxilia diætica sunt exculenta & potulenta morbo curando convenientia; ea in morbis biliosis fervore, siccis stipatis, ut in tritophya;

causo, præscribuntur, quę refrigerant, diluunt, bilem enervant, ut aqua frigida, limonata, cremores avenacei, hordeacei, fructus acidi, blandi, & natura cum arte in his suadendis blandit; inde averlatio carniarum, aerium, calidorum, exsiccantium, & sitis seu appetitus frigidorum, diluentium.

Auxilia gymnastica sunt quies vel motus mentis & corporis in ambiente congruo; in morbis febre acuta stipatis, pyreticis, debilitas & lassitudo artuum exigunt decubium horizontalem quo vires superflues servantur, quarum maxima pars cordi movendo & principio morbifico corrigendo ac expellendo necessaria est; decubendum autem est in eundem finem molliter in lectulo, & ambiens aut debet esse ita temperatus, ut nec calore nec frigore noceat, nec quietem animę necessariam turbet.

Auxilia chirurgica sunt mechanica: 1. noxtorum exclusio; sic natura forum mortuum, fæces, excrementa noxia foras amandat, calculos suis visibus & vesica, pus ex abscessibus, saburram & primis viis ejicit: 2. sanguinem superfluum ruptis per impetum vasis emittit in hæmorrhagia, artus necrosi corruptos a toto separat: 3. soluta consolidat, ulcera detergit, quod in brutis quotidie observamus, ita ut nature imitatrix sit ars chirurgica.

Auxilia demum pharmaceutica sunt medicamina quorum molecule dissolutę valent ratione coactionis, cum nostris solidis fluidisve illis salubres mutationes inferre, si tempestive applicentur; medicamina vero vel simpliciter corrigunt vires nostrę corporis & *alterantia* dicuntur; vel alterant simul & ad evacuationes sollicitant naturam, & *evacuantia* sunt: natura autem, maxime apud bruta medicamina convenientia querit, ut de canibus & bobus notum est; ars vero Medici multo tutius & multo plurima rationis inventu cognoscit.

Ille omnia auxilia extenuis salubria sunt, quatenus statum novum in corpore, priori morbofo contrarium, conciliant; ergo ut recte applicentur a Medico dogmatico, necellum est ut status morbosus individuus cognoscatur; & vix medicata auxilio huic contraria sit compertas, secus fortuito vel empirice adhibentur.

Sunt morbi quorum principia proxima obscurissime cognoscuntur a Medicis, ut delecterii scilicet, venenati, virulenti, miasmatici, exanthematici & febriculi; sed Divina Providentia nobis non pauca medicamina concessit adversas ipsos, singularem virtutem prædica, his specificis contraria quęquo *antidota* vocantur, ut in febriculis kinkina, in syphiliticis hydragryrum, quorum agendi modus est obscurissimus.

Quorundam morborum principia proxima, sub sensu cadunt, & minus ignota est eorum agendi modus; tales sunt morbi humores, ut gangrenę, pituitosi, serosi, quorum principia fere ex legibus hydraulicis agere videntur.

alio-

aliorum vero morborum, quales sunt acrimoniosis, purulenti phlogistici, principia ex legibus physices & chemice intelliguntur: dantur etiam morbi, ut organici, traumatici, empraictici, calculosi, verminosi, quorum principia viribus mechanicis agunt in nos, eorumque auxilia ut plurimum sunt mechanica, scilicet chirurgica; alii obiecturissimi sunt principia morbosum spasmodicorum, atonorum & moralium, unde difficillime curantur, eorumque auxilia partim empirica sunt, partim philosophica seu moralia, ut in hysteria, hypochondriaci, melancholia, mania &c.

Præter remedia antidota quibusdam principii morborum specificè debellantur convenientia, ut hydragryum in scabie, syphilide, hydrophobia; Kinkina in febribus intermittentibus; moschum, camphoram, castoreum in hysterici & spasmodicis, dantur alia quæ certis corporis humani partibus specialiter prodesse putantur, quæ proinde a veteribus ophthalmica, otica, cephalica, cardiaca, thoracica, hepatica, &c. vocantur; unde non immerito juxta hanc opinionem morbi juxta methodum anatomieam disponebantur, ut cognita sede facilius detegerentur medicamina specifica, verum licet cephalica, aromatica, nervina, spirituosæ, ob specificam levitatem, quæ affinitatem habent cum nervorum fluido & cerebri substantia, in cerebrum & nervos præ aliis partibus agant, ut cantharides in utinarias, & bechica in humorem bronchiale & pulmones, non indefequitur quod, cognita sede morbi, inde cognoscatur medicaminis hujus convenienti genus; quippe eandem sedem occupant morbi a principii diversissimis oriundis, ut parvæ ex hisce classibus: sic caput est sedes morborum a veneno, viru, miasmate, sanguine, sero, pituita, obstructione, vulnere, &c. pendunt; nullum est itaque medicamentum & auxilii genus quod in morbis eandem corporis sedem occupantibus non indicetur; & ut cephalica in serosis & pituitosis capitibus morbis conveniunt, ita in phlogisticis, biliosis, purulentis ejus morbis nocent. Cum causa plurimorum morborum sit naturæ conatus, & natura, nunc segnius quam pars est, nunc vividius, adversus materies morbosas insurgat, potissima auxilia, quæ omnium fere morborum causam attingunt, sunt, vel *sedantia*, ut anodyna, narcotica, quæ irritatæ nimium & vividioris naturæ conatus moderantur, tum sensum obdunt, tum vires motrices compescendo; & *stimulantia*, quæ sensum excitando & fibras nervas irritando, in motum agendo, valent naturæ conatus torpidos erigere, languentes stimulare, ipsisque veluti calcar addere; vis illa stimulis communis est omnibus alterantibus calidis, ut cephalicis, cardiacis, stomachicis, sinapismis, &c. nec non omnibus fere evacuantibus, ut emeticis, catharticis, emmenagogis; eo tamen discrimine quod æterantia sæpius roborant, evacuantia vero stimulo excitent, evacuando naturam debiliant, nisi

copia adaucta peccent humores, quos foras amandæ natura his remediis irritata.

In omnibus morbis curandis maxima habenda est facultatis motricis, ejusque virium ratio, quippe cum nulla mutatio fiat in corpore nisi per motum, adeoque per vires motrices, quarum principium est natura vel libertas, nulla curatio, quæ mutatio est, absolvi potest, nisi per vires naturæ, adeoque illarum conservatio Medico invigilare debet. Naturæ vires servantur, si perditæ reficiantur, quod præstant alimenta; & si præsentibus non fructa absumantur, quod quies mentis & corporis, præcipueque somnus exequitur: auxilia itaque dietetica & gymnastica viribus naturæ servandis potissimum intersunt, & in omnibus morbis maxime sunt adhibenda, verum ea sigillatim in quavis classe morborum ætiologica enumerare non sinunt quos nobis proposuimus limites.

Sufficit annotare nullum fere esse auxilii genus, quod in quacunque morborum classe, imo genere, ad eundem curatorum scopum non possit conspirare. Sic ad stimulandum & vires excitandas conerunt, non solum medicamina cardiaca, cephalica, tonica, non solum frictions, sicæ calidæ, quæ chirurgica sunt auxilia; sed etiam motus muscularis, vigilia, pathema vividum, quæ sunt auxilia gymnastica; sed etiam potulenta fermentata, ut vinum, caffè, coccolata & effulenta aromatis condita, quæ ad digestam attinent: idemque dictum esto de diversis auxiliis sedantibus, seu oppositis effectus producentibus.

SYNOPSIS CLASSIUM.

Æ T I O L O G I C A R U M.

1. **Morbi venenati** sunt illi qui a veneno animali, fossili, vel vegetabili excitantur: Venena vero sunt corpora sensibilia quæ parva dosi per principia physica agendo periculosas mutationes valent inferre, ut arsenicum, sublimatum corrosivum &c.

2. **Morbi virulenti** differunt a venenatis in eo quod materies morbosæ non extrinsecus accellerit, ut in venenatis; sed in corpore ipso genita sit, aut ab alio animali morbo communicata, ut virus syphiliticum, hydrophobicum, &c.

3. **Morbi exanthematici** sunt illi qui a materie exanthematica erumpente, resecta, vel repulsa soventur; ab ex extus, & *anthema* floriscencia, quasi *efflorescentia*: tale est virus variolæ, rubellæ, scabiei, herperis, &c. & in hoc quod morbus primarius pustulas vel maculas cutaneas emittat, differunt a virulentis.

4. **Morbi metastatici** sunt illi qui producuntur a materie morbosæ quæ e parte translata fuit aut repulsa, cum in parte primario affecta ulcus, fontanellam, phyma aut simile tantum vitium; non vero morbum proprie dictum, intulisset; & in

& in hoc differunt metastatici ab exanthematicis.

5. *Morbi febriles* sunt illi qui a materie febrili, vel remittentium, vel intermittentium, producuntur, sub quo sensu febres ipsamet recenseri debent, nec non morbi etiam pyrexia destituti, qui ab eadem materie foveantur.

6. *Morbi miasmatici*, sunt illi quorum materies morbifica est miasmata seu vapor molecularis deleterius inconspicuus onustus, vel per aera delatus, vel e mephitis, elocis, paludibus exhalans, ut omnes fere epidemici & quidam sporadici.

Hactenus actum de morbis quorum principium est quidpiam subtile & tenuissimum, modo penitus occulto & deleterio morbos pestiferos excitans; jam sequuntur morbi *humorales* dicti, quorum principium est humor quidam quantitate sapiens peccans, ut sanguis, bilis, serum, pituita, lac, status; vel humor vitiosus qualitate potissimum noxius, ut acrimonia, pus, saburra.

7. *Morbi phlogistici* sunt illi quorum calor internus vel externus est comes aut principium, ut plurimum cum pyrexia acuta, siti ut triphlephya ardens, phrenitis pura, nephritis.

8. *Morbi sanguinei*, qui a phlethora tum verum commota producuntur, ut hæmoptysis plethorica, &c.

9. *Morbi biliosi* qui a bilis quantitate, diffusione & acrimonia foveantur, ut tertiana biliosa, cholera spontanea, &c.

10. *Morbi saburrales* qui a fœcie vitiosis, intra primas vias latitantibus, acidis, alkalescentibus, neutris excitantur, ut vomitus a saburra, synochus, typhus, &c.

11. *Morbi pituitosi* qui ab humore vel sanguine viscido, spisso, tenaci, mucoso, producuntur: qui a sanguine spisso & feco inferuntur, sæpius *melancholici* vocantur, si simul morales sint.

12. *Morbi catharrales* quos perspirationis suppressio & frigus determinat, ut rheuma, coryza.

13. *Morbi lactei* quos lactis suppressio & in massa sanguinis redundantia producit, ut ephemera lactea.

14. *Morbi serosi* qui a sero seu parte sanguinis aquosa exundante dependent, ut hydrothorax, anasarca.

15. *Morbi flatulenti* ab aere elastico intus contento producti, ut colica, flatulentia, tympanitis.

16. *Morbi purulenti* a pure, ulcere, carie dependentes, ut phthisis, tabes.

17. *Morbi acrimoniosi* acrimoniae cuidam massæ sanguinis tribuendi citra ullam virulentiam, ut polydipsia, vel cum virulentia hereditaria, ut phlebitis, arthritidis.

Præter morbos humores sunt alii quorum principia sunt mechanica, sed solida, non fluida, ut calculi, vermes, tumores, herniæ, corpora vulnerantia, &c.

18. *Morbi organici* a prava & conspicua organorum positura, figura dependentes, ut ab her-

nia, luxatione, ut ileus ab enterocele, caligo a blepharoptosi.

19. *Morbi traumatici* differunt ab organicis quod perdelnt ab unitatis quadam solutione, ut vulnera, fractura, ictus, contusio, commotio ut carus a fractura cranii.

20. *Morbi emphratici* sunt illi quos emphraxia seu obstructio chronica, aut non inflammatoria vasorum, canalium, sovet, ut ileus a calculo, paraphonia a polypo.

21. *Morbi verminosi* quorum principia sunt infesta, vermes, &c. ut convulsio, vomitus a vermicibus.

22. *Morbi calculei* qui a concretionibus dure excitantur, ut nephralgia calculosa, hepatalgia calculosa.

Denique dantur principia morborum ut plurimum non materialia, licet a materialibus ipsamet excirentur, ut spasmi seu contractiones musculorum & membranarum, atonia seu earum laxitas, debilitas; & animæ cupiditates aut aversiones effrenas, seu pathemata.

23. *Morbi spasmodici* qui pendunt a convulsione hysterica aut hypochondriaca musculorum, ob nimiam nervorum sensibilitatem, dolorem, erethismum, ut hysteria, epilepsia a pathemate.

24. *Morbi atoni* a laxitate nervorum, fibrarum, vasorum & musculorum debilitate, inanitione, inedia, &c. ut exania.

25. *Morbi morales* ab errore, aversione, antipathia, appetitu & variis pathematibus oriundi.

Limites harum classium determinare non facile est, quippe pro sua quique theoria, quem uni classi ascribo eam maxima Neoteriorum parte, alter pari iure possit ad alteram classem amandare; adde quod maxima morborum pars a principiis combinatis dependat, ut febris intermittens in rigore ab spasmo, in calore a phlogosi & obstructione, non raro a bile, in declinatione vero ab atonia; sed si principium vere morbosum & eharacteristicum velimus assignare, certum est illud esse materiem morbosam sui generis, quæ specificis quibusdam, ut venena ab antidotis, scilicet febrisugis debellatur.

Si quæ vero elarius horumque morborum convenientiam ratione principii ipsos foveant, & therapie ipsi congruentis velint introspicere, & cuiuslibet historiam in nosologia attento examini subiciat, & diversas species ejusdem classis invicem conferat, & eam principiorum analogiam percipiat. Sic, licet apoplexia sit morbus apyreticus summa immobilitate fixatus, & synochus sanguineus sit morbus febrilis nullo sopore insignitus, evidens est quod, eum uterque pendeat a plethora, utrique conveniunt remedia molem sanguinis detrahentia & diæta tenuis: sic in eardialgia & in convulsione quæ a vermicibus primarum viarum, vel a materie verminosa dependent, adsunt plura symptomata communia, licet non essentialia, utrique generi, & cathartica, emetica, ac anthelmintica utrobique indicantur.

CLASSIS PRIMA.

MORBI VENENATI;

Maladies venimeuses.

Venena sunt fossilia, vegetabilia vel animalia. Fossilia sunt vel nativa, scilicet cobaltum, vel arte facta, ut arsenicum album, flavum & rubrum, quorum cobaltum est minera; præparata antimonialia, emetica potissimum, vinum antimonii, hepar antimonii; sulphur auratum, crocus metallorum, pulvis agaroth, &c.; præparata mercurialia, ut sublimatus corrosivus, præcipitatum viride, turtupethum minerale, &c.

Venefici ut plurimum arsenico albo seu crystallino, aut sublimato corrosivo utuntur; cætera ab Empyricis imperitis in bonum finem præscripta non minus truculenta sunt.

Venena autem eatenus dicuntur, quia sub minima mole, si malitiose aut inopportune & nimia dosi usurpentur, strages in corpore excitant: licet minima dosi, & sapienter ac caute correctæ in certis morbis & individuis sint eximia & energetica remedia, ne excepto quidem sublimato corrosivo omnium potentissimo. Venena *vitriolica*, ut vitriolum cupreum, martiale, lapis lazuli, ærugo vix unquam usurpantur, nisi adhibeantur vasa cuprea vere æruginosa; frequentius vero usurpantur venena lenta quidem sed perniciosissima, quæ *sæturnia* sunt præparata, scilicet cærulea, saccharum saturni, lithargyrium, vasa culinaria plumbo obducta & acido corrosa, quæ venena sunt adstringentia & rachialgiam producentia, quibus etiam *calx marmoris viva* corrodens addi potest.

Cobaltum & omnia arsenica sunt corrosiva & septica, quæ intus sumpta cholera, rachialgiam, citantque mortem creant; ast horum levis decoctio venenum est lentum, quod non nisi post menses & annos hæticam, tabem, dysenterias lethales producit; quod autem determinato tempore venenum possit mortem inferre vix ullus peritus crediderit.

Arsenicum album crystalli instar nitidum, metalli instar ponderosum, & miscela sulphuris colorem flavum & rubrum induit, in aqua parum solvitur, inflammabile est & ejus fumus odorem allii spargit: sapor minime injucundus est, saltem initio: vis ejus regulo cobakti unito cum sale speciali arsenicali tribuenda est. Nulla est minera metalli aut femimetalli quæ arsenicali materia destituatur, si fides *Junkers*, unde intelligitur cur mineræ fossiores, metallorum fusores, rachialgie, paresi, convulsioni sint obnoxii.

Sublimatus corrosivus est sal resultans ex unionem chemica acidi marini cum hydrargyro: hydrargyrus purus omnino blandus est & veneni expertus, quidquid crediderint veteres; ast acidum salis, nitri & vitrosi sunt venena urentia, corrosiva, & a metallis quibus ununtur quandoque vires majores acquirunt: sublimatus extus escharas, intus ardorem, rachialgiam, cholera, ileum, dysenteriam, convulsionem, mortem eo citius excitat quo majori dosi & debiliori homini exhibetur: unum granum intus sine periculo vite sumi non potest, nisi stomachus pinguedine fusa, lacte, oleo, fortius illud recipiens cito vomitione rejiciat, ut sycophantæ facere solent, qui sua antidota majori pretio stolidæ plebi vendunt. An spiritu vini vel addito vel desuper accenso sublimatus corrosivus aliaque fossilia venena mitigentur, magis quam aqua pura, dubium faciunt experimenta *Bona Itali*, qui sublimatum corrosivum aqua pura dissolutum præbet ad sextam grani partem pro cochleari aquæ adversus morbos venereos more *ill. van Swieten*.

Venena mercurialia & antimonialia intus sumpta nauseam, rachialgiam, vomitum, diarrhoeam, cholera, meteorismum, dysenteriam, &c., excitant: cuprea & vitriolica similes, sed debiliores effectus edunt sub pari dosi.

Metallici morbi dicuntur, qui a venenis metallicis dependent, ut ab hydrargyro, plumbo, cupro, cinnabari; talis est rachialgia & omnes morbi rachialgici quibus metallurgi, pictores, minere fossiores, plumbarii, speculorum confectores, &c., sunt obnoxii.

Ab arsenicalibus & præparatis emeticis antimonii, mercurii,

Cardialgia 2,
Cardialgia 8,
Ilcus 14,

Tabes 18,
Cholera 4,
Cynanche 11.

A cupreis, æruginosis, vitriolicis eadem, & præterea
Hepatalgia 5.

A plumbo, hydrargyro, saccharo Saturni, mineris metallicis,

Rachialgia 3,
Tremor 5,
Paralysis 2, & 2,
Pellissimus 7,
Hemiplegia 17,
Paraplexia 5,

Asphyxia 2,
Rheumatismus 10,
Cephalalgia 13,
Asthma 12,
Peripneumonia 12,
Ophthalmia 12.

Venena vegetabilia sunt acria, corrosiva, inflammantia, ut boleti, agarici quidam, ranunculi fere omnes, maxime sceleratus dictus, a-

nemones, euphorbiae omnes, colocynthis, ananthe cicuta Linnæi, mananilla, chærophyllum hirsutum; ex horum usu interno sunt.

Cardialgia
Gastrodynia 4,
Gastritis 3,
Vomitus 8,
Cholera 2, a, b,
Rachialgia 1,
Rheumatismus a sabina,
Dysphagia,
Meteorismus 4,
Convulsio 7, 8,

Tremor 4,
Trismus 18,
Eclampsia 12, 13, 14,
Singultus 3, 6, 7,
Typhus 9,
Amphimerina 11,
Erysipelas 3, 7,
Abortus a sabina,
Abortus ab adharoda.

Alia vero sunt dementantia, tumultuosa, inebriantia, & majori dosi narcotica, ut opium, datura methel, datura stramonium, atropa bellad-

no, hyoscyamus albus, niger, physalis narcotica, narcissus, crocus, lolium, conium Linnæi, solanum hortense, carbonum fumus, plumbaginis vapor.

Paraphrosyne 1, 2, 3, 4, 5.
Vertigo 6,
Amnesia 7,
Lethargus 3,
Aphyxia, 2,

Diplopia 10,
Amentia 3,
Carus 10, 14,
Paraplexia 5,
Dysphagia 11.

Ultima vires habent omnino singulares; nam a semine raphanistrum in pane convulsio raphania, boulimia; ab ustilagine, fecali cornuto necrosis, stupor; a gramine ossifrago asthenia; a

boletis venenatis aurigo; a coffea tremor, a rannunculo scelerato trismus Sardonicus; ab odore santalorum amphimerina mimosa, a manihot ty-

Bulimia 6,
Hæmaturia 3,
Aurigo 4,
Necrosis 1,
Asthenia 9,
Stupor 4,

Singultus 7,
Trismus 18,
Convulsio 7, 8,
Phœnigmus 3, 4,
Amphimerina 17,
Typhus 9.

Venena animalia sunt multo rariora quam creditur vulgo; ab hoc siquidem censu excludendi plures pisces, nec torpedinem, nec gymnotum tremulum his accenseas; nullum est venenum trachyni, scorpenæ, raizæ, quorum aculei puncturas mechanicas sine ullius liquoris instillatione curant; venenata sunt ova lucii & barbi, chole-ram enim inducunt; squali cataphi hepar, myxuli in nescio quibus circumstantiis, erysipelas inducunt; tethys leporina denum & medusa quidpiam venenati habent. Aves omnes veneni expertes sunt; quadrupedia nulla venenum habent nativum, sed omnia aculeis hydrophobis sunt obnoxia, imo a vehementi ira morsus sciuri, felis hominis, venenatus evasit.

dunt; huc quidam araneæ & scorpius referunt, de quorum vi venenata dubitant plurimi; imo Neoterici a veneno tarenulæ ipsam absolvunt; tethys leporina & medusa, non piscibus, sed zoophyitis debent ascribi. Cantharides & scarabæus Maialis venenata sunt insecta, eaque vesicatoria; his adde formicas Journal de Medec. Seprembris 1766.

Insecta autem plurima vires fere venenatas habent, scilicet apes, vespeæ, culices, quorum aculei fistulosi liquorem acrem in vulnus infun-

Superfunt denum amphibia, inter quæ bufo, salamandra, & lacerta veneno carent, quidquid dicant sycophantæ; carent etiam apud nos omnes colubri, sola vipera excepta; at apud Americanos & Africanos sunt amphibia venenatissima, ut crotali omnes; chersea & aspis in Gallia Septentrionali & Suecia observantur; vipera autem nostra est coluber verus Linnæi, quo nomine a vipera Ægyptiaca discrepat.

Tarantismus 1,
Hydrophobia 1,
Peripneumonia 10,
Phrenitis 8, 14,
Cholera 5,
Vomitus 5,
Asthma 4,
Cardialgia 10,
Melæstæterus 2,
Phœnigmus 4,
Aurigo 4,

Hæmaturia a cantharidibus,
Priapismus 1,
Cystitis 1,
Arthritis 14,
Erysipelas 10,
Syncope 10,
Gangræna 4,
Pneumatosis 1,
Stomacacæ 3,
Pruritus 2.

Curatio morborum a veneno oriundorum, alia est rationalis, alia est empirica; rationalis

sola valet, ubi nulla sint cognita antidota; empirica in subsidium accedit, cum ea cognita sunt.

CLASSIS SECUNDA.

MORBI VIRULENTI;

Maladies virulentes.

Virus est humor venenatus in homine ipso generatus, qui simili labe valet alios eo inquinare per contactum. Morbi virulenti sunt itaque contagiosi; sed quoniam eorum virulentia non inficit aërem, illi Epidemici non evadunt, ut qui per miasmata communicantur, ut pandemii fiant sic in obditione Neapolitana syphilis, in navibus scorbutus pandemice diffunduntur ab ægris in sanos.

Princeps virulentorum morborum est syphilis, quæ concubiu propagatur; scabies, lepra, elephantiasis, perpes simili modo se in sanos immediato contactu diffundunt. Farcimen, scrophula, rachitis, phthisis, arthritis &c., quidem contagio ab uno ad alium hominem non transeunt; verum non solum in eodem ægro a parte ad partem, sed etiam a parentibus ad prolem transeunt, & hereditarii sunt; imo scrophula & rachitis ex viru syphilitico de genere proficere quandoque censentur. Quoad virus scorbuticum, licet illud minime contagione propagetur, non minus more syphilitici & scabiosi diversa genera morborum a scorbutico disferuntur excitat, ita ut, nisi Medicus prius noverit hos morbos ab illo qui scorbutum contagiosum esse putant, & eadem cautela in nosocomiis scorbuti ab aliis ægris reponatur scorbutici, ac syphilitici, & scabiosi.

Virus syphiliticum, prout recens est aut inveteratum, diversis corporis humani partibus fluidis solidisque adhæret, & sic diversos morbos inducit; recens quidem, coitu susceptum, senilibus humoribus affine est, & syphilidem excitat, id est, ulcuscula, thagades, eristas, verrucas, porros, ficos, thymos, gonorrhæam, bubones, phimoses producit, quorum symptomatum concursus vera est syphilis; inveteratum vero jam exulcerationes oris, veli palati, amygdalarum, narium, polypos, caries vomeris, paraphoniam, otiscopum, rheumatismum, pustulas eucanas, crustas, leprosas, lepram, elephantiasim, cophosim, cephalum, dysenteriam, tertianam, quartanam, ophthalmiam, aliasque diversorum generum species excitat, quarum ignota origine curatio impossibilis est. Materia morbifica virulentorum, exanthematicorum, febricorum, miasmaticorum, producit morbos duplicis ordinis, scilicet regulares seu conspicuos, ut virus variolosa; arthriticum dolores articulorum; syphilis vitia genitalium, &c. vel delitescentes anomalos, ut cum virus arthriticum caput pectusve afficit, scabies interiora occupat. Morbos cum regulares tum delitescentes simul enumerabimus.

sunt. Sumptis quibuscvis venenis, vel natura ea per vomitionem aut secessum foras amandare conatur; vel ebruta, & somno vel de irio detenta quiescit: cum natura ejus eliminationem molitur quanto citius ea juvanda est, vel per emetica vulgaria, ut tartarum, vinum stibiatum, si nulla sit venericuli aut intestinorum inflammatio, quæ inde exacerbaretur, secus vero vel emeticum lenè, ut semen raphani, vel aquam tepidam, oleum, assatum bibere sufficit: idem dictum esto de catharticis. Evacuato pro viribus veneno residuum promptissime est corrigendum, idque diversis auxiliis pro veneni diversitate; scilicet oleosis, pinguibus, lacteis, si venenum sit acre, corrosivum, cathartico-emeticum; acidis vero, ut aceto, oxygerato, aliisque specificis, si sit narcoticum; usu camphoræ si cantharides assumptæ, radicis senekæ si morbus herexet aut viperæ medendus, & sic de aliis. Si venenum jam e primis visceribus in massam sanguineam irrepserit, eardiam ad vires rescocillandas, sudorifica, alexipharmaca ad sudorem promovendum, narcotica in eundem finem & ad dolores ac spasmos componendos, internixtis semper, si adhiit, specificis.

Si vero venenum vulneri, puncturæ infusum fuerit, illud sucia, si tuto adhiberi possit, secus cucurbitulis scarificatis, foras illico est educendum; secus igne, causticis, specificis ætus applicatis corrigendum; dein quod in massam sanguineam manavit debita methodo corrigendum & eliminandum; ut in hydrophobia per litus mercuriales, mosehum, alkalinum volatile; in morfu viperæ per alkalinum volatile ad sudorem movendum, succum plantarum cruciformium; in tantissimo per chorcan quæ sudorem excitet; in morfu crocæli, eurfæ per radicem senekæ, in morfu colubri, ræpe per ophiorizam.

Pro curatione ejusque speciei consulenda est nosologia in quolibet morbo superius citato; sic ad curam rachialgiæ methodicam, quæ rachialgiæ Saturninam, & ibi datur duplex methodus, drastica scilicet & lenitiva, quæ ad omnes morbos metallicos a plumbo feliciter adhibetur. Ad curationem morborum quos viperæ morsus excitat, lege quæ scriptæ sunt de punctura viperæ, de anxietate, aurigine, gangræna, syncope ab hoc veneno oriundis, curam hydrophobiæ videbis in classe vesaniarum de hydrophobia, nec enim ea hic repetere permittit brevitatis cui consilere animus est; qui plura voluerit legat. *Dissertationem nostram de hydrophobia præmis Academia Tolosana decoravit; Dissertationem de venenatis Galia animalibus in Academia Rhodomagensi similis honore remuneravit, & quod præstat eximia Mead, Brogiati de Venenis opera, Boerhaavi Therapeuticæ, Frideri Hoffmanni Pathologiam de Venenis &c.*

A viru syphilitico producuntur.

Morbi syphilitici

Syphilis
Terciana,
Quartana,
Aphtha,
Trismus,
Tetanus,
Priapismus,
Asthma,
Angina,
Caligo,
Pleurodyne,
Arthritis,
Ischias,
Dysæcæa,
Gonorrhœa,
Pneumonia,

Asthenia,
Coryza,
Ptyalismus,
Gonorrhœa,
Amanroſis,
Anoſmia,
Hemiplexia,
Oſtœopus,
Chphalæa,

Ophthalmia,

Dysuria,
Dysenteria,
Tabes,
Elephantiaſis,
Tinea,
Eloſis.

A viru scabioso inopportune repulso, aut sine prævia sanguinis depuratione, superveniunt plurimi morbi, qui, principio solo excepto, habent cum scabie affinitatem; qui ideo Medicos diu anceps tenent, ægroſque diſcruciant, usquequo

puſtulæ excitatæ fuerint; & deinceps sanguine ſufficienter edulcorato scabies tuto ſanatur.

Quod de scabie dico, de lepra hodie rarissima & olim de elephantiaſi dictum eſto, quod etiam die ipſo herpete valet.

Morbi scabiosi

Scabies,
Lepra,
Elephantiaſis,
Herpes,
Hæctica,
Tartiana,
Quartana,
Gaſtritis,
Cynanche,
Peripneumonia,
Ecclempſia,
Palpitatio,
Epilepſia,
Convulſio,
Arthritis,
Mania,

Pica,
Asthma,
Tuſſis,
Anauroſis,
Hemiplegia,
Apoplexia,
Pruritus,
Hæmaturia,
Angina,
Pleurodyne,
Hydrothorax,
Aſcites,
Anafarca,
Dysuria,
Pſchifiſis,
Rachitis.

A viru scorbutico producitur scorbutus, qui maculas luteas, punctatas, vibices violaceas, nigricantes, in artubus potiffimum infans, & ſtomacacem conjunctam habet; ſed præterea

ab ipſo viru latente, & quandoque ſine prævia ſcorbuti ſymptomatis, ſuperveniunt morbi, apud natuſ & Septentrionales familiariffimi, ſcilicet.

Morbi scorbutici

Orthopnea,
Dyſpnoea,
Pleurodyne,
Oſtœopus,
Arthritis,
Rheumatismus,
Rachialgia,
Odontalgia,
Lumbago,
Atrophia,
Hepatitis,
Dysenteria,
Hæmatemefis,

Aſcites,
Melæſterus,
Rachitis,
Paralyſis,
Syncope,
Asthenia,
Stomacacæ,
Hæmoptiſis,
Hæmaturia,
Lienteria,
Ptyaliſmus,
Eloſis.

Curatio virulentorum morborum, ut & venæſectorum, partim rationali, partim empyrica metho do abſolvenda eſt; quippe pluribus virulentis debellandis dantur antidota, ut hydragryum in ſyphilitide; hydragryum, ſulphur & ſaturni liquor in ſcabie & in aliis affibus morbis; acidi ſquæſus, & præſertim li-

mones, in ſcorbuto. Cum autem omnis virulentia conſiſtat in quadam acrimonia humorum, potiffimum cutaneorum & lymphæ, operæ pretium eſt medicamentis rationalibus hanc acrimoniæ evacuari & corrigere, antequam ad ſpecifica deveniamus.

Acrimoniæ corrigunt diſſolutia, quæ ſalibus

cauſæ.

venereandis sunt aptissima, ut decocta, jussula apozemata ex foliis lactuce, endivie, portulacæ, betæ, aquæ acidulæ Vallenses, Alehenſes, Lodovenſes; balnea & semicupia: his adjuncta vel succenurianda evacuantia, potissimum diuretica, ut jussula aperientia ex radicibus fragaræ, graminis canini; foliis cichorii; silybrii, sit berulæ, chærophylli, petroselinii; sale nitro, Glauberiano, polychresto; asellis; in eundem finem paratur serum lactis harum plantarum & asellorum succo factum, quod per viginti dies ad libram unam mane bibitur; præmissis & in fine additis catharticis medicamentis ex fenna, rheo, cum manna in decocto prunorum vel tamarindorum. His vero sic peccatis residuum est ut acrimonie superflua corrigatur & involvatur, quod usus diuturnus lactis asinini, capilli, vel vaccini præstat. Si vero morbus recens sit, nec æger infirmus aut senex, ab initio mittendus est sanguis, ut residuum facilius resolvatur; & liberior additis medicamentis patet, atque excretionibus cutaneæ, renales, expeditius fiant.

Curatio vero cuiusque morbi, præter hæc remedia generalia; exigit medicamina specifica; sic in curanda syphilide, præmissis repetitis balneis, ad litum mercuriale devenire opus est; unguentum vero paratur ex sex uncis auxugis & tribus hydrargyri, prius in pauxillo terebinthinæ extincti, assiduo triu intime commixtis; vel adhibetur, potissimum in antiquis morbis syphiliticis qui hydrargyriolum eluere, spiritus antivenericus Ill. vana Svieten, cuius quodvis cochlear quintam vel quartam partem grani sublimati corrosivi soluti contrineat, superbibendo magnam lactis vel decocti lenientis copiam; vel demum adhiberi possunt tragacæ Kelsiana sub cautelis in ipso libello enarratis: sed de his vide quæ de syphilide scripsimus.

Cura in herperis & scabiei quod attinet, præter repentina jussula, aquas acidulas per novem dies epotas, balnea domestica, serum lactis, interpositis catharticis, deveniendum est ad litum ex unguento sulphuris; si vero scrotem hujus æger exhorrescat, methodus a Cl. Gualard proposita potest adhiberi; secus ad hydrargyriolum deveniendum, quod non sine cautelis & tempestate opportuna tentandum est; verum tamen sæpius auxilia generalia ad herpetem & scabiei benigna sufficiunt. Verum si morbi foveantur a viru herpetico, scabiosove repulso, nec cedant remediis generalibus, tunc scabies ipsa revocanda est; quod facile fit, induta scabiosi tunica, eaque noctu intereque gestata, usque quo scabiose pustulæ effluerint, quæ deinde scabies vel sponte vel generalibus remediis præmissis sanatur.

Inoculatio scabiei est novum auxilium ad morbos chronicos, alia methodo insaniabiles, superandos, licet a viru scabioso minime pendeant; de quibus legi meretur historia anæsthesiæ a Celserr. Martello sanaræ.

Sauvages Nosologia Methodica. Tom. II.

De curatione lepræ, elephantiascos & scorbuti vide hos morbos in Nosologia, & curationes Ill. Professoris Monspelienſis Jacobi Lazernæ, nec non quæ de usu cicutæ, hyoseyami in his morbis eradicandis superi Auctores tradunt.

CLASSIS TERTIA.

MORBI EXANTHEMATICI

Maladies eruptives.

Sunt illi qui soventur a materia morbifica exanthemasi febrium, ut violæ, rubeolæ, miliaris, purpuræ, erysipelatis, scarlatinæ, &c. in massa sanguinis retenta, vel introitus repulsa, difficiliter erumpunt.

Horum morborum plurimi sunt contagiosi, vel per inoculationem communicari queunt, ut virulenti; sic juxta Illustr. Deidier experimenta, si bis pestiferi injiciatur in venas animalis, illud animal peste corripitur; de inoculatione variolæ res est notissima; de rubeolæ & miliaris contagio non ita certum videtur in omnibus, nec instituta est eorum inoculatio. Tanta est exanthematum & impetiginum affinitas, ut vix differant nisi ratione pyrexia exanthemata sæpius comitantis. An eodem genere exanthematici morbi dantur species apyretæ, aliz typhodes malignæ perniciose, aliz pyrexia acuta virvida sitatæ, quod in peste Massiliensi viderunt Medici Monspelienſes, & in variola ac pemphigo vulgo observatur. Sunt alia exanthemata quæ calido regimini tribuenda sunt, eaque valde anomala, ut miliaris quedam species; alia vero regularia, quorum seminum est a calido regimine independents ut variola, pestis; a peste, variola & rubeola qui semel evasit, vix unquam huic morbo subjacet; solutio tributo immuni est in posterum, quod de cæteris exanthematis nemo dixerit.

Eruptio variolosa, rubeolosa, herpetica, miliaris & phlyctænodes seu pemphigosa non raro in aliis morbis epidemicis inconstanter efflorescunt & commiscentur, ita ut in peste, præter bubones & anthraces, qui sunt ejus generis criterium, interveniant pustulæ horum diversorum generum; in variola maligna intermiscantur maculæ petechiales, herpeticæ, miliaræ, erysipelacæ, sed pustulæ variolose semper primas tenent; & sic de aliis morbis epidemicis etiam per se non exanthematicis, seu in quibus symptomatice sunt exanthemata; sic in typho calidiori, in syncho miliari vulgo *suetto*, in amphimerina Hungarica, durante morbi statu, inconstanter apparent pustulæ miliaræ, petechiales, pemphingodes, & ob hanc inconstantiam hi morbi inter vetos exanthematicos non numerantur.

Quod de exanthematis symptomatice dico, de aliis

aliis phlegmatis intelligatur: quippe in peste, variola, tubercula, prout materias morbosae, vel copiosior, vel difficulter in cute erumpens, ad hoc vel illud viscus irruit, superveniunt phrenitides, peripneumoniz, pleuritides, gastritides fugaces, symptomatae dicuntur, quae etiam in febribus, ut synochio, typho, ephemera, synochia, et triacophya, potissimum in statu & paroxysmatis, quandoque apparent.

Symptomatis hos morbos cum Medicis omnibus appello, quia per se non constituunt morbum primarium, sed sunt ejus partes adventitiae, seu symptomata accidentalitiae, nequaquam vero recte quis dixerit hanc symptomata esse primarii morbi effectus; nam morbus primarius seu symptomatum congeries non est causa ipsorum: sic ex eo quod in procella ventus, grando, fulgur concurrant, nemo Physicus dixerit quod unum sit causa alterius, aut quod procella seu venti, & grandinis coneursum sit causa fulguris.

Materia morbosae exanthematum est quidem species virus quod tenuissimis moleculis, acerbis, causticis, partes inflammant, erodit, pungit, exulcerat, putrefacit; sed indolem cuique propriam nemo nisi ab effectu virus cognoscit: in miliaribus alba, laetia, illud virus est acidum; in purpura seu petechiis est putridum; sed quod sunt acida in rerum universitate, tot sunt proprietates distinctae, nec acidum vitrioli idem est ac acidum acetosae: acido limonum vomitum acidum etiam curamus; obscura est itaque haec horum venenorum cognitio: hoc tantum scimus quod in exanthematicis natura pyrexiae intervenit materiem morbosam ad cutem protrudere conatur, & quod Medicus, naturae minister, eundem sibi scopum proponere debet, non secus ac in virulentis imperiginosis; aut in istis non ideo sanatur æger quod herpes,

scabies, scorbutus in cute resideant; e contra in exanthematicis facta bene & completa eruptio, æger solius naturae ope dein sanatur.

Numerosissima sunt symptomata quae a cujuslibet exanthematis difficili aut suppressa eruptione soboleant in ipso morbi decursu; sed ea inter morbos exanthematicos non reponimus, quia fugacia sunt; & cum aliis ejusdem generis symptomatibus, eodemque tempore apparent: sic in variolae confluentis decursu cephalalgia, vomitus, somnolentia, quae tribus primis diebus solent accidere succedente eruptione pyrexia acuta, asthenia, unum tantum morbum, variolam dictam, constituunt: sed si subseque te tempestate accedat epidemicus morbus, in quo sit pyrexia acuta, cephalalgia, vomitus, somnolentia, qui sine ulla eruptione per petalium solvatur, ut variola ab illo non differat, nisi per eruptionem curentem, *Sydenham* ipse hunc morbum synochum variolodum, seu a viru varioloso latente excitatum, nuncupat, & propria methodo curandum esse monet. Est itaque iste morbus distincta species synochi ab aliis, quoad symptomatum seriem & therapeiam diversissima: hic morbus non est exanthematicus, sed exanthematicus, seu intus efflorescens.

Quoties etiam in decursu Epidemiz, v. gr. pestilentiz, observatur morbus qui eodem modo incipit & crescit ac pestis, sed ob impeditam eruptionem bubonibus non stipatur, si hoc frequens & constans sit, inde exurgit huius morbi vel species vel varietas notata dignissima, utpote quae absolute & cito lethalis, quae *pestis abortiva* vocantur, quare species huius morbi *classis* non apte a *Classi*. Viris nominatur.

Morbi pyretici ab exanthematis difficultes erumpentibus oriundi, sunt.

- Synochus variolodes,
- Synochus miliaris,
- Tertiana petechialis,
- Tertiana miliaris,
- Phrenitis miliaris,
- Phrenitis morbillosa,
- Phrenitis variolosa,
- Morbi evacuatorii ex eodem principio dependentes,
- Hæmaturia exanthematica,
- Gæmaturia variolosa,
- Hæmoptysis variolosa,
- Dysuria herpetica,

- Materies acris exanthematum morbos dolorificos excitat, quales sunt
- Rheumatismus miliaris,
- Scupor miliaris,
- Pruritus exanthematicus,
- Catarrhus tuberculorum,
- Si ea materies in pectus vel pulmones influat,
- Asthma exanthematicum,
- Orthopnoea variolosa,
- Catarrhus tuberculorum,
- Si denum caput aut diversa organa affecerit,
- Amorosis exanthematica,
- Hemiplegia exanthematica,

- Pestis interna,
- Pleuritis miliaris,
- Gastritis exanthematica,
- Gastritis erysipelatoza,
- Cynanche exanthematica,
- Peripneumonia exanthematica,
- Apyria omnis.

- Dysenteria miliaris,
- Diarrhoea variolosa,
- Diarrhoea miliaris,
- Coryza variolosa.
- Quales sunt
- Ophthalmia phlyctenodes,
- Ophthalmia pustulosa,
- Lumbago miliaris.
- Arthritis exanthematica.

- Angina exanthematica,
- Hydrothorax a tuberculo.

- Carus variolofus,
- Cataphora exanthematica,

Hemi-

Hemiplegia purpurea.

Morbi vero exanthematici regulares sunt,

Variola discreta,
Variola confluens,
Pemphigus major,
Rubeola vulgaris,
Rubeola variolodes,
Scarlatina febris,

Mania a metastasi.

Scarlatina urtica,
Miliaris benigna,
Miliaris lactea,
Purpura benigna,
Erysipelas rosea,
Erisera vulgaris.

Illud discrimen est inter morbos exanthematicos puros & miasmaticos, quod miasmaticis seminum ab aere inutuntur; exanthematici in ipso corpore habeant: sic variola benigna, utut epidemicae grassetur, suum seminum velut innatum, habet in corpore humano, quod data tempestate evolvitur: sed variola maligna, præter seminum vasiculosum, habet etiam seminum ab aere mutatum, perniciosum, quod pyrexiam typhodem cum variola conjunctum inducit; illud vero ex eo probatur, quod si pus ex variola etiam maligna inferatur infanti sano, illud variolam benignam, non vero malignam, inferat; a seminis itaque variolæ & eryphi combinatis suum periculum habet variola maligna: quod de aliis exanthematicis, nequidem peste excepta, intelligendum est: si dari enim pellem benignam, seu quæ sine febre notabili, sine virium prostratione bubones (uos tantum extrudit, docet Classis quinta Pestis *D. Chicoyneau* & *Verny* Masfiliz observata: & si pestis inorulatione heret, verosimile est in subiecto præparato, ut in variolis moris est, eam speciem innocuam erupturam fore.

De cura exanthematum vide Classis 3. in Ordine 3.

Cura vero exanthematicorum ad eum scopum vergeret debet, ut foras ad cutem deferatur materia morbifica, quod præmissa una phlebotomia, & ut plurimum primis viis ano & cato expurgatis, natura sola præstat; interea adjuvetur in peste cataplasmatibus ad inguina applicatis in variolis fomentis & vaporibus tepidis cuti admotis, & juxta quosdam balneis tepidis; in aliis vero morbis gravissimis, ut pemphigo Helvetico, admotis orcipiti vesicatoriis, quorum usum etiam in miliaribus & variolis adhibent Angli. Horum vesicatorum usus est necessarius quoties materies exanthematicæ repressa vel recentia caput aut pulmones affrigit, præsertim cum vires vitales languent, pulsus depressus est, calor imminuitur: quippe horum usu ut plurimum pulsus resurgit plenior & pacatior evadit, ut plurimum in pleuritide expertus est *Clar. Raymond* Anglorum exemplo incitatus.

CLASSIS QUARTA.

MORBI METASTATICI;

Maladies métastiques.

Metastasis est translatio materię morbi ficæ a parte in partem, in qua alterius ge-

neris morbus producitur: sic ex fontanella resecata, ex materie arthritica repulsa, ex ichore cancro retento, si alibi superveniat, ophthalmia, hemiplegia, phthisis, &c. morbi illi a prioribus diversis per metastasim facti seu metastatici dicuntur; quod de scabie repressa & iterum resumpta dici non potest.

Virulenti plurimi quidem metastases faciunt, sed per metastaticos intelligimus eos qui virulentia expertes sunt, licet a materia morbifica, ejusdem fere indolis ac virulenti, producantur, & qui reapse contagiosi non sunt; sic arthritis, scrophula, trichoma, rachitis, gangrena, carcinoma, eleofes, imo hæmorrhoids, exulceratio vesicatoria, ulcus fontanellæ, repressa morbos metastaticos inducunt.

Resumptio materię morbi ficæ fit per venas, tum sanguines, tum lymphaticas, quæ instar tubulorum capillarum succos attrahere, & vi circulationis in massam sanguineam reducere valent: inde vero materies illa, per arterias quoque versum delata, ibi fecerunt ubi cum vasis secretoris eorum exigit affinitas, eadem lege ac bilis in hepate, & urina in renibus, non vero reciproce deponuntur.

Dantur morbi metastatici salubres, ut pyuria pus & thorace in vias urinarias deducens; hæmorrhoids in splenalgia & hypochondriasis; diabetes in anasarca; dantur & nocui, ut cephalæa arthritica, phthisis a plica; periculum etenim est si materies morbifica & colicoria foras mittenda in eis retineatur; magis adhuc si in partes nobiliores mittatur; & contra bonum est eam ad cutem, extremas partes, aut ad colatoria amandari ut foras excretnatur. Quo materies retenta magis est ardens & deleteria eo metastasis peior est: sic ab urina retenta & in cerebrum translata convulsiones hunc, a pure ulcero retento & in pulmonibus deposita phthisis.

Curatio exigit ut materie morbifica ad colatoria consueta aut loca commoda iterum amandetur, saltem ad cutem aut artus extremos; nec non ut simul corrigatur ejus acrimonia, verum ut illa revoretur materies morbifica ad excretoria, sæpius est naturæ quam artis opus; interea primo materia illa tenax viscidæ resolvenda est potu calido, movenda auxiliis circulationem accelerantibus, sudorificis, cardiacis; secundo minuenda resistencia in partibus ad quas amandari debet, sicut balneo, cataplasmate, frictione, calore, stimulantibus, vesicatoriis, &c.

Sic ad revocandam podagram, pedes in aqua servidissima retinentur; sinapismi ipsis applican-

cantur, udones ex tela cerata gestantur, frictiones sicce adhibentur, intereadum poru diaphoretico intra lectum calidum fluida diluuntur & commoventur.

Ad revocandam scabiem, cutis sorditie omni detergitur, balneo emollitur, pannis siccis fricatur, dein decocto ex solis nicotianæ, hederæ arboreæ, lauri, foveatur, vel quod rutilus est tunica scabiosa crustis infecta noctu gestatur.

Si humiditas aurium revocanda, aures calide foveantur, fricantur, sinapisimo irritantur: aut demum emplastrum vesicatorium pone eas applicatur, fluxus vero inde exurgens folio betæ, he-

deræ butyro illito servatur: ulcera maturius resiccata unguento digestivo teguntur, crustæ cataplasmatibus emollientibus foveantur.

Si non sint emunctoria artificialia ad vicina nativa materies est revocanda, quod præstant diuretica, sudorifica, cathartica: si fluxus maricarum suppressus sit, is frictione, fotu, vapore calido, aut affrictis foliis ficus, vel demum admotis hirudinibus revocatur aut suppletur.

Scrophula, trichoma, arthritis, carcinoma, gangræna, viru suo vagante inducunt morbo metastasicos sequentes:

Morbi metastasici

- Paralysis scrophulosa.
- Hæctica scrophulosa.
- Phrenitis a plica.
- Dysenteria Polonica.
- Dæmonomania Polonica.
- Cephalæa Polonica.
- Ophthalmia cancrofa.
- Hemiplegia scrophulosa.
- Ophthalmia scrophulosa.
- Pleuritis Polonica.
- Paralysis Polonica.
- Rachitis Polonica.
- Phthisis a plica.

- Ostocopus clavus.
- Ostocopus clavus.
- Arthritis rachitica.
- Paralysis rachialgica.
- Chlorosis rachialgica.
- Scrophula farcimen.
- Dysuria rachialgica.
- Elcosis cancrofa.
- Peripneumonia rachialgica.
- Aurigo rachialgica.
- Eclampsia rachialgica.
- Contractura rachialgica.
- Rheumatismus rachialgicus.

Morbi arthritici

- Quartana arthritica.
- Peripneumonia arthritica.
- Tussis arthritica.
- Agrypnia arthritica.
- Diarrhœa arthritica.
- Diabetes arthriticus.
- Rachialgia arthritica.
- Palpitatio arthritica.
- Odontalgia arthritica.
- Tremor Asturiensis.
- Cynanche arthritica.
- Trismus arthriticus.
- Anorexia arthritica.

- Asthma arthriticum.
- Hemiplegia arthritica.
- Pruritus arthriticus.
- Paralysis.
- Syncope arthritica.
- Ichias arthriticum.
- Cholera arthritica.
- Typhismus arthriticus.
- Phthisis arthritica.
- Ascites arthriticus.
- Cephalæa arthritica.
- Pyuria arthritica.

Morbi rheumatismales ab
arthritide, rheumatica.

- Hemicrania.
- Odontalgia.
- Angina.
- Pleurodyne.

- Ophthalmia.
- Otalgia purulenta.
- Carus.
- Peripneumonia.

CLASSIS QUINTA.

MORBI FEBRICOSI, FEBRILES;

Maladies intermittentes.

Illis sunt qui a materia morbifica, febris, vel remittentis, vel intermittens, excitantur, sive sint cum ipsa febre, sive citra ipsam. Cognoscuntur ex eo quod 1. periodici sint cum intervallis vel lucidis vel saltem sensibilibiter pacatis; 2. quod more accessuum febrilium quodam horrore, frigore, oscitatione, non raro & sine causa evidenti, veluti subito aggrediantur; 3. quod pariter sine causa evidenti post aliquot horas remittant, aut intermitant; 4. quod uri-

ne sint ut plurimum lateritæ, rubræ; 4. quod æger quandoque febri intermittenti vel remittenti fuerit obnoxius, vel actu sit detentus.

Primus qui hos morbos utrumque familiares præstavit fuit *Mercatus*; hos acrius examinavit *Morisonus*, deinceps vero accurate descripsit *Torzi*, quos sequuti sunt *VVerrhof*, illustris S... atq. Scholastici etiam nuperi eas sua malignorum & anomalorum morborum vana denominatione confunderunt, aut ut rectius loquar non cognoverunt.

Febribus certe adscribi non debent omnes morbi; quippe nulla quandoque sunt febris signa pathognomonica, nec calor, nec horror præcedens, nec pulsus frequentia, sed facies alterius morbi, syncope, vomitus, cholera, carus, orthopnoea, apoplexia, pleuritis, unde per tot sæcula,

Næc.

Medicorum sagacitas maximo ægrotorum detrimento delusa fuit.

Illi morbi periculosissimi sunt, quoties ignoti; aut si mature cognoscantur multo facilius quam quis crederet debellantur; unicum autem est sed præstans antidotum, kinkina, quod non ad unam alteramve drachmam, sed ad semi uncias, quandoque quater in die, præscribi debet, si morbus urgeat & serius cognitus fuerit; ex hac quidem uberrima kinkinæ assumptione urinæ turbidæ evadunt, imo quandoque ichthuria accedit, sed fugax, & cum æger a priori morbo in tuto collocatus est facile superanda: vide *Typhama-*

niam febricofam tertianam. Bolus febrifugus ex *kinkina recens pulverati drachm. iij; storum chamæmelis Romani drach. j; cremoris tartari scrup. j; cum syrupo de absinthio vel de cicorio fiant tres boli*.

Datur etiam *semen pastinacæ, ad drachm. j; testa ovorum calcinata pro puerulis amara recensantibus, ad scrup. j; semen Hispanicum nondum satis cognitum, ad scrup. j. semel in die per striduum*.

Flores maricariz, chamomillæ ad drachm. sem. tercia die; radix pentaphylli, caryophyllatæ, anferinæ; in apozematibus ad unc. j; cascariillæ pulvis ad scrup. j. præstans in intermittentibus.

MORBI FEBRICOSI

Ephemera mensural.
Ephemera anniverfaria.
Amphimerina syncopalis.
Amphimerina phricodes.
Amphimerina plegdo hemitritæus.
Tritæophya carotica.
Tritæophya deceptiva.
Tetartophya carotica.
Quotidiana simplex.
Tertiana epileptica.
Quartana amens.
Quartana comatosa.
Erratica quintana.
Erratica nonana.
Rigor febricofus.
Eclampsia febricofa.
Hysteria febricofa.
Ephialtes tertianaria.
Pleurodyne febricofa.
Ephemera dichomene.
Amphimerina epial.
Amphimerina humorosa.
Amphimerina hemitritæus.
Amphimerina spasmodica.
Tritæophya leipyria.
Tetartophya maligna.

MORBI FEBRICOSI

Aurigo febrilis.
Syncope febrilis.
Hemiplegia febricofa.
Cataplexis quartanaria.
Cataphora timor.
Arthritis febricofa.
Rheumatismus febrilis.
Cephalæa febricofa.

Tetartophya semitertiana.
Tertiana carotica.
Tertiana hemiplegica.
Quartana nephralgica.
Erratica vaga.
Erratica septena.
Tetanus febricofus.
Rigor tertianarius.
Epilepsia febricofa.
Scelerybe intermittens.
Oscedo febrilis.
Asthma febrilis.
Orthopnea febrilis.
Amaurosis febrilis.
Paraplexia intermittens.
Typhomania febricofa.
Apoplexia febrilis.
Arthritis febrisæqua.
Cephalalgia intermittens.
Hemicrania lunatica.
Ophthalmia febricofa.
Gastrodynia.
Nephralgia 13.
Rachialgia 24.
Amentia a quartana.
Vomitus febricofus.
Diarrhæa febricofa.
Ophthalmia febricofa.
Cardialgia 48.
Colica 64.
Hysteralgia 92.
Paraphrofyne 64.
Hepatirrhæa intermittens.
Cholera intermittens.
Ephidrosis febrilis.

CLASSIS SEXTA.

MORBI MIASMATICI

Maladies épidémiques, malignes.

Sunt illi qui ut plurimum acuta febre aut pyrexia stipati a regione in regionem grassantur intervenientu miasmatum qualitatibus deleteriarum, gangrenosæ, phlogisticæ, qui ex cloacis, foricis, nosocomiis, carceribus, castris, sepulchretis exhalant, ut morbi maligni, putridi, pestilentes, vel ope miasmatum singularis prorsus, vix cogni-

tæ, indolis, ex quibus epidemiarum catarrhales, anginosæ, pleuriticæ procedunt; nec non plures phlegmasiæ exanthematicæ, ut variola, rubæola, miliaris & pestis.

Principium horum morborum est commune, adeoque ab aere, aqua vel cibo repetendum videtur; sed præterea illud a regione in regionem, grassatur; quod de aqua & cibo vix intelligi potest, nisi ab influxu vaporum, toris maligni, mephitidum, ipse cibus & potus inficiatur; unde semper ad miasmata per aerem diffusa referendæ sunt epidemiarum, aut ad vapores ex locis infectis exhalantes: huic vero morborum

principio addendus est moror & timor, quo omnes fere eiusdem regionis incolæ afficiuntur, maxime vero in annonæ caritate pauperes, in nuda obfessionibus mulieres, in terræ motu, fulgure & tempestate fere omnes.

Occasione morbis epidemicis præbent t. bella, 2. terræ motus, 3. exundationes, 4. annonæ caritas, 5. paludum exsiccationes, 6. constituciones aeris; quæ omnes ærumnæ sæpius simul concurrunt aut se mutuo consequuntur.

Morbi castrenses sunt maxime ex malignorum & contagiosorum numero, & ex infima succorum vitalium corruptela procedunt: huius vero corruptionis variz & multiplices sunt causæ, ut famics quæ ad pessima & corrupta edulia capessenda cogit, assiduum vigiliz, frigatio continua, metus, terroc eorum qui obfessione detinentur, horrenda crudelitatis spectacula præ oculis observantia; in castris ipsi, sub tanta pecorum hominumque multitudine, aer foetidus vasis generis exhalationibus inquinatur. Vapor e latrinis exurgens, dum viget dysenteria, ingressu in intestinum rectum morbum aliis impertit. Post prælia cadavera inseputa terrore animum deiecit, foetore viciniam morbis malignis inficiunt. Terræ motus, præter terrorem & infortunia belli ærumnæ similia, perniciosos ex specubus telluris halitus excitant; imo ubi magnæ solis & terræ subversiones sunt, morbos epidemicos produci docet historia. Exundationes fluminum, urbes vicinas impetientium, omnes aquas potulentas luto inquinant, vicos & plateas eodem luto cito foet du replent, quo nihil aptius ad putredinem inducendam, ad omnia ibi in misera corruptenda, ut Alesiensis experti sunt; adde quod vina, olea, pecora, annona, cibaria submergantur, unde eorum corruptio vel penuria; inde ærumnæ, morores, morbi epidemici. Verum nihil aptius ad hos inducendos putrefactione piscium, insectorum, plantarum in aquis paludosis, cum æstu solis, vel de industria hæc loca paludosa exsiccantur. Horrendus foetor ante aliquot annos ex lacubus duas leucas a Monspelio distantibus huc usque & ultra extendebatur, & dein pleuritides pestilentes oppida vicina invaserunt.

Putredine nihil est insensius, ad hanc vergunt omnes humores, potissimum tæcrementitii, & post eos ipse sanguis, multo minus lymphæ, omnium minime pinguedo; sed hæc a fermentis delectariis, a misfmatibus putridis maxime exaltatur. In primis viis materies putrida rufus nidorosus, nauseas, cardialgias, vomitus, choleras excitat; natura quippe totis viribus eam materiem eliminare contendit: verum cum similis materiam infecit ipsum sanguinem, quid opis superest naturæ ut ab hac se liberet, nisi ut, excitata febre, ejus materiei stagnationem impediat; ut, excitatis sudoribus, diarrhoeis, ejus excretionem in collo cutaneo intestinale promoveat; hinc synochi, trienterophæ, tertiana frigivæ mala juridica dicta. Si vero pejor sit indoles. fermenti illius deleterii ita ut

textum solidorum corumpat & vapore methitico fluidi nervi activitatem destruat, quod experimentis electricis consensum est, tunc viscera quandoque plura simul, ut pulmones, intestina, vena gangræna afficiuntur; pulsus sanorum similis est aut multo debilior, inæqualis, intermittens; purpuræ maculæ, vibices efflorescunt, delirio turbatur anima, mors ossa pulsas; funera densantur, eadaverrum abdomen meteororum tenditur, foetor horrendus intra paucas horas ex illis spargitur, viscera remollita, nigricantia, tumores atrii, brunnei, viridescentes, saniosi reperiuntur, & hi morbi maligni aut typhodes vocantur. Aliquid spei superest in his an, ut si deleteria materies ejus sit indolis ut in emundatoris a corde difficilis, si non excerni, saltem congeri possit, & procul a corde in parotides, glandulas inguinales, axillares aut cutaneas forma anthracum, bubonum, pustularum amandari, sed cum ipsa pestis epidemicæ viget, non id felicitatis omnibus pestiferis accidit, ut venenum pestilens ad illas glandulas amandetur, quippe dantur pestes abortivæ in quibus bubones non erumpunt & omnes ægri intereunt, ut in variola suppressa cujus pustulæ foras tradi non possunt, & materies deleteria viscera nobiliora, ut cerebrum, pulmones, stomachum infarcit, inflammat, gangræna afficit, unde mors.

His anomalis induciti sunt: quidam Medici ad credendum pestem epidemicam non unum genus morbi, sed plurimorum generum simul vigentium congeriem; sed nedum res ita sit, facile attendenti patebit pestem abortivam esse veram pestem, ut variola abortiva vera est variola, in qua tantum deficit eruptio, seu in qua æger ante eruptionem aufertur. & multo rectius, meo quidem judicio, opinantur illi qui peste regnante omnia alia morborum acutorum genera silere contendunt, quod Alesim anno 1721 Collegæ mei sedulo observarunt.

Non ine latet nostram theoriam *Chiracii, Delictio*, aliisque scilicet mechanicæ fautoribus exhibitam fuisse: illi enim omnem acrimoniæ, omne virus inter fabulas habent, & omnia malignorum morborum phenomena ex infarctu vasorum cerebri mechanicæ & hydraulice intelligi posse contendunt; vide *Chiracii Liberum de febribus*, de quo ipse scripserit, *Exegi monumentum*..... illud tamen monumentum num vitabit Libitinam anceps est.

Curatio horumce morborum hætenus æque difficilis est ac eorum theoria obscura; errant Veteres in eo quod alexipharmacis sudorificis, per vim, nulla habita. Basia inflammatoriz ratione, materiem morbificam eliminare voluerunt; alii tamen errando viam Neotericeis præmonstrarunt: in hoc morbi illi periculosissimi sunt quod natura veluti perterrita nequidem adversus materiam morbificam pugnare.

aggrediatur, ut ait *Galenus*. Medici itaque hoc munus est, ut stases inflammatorias quantocius una vel altera phlebotomia evertat, quantocius saburram putrem e primis viis ope emeticorum & catharticozum evertat; dein vero antiseptici putredinem humorum corrigat; & si natura vergat ad glandulas inguinales, cutaneas, eo per apposita auxilia materiem morbosicam ducat, cardiacis & alexipharmacis vires ejus rescindendo. Alterum vero Medici munus est ut prophylactici remediis imminentes has epidemias avertat, & animos egrorum, quos terror sæpius dejecit, exemplo suo erigat.

Alexipharmaca seu antiseptica maxime laudata sunt camphora, nitrum, kinkina, acetum, succus fructuum acidorum, ut limonum; serpentaria Vir-

giniana, contrayerva, theriacum; illa parca dosi, interpositis catharticis quæ etiam antiseptica eximia esse expertus novi. De iis vide *curatorem Pestis, Variolæ malignæ, Typhi, &c.*

Prophylaxis consistit in remotione occasionum; fugienda sunt scilicet loca in quibus aer est fetidus, putridus, cænosus; si vitari non possint aer est renovandus, refrigerandus, vapore aceti, aromatum accensione, pulveris pyrii desagrati-
one corrigendus: ventilatore carceres, nosocomia, naves, granaria sunt munienda: vestimenta lanea, linea, sæpius mutanda; aquæ puræ potandæ vel aceto corrigendæ; carniùm & frugum usu commutandus. *Bœrhavii Therapeut.* 1145. *Frieder. Hoffmann. de Venenis in Patholog.* cap. 4. 9.

MORBI MIASMATICI.

Ephemera sudatoria.
Synochus dysenteriodes.
Synochus ardens.
Synochus miliaris.
Typhus nervosus.
Typhus castrensis.
Synochus variolodes.
Synochus pleuritica.
Synochus hyemalis.
Typhus carcerum.
Typhus comatosus.
Typhus Ægyptiaca.
Typhus icterodes.
Amphimerina humerosa.
Amphimerina hemitriteus.
Amphimerina miliaris.
Amphimerina mimosa.
Amphimerina biliosa.
Tritoxophya Americana.
Tritoxophya carotica.
Tritoxophya deceptiva.
Tertiana petechialis.
Tertiana duplex.
Quartana legitima.
Variola benigna.
Variola confluenta.
Rubeola vulgaris.
Miliaris benigna.
Miliaris maligna.
Miliaris nautica.
Purpura maligna.
Phrenitis synochalis.
Pleuritis biliosa.
Pleuritis putrida.
Cephalitis Ægyptiaca.
Cyanche tonsillarum.
Cyanche ulcerosa.
Peripneumonia vera.
Peripneumonia typhodes.
Peripneumonia exanthematica.
Tussis convulsiva.

Amphimerina epiala.
Amphimerina phricodes.
Amphimerina Hungarica.
Amphimerina anginosa.
Amphimerina paludosa.
Tritoxophya caesus.
Tritoxophya albosides.
Tritoxophya leipyrria.
Tertiana legitima.
Tertiana carotica.
Tertiana subcontinua.
Pestis vulgaris.
Variola miliaris.
Pemphigus castrensis.
Rubeola anomala.
Miliaris sudatoria.
Purpura benigna.
Phrenitis miliaris.
Pleuritis vera.
Pleuritis verminosa.
Pleuritis catarrhalis.
Cephalitis verminosa.
Cyanche epidemica.
Cyanche exanthematica.
Peripneumonia putrida.
Peripneumonia catarrhalis.
Tussis serena.
Orchopneea peripneumonica.
Angina bronchus.
Catarrhus epidemicus.
Asphyxia a carbonis fumo.
Stomacace.
Dysenteria castrensis.
Syncope ab antipathia.
Scorbutus septentrionalis.
Cardialgia ab antipathia.
Asphyxia a mephitide.
Asphyxia a multo.
Amaurosis fornicariorum.
Dysenteria æquinoctialis.
Diarrhœa biliosa.

Sudrificæ.

Aqua generalis, theriacalis, imperialis, Carmelitarum, Regine Hungarie a drachm. j. — xv.
 Sympus de cinnamomo, de floribus aurantiorum, de kinkina, a drachm. ij. — unc. j.
 Elixirum propiæatis, theriacale, vitrioli a gutt. v — xx.
 Oleum essentielle cinnamomi ad gutt. j in mixtura.
 Spiritus vini camphoratus, a gutt. xv — x.
 Acetum quatuor furum, a drachm. j — iv; acetum theriacale ad drachm. vj.
 Essentia cephalica, a gutt. vj — xx.
 Acetum destillatum ad drach. iv quovis quadrante horæ in mixtura.
 Tinctura coralliorum a gutt. vj — xx.
 Flores benzoini, sal volatile oleosum, sal volatile succini, a gran ij — xij.
 Guttæ Anglicanæ, Monspelienfes, Generalis La Mothe, ætheris vitriolici, tinctura falsæ tartari, tinctura antimonii, a gutt. xv — xx.
 Liliū Paracelsi, a drachm. j — iv.
 Tinctura ambre griseæ, a gutt. ij — viij.
 Vinum de kinkina, ab unc. j — iv.
 Theriaca Anglicanæ, Michridatum, Confectio alkermes, Pulvis Comitiffæ, Ambræ griseæ, pulvis aureus Zelli, a gran. xij. — drachm. j.
 Kermes mineralis, a gr. j — ij.
 Pulvis diarrhœ, a gr. vj — xx.
 Opiata Salomonis a scrup. j — drachm. j. Trochisci de Catechu cum cinnamomo, nu. iij. — tv.
 Sympus de stœchade, de tunicis a drachm. j — iv.
 Sympus de citreo, a drachm. j — unc. j.
 Extractum juniperi, ad drachm. j.
 Cortices citri conditi, ad drachm. iv.
 Pulvis viperinus, a gr. xij. — xxx.
 Sal volatile viperarum, cornu cervi, a gr. vj — xx.
 Bezoarticum Orientale, a gr. x — xx.
 Flores salis ammoniaci, a gr. vj — xij.
 Camphora, a gr. v. — xv. Coccinella a gr. iij — xx. Crocus a gr. iij — viij.
 Flores sulphuris, a gr. x — drachm. j. Flores benzoini, a gran. iij — xxx.
 Spiritus volatilis urinæ, ad gutt. vj. Aqua Lucis ad gutt. x.
 Suffitus ex aqua vitæ, baccis juniperi, Karabe.
 Stuphæ domesticæ thermæles, amurca uvarum, folia ulni.

CLASSIS SEPTIMA.

MORBI PLOGISTICI;

Maladies phlogistiques.

Disti sunt a Græco phlogizo; inflammo; ardor vero flammæ quo stipantur, vel a causa externa, ut insolatione, igne; vel a causa interna, seu vehementi patium ignearum & acrim evolutione & afflictu dependet. Vide *Phlegmasiarum thesaurum*.

Qui coram fornacibus magnis laboribus se exagitant, vel Sole sub ardenti morantur, illi maxime, tritæophyæ ardenti, ophthalmiæ sunt obnoxii; & si, vel frigidam bibant, vel acri frigido se exponant incaute, inde in pleuritides, peripneumonias, reumatismos aliosque morbos inflammatorios se conjiciunt; & apud Americanos plurimè inde tetano vel trismo convelluntur.

Verum maxima pars phlegmasiarum a causis internis ortum habet, ut plethora, menostasi, pathematis, infarctibus viscerum; unde febris conatus vehemens ad infarctus resolvendos,

ad sanguifluxum ciendum; & ex illo febrili conatu calor accenditur, infarctus inflammatorius concitatur; adde quod raro, saltem apud nos, inflammationes illæ puræ sint, sed sæpius saburra primarum viarum stipatæ, vel putridæ; puræ vero sunt non raro apud rusticos, monticollas, durius laboribus exercitatos, diæta vegetabili utentes aeris vicissitudinibus magis expolitos, & fibra fortiori sanguineque calidiori donatos.

Cognoscuntur ex calore vehementi, dolore, pulsu veloci, tenso, frequenti, siti, siccitate, pervigilio; & si pars externa obfesa sit, adest tumor, rubor, tensio, quandoque pulsatio. Morbi illi ut plurimum acuti sunt; iis obnoxii sunt robusti, exercitati, rustici, operarii, adolefcentes biliosi, sanguinei; rarius senes, infantes, debiles, pituitosi: huc referendæ sunt phlegmasiæ puræ membranose, ut pleuritis, phrenitis, enteritis; & parenchymatose, ut peripneumonia, nephritis, hepatitis; & febres ardentes, ut synochus ardens, tritæophya, causus; necnon reumatismus inter inflammatorios, dysenteria &c.

Curatio exigit ut impetus sanguinis conpe-

fecatur, quod largæ & repetitæ phlebotomiæ, dietæ liquida, potus diluens, refrigerans, nitrosus subacidus maxime præstant; huc pertinent emulsiões, limonate vegetabiles ac minerales; & leniter expurgatis primis viis ecoproptica, conveniunt balnea, semicupia; si vero natura aliquam criticam evacuationem molietur per spuatam, enuresim, sudorem, alvi fluxum biliosum,

catamenia, eo ducendum est imminutis resistentiis ex parte colatorii, & pyrexia in iusto tenore servata. Si vero inflammatio resolvi nequeat, tunc partis inflammatae suppuratio juvanda, puris ejectio, ulceris deterfio, cicatricisque efformatio promovenda; *Berhaave Aphor. 370. & Aphor. 1. & 770-1006*: Vide etiam quæ de phlegmatibus dicta sunt in *Nesologia*.

MORBI PHLOGISTICI.

Ephamera a phlogosi.
Ephamera sudatoria.
Synocha tragæda.
Synochus ardens.
Synochus dysenteriodes.
Tritoxophya Americana.
Tritoxophya elodes.
Tritoxophya leipyria.
Tertiana duplex.
Erysipelas rosa.
Phrenitis calentura.
Paraphrenesis pleuritica.
Paraphrenesis hepatica.
Pleuritis dorsalis.
Pleuritis hepatica.
Enteritis mesenterica.
Gastritis sternocostalis.
Cephalitis Aegyptiaca.
Cephalitis Epidemica.
Cynanche tonsillaris.
Cynanche pharyngea.
Cynanche hepatica.
Peripneumonia pura.
Peripneumonia phthisicorum.
Hepatitis erysipelatosa.
Hepatitis pleuritica.
Convulsio febrilis.
Lethargus cephaliticus.
Ephamera ardens.
Synocha ardens.
Synocha cephalalgica.
Synochus pleuriticus.
Synochus biliosus.
Tritoxophya caufus.
Tritoxophya alvodes.
Tertiana legitima.
Erysipelas ambustio.

Phrenitis vera.
Phrenitis synochalis.
Paraphrenitis diaphragmatica.
Pleuritis vera.
Pleuritis mediastina.
Pleuritis biliosa.
Gastritis legitima.
Cystitis spontanea.
Cephalitis spontanea.
Carditis spontanea.
Cynanche parotidea.
Cynanche trachealis.
Cynanche prunella.
Peripneumonia ardens.
Hepatitis muscularis.
Hepatitis cystica.
Nephritis vera.
Asthénia Virginica.
Carus ab insolatione.
Lassitudo a calore.
Ardor externus.
Ophthalmia chemosis.
Rheumatismus acutus.
Pyrosis a phlogosi.
Anxietas febrilis.
Paraphrosyne calentura.
Chlorosis Carthagenica.
Gangræna ab ustione.
Ardor internus.
Ophthalmia humida.
Otalgia inflammatoria.
Rheumatismus calidus.
Cardialgia inflammatoria.
Paraphrosyne febrilis.
Dysenteria æquinoctialis.
Chlorosis Bengalensis.
Gangræna ab inflammatione.

CLASSIS OCTAVA.

MORBI SANGUINEI.

Maladies sanguines.

Sunt illi qui determinantur a plethora, ea que foventur, sive quia ab assumptis copiosis, eupeptis, bene digestis, aucta est sanguinis copia, sive quia a suppressis, imminutis: solitis fluxibus, & potissimum sanguisfluxibus, ut catamenii, hæmorrhoidibus, ejus moles major facta est. Differunt a phlogisticis in eo quod si plethora sit commota & febre stipata, febris illa

non est inflammatoria seu peculiari partis inflammatione stipata.

Plethora dicitur illa boni sanguinis abundantia quæ sanitari nõceat.

Menostasía est sanguisfluxuum periodicorum, assuetorum, suppressio, vel retardatio aut imminutio.

Maxima pars sanguineorum morborum accidit apud mulieres a menostasía, tum vacuum tum gravidarum; inde fit ut maxima pars morborum qui gravidas divexant phlebotomia curetur.

Plethora dicitur particularis si quedam pars majori copia sanguinis gaudeat quam fert consueta proportio.

Vasa p. meningis & cerebri post mortem re-

periuntur scilicet semper turrida magis sanguine quam exteriora partes, quia ex aliis partibus pressione atmosphære cutis coarctatur & sanguinem in venulas exprimit quoquoeverum; cum autem theca cranii ab illa atmosphærica pressione cerebrum liberet, huc sanguis undequaque pressus facilius affluit nec ex eo exprimitur.

Morbi plethorici quia tales curantur 1. abstinentia a cibis potissimum ab eucharistia & multum nutritibus; ut cornibus, pane, ossis, in quorum vicem iuscula diluta, pauca, cremores ex farinosis substituantur: initio acutorum merita aqua & diarrætica diæta sufficit; vulnerati potissimum & febricitantes sola euisana vitæ per aliquot dies sustinent & citius curantur: 2. detractione sanguinis per phlebotomias repetitas e vena commodiori; nec enim delectus eorum alio motivo ferme determinari potest, nisi præjudiciis adstantium aut veterum Medicorum obsequio adheremus: si plethora partialis sit in certis partibus, nec ea sit vis pulsus quæ phlebotomiam admittat, partis affectu, vicinitate hi-

rudines ad moveri possunt, quarum etiam pars postica refectatur ut uberiorem exsugant cruoris copiam: quo facto, sale asperse cutem dimitunt: 3. denum detracta per cathartica aut emetica humorum e primis vis copiam, immunitur massa sanguinis, ob evacuationem succorum qui hac occasione a sanguine secretuntur.

Aut si fluxus cuiusdam, potissimum sanguinei, suppressio plethora soveat, opus pretium est eum revocare, quod ipsa plebotomia e brachio instituta in plethoricis non raro præstat, pediluvia calida, iuscula diluentia & aperientia, ambulatio & demum emmenagoga forma iusculi vel ptisanæ, in phlegmaticis vero martialia & resinosa efficiunt. Si hæmorrhoids fluere desierit mariscæ sunt sicut emollienti præparandæ, usu aloeticorum interno irritandæ, si turgeant læneola: vel hirudinibus admotis, perturbandæ: Boerhaave Aphorism. 106.

Qui sunt a plethora tum universali tum particulari, tum vera tum commota seu apparenti, sunt.

Morbi sanguinei

Ephemera plethorica.
Synochus sanguineus.
Tremor a plethora.
Eclampsia parturientium.
Seclotyrbæ plethorica.
Tussis hæmoptoica.
Asthma plethoricum.
Orthopnoea cardiaca.
Caligo hypophæma.
Anorexia plethorica.
Paraplexia sanguinea.
Syncope plethorica.
Carus spontaneus.
Apoplexia sanguinea.
Rheumatismus vulgaris.
Cephalalgia plethorica.
Cephalalgia catamenialis.
Cephalalgia pulsatilis.
Hemicrania hæmorrhoidal-
lis.
Ophthalmia choroidea.
Cardiognus omni.
Colica plethorica.
Nephralgia hæmorrhoidalis.
Mastodynia phlegmonodes.
Ischias rheumaticum.
Proctalgia inflammatoria.
Suffusio myodes.
Syrignus plethoricus.
Synocha plethorica.
Tertiana pleuritica.
Eclampsia plethorica.
Nausea gravidarum.
Vomitus hæmorrhoidalis.
Dysuria hæmorrhoidalis.
Leucorrhœa gravidarum.
Ascites calidus.
Mydrometra sanguinea.
Ischuria lunatica.

Epilepsia plethorica.
Tussis gravidarum.
Dyspnœa plethorica.
Orthopnoea peripneumonica.
Lleurodyne plethorica.
Amaurosis plethorica.
Paralysis plethorica.
Asthénia febrilis.
Catalepsia a menostasi.
Carus febrilis.
Rheumatismus acutus.
Rheumatismus calidus.
Cephalalgia hæmorrhoidalis.
Cephalalgia febrilis.
Cephalalgia gravidarum.
Ophthalmia chemosis.
Odontalgia gravidarum.
Colica gravidarum.
Colica phlogistica.
Nephralgia rheumatica.
Ischias sanguineum.
Proctalgia a mariscis.
Vertigo plethorica.
Diplopia pyretica.
Syrignus cephalagicus.
Syrignus bombus.
Paraphrosyne puerperarum.
Hæmorrhagia plethorica.
Hæmoptysis accidentalis.
Hæmoptysis habitualis.
Hæmoptysis Helvigiana.
Hæmatemesis catamenialis.
Hæmoptysis catamenialis.
Hæmoptysis periodica.
Hæmatemesis plethorica.
Melæna hæmorrhagica.
Vomitus gravidarum.
Ephidrosis eruenta.
Dysuria neoneumphyarum.

Morbi sanguinei.

Aurigo febrilis.	Phlegmasia a menostasi.
Phenigmus plethoricus.	Ascites sanguineus.
Hæmaturia violenta.	Ischuria nephritica.
Hæmaturia hæmorrhoidalis.	Aurigo plethorica.
Menorrhagia immodica.	Aurigo typhodes.
Menorrhagia stillatica.	Hæmaturia spontanea.
Menorrhagia lochialis.	Hæmaturia stillatica.
Hepaticæ hæmaturia.	Menorrhagia difficilis.
Hæmorrhœa moderata.	Menorrhagia gravidarum.
Dysenteria benigna.	Menorrhagia erronea.
Dysenteria gravidarum.	Hepaticæ hæmaturia.
Hypochondriasis sanguinea.	Hæmorrhœa polyposa.
Amnesia plethorica.	Hæmorrhœa immodica.
Hæmorrhagia critica.	Dysenteria catamenialis.

CLASSIS NONA.

MORBI BILIOSI.

Maladies bilieuses.

Sunt illi quorum principium est bilis abundantia, ejusque acrimonia solito major, ut plurimum cum temperamento bilioso, ex cujus signis cognoscuntur: biliosi scilicet sunt siccæ, calidi, alacres, audaces, vivido ingenio præditi, ad iram & rixas proni, activi, negotiosi; ipsi pulsus est velox, fortis; rubet facies; cutis strigosa, macilentra; sanguis fluxilis, acer; cor & arteriæ vegetæ sunt: in morbis levi de causa calent, sitiunt, bilem ano vel cæto rejiciunt, morbis ardentibus, inflammatoriis obnoxii sunt; juvantur a frigidis,

acidis; læduntur a calidis, acerbis, siccis.

Cum in his morbis humores acrimonia alcaliscente & siccitate peccent, & deficiat partium ferrosus latex, indicantur alimenta & medicamenta diluentia & refrigerantia, acida, tum fossilia sed multum diluta, tum vegetabilia; olera molliora; fructus aquosi, subacidi, cathartica diluentia, ut acidulæ minerales, tamarindi, pruna, cassia; neque ea quæ secretionem bilis sollicitant, intestina expurgando, sanguinem diluendo; huc pertinent hepatica dicta aperientia, cichorium, taraxacum, lupulus, fumaria, agrimonia, rheum; imo fortiora si emphraxi frigida laboret hepar: *Vide Aurigæ curam: Boerhaave Aphorism. 76. Insistit. Therap. 788.*

Huic classi accensendi sunt morbi phlogistici febre aut pyrexia stipati.

Morbi biliosi.

Anorexia biliosa.	Melæna atrabilis.
Asthénia Americana.	Vomitus a veneno.
Typhomania agrypnocoma.	Vomitus atrabilarius.
Pyrosis biliosa.	Vomitus marinus.
Gastrodynia biliosa.	Cholera a veneno.
Cephalalgia stomachica.	Cholera auriginosa.
Cephalalgia febrilis.	Cholera Indica.
Hepatalgia calculosa.	Diarrhœa biliosa.
Hepatalgia æruginosa.	Diarrhœa febricosa.
Singultus inflammatorius.	Tenismus spontaneus.
Singultus a dysenteria.	Præsternus viridis.
Hypochondriasis biliosa.	Aurigo a vipera.
Polydipsia febrilis.	Aurigo hepatica.
Paralysis biliosa.	Dysenteria castrensis.
Typhomania continua.	Dysenteria intermittens.
Pruritus ictericus.	Vomitus biliosus.
Pyrosis Suecica.	Vomitus a capitis ictu.
Colica biliosa.	Vomitus iliacus.
Cephalalgia traumatica.	Cholera spontanea.
Cardialgia a saburra.	Cholera dysenterica.
Hepatalgia Petitioniana.	Cholera intermittens.
Singultus criticus.	Nausea biliosa.
Singultus exanthematicus.	Diarrhœa cholericodes.
Verrigo stomachica.	Diarrhœa hypercatharsis.
Paraphrosyne febrilis.	Anacatharsis biliosa.
Polydipsia fluxuum.	Aurigo febrilis.
Dysenteria epidemica.	Aurigo febricosa.
Dysenteria æquinoctialis.	Aurigo ab obstructione.

CLASSIS DECIMA

MORBI SABURRALES

Maladies de saburre.

Vitiosi succi è reliquiis pravæ digestionis intra primas vias residui *saburra* constituunt, *qua* vel *cruda* est si alimenta *vir* digesta natives qualitates servant; *acida* si ob moram & salivæ culpa fermentationem iniverint, ut vegetabilia, inde status, ructus, morsus ventriculi, lactis coagulatio: *nidorosa* est si ex carnisbus putrescentibus sint illæ reliquæ, unde fætor putris, nausea, horror-jusculorum: acidorum appetentia, diarrhœæ fœtidæ, biliosæ; *saburra* in morbis est *primaria* si ipsa ansam dederit ciborum major copia vel qualitas; *secundaria* vero est si alimenta ratione ægritudinis male concocta fuerint.

Ita frequens est in morbis *saburra*, tum *primaria* tum *secundaria*, ut sint non pauci Medici qui hanc veluti omnium fere morborum principium habeant & *stercorarii Harum* dicuntur. Facendum est vix ullum esse morbum, *sive* acutum *sive* chronicum, in quo, initio vel in decursu, usurpanti non debeant cathartica ad digestionem restituere.

Morbi saburrales.

Ephemera nauseativa.
Tertiana emetica.
Eclampsia a saburra.
Ephiales a saburra.
Tussis stomachalis.
Dyspnœa a stomacho.
Aghestia a saburra.
Leipsothymia a saburra.
Amphimerina singultuosa.
Tremor a saburra.
Hysteria a saburra.
Oscedo stomachica.
Tussis convulsiva.
Asthma stomachicum.
Anorexia a saburra.
Syncope stomachica.
Catarrhus epidemicus.
Cardialgia a saburra.
Lumbago a saburra.

Emetica.

Tartarus stibiatus a gran. j. — v. j. vel gran. ij. ;
iv. vj in aquæ unc. xij. : sumat quartam vel tertiam partem omni quadrante horæ, usquequo vomitio succedat.

Vinum emeticum a drachm. j. ad vj. vel viij. ; vel misce vini emetici unciam & semissem in aquæ cyathis tribus, quatuor ; sumat unum omni quadrante horæ.

Nunquam præscribantur emetica nisi explorato abdomine, num doleat, tensum sit ; utatur æger clysmatis, aqua pulli ; & sæpius phlebotomia præmissa, si sit plethora.

das, obstructions viscerum referendas, cacochyliam in sanguinem transfusam aut saburram eliminandam; cavendum tamen ab irritantibus, ubi stomachus aut phlogosi, tensione, nimia sensibilitate, siccitate affectus, ubi adeit similis status in intestinis; aut alvus est obstipata: præmitti debent in his casibus apozemata, juscula humectantia, clysmata emollientia, aqua pulli, phlebotomia; aut adhiberi tantum cathartica ecoproetia, pulposa, aquosa, gummosa, abstinendo a resinosis.

Ubi vero pondus stomachi, cardialgia, nausea, oris amaror, vereiginosa cephalalgia, vomitoria adhibenda suadent, eadem cautelæ adhibendæ sunt, & emetica multum diluta partibus vicibus in usum vocanda: sic vini emetici uncia in aquæ uncis xij. vel xv. dividatur in duas doses; & dimidia pars omni quadrante horæ tepide sumatur, facilis & plenaria inde excitetur vomitio; aut si grana quatuor aut quinque tartari stibiati in aquæ unc. xij. diluta, in tres doses divisa, simili intervallo hauriantur; ypecacuanha etiam pulverata a gran. xv. — xxv. ut plurimum a dulcoris satis evacuat; in multis casibus oxymel scilliticum ad unc. j. idem præstat; dum vomitio accedit multo tepide potu ea juvenanda est. *Boerhaave Aphor. 642. Therapeut. 1102. ad 1122.*

Nausea a saburra.
Vomitus a saburra.
Cholera a saburra.
Diarrhœa vulgaris.
Ptyalismus nauseosus.
Ptyalismus Laponicus.
Flatulencia nidorosa.
Ephidrosis febrilis.
Cephalalgia stomachica.
Colica accidentalis.
Vertigo stomachica.
Vomitus a crapula.
Vomitus rabiosus.
Diarrhœa stercorosa.
Diarrhœa febrilis.
Ptyalismus a pyroxi.
Flatulencia acida.
Dysodia stomachica.
Ephidrosis a saburra.

Semen radiani consutum ad drachm. j., vel in decocto ad drachm. ij.

Oxymel scilliticum ad unc. j. & semissem.

Aqua vitæ Germanica ab unc. semisse ad unc. j. & semissem.

In chronicis; Symplicium emeticum Glandieri a gutt. xv. ad xij. pro pueris & mulieribus.

Ypecacuanha forma pulveris a gran. iv. ad xxv. ; ubi adstringenda alvus forma infusi ad drach. j. in aquæ unc. viij. pro duobus dosibus; ad gran. ij. vel iij. acuit cathartica: ad gran. in opiatris viscosa primarum viarum everrit, tonum restituit usa iterato.

Terpethum minerale ad gran. ij vel iv in prophylaxi hydropnobia.

Extus Unguentum de arthanica forma lixus super abdomen.

Magna aque Vallensis, Alefensis copia confer-tim ingesta vomitionem excitat in chronicis non serosis sed siccis: Bellilucanæ in serosis atonis.

Cathartica mista in subiectis sensibilibus.

Extractum cassiæ a semiuncia ad unc. ij.

Cassiæ pulpa ad unc. ij.

Manna ab unc. j ad ij.

Tamarindi decocti pro aque cyatho ad unc. j. Pruna Damasæna cocta pro aque cyatho, num. xij.

Oleum amygdalarum dulcium in morbis inflammatoriis bis vel ter in die ab unc. j ad ij; sed recentissimum sit adeoque non limpidum.

Aque acidulæ Vallenses, Alefenses, in morbis pyreticis, intra bihorium ad libras viij calide bibantur.

Aque thermales Bellilucanæ, in morbis frigidis, ad libras vi vel viij intra bihorium calide bibantur.

Aque acidulæ æstate apud biliosos, siccos, calidos, acuantur manna, rheo, vel sale cathartico; thermales hieme apud frigidos, pituitosos acuantur sale cathartico, jalappæ, scammonio, pulvere de tribus &c. tartaro vttriatato, cremore tartari.

Cathartica medioetia edulcorantur infuso florum violæ, malvæ, decocto cassiæ, tamarindorum, polypodii, cuscute, aliquot aque acidulæ cyathis simul assumptis: Initio acutorum acuantur uno grano tartari stibiat vel vini emetici drachm. j, vel jalappæ gran. x, vel scammonii gran. ij, iij, vel sali cathartici drachm. j, ij, vel cœnæ jalappæ, gr. j, ij, magnesiæ alba ad drachm. j vel ij, tertia foliata tartari ad drachm. j, ij.

Sal Glauberi, Epfamenfæ, Sedlicenfæ, Rupel-lenfæ, polychrestum ad nne. j & semissem in aque libra una.

Medieamina vix apud nos forma sicca præferuntur, saltem in acutis & pyreticis morbis; adhiberi possunt in pituitosis & frigidis.

Sennæ folia in aque cyatho infusa ad drachm. j, ij, iij: pulvis ingreditur pilulas cochias: corrigi-tur acrimonia sennæ si infundatur in limonata, decocto prunorum, dactylorum, sebesten, succum, cassiæ, tamarindorum. Folliculi sennæ eadem dosi fere eadem vi agunt; horum infusum nigricat.

In chronicis, pituitosis, frigidis.

Aloes, pilulæ aloeticæ a scrup. j -- drachm. j.

Pilulæ cochis, a semi-scrupulo ad ij.

Pulvis Cornachini vel de tribus, a scrupulo semisse ad drachm. j.

Tabelle de citro, diacarthami, a drachm. ij -- vi.

Sawages Nefologia Methodica Tom. II.

Rhei & cremoris tartari, ana, gran. xl. fiat pulvis.

Cathartica adstringentia ex cheo, chapontico, myrobalanis.

Rheum in chronicis pyreticis a gran. x. ad scrupul. ij. forma pulveris: infusum pro aque cyatho a semidrachma ad drachmam unam & semissem, additur cremor tartari pari dosi.

Hydragoga.

Jalappæ scrupulus j diutissime teratur in mortario cum sacchari pauxillo; sumatur pulvis, superbibendo potum theiformem.

Resinæ jalappæ gran. ij diutissime terantur in mortario cum sacchari frustulo & tribus amygdalis; adde syrupi capillorum venecis drachmam pro infante omnia cathartica cecusante.

Resinæ jalappæ gran. xij, scammonii grana iij, contunda cum frusto sacchari in mortario marmoreo quam accuratissime, fiat emulgio aquam superaffundendo ad unc. vi; potus purgans minime ingratus.

Scammonii gran. x vel xv contunde in mortario marmoreo cum amygdalis dulcibus ij, vel cum succi limonium unc. j. superaffundendo emulsionis ex amygdalis & feminibus frigidis unc. x; fiant doses duæ.

Cremoris tartari uncia una injiciantur in lactis bullienti libra una; serum percolatum bibatur: purgat jucunde.

Syrupus de rhamno cathartico ab unc. j -- ij. In nostris regionibus apud juvenes biliosos, siccos, ætate, hæc cathartica acra, pulveris aut boli forma, tormina, diarrhæas, dysenteriam excitant: præstant largæ decocta vel infusa mediocrium & mitium adhibenda.

Arthriticis resina guaiaci a drachma semisse ad drachmam unam.

Pro infantibus manna in aqua soluta ad unciam, syrupus de ciehorio composito cum rheo ad unciam unam.

CLASSIS UNDECIMA.

MORBI PITUITOSI;

Maladies glaireuses.

Pituita est humor mucilaginosus, viscidus, qui interiora narium, œsophagi, stomachi, intestinorum, vesicæ, pulmonis, &c. oblinat, a siccitate & aeredine defendit; verum si uberius fuerit ille mucus; insipidus, tenax, tunc nervosas papillas obducens, odoratum, gustum, samem, litum obscurat vel tollit, stomachum aggravat, digestionem præpendit, vomitus, diarrhæas pituitosas excitat; in ureteribus; vesica, pyurias, mucosas excitat; in articulis hyarthrum, in aliis alia incommoda producit.

Ad sanitatem requiritur ut succi digestivi, saliva, bilis, crassi salina, sapida gaudeant, ut

Z

dissolvant alimenta, motum peristalticum & famem excitent; si vero predominetur mucus blandus, inertis, in primis viis & in massa sanguinea, languent functiones ab his humoribus pendentes, inde exurgit digestio vitiosa, glutinosum chylum inducens, sanguinis & omnes humores eandem indolem retinent; hinc urinae cruditas, aquositas, faciei pallor, functionum tarditas, obstructions variae.

Alimenta vegetabilia, acida, terrea, farinosa non satis fermentosa, animalium partes gelatinosae, pingues, mucosae, idem vitium inducunt, maxime si concurrat vitis defixa, debilitas, senectus, vasorum laxitas, nativa bilis, salivae vapiditas, insipiditas.

Morbi, quos pituita copiosior excitat, dum est in massa sanguinea, sunt sequentes.

Morbi pituitosi. { Chlorosis pituitosa.
Sclerothyre pituitosa.
Catarrhus frigidus.
Anasarca Americana.

Arthritis chlorotica.
Paraplexia rheumatica.
Hypocondriasis pituitosa.

Si in origine nervorum aut organis adsit, oriuntur.

Morbi pituitosi. { Cophosis a comate
Apoplexia pituitosa.
Coryza phlegmatorrhagia.
Coryza catarrhalis.

Pica, malacia.
Anorexia pituitosa.
Epiphora sebacea.
Pyralismus gravidarum.

In pulmonibus, gutture, nascuntur

Morbi pituitosi. { Tussis gutturalis.
Dyspnoea hydatidosa.
Dyspnoea pituitosa.

Stertor asthmaticus.
Asthema humidum.
Anacatharsis asthmatica.

Demum in primis viis sunt

Morbi pituitosi. { Vomitus pituitosus.
Cœliaca mucosa.
Colica pituitosa.

Cardialgia bradypeta.
Diarrhoea pituitosa.

Et in aliis organis

Ischuria phlegmatica.
Leucorrhœa Nabothi.
Pyuria viscida.

Ischuria thromboides.
Pyuria mucosa.
Hydarthrus synovialis.

Ad curandos morbos pituitosos 1. prævertenda est mucosi illius humoris productio usu cibi & potus bene fermentati, sale & aromate conditi, stomacho grati; nec non victu ex carnibus animalium; avium, piscium, &c. quæ ad calefactionem vergunt; 2. exercitio corporis & animi paulo vegetiori, quo calor generatur in corpore, mucus dissolvitur, crassa attenuantur, cralis salina extricatur, viscosa resolvuntur, & potissimum vasa & viscera roborantur; huc frictio, equitatio, deambulatio conferunt.

Medicamina vero quæ in his conducunt sunt 1. stomachica & omnia roborantia partibus aromaticis calorem & motum in fluidis viscosis excitantia, imprimis martialia, theum, salia alkalina fixa & volatilia, saponacea, amara, ut enula campana, aloes, balsama, resinosa, demum evacuantia quæ abstergunt mucum a pulmonibus, ut bechica incidentia; a viis urinariis, ut diuretica calida; ab intestinis, ut cathartica salina, non neglectis tamen diluentibus calidis quæ pituitæ tenaci fluxilitatem conciliant.

CLASSIS DUODECIMA.

MORBI CATARRHALES;

Morbi catarrhales.

IN hoc differunt morbi catarrhales a pituitosis 1. quod a frigore perspirationem reprimente subito corpus calefactum adoriens nascantur; 2. quod lympham inspisset quidem illud frigus, sed levem simul phlogosum in vasis infarctis excitet, unde dolor, levis intumescencia, febricula; 3. quod materia sudoris aut perspirationis retenta acredine sua dolores intendat: morbi itaque catarrhales recentes sunt phlogisticis sed mitioribus affines, inveterati vero pituitosi ferme evadant; curantur initio phlebotomia, diluentibus calidis, diaphoreticis, victu tenui; inveterati vero exigunt sudorifica, suffusis, ductis ex aquis theriacalibus, tegumenta lanae, calida, sicca, frictions.

Eph-

Morbi catarrhales.

Ephamera a frigore.	Synocha catarrhalis.
Synochus hyemalis.	Amphimerina laeica.
Amphimerina catarrhalis.	Amphimerina anginosa.
Quotidiana catarrhalis.	Pleuritis catarrhalis.
Peripneumonia catarrhalis.	Contractura catarrhalis.
Serabismus catarrhalis.	Rigor a frigore.
Rigor catarrhalis.	Pleurodyne catarrhalis.
Sternutatio catarrhalis.	Tussis catarrhalis.
Asthma catarrhale.	Orthropnea pseudo-peripneumonica.
Angina bronchus.	Angina nasalis.
Rheuma vulgare.	Anosmia catarrhalis.
Aphonia a rauedine.	Paraphonia catarrhalis.
Carus a frigore.	Catarrhus ferrinus.
Catarrhus epidemicus.	Catarrhus caninus.
Stupor a frigore.	Algor externus.
Cephalalgia catarrhalis.	Cephalalgia anemotropa.
Hemicrania coryza.	Oralgia catarrhalis.
Colica a frigore.	Rachialgia ab adiapneustia.
Diaploopia a catarrho.	Hypochondriasis algida.
Hæmoptysis catarrhalis.	Peyalismus catarrhalis.
Diabetes Anglicus.	Anasarca ab adiapneustia.

CLASSIS DECIMA TERTIA.

MORBI LACTEI;

Maladies lacteuses.

Chylus in puerperis & nutricibus redundans, in sano corpore elaboratus, partim in mammis secretus abit in lac mammarum, & in colo uterino lac uterinum præbet quod partim cum lochiis foras post partum emittitur. Utrumque lac, si foras non emittatur, & in massam san-

guinis redeat, diversa producit incommoda & morbis lacteis materiem suppeditat.

Lac autem, cum ad acidam fermentationem sponte vergat & ad coagulum, excitat, in mammis tumores inæquales, dolorificos, inflammatorios, inde abscessus scirrhosi, canceri; idem lac in glandulis axillarum, inguinum hærens, in textu celluloso aggestum, cedematæ, phlegmatias, obstructions inducit; ast acore suo diversos dolores, exanthemata, acidum odorem inducit.

In alumnis etiam lac accensum, corruptum, coagulatum, vomitus, cardiacalgia, diarrhoeas, aliaque genera morborum producit, qualia sunt.

Vomitus lacteus.
Diarrhoea lactentium.
Colica lactea.

Colica chylofa.
Miliaris lactea.
Aphtha lactucina.

In nutricibus vero & puerperis oriuntur a lacte suppressio.

Ephamera lactea.
Miliaris puerperarum.
Metritis lactea.
Hysteralgia lactea.
Mastodynia ab spargonosi.
Mastodynia a terrore.
Mania lactea.
Epiphora lactea.
Pyuria lactea.
Galactorrhoea erronea.
Phlegmatia lactea.

Tritophya lactea.
Pleuritis lactea.
Hysteralgia ab spargonosi.
Mastodynia pilaris.
Mastodynia butyrofa.
Ischias ab spargonosi.
Ephidrosis lactea.
Enuresis ab spargonosi.
Galactorrhoea mammarum.
Galactorrhoea serosa.
Ascites chylofus.

Indicationes adimplendæ sunt: ut las alumnis suis præbeant matres; adeoque excernantur per vias a Sapientissimo Numine stabilitas: sic enim omnes morbi lactei prævertuntur, atque si jam suppressum lac in alias partes deviaverit factu assiduo vel alumni vel catelli vel suæricis in mammæ ejus fluxus est revocandus: Si vero tardius ad hoc remedium & frustra confugas

puerpera, nec multum fluxerint lochia, ptisanis diureticis & catharticis est insistendum, modo nulla uteri phlogosis impediatur, in quo casu phlebotomia præmittendæ sunt, diætæque tenuis imperanda.

In morbis lactentium s. cavendum ne lacte copiosiori ingurgitentur; ne nutrices pathematibus, ebrietati indulgeant; ne lac fluxilius, acce-

Z. 2.

are suppeditent; 3. lenia purgantia in vomitu lacteo, diarrhoea lactea adhibeantur, ut syrupus de cichoria, manne; 4. dein ad absorbentia terrea deveniendum est, ut cretam, oculos cameronum, corallia, quæ ad scrupulos duos sumenda cum syrupo stomachico vel conservâ adstringente, non acida. De his vide curas speciales *œdematis lactei, mastodynia pilosa, ephemera lactea &c. in Nosologia.*

CLASSIS DECIMA QUARTA.

MORBI SEROSI.

Maladies serenses.

Seri nomine intelligimus humorem aqueum subpellucidum sero lactis similem, aut ipsam lympham qualis in patella a thrombo purpureo separatur, qui humor, cum sanguis in patella per diem integrum remansit, est æqualis quoad pondus thrombo residuo; verum hæc proportio mutatur in morbis serosis; in illis serum vel ubique exundat, vel in certis locis contra sanitatis leges accumulatur, vel in textu celluloso & inde anasarea, in seroto hydrocele, in cerebro hydrocephalus, in oculo hydrophthalmia, in pectore hydrothorax, in pericardio hydrocardia, & sic deinceps: cum autem serum sit vehiculum salium, ubi est ærimonia in sanguine serum acris solito evadit, & urinæ ac sudoris quam simile est, nisi quod igni expositum vel vini alcoholi mixtum concrevisit in albumen.

Cum sanguis per venas expeditæ ad eor revertitur, serum e vasis lymphaticis redux hæc venas facile subit & cum eo circulat; at tum sanguis in venis hæere cogitur ob ligaturam, ut patet experimento Lovveri, vel ob obstructions, serum in suis vasis resistens, vel effunditur in cavis vicinis, vel intra textum cellularem accumulatur. Hæc seri intra textum cellularem collectio in morbis chronicis familiaris est, quoties vires circulationis languide evadunt, serum enim illud propria gravitate vires circulationis in minimis vasis superans, eo versus ændit quo jubet gravitas, nec facile a paribus imia ad superiores ascendit; hæc imarum partium phlegmatia sed œdematosus tumor qui horis vespertinis apparet, dum maturis ea intumescit pallida, pustacea, partes omnes, præsertim molliores ut palpebras, labra, invadit. Initio quidem anasarcæ aut phlegmatiz quæ subito quandoque invadit, textus solidorum ab hujus seri stagnatione non est remollescit & facultas vitalis integra potest tolerare phlebotomiam, maxime cum a plethora pendet resistētia circulationis lymphæ ejusque est stagnationis causa; verum ubi remollescit sunt partes solidæ, ubi chronicis morbis succedunt œdematosi tumores aut feri collectiones, phlebotomia est maxime noxia, quæ vires cordis languidas ulterius imminuit.

Hi morbi sunt sanatu difficillimi, quia natura organis flaccidia debilitur utitur, & ea debet ma-

ximam in omnis morbi curatione operam præstare; hac cooperante prospere cedunt omnia tum morbus sanabilis sit; ea vero quiescente & debilitata frustanea sunt ut plurimum artis conamina.

Indicationes curativæ sunt 1. robur addere organis vitalibus quæ obstructionibus impedita vel sero dudum remollescit languide moventur; 2. obstructionibus referre thrombum purpureum in his morbis densatum & coherens attenuando, dividendo; utrumque præstant omnia mentalia quæ solidis robur, fluidis attentionem conciliant: idem sed debilius efficiunt stomachica, tonica, ut cinnamomum, cassia lignea, saffras, santalum album, china; pulvis ex cinnamomo & limaturæ ferri in his præstantissimus est; sumitur quotidie in ossa ad gran. vi. x. &c. ex rhei & limaturæ ferri ana drachma j. in aquæ libris ij. infusa sit pitana, cujus longus usus utrumque roborandi aperiendique, necnon digestivas vires reparandi scopum attingit. Aperiencia etiam seu diuretica calida crassum sanguinis textum attenuant; hæc pertinent radices asparagi, rusci, feniculi; cortices radicis eryngii, ononidis, feniculi, calcitrapæ; salia neutra, ut Glauberianum, Epistemicum, Rupellense, tartarus crudus; imprimis vero terra foliata tartari, quæ a drachma semisse ad drachmam unam non solum obstructa reserat, verum etiam urinæ alvumque feliciter movet. Exterius vero exsiccat & roborant partes phlegmatia remollescit thermarum lutum calide admotum, duccæ, arena maris calore solis fervida, surfur macrum calefactum, spiritus vini calefactus, sacculi plantis aromaticis, ut salvia, thymo, serpillio, inaro, stoechea, roremarino &c. turgidi, frictions ex pannis laneis siccis, calidis, fumus plantarum aromaticarum super prunas ardentes projectarum, item fumus ex succino &c.

Sed alter scopus est serum superfluum foras amandare, & 2. novi generis præpedire. Serum exundans foras mittitur in robustis ope cathartico & emetico, in debilibus ope diuretico; huc etiam spectant tum paracentesis in ascite, tum scarificationes in quibusdam casibus.

Inter cathartica laudantur potissimum syrupus de rhmano cathartico ad uncias duas, vel purus, vel minori dosi cathartici vulgaribus additus, aqua vitæ Germanica, succus radieis iridis Germanicæ, sambuci ab unc. j. ad ij, bæccæ thamni cathartici, jalappa, scammonium acido citri mitigatum &c.

Inter diuretica aselli decem aut viginti in sero lactis, succi expressi ex recedentibus herbis cichorii, apii, symphitæ aquatilis contusis, & cum limaturæ martis ac asellis aliquandiu relictis, qui dein expressi ad uncias iij. hauriuntur, juscula parata ex radicibus aperiētibz, foliis eichorii, scolopendræ, additis caneris fluvialibus, asellis, sale Glauberiano j. ac oxy-

mel.

vel scillitium ad drachmas duas bis vel ter in die sumptum; lixivium cinerum genistæ, stipitum fabarum ex vino albo ad uncias tres sero & mane bibitur,

Sed si ascites vel anasarca pendeat a morbo exanthematico represso, ut ab scabie repulsa,

a rubecula &c. *Vide cura exanthematicorum.* Si a virulento quodam morbo foveantur, ut ab scorbutico, hujus primarii morbi remedia adhibenda sunt simul cum hidragogis. Si obstructio, (menostasis his ansum dederint, remedia his propria advocanda sunt.

Morbi serosi.

Hæctica hydropum.
Convulsio ab hydrocephalo.
Eclampsia ab hydrocephalo.
Asthma cachecticum.
Orthopnoea ab hydropneumonia.
Hydrothorax vulgaris.
Amaurosis pituitosa.
Cophosis serosa.
Anorexia cachectiarum.
Hemiplegia serosa.
Paraplexia ab hydrorachitide.
Asthenia cachectica.
Syncope ab hydrocardia.
Lethargus a frigore.
Cataphora sube.
Cataphora hydrocephalica.
Carus hydrocephalicus.
Pleuritis hydrothoracica.
Tremor ab hydrocephalo.
Epilepsia ab hydrocephalo.
Orthopnoea hydrothoracica.
Hydrothorax chylosus.
Amblyopia hydrophthalmica.
Dysœcia ab hydrotympano.
Anæsthesia ab hydrorachitidi.
Paralysis serosa.
Asthenia hydrocephalica.
Asthenia infantum.
Lethargus febrilesequens.
Cataphora somnolenta.
Cataphora scorbutica.
Carus ischurioticus.
Apoplexia pituitosa.
Cephalæa serosa.
Amentia serosa.
Amentia morosis.

Hepatitiora vera.
Diarrhoea serosa.
Ephidrosis spontanea.
Pyralismus a laxitate.
Diabetes hystericus.
Dyspermatismus serosus.
Enuresis critica.
Enuresis infantum.
Otorrhœa serosa.
Hydrocephalus interior.
Ascites urinosus.
Hydrometra gravidarum.
Hydrometra ascitica.
Chlorosis virginea.
Anasarca periodica.
Anasarca Americana.
Lumbago ab hydrothorace.
Amentia senilis.
Menorrhagia decolor.
Melæna hepatitiora.
Diarrhoea urinosa.
Epiphora frigida.
Pyralismus urinosus.
Diabetes artificialis.
Enuresis catamenialis.
Enuresis paradoxa.
Dysuria gravidarum.
Hydrocephalus exterior.
Ascites vulgaris.
Hydrometra ascitica.
Hydrometra ovarii.
Chlorosis ab hydrothorace.
Anasarca a suppressione.
Anasarca hysterica.
Elcosis hydropum.

CLASSIS DECIMA QUINTA.

MORBI FLATULENTI;

Maladies ventueuses.

Flatu qui in humano corpore observantur fere omnes a ciborum fermentatione ortum ducunt, aut ab ipso aere cum edulis deglutito, qui ope bonæ digestionis & potissimum interventus salivæ debuerat intime cum chylo dissolvi & elasticitatem dependere, ut docent *Illust. Pringle* egregia experimenta; quique hujus rectæ digestionis defectu integram elasticitatem conservat, aut calore loci moxorem adipiscitur.

Deficiente itaque saliva quoad fluxilitatem
Sauvages Nosologia Methodica, Tom. II.

& vim saponaceam bene constituta, quoties scilicet ea viscosa est, nec alimentis rite dissolvendis apta, aer elasticus remanet, fermentatione in primis viis ex alimentis extricatur, hinc ructus, borborygmi, dolores, tensiones, tympanites aliæque mala plurima; intestina his flatibus diu distensa laxantur, inde novas stases patiuntur in his materiæ chymacæ, ubi iterum mora fermentescunt.

Curatio itaque morborum flatulentorum eo dirigi debet ut salivæ & succi gastrici fluxilitas & vis dissolvens restitatur, quod potus diluens ex infusione chamomillæ, veronicæ, chamædrysos; aquæ acidulæ salsæ Glauberianæ formæ, ut *Alesiensis*; *Vallenses*, efficiunt; sed si debitum exercitium, ut equitatio, deambulatio, ad solvendam fluidorum visciditatem, &

Z 3 aquæ

aquei potus cum ipsis intimam miscelam, non concurrat, frustranea sunt medicamina; magna etiam est habenda victus ratio, imprimis tubercinatio, edulia non fermentata, dulciora, pistorum ferula vitanda sunt; ossis & carne tum assata tum elixa ac potu aqueo vescendum, alvus laxa est servanda; cathartici efficacibus, rhubarbarinis raro utendum, aquea & salina multo præstantior sunt. Ubi vigent dolores, præmissa phlebotomia largus præsanæ emollientis potus calidus, ut aquæ pulli, est præscribendus, & si dolor

non cesserit ad laudanum confugiendum est. Alterius generis est meteorismus qui in febris putridis & malignis accidit; a putrefactione expanditur aer & extricatur in majori copia quam absorbetur. Aerem a putridis vaporibus destrui docent experimenta *Halsii*; verum ubi sunt mixta putrescibilia multo acri commixta calore & putredine ea statim rarefunt, ut patet ex meteorismo cadaverum, unde corruptæ aquæ innascent, ipsæ carnes putridæ leviores evadunt aqua, ut *Illustriß. Pringla* expertus est.

Morbi flatulenti.	Enteritis flatulenta.	Pneumatosis febrilis.
	Dyspnœa tympanica.	Physometra humida.
	Pleurodynia flatulenta.	Tympanitis abdominalis.
	Cardialgia lactentium.	Tympanitis ascitica.
	Colica flatulenta.	Meteorismus stomachi.
	Singultus flatulentus.	Meteorismus hysterici.
	Dyspnœa a pneumatia.	Hypochondriasis flatulenta.
	Cardialgia flatulenta.	Cholera flatulenta.
	Gastrodynia flatulenta.	Flatulentia nidorosa.
	Asphyxia flatulenta.	Flatulentia accidentalis.
	Mastodynia emphysematosa.	Pneumatosis artificialis.
	Ileus phytodes.	Physometra sicca.
	Flatulentia acida.	Tympanitis intestinalis.
	Flatulentia hypochondriaca.	Tympanitis enterophytodes.
	Pneumatosis hysterica.	Tympanitis Styracis.
		Meteorismus abdominis.

Medicamenta terminativa.

Aqua menthæ composita, a drachm. ij ad unciam j.
 Aqua imperialis, generalis, theriacalis, a drachm. j ad iv.
 Aqua naphæ, aqua cinnamomi hordeata, a drachm. ij ad iv.
 Tinctura absinthii, balsamum vitæ Hoffmanni, a gutt. x ad cxxx.
 Elixirium Garus, a drachm. ij ad iv.
 Syrupus de mentha, a drachm. ij ad unc. ij.
 Opjata Salomonis, a scrupulo j ad drachm.
 Oleum essentielle anisi, a gutt. ij ad vj.

Anodyna.

Syrupus papaveris albi, adultis, a drachm. iv ad unc. j.
 Syrupus de karabe, a drachm. iv ad unc. j.
 Caput papaveris albi decoctum, num. j.
 Extractum capitum papaveris rhœados, a gran. x ad x, xx.
 Extractum opii, a quarta parte grani ad gran. j, vel assuetis plura.
 Laudanum solidum eadem dosi; opium eadem dosi.
 Laudanum liquidum, adultis, a gutt. vj ad xx; & assuetis plures.
 Philonium Romanum, a scrupulo j ad drachm. j.
 Theriaca recens, a gran. xx ad drachm. ij.
 Pilulæ de cynoglossa, a gran. ij ad viij.
 Camphora a gran. iij ad xv, in hystericiis, convulsivis, maniacis.
 Moschus a gran. j ad xij.
 Sal sedativum, a gran. iij ad xx in hystericiis.

Extus oleum chamæmeli, liliorum, anethi, fœli, amygdalarum; unguentum de Althea, ceraturn Galeni; butyrum recens de cacao; pinguedo urfi, porci, vituli, humana; lac. Semen lini, sænugræci; flores & folia violarum, malvæ; radices altheæ, bulbi liliorum.

CLASSIS DECIMA. SEXTA.

MORBI PURULENTI.

Maladies purulentes.

Pus est humor albus, subviscidus, inodorus, aqua ponderosior, qui ex partis inflammatione suppuratione exurgit. *Ichor* est humor fortidus, liquidior, serosus, diversicolor, putris, brunneus, viridescens, luteus, nigricans, qui ex ulceribus cariebusve exsillat: si rubellus sit a tinctura sanguinis *sanies* vocatur: si ex ulcere gangrenoso omnino putrido & nigricans, sit *tabum* dicitur.

Puris materia exsiccata *crusta* vocatur: si a caustico facta, sit, *eschara* est.

Quomodo vero distinguatur a pure, humor febrilis, qui sine prævia inflammatione ex lupis, favis, tinea, cryptis, tarsum, ophthalmi effluit, qui in morbis catarrhosis expectoratur viscosior pure, non ut pus, resolvable in griseum pastam, hoc inquirendum restat.

Omnis humor purulentus, diu corpore retentus, tandem foetidus, acer, corrosivus, putris evadit; ex huius præsentia irritantur nervi: hinc

oborta pyrexia foras forma sudoris enurens, diarrhoea, emittere, natura conatur; hinc oriuntur tabes, amphimerina hectica, diarrhoea colliquativa, sudores colliquativi, phthises &c. Si suppurantur pustulae hepaticae, variolosa, leprosa; si psillyanae, erythemata, similiaque vitia cutanea puri originem præbuerint, pus illud est magis acre, magis virulentum; si vero scrophulosi tumores, lupiae, huius aniam dederint, pus est mitius, viscosius, a putredine magis alienum, nec pyrexiam lentam facile excitat.

In omni morbo purulento exitus est occisime puri facti, ichori, saniei, parandus; ulcera detergenda; fistulae aperiendae, dilatandae, cuniculi referandi, ne in textum cellularem diffusa materies morbosica novas strages edat & ulterius diffundatur, aeris accessus, quo putredo intenditur, caute creeri debet; quod extus optime præstant balsamica; alkaliescentia & putredo accenda, cui scopo diuretica, balsamica, vulneraria potu theiformi & lotu præstant; deinde vero demulcentia, incrassantia, lacticina dissolutionem ulteriorem humorum avertunt; successu enim temporis cum purulentia massam sanguineam inficit, hæc massa resolvitur, & lymphæ acris & dissoluta diarrhoeas colliquativas, sudores foetidos, uberrimos excitat. Vide curam in acrimoniis dissolutis.

Morbi purulenti.

Ephmera vulneraria.
Amphimerina variolosa.
Cephalitis spontanea.
Cephalitis cerebelli.
Cynanche ulcerosa.
Hepatitis suppurans.
Palpitatio apostematosa.
Eclampsia traumatica.
Tussis phthisica.
Dyspnoea a liene.
Dyspnoea traumatica.
Amphimerina tabidorum.
Trioxophya variolosa.
Cephalitis traumatica.
Carditis spontanea.
Peripneumonia phthisicorum.
Convulsio a capitis ictu.
Rigor a purulentia.
Singultus purulentus.
Dyspnoea a vomica.
Dyspnoea a stomacho.
Orthopnoea ab empyemate.
Pleurodyne phthisica.
Empyema a peripneumonie.
Empyema mediastini.
Empyema intercostale.
Amaurosis a synchysi.
Paraphonia ulcerosa.
Syncope ab apostemate.
Hemicrania ocularis.
Hemicrania purulenta.
Ophthalmia unguis.
Odontalgia cariota.
Dysphagia ulcerosa.

Pyrosis ulcerosa.
Hepatalgia intercus.
Splenalgia suppurata.
Nephralgia a carie.
Hysteralgia ulcerosa.
Hysteralgia purulenta.
Mastodynia carcinomatosa.
Lumbago ab arthroace.
Lumbago apostematice.
Ischias ex abscessu.
Peyalismus aphthosus.
Proctalgia a fistula.
Proctalgia Brasiliensis.
Pudendagra carcinomatosa.
Angina suppuratoria.
Pleurodyne ex abscessu.
Empyema a vomica.
Empyema diaphragmatis.
Catarrha purulenta.
Anosmia ab ozena.
Hemiplegia apostematosa.
Lethargus pulmonicus.
Hemicrania odontalgica.
Ophthalmia elecona.
Ophthalmia fistulosa.
Odontalgia a parulide.
Dysphagia tussiculosa.
Gastrodynia ulcerosa.
Hepatalgia apostematosa.
Nephralgia purulenta.
Nephralgia mesenterica.
Hysteralgia canerosa.
Hysteralgia ex abscessu.
Mastodynia apostematosa.

MORBI PURULENTI.

Lumbago psoadica.	Tenesmus ulcerosus.
Ischias a serie.	Ephidrosis hectica.
Ptyalismus purulentus.	Epiphora anchilopis.
Ptyalismus a padanchone.	Corryza virulenta.
Proctalgia a rhagadibus.	Anacatharsis a vomica.
Pudendagra ab ulcusculis.	Dysuria nephralgica.
Hypochondriasis phthisica.	Pyuria vesicalis.
Agrypnia a pancreate.	Pyuria a mesenterio.
Hæmoptysis a tuberculis.	Leucorrhœa fungosa.
Hæmatemesis a pancreate.	Leucorrhœa carcinomatosa.
Dysenteria a vomica.	Gonorrhœa pura.
Diarrhœa purulenta.	Otorrhœa purulenta.
Lienteria ulcerosa.	Dysodia ozæna.
Tenesmus Indicus.	Dysodia ab otorrhœa.
Tenesmus a carcinomate.	Tabes a vomica.
Epiphora xgilopis.	Tabes apostematodes.
Corryza purulenta.	Phthisis siccæ.
Anacatharsis phthisica.	Phthisis scrophulosa.
Anacatharsis puriformis.	Phthisis a vomica.
Pyuria renalis.	Phlegmatia ulcerosa.
Pyuria a thorace.	Phlegmatia elephantiasis.
Leucorrhœa ulcerosa.	Ascites purulentus.
Leucorrhœa syphilitica.	Ascites intercus.
Galactorrhœa purulenta.	Ischuria nephropyica.
Gonorrhœa virulenta.	Ischuria urethropyica.
Adophsia urethræ.	Frambæsia Americana.
Dysodia pulmonica.	Syphilis venerea.
Dysodia a tinea.	Tinea humida.
Tabes ulcerosa.	Lepra Asturientis.
Tabes renalis.	Elcosis variolosa.
Phthisis humida.	Elcosis scrophulosa.
Phthisis asthmatica.	Gangræna omnis.
Anasarca purulenta.	Hydrometra puriformis.
Phlegmatia Malabarica.	Ischuria cystopyica.
Phlegmatia cruralis.	Malis cornipedum.
Hæmoptysis phthisica.	Frambæsia Guineensis.
Stomacace purulenta.	Syphilis Polonica.
Menorrhagia ulcerosa.	Tinea favosa.
Vomitus ab ulcere.	Elcosis fistulosa.
Cœliaca purulenta.	Elcosis herpetica.
Lienteria aphthosa.	Elcosis hydropum.

CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

MORBI ACRIMONIOSI.

Maladies acrimonienses.

A Crimonia est in humoribus vel sanguine principiorum salinorum prædominium.

Principia salina sanguinis sunt vel ascescentia vel alkaliescentia, vel neutra ut muriatica; ast in sanguine vix unquam acor observatur nisi in morbis lacteis; acrimonia vero acida primarum viarum ad morbos saburrales attinet.

Hic itaque agitur de acrimonia alkaliescente vel muriatica sanguinis & humorum, & huc referendi sunt morbi omnes virulenti, biliosi, necnon purulenti; horum quipiam *melancholici* a Veteribus habebantur, quo nomine intelligebant eos qui ab atra bile excitantur seu ab humore acri simul & viscido, tum in primis viis

contento tum in massam sanguinis diffuso. Alii vero morbi acrimonioli sunt cum sanguine seroso seu dissoluto, & illi morbi possunt vocari lixiviosi, quia fluidum multo sale saturatum pro principio agnoscunt: sed lixiviosi recidunt ad purulentos vel malignos a dissolutione, ut sunt *scorbutici, exanthematici, castrenses* &c.

Acrimonia cum siccitate & ardore, qualis post labores immodicos, itinera ætate suscepta, usum potum ardentium, condimentorum, ut salis, piperis, maxime si concurrant genus vitæ quod sordacum, ignis præsentiam exigit, ut ars coquorum, vitriariorum, fabrorum ferrariorum, chymicorum &c. curatur diluentibus, qualia sunt in acuris infusa ex foliis floribusque emollientibus, violæ, malvæ; potus nitrati, aqua pulli; emulsiones; limonate vegetabiles ac minerales, phlebotomia præmissa, ut calor, sitis, pyrexia contemperetur; necnon præmissa cathartici antiphlogistica ex zamarindis, cassia,

man-

manna. In chronicis juscula ex pullo, ranis, carne vitulina, eum radicibus graminis canini, fragarum, feminibus frigidis majoribus ac minoribus quibus pulli venter infartus sit; serum lactis purum sero & mane per aliquot dies ad unelas xij haustum, aquae acidulae aestivo tempore per novem dies epotae intra triduum ad libras vj, vel pro potu ordinario ad libram j vel j & semiss. quotidie per mensem: balnea domestica praemissa catharsi antiplogistica per dies quindecim aut viginti, horis matutinis, in quibus per horam stet xger; & si maniacus xger fuerit balnea frigida: sunt ac frigida caput irrigetur.

Si acrimonia fuerit sine ardore aut eum sanguinis viscositate, pulsu tardo, duro, ut in melancholicis & hypochondriacis, massa sanguinis est diluenda sed simul resolvendo, adeoque

jusculis addenda sunt folia ex plantis diureticis antiscorbuticis ut cichorio, endivia, sylvestris, taraxaco; additis cancris fluviatilibus, millepedibus, ut viscositas sanguinis solvatur: martialia etiam parva dosi pisanis vel jusculis addantur: aquae acidulae sale Galuberiano sociae, serum lactis succo plantarum praedictarum onustum, aestate balnea domestica, caelo sereno, rustico, exercitia moderata ut equitatio, deambulatio adhibenda sunt; nec enim acrimonia sanguinis et viscoso potest educi, nisi viscositas medicamentis & exercitio resolvatur; autumno vero juscula ex testudinibus cum herbis nitrosis, lacte saponaceo turgidis; deinde vero lac asinum per mensem unum aut alterum usu repetitur.

Huc referendi sunt omnes morbi virulenti, exanthematici, metastatici, biliosi, purulenti, & praeterea

Pruritus omnis.
Cephalaea ab acrimonia.
Ophthalmia sicca.
Ophthalmia trachoma.
Pyrosis vulgaris.
Hysteralgia pruriginosa.
Proctalgia intertriginosa.
Pudendagra pruriens.
Pudendagra asura.
Pica chlorosantium.
Boulimia canina.
Boulimia esurigo.
Boulimia ab acidis.
Gonorrhoea libidinosa.
Gonorrhoea balani.
Flatulentia nidorosa.
Chlorosis infantum.
Anxietas tibiarum.
Ophthalmia angularis.
Ophthalmia pustulosa.
Odontalgia hamodia.
Colica lactentium.
Lumbago a satyriasis.
Proctalgia teneosmodos.
Pudendagra gonorrhoeica.
Pica infantilis.
Pica antiscorbuticorum.
Boulimia cardialgica.
Boulimia addephagica.
Polydipsia febrilis.

Morbi acrimoniosi.

Polydipsia hydrophobica.
Satyriasis neogomorum.
Nymphomania salacitas.
Nymphomania servor uteri.
Haematuria lateritia.
Dysenteria alba.
Dysenteria atrabilaria.
Diarrhoea Chilensis.
Diarrhoea hypercathartica.
Epiphora calida.
Diabetes legitimus.
Dysuria a diabete.
Dysuria primaria.
Satyriasis venerea.
Satyriasis chronica.
Nymphomania furibunda.
Nymphomania pruriginosa.
Haematuria spuria.
Dysenteria a cathartica.
Melæna atrabilis.
Diarrhoea febrilis.
Lienteria spontanea.
Epiphora ophthalmica.
Diabetes a vino.
Dysuria herpetica.
Dysuria venerea.
Gonorrhoea onerosa.
Flatulentia acida.
Tabes rachialgica.

CLASSIS DECIMA OCTAVA.

MORBI ORGANICI.

Maladies organiques.

Sunt illi qui ab organorum, seu partium solidarum, viscerum, glandularum evidenti dispositione, figura, magnitudine, tumore non inflammatorio nec purulento demum luxatione, hernia, prolapsu dependent.

Differunt ab emphracticis quod emphratici supponant obstructionem seu obturationem canalium vitio fluidi crassi cujus transitus denegatur, organici vero supponuntur figuram, volumen, situm cujusdam visceris aut organi, non vero vitium fluidi; differunt a phlogisticis defectu inflammationis, a purulentis defectu suppurationis.

Morbi organici sunt diuturni & curatu difficillimi, nisi vitium organicum operatione chirurgica tolli queat: sic cordis auricularum, aortae aneurysmata, tumores, ossificationes, poly-

pi, vomica, medicamentis nullis, nulli dixerit possit, morbi ab his principiis oriundi sunt im-
cedunt; & cum ars chirurgica, nihil prestare medicales, ut.

Morbi organici	{	Palpitatio.	Dyspnœa.
		Orthopnœa.	Pleurodynæ.
		Syncope.	Lumbago.
		Cardialgia.	Dysphagia.
		Cardiognus.	Dæmonomania.

Idem dictum esto de morbis a viscerum sar-
comate, excreſcentia, scirrho, cancro, glandu-
lis; a graviditate quatenus illi tumores pondere-
pressionem vicinas partes irritant.

Morbi organici	{	Dysphagia a sarcomate	Cardialgia scirrhusa.
		Colica a pancreate.	Colica mesenterica.
		Hepatalgia a sarcomate.	Hepatalgia Petitiæna.
		Splenalgia sarcomatosa.	Nephralgia monstruosa.
		Nephralgia scirrhusa.	Hysteralgia cancerosa.
		Hysteralgia scirrhusa.	Mastodynia portentosa.
		Dyspnœa hydropneumonica.	Dyspnœa tuberculis.
		Dyspnœa ab hydatidibus.	Dyspnœa a vomica.
		Dyspnœa a liene.	Dyspnœa a carie.
		Dyspnœa rachitica.	Orthopnœa a pinguedine.
		Orthopnœa a bronchocèle.	Orthopnœa cardiaca.
		Orthopnœa a lipomate.	Orthopnœa thymica.
		Orthopnœa polyposa.	Hydrothorax ab omento.
		Hydrothorax hydatidosus.	Cataracta omnis.
		Caligo a lupia.	Caligo a sarcomate.
		Caligo a cancro.	Caligo a pterygio.
		Caligo a pacheablepharosi.	Lumbago mesenterica.
		Proctalgia a mariscis.	Proctalgia a canceris.
		Pudendagra cancerosa.	Pudendagra a phimosi.
		Amentia a tumore.	Nausea a scirrhusa.
		Vomitus a steatomate.	Vomitus gravidarum.
		Vomitus a pancreate.	Vomitus ab hepate.
		Dyspermatismus refluus.	Dyspermatismus nodosus.
		Tabes ab hydrope.	Tabes a pericardio.
		Graviditas sarcoma.	Graviditas mola.
		Rachitis nodosa.	Amblyopia hydrophthalmica.
		Amaurosis scrophulosa.	Amaurosis venerea.
		Anosmia a polypo.	Anaphrodisia a mariscis.
		Paraplexia hydrorachitica.	Paraplexia ex gibbere.

Multi morbi pendunt a partium vel ossium, vel mollium e suo loco dimotione.

Morbi organici	{	Caligo a ceratocele.	Caligo a staphylomate.
		Orthopnœa a gastrocele.	Asthma a gibbo.
		Dyspnœa a gastrocele.	Enuresis hernioforum.
		Ischuria a cystocele.	Ileus herniosus.
		Nausea a gastrocele.	Pudendagra herniosa.
		Pudendagra a parorchidio.	

CLASSIS DECIMA NONA.

MORBI VULNERARI;

Maladies vulneraires.

Seu qui a vulnere, fractura, ictu, contusione,
&c., oriuntur; horum diagnosi est facili-
ma, ut plurimum; symptomata vero pertinent
atque ad dolores, qui eo diutiores sunt quo

plures nervi læsi sunt; quo instrumentum se-
cans est asperius & lacerare potius quam seca-
re aptum; post vulnera lacerata, punctura
cutis, extremorum digitorum; nervorum & ten-
ditum atrociore dolores excitant; ex his quan-
doque spasmi superveniunt; tertium genus sym-
ptomatum ad inflammationem pertinet, hinc
tumor, tensio, rubedo, calor, dolor, ut
plurimum cum pyrexia; inflammatio vero
vel resolvitur vel abie in suppuratum, vel
de-

demum gangrena terminatur: ultimum genus symptomatum vulnere stipantium est sanguifluxus, qui eo major quo majora vasa transversim secia sunt, & sub pari diametro ter major est ex arteriis quam ex venis.

Vulnera sclopetaria ceteris sunt pejora, maxime ob vehementem quam inferunt toti corporis compagi succussionem, inde erectismus, vasorum contractio per fascias aponeurosesque irritatas, hinc stases sanguinis gangræne excitandæ aptissi-

me, quibus maxime nocent spirituosæ, dolorem spasmus, gangrænam accelerantia.

Contusiones gangrænam facilius inducunt quam vulnera; imo si partibus mollibus ut abdomini inferantur, dum nulla sui in integumentis vestigia relinquunt, periculosos in vulneribus impressiones transmittunt; nam viscera undique contenta resistunt impetui & quæ magis resistunt ictibus ea magis patiuntur: actio enim reactioni æqualis est.

Morbi traumatici. { Pleuritis.
Cephalitis.
Carditis.
Ephmera vulneraria.
Phlegmone.

Peripneumonia.
Gastritis.
Cystitis.
Ecchymoma.

Morbi evacuatorii qui vulnera sequuntur, sunt

Morbi traumatici. { Hæmoptysis.
Abortus.
Vomitus sympathicus.
Hæmatemesis aneurysmatica.

Hæmaturia.
Hepatitis.
Hæmatemesis traumatica.

Morbi convulsivi etiam plures inde oriuntur.

Morbi traumatici. { Trismus.
Eclampsia.
Tetanus.

Convulsio.
Epilepsia.

Ex ictibus capiti, medullæ spinali inflicti, oriuntur,

Morbi traumatici. { Amaurosis.
Dysæcia.
Amentia.
Vertigo.
Hemiplegia.
Asphyxia.
Apoplexia.

Aphonia.
Cophosis.
Amnesia.
Musica.
Paraphonia.
Carus.
Rachialgia.

Ex vulneribus pectoris oriuntur,

Morbi traumatici. { Pleuritis.
Hæmoptysis.
Pneumotosis.
Orthopnea.

Peripneumonia.
Dyspnea.
Carditis.
Empyema.

Abdomine vero contuso, vulnerato,

Morbi traumatici. { Cystitis.
Hepatitis.
Abortus.
Hæmatemesis.

Gastritis.
Hæmaturia.
Ascites.

In vulnerum curatione diæta æque tenuis est servanda ac in morbis inflammatoriis, & si gravia contusa penetrantia, primis diebus a juve- nilibus abstinendum, & potus æquus tantum concedendus, phlebotomia, nisi æger a sanguifluxu debilitatus sit, sunt adhibendæ & sæpe repetendæ ut post operationes chirurgicas: expectanda etenim est pyrexia quam prævertere consultum est; pitana herbarum vulnerariarum convenit,

maxime si ecchymosis adæt; postura sanguinis puris exitui commodior est servanda; dolores & spasmi phlebotomiis, emollientibus, solerti vulneris mundatione, peregrinorum corporum, ut frustulorum ossis, cruoris, puris, glandium plumbeorum, &c. extractione, demum terebithinæ in ovi vitello solutæ affusione ac narcoticis intus sumptis sedantur.

Si nervi vel tendinis punctura spasmi ansam præ-

præbeat, nec hæc symptomata prædictis auxiliis cedant, ad transverſum nervi vel tendinis ſecti-
onem deveniendum eſt.

In vulneribus ſcelopetariis cavendum a ſpiritu-
oſis & calidis, quæ augment erechtiſmum: emollien-
tia; ſedantia; & ſi adhiæ ecchymoma ſolers ſci-
rificatio gangrænam tutius prævertunt. Sanguis
fluxus e vulnere, ſi exigue arteriæ & venæ tuſæ
ſint, permittendus ad arcendam inflammationem,
ſi uberior ſit linteo carpo cohibendus; aut ſi pe-
riculum urgeat arteria ſupra vulnus eſt compri-
menda; ſi ea majusculæ ſit & puncta, tranſverſim
ſecetur, quo factò retracta anguſtabitur, lamina
boleti ignarii mollis, vulgo *amaron* vulneri ap-
preſſa ſine incommodo ſanguisfluxum cohibebit,
modo appreſſa teneatur, ſpiritus vini purus eſſu-
ſus cruorem coagulando & vaſa criſpando ſan-
guinem ſiſtit: ſed e cavo peſtoris abdominiſve
reſſuens ſanguis non cohibendus eſt, quippe in
tro collectus in tabum putridum mutaretur, ſed
phlebotomiis, diæta tenuiſſima, quiete mentis
& corporis, maxime præcavendus.

Cætera ex ſcriptis *Heiſterii*, *Flammeri*, *Ludwigii*,
aliſque eruantur: hic enim ſumma rerum cacu-
mina attingere tantum animus eſt.

CLASSIS VIGESIMA.

MORBI EMPHRATICI;

Maladies d'obſtruction.

Sunt illi qui pendunt a canalium, vaſorum,
meatum obſtructione, immobilitate, imper-
foratione. Plurimi quidem ſtipantur tumore,
ſcirrho, inſarſu viſcerum, & ad organicos
videntur referendi: verum organici pendunt,
non a cauſa obturante canales, ſed ex eo quod
tumores, ſi adſint, alio quocumque modo noc-
ceant, ut gravando, irritando & in hoc diſ-
ſerunt ab emphraticis.

Aliæ ſunt obſtructiones evidentes, ſenſibus
conſpicuæ, ut pupillæ in cataracta; æſophagi
in angina, alvi in conſtipatione, ingeſtini in
ileo hernioſo; aliæ ſunt obſcuræ & vi ratioci-
nii, quandoque hypothetici deductæ; ut nervo-
rum in paralyſi, vaſorum in febre, æque, ſi
Neotericiſ quibuſdam credamus, maxima pars
morborum his obſtructionibus debetur, hinc ap-
paret quam fallax ſit methodus ætiologica.

Emphraxis pendet vel a vitiò fluidi tranſitu-
ri, vel a vitiò canalis tranſeundi, vel demum
a culpa principii moventis, ſine quo nullus

Heſtica infantilis.
Tetartophya ſimplex.
Tetartophya hepatalgica.
Quarſana ſplenetica.
Quarſana triplex.
Palpitatio chlorotica.
Hyſteria emphratica.
Cataracta antiglaucoma.
Cataracta membranacea.

Morbi emphratici.

tranſitus ſeu nullus fluidi motus dari po-
teſt.

Medicus itaque obſtructionem curaturus debet
huius cauſam prius indagare; ſit verbi gratia ve-
noſtalis ſeu catameniorum emanſio vel ſuppreſſio:
inquirendum eſt num uterus tono, rigiditate,
dolore, ſpſmos conſtricti ſanguini fluxuro exi-
tum deneger, in quo caſu ſemicipia, vapores
humidi, fomenta emollientia, anodyna, anti-
ſpſmodica hanc obſtructionem ſublatura ſunt,
quam emmenagoga & calida-irritantia valent in-
tendere aut in pejorem ſtatum mutare.

Si ſanguis non adſit ſuperfluus, ut in nutri-
cibus, convaleſcantibus, impuberibus, quæ va-
lent catamenia movere aut uteri obſtructionem
reſerare ſunt anæleptica, vires reſtaurantia. Si
ſanguis viſciditate peccet, tunc diluentia, mo-
ventia, emmenagoga vulgaria fluorem ſanguini
conciliabunt, & nullum erit ex ejus craſſitie ſu-
xuris catameniiſ impedimentum; ac ſedemum ſi
inertia, languor, mœror, debilitas principii vi-
talis in cauſa ſit cur ſanguis uteri vaſa non ſuf-
ficienter diſſendat, tunc exercitia, ſtimulantia,
ambulatio, equitatio catamenia reſtituunt.

Sæpius veto plura principia concurrunt ſimul
ad catamenia ſupprimenda, & tunc auxilia hu-
vitiis impugnandis propria debent combinari; ſic
ſi ſanguis ſero deſtitutus, ſeu, ut ajunt, ſecus
concurrat cum ſolidorum ſtriſtura & tono majori;
debent humectantia, diluentia cum anodynis
maritari; ſi inertia principii vitalis cum pletho-
ra concurrat, tunc phlebotomia, quæ plethoram
tollit, tollit & reſiſtentiæ principio vitali obla-
tam, unde ab hac ſarcina liberatum hoc princi-
pium velocius faciliſque impellet ſanguinem quo-
quoverſum & ſpecialiter in uterum. Si fluidorum
craſſities & viſcoſitates gummoſa concurrat cum
vaſorum ætonia & laxitate, tunc utriusque vitiò
medentur martialia, caſtoreum, reſinæ ſere o-
mnes.

Hinc patet quantum illudant tyroniſbus, qui
non ſatis diſtinctis ejuſdem morbi principiiſ ſe-
riem formularum huic medendo deſtinant, quæ
quantum in uno caſu proſunt, tantum in al-
tero nocere poſſunt. Nulla itaque eſt methodus
quæ ſine ſedula principiorum & cauſarum inveſ-
tigatone, ſeu ſolida & certa theoria nos poſ-
ſit in tutam præxim manuducere; ſed ante om-
nia inquirendum eſt nomen morbi, id eſt ſigna
cuiusque ejus ſpecierum propria; ſignotum enim
iliorum concurſus ut ſpeciem ita & ejus princi-
pium proximum a Medico debellandum determi-
nat.

Heſtica chlorotica.
Tetartophya ſplenalgica.
Quarſana legitima.
Quarſana duplex.
Erratica vaga.
Hyſteria chlorotica.
Cataracta vera.
Cataracta glaucoma.
Cataracta ſecundaria.

CLASSIS VIGESIMA PRIMA.

MORBI VERMINOSI

Maladies vermineuses.

Quæcumque insecta in corpore genita morbos inducunt; hi morbi vulgo a Medicis *verminefi* vocantur. Inter vermes proprie dictos novimus tantum gordium Medinensem, furiam infernalem, lumbricum strongylum, ascaridem vermicularem & lumbricoidem, fasciolam hepaticam & intestinalem, hirudinem medicinalem, tæniam solium, tæniam vulgarem, latam & caninam: Insecta illa sunt apoda, artubus ossibusque destituta & in corpore humano nidulantur.

Verum his affines sunt larvæ plurimorum insectorum volatiliū; nam ova masearum, v. g. ut papilionum, cum primum excluda sunt, exhibent insecta vermiformia, vel apoda vel pedata, quæ post aliquot exuvias dimittas in volatilia mutantur, postquam sub forma nymphae aut chrysalidis aliquandiu veluti mortui vixerint: insecta vero volatilia nos sæpe importune circumvolitant, os, nares, imo pedicem, aures, ulcera, fistulas avidissime subeunt, quædam, ut cæstri, pecorum corpora perfodiunt, & ibi ova sua deponunt, unde nascuntur tot larvæ in sinibus frontalibus caprarum & hominum, in auribus purulentis, in pustulis variolosis, in ulceribus neglectis quæ pertinent ad muscam carnarium, illæ enim larvæ, si in phiala vitrea aliquandiu steterint, in has muscas mutantur: sunt cæstri qui sinus frontales po-

stissimum in ovibus subeunt, ut fasciola eorum ductum choledochum, & varenæ equorum stomachum in quo nidificant; ea omnia insecta vermicibus satis affinis sunt, verum ex his nascuntur alia insecta alata a vermicibus valde distincta.

Sub generico itaque licet improprio vermium nomine cætera insecta quæ hominibus intus nocent aut extus huc referimus, de quibus sigillatim consulendi veniunt *Andry & Le Clerc*, nec non J. B. Bianchi de morbosa generatione, ac præ omnibus *Equitis Linnaei Systema Naturæ*, & de *moxa insectorum differtatio*.

Signa lumbricorum sunt consuetudo lumbricos ore vel ano ejiciendi, pruritus narium, alterutrum genæ fugax rubedo, dolores vagi vel mobiles abdominis, alvi laxitas noctu præsertim superveniens sed inconstans, odor oris proprius, sensus titillationis quasi vermis ad œsophagum, tussis sicca, febris cum pulsu non raro inæquali, parvo, intermittenti, mutitas, caroticus affectus, convulsio, vomitus; sed hæc ultima signa cum rubedine fugaci genæ & tussi sicca sunt quandoque dentitioni difficili communia sine lumbricis, adde famem seu esuriginem inconstantem, faciei pallorem, fæces griseas, stridorem dentium, urinas turbidas; signa in tæniâ sunt prurioribus non dissimilia, excepto quod in tæniâ laborantibus cardialgia, bulimia, esurigo, cum stomachus est cibus vacuus, frequentiores & majores sunt, quod cucurbitinis seu fragmenta tæniæ cum facibus externi soleant, quæ titillationem aut prurium pedicis, non secus ac ascarides excitant: huc attingunt

Morbi verminosi.

- Cardialgia.
- Nausea.
- Colica.
- Diarrhœa.
- Hæctica.
- Purpura.
- Pleurodyne.
- Panophobia.
- Tetanus.
- Vomitus.
- Ileus.
- Bulimia.
- Dysenteria.
- Amphimerina.
- Pleuritis.
- Trismus.
- Eclampsia.
- Hysteria.
- Typhomania.
- Dæmonomania.
- Rheumatismus.
- Tussis.
- Mutitas.
- Atrophia.
- Scelotyrbe.
- Chlorosis.

Morbi vero qui ab aliis insectis dependent varii sunt pro sede quam ea occupant & pro diversitate insectorum.

Morbi verminosi.

- Phthiriasis a pediculis.
- Trichoma a pediculis.
- Hemicrania a larvis in sinibus.
- Scabies a fronibus & fasciolis.
- Malis a muscis.
- Malis a crinonibus.
- Malis a ricinis Americanis.
- Atrophia a crinonibus.
- Eclampsia ab ascaridibus.
- Tenesmus ab ascaridibus.
- Pudendagra ab ascaridibus.
- Erysipelas a vespis, apibus.
- Priapismus a cantharidibus.
- Pruritus a pediculis.
- Vertigo a larvis in sinibus.
- Otalgia a larvis.
- Herpes a fronibus & fasciolis.
- Malis a pulice Americano.
- Malis a dracunculis seu gordiis.
- Malis a furia.
- Pruritus a crinonibus.
- Tussis ab ascaridibus.
- Ischuria ab ascaridibus.
- Hæmatemesis ab hirudinibus.
- Dysuria a cantharidibus.

Verme e primis viis eliminantur vel enecantur: eliminantur per cathartica, potissimum senenam, rheum; emetica, ut ope tartari & vini bibulati, aceti scilicet, affari. Enecantur interventu plantarum quæ gaudent sapore amaricante sætido, ut foliis & seminibus absinthiorum, præsertim absinthii fantonici fœe cinæ, scordii, tenacetii, fantolinæ &c. ad scrupul. j. forma pulveris: omnia amara profunt, ut succus aurantii amari, aloes, kinkina; olea omnia ad uncias ij sumpta, præsertim oleum nucis, amygdalarum, sal marinum, pulvis corallinæ, succus limonium, radix filicis maris, mori, decoctum hydragryi in aqua pro potu; mercurius dulcis ad grana xv. præscripto mane cathartico, vespere injicitur enema ex decocto passularum, ficuum, aliisque dulcibus ad infuscandos lumbricos; aqua etiam frigidissima apud adultos: demum in debellanda tænia arcanum. *D. Herrenscheivand nunc Regis Polonia Archiatr.* vel quod tutius & lenius est illud *D. Nouffre* quod possidet etiam *D. Poucau Chirurgus Lugdunensis celeberrimus, dexterrimus*.

Quoad alia insecta quæ in diversis partibus nidulantur, ea decocto tabaci exitus admoto, pulvere hordei caustici, vulgo cevadille, lieu mercurialis unguenti enecantur. Vide *entæe speciales in locis Nosologia allegatis*.

Extradum rhei, aloes, a gran. iv. ad scrupul. j. pilulæ mercuriales a gran. vj. ad drachm. j. extractum juniperi ad drachm. ij. tinctura absinthii ad guttas xxx. vinum absinthii, ad unc. tv. quinta-essentia absinthii ad guttas xx. pilulæ Becheri ad scrupul. j.

CLASSIS VIGESIMA SECUNDA.

MORBI CALCULOSI;

Maladies calculeuses.

Sunt illi quæ excitat vel sovet. concretio terrea vel salino terrea vel resinosa in corpore humano latens; illæ concretiones fiunt in omnibus fere corporis humani partibus; in aure a corumine indurato, unde dyscœra vel cophosis; circa dentes, unde labarum; in glandulis sublingualibus, colli, mesenterii a concreto muco serophuloso; in cystide fellea ubi calculi sunt polyhedri ex stratis viridibus, luteis & nigrescentibus; in pulmone seu glandulis bronchialibus ubi ruffum & dyspnœam creant; in stomacho ubi bezoartica nuncupantur; inde ea ex cystide, fellea in intestina delabuntur, ubi ileum quandoque creant; in utero & circa pessarâ intra vaginam, in articulis arthriticorum, & illi sunt cretacei, demum in renibus, uterinis, vesica & glandulis urethræ frequentissimi sunt, & illi sunt vel cretacei vel lapidei & murales, æque vel arenulas, vel lapillos, vel majores calculos sphaeroides referunt hæc concrementa.

Concretum cerumen in canali auditorio soni transmissionem impedit, & vel auriscalpo foras

educitur, vel aquis thermalibus, ut Bagnoliensis injectis dissolvitur.

Calculi dentium ferramentis aptis auferuntur, illi dysodiam excitant, gingivarum accretionem impediunt, unde successu temporis dentes carniibus denudati labuntur, & in radice ob putredinem humoris hærentis carioli evadunt; dentes dealbant aqua vegetabilia, ut acetosa, tum fosilia, ut spiritus salis, sed dum lutum terreum his adhærens dissolvunt hæc aqua, ipsi vitree parti dentium rodendo nocent maxime. Solus fragrarum usus calculum dentium dissolvit nec dentes flavos reddit.

Calculi fœe topi in geniculis enati (genicula voco loca ubi mutuo ossa articulantur) nodos articulorum excitant, unde acylofes arthriticorum; hi calculi rupta cute demum foras sponte prorumpunt, curantur ut arthriti.

Calculi sublinguales, gutturales, dysphagiam, anginam, ptyalismum excitant; hi sectione chirurgica foras educuntur.

Calculi in bronchialibus glandulis enati multo frequentiores sunt, quidam dicitissime gestantur sine noxa, quia non commoventur, alii vero hæmoptysim, phthisim, tussim producant; his lac, æque thermales sulphureæ remedia sunt, quatenus horum expectorationem adjuvant.

A calculis hepaticis atrocia quandoque mala gignuntur, scilicet hepatalgia dirissima rachialgia atinis, præter auriginem; juvant in his calibus juscula diluentia, aquæ acidulæ, saponacæ, saponi ipsemet ad drachmas ij. quotidie deglutitur; balnea domestica, quibus demum ipsi calculi in intestina delabi queunt, unde foras per alvum ejiciuntur.

Calculi intestinales sunt ovis columbinis æquales aut majores, non æque innant ut plures biliosi, ex albo fravescent, & iisdem auxiliis eorum per intestina prolapsus juvatur. Vide *ileum calculosum, tumorem benignum &c.*

Frequentissimè omnium sunt calculi in viis urinaris enati, in quorum censu reponenda non sunt arenulæ tenuissimæ quæ in matula concreverunt ad parietes, quoties urinæ acres; ardentes sunt, salinis principis nimium saturatæ; hæc arenulæ rubræ sub digito crepitantes efformatæ sunt in matula; nec erant in corpore; verum sunt lapilli lentis, pisi, ciceris magnitudine, rubelli & durissimi, quos senes nephralgici, arthritici sæpius non sine dolore ejiciunt, sibi que tumulum edificare dicuntur; hi lapilli raro gravem ischuriam inducunt; & difficillime si unquam dissolvuntur. Vide *Nephralgiam arenosam*.

Calculos majores renum & vesicæ quod attingit, illi vel sunt murales, siccæ, durissimi, & vix ullum est lithontripticum quo dissolvantur; sola supereit vel nephrotomia in certis circumstantiis tentanda, ut cum abscessus ad lumbos locum affectum indicat, vel cystitomia, lithotomia vulgo dicta, quæ hodie per apparatus

tum lateralem Montpellii feliciter instituitur. Si vero calculus sit vel omnino calcareus vel ex lapillis duris cretaceo glutine coagmentatus factus: tunc eximia remedia sunt infusum ex drachma .j. foliorum urvi ursi in libra i. aque bullientis factum, & quotidie sumptum ad uncias vi. superbibendo jusculum emolliens. 2. usus quotidianus saponis vulgaris a drachm. ij. ad xv. 3. lixivium ex aqua prima calcis vul-

garis, quod remedium Ettmullero non erat ignotum, vel ex aqua prima calcis ostreorum, quod quotidie bibitur ab unc. vi. ad xij. per multos menses: de quibus vide eximium tractatum III. Rob. VVhrr. Novi puerulum cui bis extractus est e vesica calculus, quique itetum calculo vesicæ afficitur; itaque lithotomia principium morbi non eradicat quod præstant lithotriptica.

Morbi calculosi. {
 Hemica a calculis.
 Convulsio nephralgica.
 Asthma pneumonodes.
 Amaurosis a calculo.
 Hemicania nephralgica.
 Hepatalgia calculosa.
 Nephralgia arenosa.
 Dysphagia pharyngea.
 Hypochondriasis calculosa.
 Nausea nephralgica.
 Tenesmus calculosus.
 Pyralismus a calculo.
 Dysuria calculosa.
 Syncope Lanzoni.
 Ischuria cystolithica.
 Ischuria uterolithica.

Nephritis calculosa.
 Dyspnœa a calculis.
 Angina calculosa.
 Psellismus calculosus.
 Gastrodynia calculosa.
 Nephralgia calculosa.
 Nephralgia a pancreate.
 Hyfteralgia calculosa.
 Hamaturia calculosa.
 Ileus calculosus.
 Vomitus bezoarticus.
 Enuresis calculosa.
 Dysuria nephralgica.
 Phthisis calculosa.
 Ischuria nephrolithica.
 Aurigo calculosa.

CLASSIS VIGESIMA TERTIA.

MORBI SPASMODICI;

Maladies spasmodiques.

Omnis morbus ab anima dependens in corpore fit interventu contractionis muscularis, sive totus musculus, sive tantum quidam ejus lacerti aut fibræ quædam contrahantur; hæc contractio a libertate non dependens in statu morbofo *spasmus* dicitur. Natura itaque in plurimis morbis spasmus utitur ad eliminandam vel corrigendam materiem morbosam, & quandoque per errorem, morositatem, pravam consuetudinem, inepte hos spasmos excitat sine præsentia materiæ morbosæ saltem Medicis cognitæ, ut in hystericiis, hypochondriacis affectibus, doloribus, anxietate, agone mortis, profusus evacuationibus. Non mirum itaque si quidam Neoterici, ut *Galenus*, post Germanos maximam morborum partem spasmi tribuant.

Spasmos per sympathiam & sympathiz leges explicare est obscurum, perobscurum exponere, ac in mechanicis & hydraulices leges impingere: omnis spasmus est contractio muscularis violenta, adeoque pendet ab influxu violento fluidi nervi in musculos, requiritur in motu musculari vis impressa fluido nervo multoties major vi muscoli ipsius evidenti; nulla autem est vis mortis in homine præter eam quam animæ facultates exerunt, quæ musculos integros decurrer.

Licet Anatomici in membranis viscera involventibus fibras subræ non inveniant, inde

non possumus inferre membranas illas vi musculari contrahi non posse, cum in morbis eas coarctari doceat observatio: dantur enim fibræ musculares albæ, ut in insectis fere omnibus haud dubium est, dantur itaque contractiones spasmodicæ membranarum viscera involventium, ut meningum, pleuræ, peritonæi, necnon vasorum excretorium & fibræ sanguiferorum, intestinorumque in cadaveribus albisimæ sunt, & ex his spasmi supprimuntur excretiones, secretiones, sunt humorum metastases, fluidi nervi influxus in partes supprimuntur, inde morbi qui convulsivis omnino oppositi videntur, ut carus hystericus, muretas, amaurosis spasmodica.

Horum morborum curatio difficillima, quia theoria obscurissima est; alii enim spasmi excitantur occasione plethoræ, ut a menostasi, & illi exigunt phlebotomiam; alii ab inanitione dependent in quibus phlebotomia valde noxia est, & adhiberi debent anæsthetica, cardiaca, spirituosa; quidam a dolore cientur & in is conveniunt anodyna, narcotica; plurimi a pathemate foveantur & in his cephalica, fragrantia, aromatica, camphora, moschus, alkalina volatilia conferunt, necnon auxilia moralia quæ animam a tristibus ideis divertunt, in quo censu reponi debent ambulatorio, rusticatio, equitatio, musica, monita philosophica, religionis præcepta quæ in chronicis, hystericiis, hypochondriacis, melancholicisque morbis minime spernenda sunt.

In spasmodicis morbis quædam auxilia generalia conveniunt, quæ a principis materialis morbi indicantur, uti emetica, cathartica cum saburra primarum viarum his anam præ-

bent; anthelmintica cum verminosa est materia morbifica; phlebotomia cum materia, febris vehemens, pulsus plenitudo suadent; præter ipsa cum spasmi perseverant ad antispasmodica medicamina sic dicta deveniendum est, qualia sunt in *hysteria*.

Sal volatilis succini a gran. x. ad xxx. Olcum succini ad gutt. xx.

Moschus a gran. ij. ad xx. vulgo ad gran. vj. Camphora cum aliquot nitri granis ad gran. j. - iij.

Aqua artemisiz in qua camphoræ frustum accensum dein fuerit extinctum.

Pulvis castorei a gran. j ad xij Tinctura croci eadem dosi.

Tinctura castorei a gutt. xij ad xl. Tinctura myrrhæ ad gutt. xv.

Tinctura succini a gutt. vj ad xx. Balsamus vitæ Hofmanni ad gutt. x.

Aqua menthæ, aqua generalis, aqua theriacalis, aqua Reginz Hungariz, aqua Carmelitarum, elixirium Garus a drachm. j ad iv.

Tinctura cinnamomi a scrupulo j ad drachm. ij. Sal sedativum ad gran. xx.

Aqua rutæ, matricariæ, naphæ, melissæ simplex, ad unc. ij.

Syrupus de floribus aurantiorum, artemisiz, balsami de Tolu ad unc. j. - ij.

Balsamus Commendatoris de Perna, a scrupulo j.

Lilium Paracelsi, ad guttas xl. Elixirium thetriacale ad gutt. xx.

Pilulæ hysterice, Pilulæ chalybeæ, a gran. vj ad scrupulo j.

Pulvis antispasmodicus, Pulvis de gutteta, Pulvis radicis valerianæ sylvestris, a gran. vj. ad scrupulo j.

Pulvis succini ad scrupulo ij. Aqua Luciz ad gutt. vj.

Flores tiliz, lilii convallium, gallii lutei, ad pugill. ij. in infuso theiformi, fero lactis &c. flores tunicæ, primulæ veris.

Ad odorandum aqua Luciz, spiritus volatilis salis ammoniaci, sal volatile aromaticum oleosum, sal volatile aceti, aqua Carmelitarum, Reginz Hungariz.

In *spasmi a dolore, pæthemate anodyna*.

Philonium Romanum, a scrupulo j. ad drachm. j.

Pilulæ de cynoglossio, a gran. iij ad x.

Theriaca caelestis, a gran. j ad xx.

Syrupus de Nymphæa, ad unc. j.

Theriaca Andromachi, Orvietanum, Mithridatum, Diascordium, a gran. x ad drachm. j.

Sal sedativum, ad gran. xx.

Laudanum liquidum, a gutt. iv ad xx & ultra pro affuetis.

Syrupus de karabe, syrupus de papavere albo, a drachm. j ad iv.

Moschus ad gran. x. Crocus ad gran. x. Camphora ad gran. ij. iij.

Extractum hyoscyami albi ad granum semisse.

Extus semina anethi; opium; camphora, ca-
storeum, hyoscyamus.

In *Epileptis*.

Pulvis foliorum aurantii ad gran. xx. Folia decocta ad manipul. semiss. pro duobus cyathis.

Radix valerianæ sylvestris pulverata; ad drachm. j; in decocto ad drachm. j. - ij.

Radix præniz in decocto, ad drachm. ij. di-
stamini ad drachm. ij.

Viscus quercinus ad drachm. ij in decocto.

Castoreum, ad gran. xij; Cinnabaris arti-
ciælis, ad gran. xij.

Hepar lupi exsiccatum, ad drachm. j.

Flores tiliz, gallii luthci &c. in potu thei-
formi.

Kinkina, ad drachm. j ter in die.

Flores hyperici in aceto infusi.

Spiritus aceti, ad cochlear j ter in hora.

CLASSIS VIGESIMA QUARTA.

MORBI ATONICI;

Maladies d'atonie.

LAXITAS seu atonia partium procedit a mi-
ori fibrillarum eas componentium cohesione,
sive fluidum ipsis specificè levius ipsis interposi-
tum sit, unde tollitur proximitas ad cohesio-
nem necessaria, cum vis cohesionis cubo proxi-
mitatis respondeat; hinc laxitas corporis huma-
ni nimio calore resoluti, sive appressio multia
fibrillarum deficit ob valorem inanitionem sive
fluidi ipsas distensuri defectum. Sic intelligimus
ab alvi-fluxibus, sanguifluxibus, abstinencia
laxari & debilitari vasa, tum totum corpus:
verum sunt aliz laxitatis cause ad debilitatem
referendæ, impetus fluidi nervi & sanguinis est
causa canales distendens; quippe fluidum duplo
velocius vas flexibile trajiciens quadruplo fortius
in ejus parietes agit, ergo inertia, languor,
tarditas fluidi nervi nervis, tarditas sanguinis
sanguiferis vasibus atoniam & debilitatem concu-
liat.

Animæ pæthemata vivida, cupiditates inten-
sæ, fluido nervo, proindeque sanguini propor-
tionatam velocitatem impertiunt, unde liquet
cur languente animo omnia debilitentur, la-
xentur, ut patet ex leiporthymia, syncope a
metu.

Humores quidam corporis humani ratione vo-
luptatis quam foveat aut excitant, ut saliva
suavi salico fercull succo imprægnata, ut se-
men prolificum diu retentum, hunc animi fla-
tum vividum, hos appetitus excitant, ergo &
vires motrices sustinent; his vero deficientibus
languet anima, languet pativus totius naturæ
erectissimus qui vigorem animæ & corporis con-
tinetur.

Nervorum obstructio, immobilitas fluidi
nervi est potissima paralyseos & immobilitatis
musculorum causa; an vero serum ipsæ & pi-
tuita

tuia solo contactu nervis electricitatem aufert, a filiis ferreis electricitatis conductoribus? hoc suadet analogia fluidi nervi cum vapore electrico. An a plicata obstruantur pori nervorum? certe ligatis, compressis nervis, resolvi musculos appen-

fos non dubium est: in tanta rerum obscuritate ignoramus quinam morbi causis internis tribuendi pertineant ad atonos, quinam ad emphracticos, ad sanguineos, serofos &c. licet sub eadem Classe, imo sub eodem genere militent.

Morbi atoni.

Typhus exhaustorum.
Convulsio ab inanitione.
Tremor a debilitate.
Hysteria menorrhagica.
Claudicatio a debilitate.
Amblyopia crepuscularis.
Amaurosis congenita.
Agheusia paralytica.
Cophosis a tympano laxo.
Anæsthesia nascentium.
Anorexia exhaustorum.
Athenia abstinentium.
Anaphrodisia gonorrhœica.
Syncope a phlebotomia.
Mutitas surdorum.
Hæctica fluxuum.
Convulsio ab onanism.
Tremor paralytodes.
Trismus diastrophe.
Scelotyrbe instabilis.
Amblyopia absoluta.
Amaurosis a narcoticis.
Paracusis Villisiana.
Cophosis congenita.
Anorexia paralytica.
Anorexia neophytorum.
Athenia ab inanitione.
Syncope ab inanitione.
Adipsia primaria.

Mutitas a narcoticis.
Paraphronia stertens.
Hemiplegia ab epilepsia.
Lethargus omnis.
Rheumatismus dorsalis.
Lassitudo a fluxu.
Epidrosis syncopatica.
Aborus a laxitate.
Enuresis infantum.
Leucorrhœa Americana.
Diplopia a debilitate.
Tabes dorsalis.
Tabes nutricum.
Atrophia a pyralismo.
Anasarca a fluxu.
Hemiplegia ab apoplexia.
Ecitasis resoluta.
Apoplexia serofa.
Lassitudo a labore.
Amnesia a venere.
Hæmoptysis a diapedesi.
Diarrhœa aëria.
Enuresis paralyticorum.
Dyspermatismus apraxtodes.
Syngismus a debilitate.
Fæbes sudatoria.
Atrophia nervosa.
Atrophia ab alvi fluxu.
Chlorosis a menorrhagia.

Auxilia atoniz debellandæ apta sunt diversa pro diversitate principii a quo pendet; quæ pendet a laxiori fibrillarum coheſione, quod ex partium mollitie cognoscitur & ex ignavia, vita sedentaria, abusu oleosorum, ære calidiori, balnearum usu pendet, exigit auxilia gymnastica: ut exercitium paulo validius conſtanter repetitum, sæpius pro viribus auctum, ut potissimum equitatio, venatio, rusticatio, frictions ex pannis calidis, volatili aromatæ, succini fumo fortis, balnea frigida melle repetita, natatio, aer montanus, regio ventis austrinis minus exposita, frigida, usus vini generosi, ciborum aceto, succo limonium, sale conditorum; hæc in chronicis bene multis necessaria sunt. Apud omnes fere convalescentes hæc atonia viget, unde ipsis viſum reſcientem, aerem purum, exercitium viribus proportionatum suademus.

Si atonia ex languifluxibus seu ab inanitione & collapsu vasorum pendet, indicantur auxilia diæretica chylum & sanguinem reparantia; si stomachi vires vigeant nec ulla saburra sit in primis viis, cremores oryzae, hordei, lactitina varra vires a languifluxibus exhaustas reſcient, maxime si a diabrosi pendeant

aut foveantur illi sanguifluxus, ut in menorrhagia ulcerosa, cancroſa, hæmoptisi phthiſicorum; magna simul quies animæ & corporis requiritur, ne impetu sanguinis vasa nondum coalita debiſcant & novum sanguifluxum patiantur. Si alviſluxus perſiſterint, vix unquam digestiones recte sunt; illis itaque proſpicendum est per cathartica & stomachica, dein vero cibus conveniens & quantitate viribus proportionata concedendus est, offæ, panatellæ ova tremula genalitz, decoctum album in his primaria sunt; iura ex carnibus femi aſiatæ & taleolatum ſectis, dum calente expreſſa juſculis addita succum cupeptum ſuppeditant; conveniunt etiam condimenta aromatica, cinnamomum, cortex citri, conditura ex aurantii Sinenſibus, nucæ, zingibere conditum; juvant nux moſchata cujus pulvere juſcula condiuntur; vinum generosum Burgundiacum, Alicanetium, aut Miſpanicum aliud.

Si ſemini proſtutium quodvis morbo anſam dederit, ut in tabe dorsale, amneſia a venere, anorexia exhaustorum, lactitinis, cremoribus jungenda sunt aphrodiſiaca, ut chocolata cum vanilla, moſco, cremores ex ſalab addito ginfeng, bulbi plurimarum orchidum

dum in cremorem decoquendo mutati vires proprius reficiunt: Huc pertinent morbi nutricum quas longior lactatio sæpe exharuit, unde tussis, phthisis.

Si a fero stagnante in ventriculis cerebri medulla spinali, nervorum laxitas procedat, catharticis, emeticis, diureticis illud foras est ducendum, vesicatoriis; fontanellis ad nucham tussis extus derivandum; sudores ope ammochasiz, stupharum, balnearum, thermalium, proliciendi; thermæ autem eligendæ calidiores saleque potissimum scaten-tes, ut Balneucanz, in quibus si per pauca minuta steterit æger, ephemera vehemens excitatur sudore uberrimo intra horam solvenda, cui potissimum febris & sudorj tribuenda plurimorum morborum huiusce profapiz sanatio.

Illæ eadem aquæ thermales epotæ stomachi & intestinorum atoniam, anorexiam, vomitum inde ortum sanant. Diarrhæas ab intestinorum atonia ortas pariter tollunt medicamenta tonica; stomachica, adstringentia, ut rheum, myrobalani, rha-ponticum, &c.

Rheum, ad gran. vj. -- x: extractum thei, ad gran. xij.

Extractum juniperi, a scrupulo j. ad drach. mam. j. kinkina ad scrup. ij.

Vinum absinthiacis, de kinkina, ab unc. j. ad iij.

Tinctura absinthii, a gutt. x. ad drachmam semissem.

Elixirium proprietatis, theriacale, Garus a guttis xx. ad drachm. ij.

Confectio de hyacintho, alkermes; theriaca, opiatæ Salomonis, ad drachm. j.

Tronchisci catechu simplices, cum cinnamomo, cum ambara.

Aqua cinnaomomi, a drach. j. ad vj.; menthæ ad uncia iij.

Syrupus de cinnamomo, de cortice citri, de floribus aurantiorum, ad unc. j.

Externis Epithemata ex fructu panis calido cum pulvere nucis myristicæ, cinnamomi, piperis, oleo nucis myristicæ, vino generoso.

Si vero nervorum aditus obstructio a causa physica, a lymphæ spissâ & acri, materie arthritica, rheumatismali, tunc conferunt irrigationes, balneæ, fatus ex aquis thermalibus sulphureis, Bagnolembus, St Laurentii, Barregiensibus &c. Juvant etiam mirifice electrisatio, commotio electrica, scintillis ex nucha & ex artu paralyticoeductis, admoto idemdem cono ferreo.

CLASSIS VIGESIMAQUINTA.

MORBI MORALES.

Maladies morales.

Sunt illi qui ab animæ facultatibus erronee agnibus dependent tanquam a suis principiis proximis, ut ab imaginatione, appetitu, voluntate, judicio viciatis: tales morbi vocantur ab Anglis & ill. *Lory morbi nervosi*, aliis *melancholici*, aut *hypochondriaci*, hysterici sine materia.

A prava consuetudine oriri plures morbos docet observatio: tuminationem voluntariam dein coactam in homine nuper observavit D. de Nicolais; morbos diversi generi a moreore, tristitia, ut anorexiam, agrypniam quotidie observamus, & hanc molestiam ratione superari posse quis negat? a patriæ vel parentum effrazni desiderio nostalgia, hectica & millena incommoda superveniunt, quæ sola spe adaucta repetendi patriam sublevantur. Datur melancholia multiplex, mania, paraphrosyne sine materie, quæ initio averti & sanari potuissent, si ægri animam a certis objectis removissent: novi certe plurimas eorundem generum species esse humorales, sic nymphomania, satyrnasis a seminis acrimonia oriuntur, sed dantur etiam mere morales, ut erotomania qua uxorem suam Numinis instar habebat eique thus offerbat *Aristoteles*, qua Principem Esthensem vix visu cognitam prosequabatur Poeta Tassus, ut Dulcineam Eques Hispanus, a romanensium fabularum lectione ortum ducebat.

Verum nec minus morales sunt morbi, etiam si in origine voluntas non peccaverit. Nuper vidi mulierem quæ a duobus annis quotidie convellitur ex quo fulminis fragore fuit perterrita. Quot epileptici a terrore facti sunt? certe ex decem epilepticis sex & ultra huius principio morbum suum debent. Quot strabones alterutrius oculi usum amisere, quod meliori tantum oculo objecta cernere vel lumen alterutro oculo inspicere consueverunt? Antipathiz effectus, qui ignorat? inde subita aphonia, convulsio, syncope & alia mira symptomata.

Morbi simulati singulariorem attentionem merentur & sapient Medicos decipiunt. Milites, ut honestam licentiam impetrent, morbos sapissime fingunt: Moniales, ut e monasteriis dimittantur, miros morbos simulant: puerulos etiam quadriennes, quinquennes, quod vix antea credidisset, novi qui epilepsiam simulabant, ita ut præscriptis flagris illico sanati sint, nec unquam eorum motivum hariolando nosse potui. Sunt qui morbos ut ajunt politicos, ut se a quodam munere, itinere eximant, vel ut alterius amorem tentent. Convulsiones fanaticorum cujuscunque Religionis, quis huic classi non annumeret? Hysteri corum majorum iliadem pati apud plures mulieres decorum censetur, ut de-

licitiora ingenii character, ita ut ipsas puderet non animo linguam aut non vomere ad illepidi carminis recitationem, ad passeris obitum non convelli.

Ita autem frequentia sunt horum e morborum, quos vapores vocant, exempla, ut chonicorum morborum dimidiam partem constituent.

MORBI MORALES.

Synochus tarantulus.
Tremor a pathemate.
Epilepsia a terrore.
Hysteria multiplex.
Strabismus Buisonii.
Hectica nostalgica.
Rigor a pathemate.
Epilepsia simulata.
Trismus hypochondriacus.
Serabismus myopum.
Serabismus caligantium.
Mutitas proeretica.
Aphonia ab antipathia.
Hemiplegia simulata.
Leptothymia a pathemate.
Lassitudo a pathemate.
Dystocia a pathemate.
Vertigo fugax.
Sonnambulismus vulgaris.
Pica simulata.
Panophobia omnis.
Tarantismus omnis.

Melancholia omnis.
Satyriasis omnis.
Hypochondriasis multiplex.
Himatemesis simulata.
Gonorrhoea onerogmos.
Chlorosis amatoria.
Orthopnea ab antipathia.
Anaphrodisia magica.
Aphonia atonitorum a pathemate.
Astenia a pathemate.
Carus a pathemate.
Dysphagia a nausea.
Mastodynia a terrore.
Diplopia a pathemate.
Pica voluntaria.
Nostalgia omnis.
Paraphrosyne a pathemate.
Dæmonomania omnis.
Mania a pathemate.
Amnesia a pathemate.
Epiphora a pathemate.
Agrypnia a pathemate.

Ut obscurissima est morborum moralium aetiologia, ita & difficillima sanatio & frustranea saepe curatio.

Morbi animi obnoxii sunt aulici, qui fortuna laetiori utuntur & magnis simul curis exagitantur: multi fateor, ait Baglivus, ob repletiones in morbos incidunt: sed multo plures ob animi pathemata, & potissimum, aut patres familias, aut rei familiaris cura distanti, aut in dignitate constituti fuerint, aut in aula vivant. Mercatores quorum fortuna labascit, puellae quarum honores jacturam patitur, quaeque virtutem colere prius assuetæ fuerunt, artifices, qui ab opinione plebis suum censum suasque divitias spectant qui ab invidis aut malevolis detrectantur; pejus etiam habent qui ea patiuntur infortunia quæ in amici sinu exponere pudor esset: hinc morbi plurimi, eo sanatu difficiliores, quo rarius a Medicis cognoscuntur quod originem: tales enim ægrotantes principium sui morbi vel non agnoscunt, aut Medicos ipsos celant causissimè.

Hysterice, hypochondriaci, melancholici, qui animi affectus moderari nesciunt ob summam sensibilitatem cum infirmitate conjunctam, miseriam vitam ducunt. Puellæ, v. g. amoris ignibus accensæ, inde chlorosim patientes, agrypnia, anorexia absumptæ. Qui laborant gravi animi pathemate conqueruntur s. de stomacho, de anorexia, oris amare, flaribus; his si Medicus ignarus catharticus & emeticis repetitis obviatur, ægritudo in pejus ruit, & hoc nimis familiare est Medicis in omnibus repletionem & saburram incurare.

Qui studio acrius incumbunt corpus suum debilitant & in morbos animi facile dilabuntur,

nisi per intervalla otio, ambulatione, rusticatione, amicorum colloquio vires animi fractas refarciant; his agrypnia, anorexia, melancholia, macies similique mala superveniunt, quibus quies, balnea, diæta magis profunt quam medicamina.

A pathematis oriundi morbi aut ipsi supervenientes, si acuti sunt, ut plurimum ceteris sunt multo periculosiores; a cathartico & phlebotomii non mitescent ut ceteri; symptomatis peregrinis, miris sunt stipati; & quamdiu viget animi pathema, tamdiu ægrum divexant: in illis vires sunt caute servandæ: medela blanda sit oportet; a nimia remedium copia & vehementia abstinendum est: infelices illi ægri qui non ingeniosum sed bardum Medicum advocant: quodam crassa theoria scholastica circumventum.

Desideratur, ut ait sagax Baglivus, historia morborum cuique pathemati supervenire solito: rum; a morore diarrhoea, synochus, typhos; ab ira vehementi diarrhoea biliosa; a terrore, qualis in terræ motu, urbium obsidione, abortus, epilepsie, tertianæ, alique morbi solent accedere, quos *Talonius libro de terra motu* enumerat.

Curatio morborum moralium ab auxiliis moralibus potissimum est repetenda: animi fortitudo, prudentia, tranquillitas sunt potissima illorum remedia & præsidia sine quibus vana sunt medicamina, quæ vulgo exhilarantia, anmelancholica in pharmacopoliis venduntur; solum pharmacopolam exhilarant ut plurimum, exercitia tempestiva, migratio in exteræ regiones, equisatio, rusticatio, usus mulices, saltatio.

tionis ; lusus non lucri sed delectationis causa instituti , ægros curis , negotiis implicatos , si ab his abstinere possunt optime juvant ; si vero negotia momentosa sint , illa juxta prudentiæ leges prius componenda sunt . Si vero infortunii nulla sit medela , tunc forti animo religionis potissimum auxilio ex infortunia sunt sustinenda ; indignatio enim , impotentia , animi dejectio morbos multo graviores efficiunt , nedum ipsis medeantur . In hujusmodi ægris curandis præstat Medicus qui remedia aut præcepta ea arte ac dicendi libertate proponit , qua ipsum ad patientiam & tranquillitatem componere & ad summam medicamentis præ-

standam fidem hortari valeat : ægri morbis animi dejecti , tanquam infantes , verbis , promissis , crepundiis duci se non raro patiuntur ; magna curationis pars est eorum animum erigere , spem sanitatis proximam facere , quod quidem in nostalgia quotidie cum successu factum videmus : qui enim morbo gravi a nostalgia laborant , si repetendorum penatum spes accesserit , illico melius habent , longo itinere sustinendo pares evadunt , quos antea vix evasuros putabant adstantes . Curam horum ce morborum specialem videlis in singulis generibus , ut *melancholia* , *dæmonomania* , *hysteria* , *nostalgia* .



METHODUS ANATOMICA

MORBORUM.

CLASSIS PRIMA.

Morbi cutanei universales.

ORDO I.

Morbi decolores.

AUrgio.
Chlorosis.
Melaschærus.
Phoenigmus.
Scorbutus.

ORDO II.

Morbi eruptivi calidi.

Pellis.
Variola.
Rubeola.
Miliaris.
Scarlatina.
Purpura.
Pemphigus.
Erysipelas.

ORDO III.

Morbi eruptivi aquares.

Ptydracia.
Etiæra.
Scabies.
Frambæia.
Lepra.
Elephantiasis.
Syphilis.
Tinea.
Pruritus.
Herpes.

ORDO IV.

Morbi tumidi.

Polyfarcia.
Pneumatosis.
Anasarca.
Phlegmatia.

ORDO V.

Morbi Tabidi.

Tabes.
Pthetisis.
Atrophia.
Aridura.

ORDO VI.

Morbi incemperiei.

Ardor.
Algor.
Ephemera.
Synocha.
Synochus.
Typhus.
Hæctica.
Amphimerina.
Tritrophya.
Tetartophya.
Quotidiana.
Tertiana.
Quartana.
Erratica.

CLASSIS SECUNDA.

Morbi cutanei partiales.

ORDO I.

Morbi maculosi.

Leucoma.
Vitiligo.
Ephelis.
Gutta rosea.
Nævus.
Ecchymoma.
Alopecia.
Gangrena.
Necrosis.

ORDO II.

Phymæ.

Phlegmone.
Bubo.
Parotis.
Furunculus.
Anthrax.
Cancer.
Paronychia.
Phimosis.
Erythma.
Oedema.
Emphysema.
Scirrbus.
Sarcoma.
Condyloma.
Verruca.
Pterygium.
Hordeolum.
Bronchorele.

Exostosis.
Cancer.
Scrophula.
Rachitis.
Leontiasis.
Epinyctis.
Tarus.
Papula.
Pustula.

ORDO III.

Cystides.

Aneurysma.
Varix.
Hydatis.
Marisca.
Staphyloma.
Lupia.
Hydathrus.
Hydrorachitis.
Apostema.
Exomphalus.
Osteocoele.
Hydrocephalus.
Physocephalus.
Ascites.
Hydrometra.
Physopectra.
Tympanites.
Meteorismus.
Iscuria.

ORDO IV.

Esopia.

Exophthalmia.
Encephaloele.
Blepharoptosis.
Paraglossa.
Proptoma.
Exarthrema.
Loxarthrus.
Diastasis.
Lordosis.
Gibbositas.
Exania.
Exocyste.
Hysteroptosis.
Enterocoele.
Epiplocele.
Gastrocele.
Hepatocele.
Splenocoele.
Hysterocoele.
Cystocoele.
Parorchidium.

ORDO V.

Plaça.

Vulnus.
Punctura.

Excoriatio.
Contusio.
Fractura.
Fissura.
Ruptura.
Amputatura.
Ulcus.
Elcosis.
Malis.
Carcinoma.
Frambæsia.
Tinea.
Exulceratio.
Sinus.
Fistula.
Rhagas.
Eschara.
Caries.
Arthrocace.

CLASSIS TERTIA.

Morbi acutum.

ORDO I.

Morbi partium mollium.

Hemiplegia.
Paralysis.
Paraplexia.
Beriberia.
Tetanus.
Rigor.
Tremor.
Scelotyrbe.
Crampus.
Pandiculatio.
Rheumatismus.
Convulsio.
Anxietas.
Lassitudo.
Ischias.
Pernio.
Sarcoma clavus.
Paronychia.
Arthritis podagra.
Loxarthrus.
Exarthrema.
Exostosis.
Hydathrus.
Phlegmatia.
Lordosis.
Contractura.
Aridura.
Claudicatio.
Carpologia.

ORDO III.

Morbi partium tendendo-offensum.

Arthritis.
Osteocopus.

Rachitis.
Claudicatio.
Contractura.
Exarthema.
Loxarthrus.
Gibbositas.
Exostosis.
Paronychia.
Hydanthrus.
Lordosis.
Dialafis.

CLASSIS QUARTA.

Morbi Sexuum.

O R D O I.

Morbi genitalium communes.

GONorrhœa.
Enuresis.
Dysuria.
Pyuria.
Icturia.
Hæmaturia.
Diabetes.
Ædopsophia.
Anaphrodisia.
Pudendagra.
Ulcus venereum.
Condyloma ficus.
Condyloma porrum.
Condyloma thymus.
Verruca venerea.
Rhagas venerea.

O R D O II.

Morbi virorum.

Phimosis.
Parorchidium.
Oscheocele.
Priapismus.
Oedema penis.
Satyriasis.
Disperatismus.

O R D O III.

Morbi mulierum.

Abortus.
Dysstocia.
Lucorrhœa.
Graviditas.
Hysteria.
Hysteroloxia.
Hysteroptosis.
Physometra.
Menorrhagia.
Nymphomania.

CLASSIS QUINTA.

Morbi sensum.

O R D O I.

Morbi oculorum: 1. interni.

A. Maurotis.
Diplopia.
Suffusio.
Amblyopia.
Epiphora.
Vertigo.

2. externi.

Caligo.
Cataracta.
Exophthalmia..
Ophthalmia.
Hordeolum.
Pterygium.
Staphyloma.
Blepharoptosis.
Nyktagnus..
Strabismus.
Apothema hypopyon.
Apothema synchysis.
Apothema onyx.
Ecchymoma palpebrarum.
Ecchymoma hypopyon.
Phlegmone oculi.
Sarcoma ecanthis.
Sarcoma oculorum.

O R D O II.

Morbi aurium interni.

Cophosis..
Dysacœcia.
Paracusis.
Syrignus.
Otalgia.
Otorrhœa.
Proptoma auris..

O R D O III.

Morbi narium.

Anosmia.
Dysodia ozana.
Paraphonia a polypo..
Coroza.
Hæmorrhagia.
Sarcoma narium..

O R D O IV.

Morbi oris.

Aphtha..
Pryalismus.
Hypostaphyle.

A 2 4

Pa

Paraglossæ.
 Agheusia.
 Pselismus.
 Mutitas.
 Adipsia.
 Aphonia.
 Paraphonia.
 Polydipsia.
 Stomacacæ.
 Angina.
 Cynanche.
 Apostema parulis.
 Odontalgia.
 Caries dentium.
 Dysphagia a labario.
 Proptoma labii.
 Dica.

Lechargus.
 Scupor.
 Convulsio.
 Eclampsia.
 Epilepsia.
 Ephialtes.
 Hydrophobia.
 Rabies.
 Cephalæa.
 Cephalalgia.
 Hemisrania.
 Tarantismus.
 Antipathia.

CLASSIS SEXTA.

Merbi capitis.

O R D O I.

Externi.

Alopecia.
 Trichome.
 Tinea.
 Hydrocephalus.
 Physocephalus.
 Phthiriasis.
 Encephalocoele.
 Lupia testudo.

Culci.

Scrophula.
 Catarrhus.
 Bronchocele.
 Angina.
 Cynanche.
 Trismus.
 Obstipitas.

O R D O II.

Merbi capitis Interni.

Mania.
 Dæmonomania.
 Melancholia.
 Paraphrosyna.
 Panophobia.
 Phrenitis.
 Cephalitis.
 Agrypnia.
 Amentia.
 Amentia.
 Apoplexia.
 Anæsthesia.
 Carus.
 Cataphora.
 Catalepsis.
 Batochus.
 Ecstase.

CLASSIS SEPTIMA.

Merbi Pectoris.

1. externi.

Gastrorrhæa.
 Mastodynia.
 Trismus.
 Bronchocele.
 Catarrhus.
 Pleurodyne.

2. interni.

Rheuma.
 Tussis.
 Oscedo.
 Singultus.
 Dyspnœa.
 Asthma.
 Orthopnœa.
 Hydrothorax.
 Empyema.
 Pleuritis.
 Peripneumonia.
 Pleurodyne.
 Paraphrenesis.
 Hæmoptysis.
 Anacatharsis.
 Phthisis.
 Stertor.
 Paraphonia.
 Aphonia.
 Anxietas.
 Aphyxia.
 Syncope.
 Leipothymia.
 Palpitatio.
 Cardiognus.
 Carditis.
 Althenia.

CLASSIS OCTAVA.

Merbi Abdominis.

1. Externi.

Lumbago.
 Rachialgia.

Exom-

Exomphalus.
Gastrocele.
Hepatocele.
Enterocoele.
Epiplocele.
Splenocoele.
Cystocoele.
Erythema intertrigo.
Phisconia.
Hæmorrhoids.
Proctalgia.
Exania.
Marisca.
Tympanites.
Ascites.
Physometra.
Hydrometra.
Neteroismus.
Bubo.

2. *Stomachi interni.*

Anorexia.
Bulimia.
Nausea.
Pica.
Pyrosis.
Gastrodynia.
Flatulentia.
Vomitus.
Hæmatemesis.
Gastritis.
Cholera.
Hypochondriasis.

3. *Intestinorum.*

Melæna;
Ileus.
Dysenteria.
Diarrhœa.
Hepatitis.
Linteria.
Cœliaca.
Tenismus.

4. *Hepatis.*

Scirrhus hepatis.
Hepatalgia.
Aurigo.
Hepatis melancholicus.

5. *Lienis.*

Splenalgia.
Splenitis.

6. *Renum.*

Nephralgia.
Nephritis.
Ischuria falsa.
Pyuria.

7. *Vesicæ.*

Cystitis.
Diabetes.
Inuresis.
Yuria.
Dysuria.
Ischuria.

8. *Epiplois.*

Epiploitis.
Phisconia.

CLASSIS NONA.

Morbi acutum.

O R D O I.

*Morbi Juvenum.**Vitis.*

HYDRORACHITIS, spina bifida.
Pædarthorace omnis.
Erythema intertrigo.
Erythema pernio.
Exania ab alvi fluxu.
Exomphalus aqueus.
Enterocoele umbilicalis.
Enterocoele inguinalis.
Bubo crescentium.
Parorchidium omne.
Paraglosse omnis.
Phimosis vera.
Phimosis circumligata.
Hydroa sudamen.

Febres.

Hæctica infantilis.
Hæctica nostalgica.
Hæctica verminosa.
Hæctica scrophulosa.

Phlegmasæ.

Variola omnia.
Rubeola omnis.
Aphæta lactucimen.
Cephalatis siriasis.
Cynanche gangrenosa.

Spasmi.

Convulsio febrilis.
Convulsio ab hydrocephalo.
Convulsio verminosa.
Eclampsia verminosa.
Eclampsia a dentitione.
Eclampsia ab hydrocephalo.
Scelotyrbe chorea Viti.
Ephialtes stomachica.
Ephialtes verminosa.
Tetanus verminosus.
Trismus nascentium.
Trismus verminosus.
Strabismus omnis.
Claudicatio rachitica.

Anhelationes.

Asthma a gibbo.
 Dyspnoea rachitica.
 Pleurodyne verminosa.
 Sternutatio tuberculosa.
 Tussis ferina.
 Tussis a dentitione.
 Singultus a gula.

Debilitates.

Anæsthesia nascentium.
 Anæsthesia hydrorachitica.
 Asthenia ab hydrocephalo.
 Asthenia infantum.
 Carus verminosus.
 Carus ab hydrocephalo.
 Amblyopia luscorum.
 Anorexia Neophytorum.
 Mutitas a glossolysii.
 Mutitas surdorum.
 Mutitas elinguium.
 Pellissimus omnis.

Dolores.

Agrypnia a dolore.
 Agrypnia a crinonibus.
 Anxietas a fasciis.
 Cardialgia verminosa.
 Cardialgia lactentium.
 Catarrhus rubeculosus.
 Colica meconialis.
 Colica lactentium.
 Dysphagia a freno.
 Gasterodynia saburrilis.
 Odontalgia dentitionis.
 Ophthalmia scropulosa.
 Otitocopus ab orthopnoea.
 Prostalgia ab exania.
 Pruritus pedicularis.

Vesania.

Bulimia verminosa.
 Bulimia esurigo.
 Bulimia addephagia.
 Nostalgia omnis.
 Panophobia verminosa.
 Pica infantilis.

Fluxus.

Diarrhoea acralia.
 Diarrhoea variolosa.
 Diarrhoea verminosa.
 Diarrhoea lactentium.
 Dysuria calculosa.
 Enterefis infantum.

Enterefis calculosa.
 Flatulentia acida.
 Flatulentia infantilis.
 Vomitus lacteus.
 Vomitus a saburra.
 Vomitus a dentitione.
 Vomitus verminosus.
 Ileus verminosus.
 Hæmorrhagia plethorica.
 Dysodia ab otirrhoea.
 Dysodia a tinea.

Cachexia.

Atrophia lactentium.
 Atrophia rachitica.
 Atrophia a crinonibus.
 Atrophia verminosa.
 Aurigo neophytorum.
 Chlorosis infantum.
 Chlorosis verminosa.
 Elcolis variolosa.
 Hydrocephalus omnis.
 Malis a crinonibus.
 Phthiriasis pedicularis.
 Phisconia mesenterica.
 Rachitis nodosa.
 Rachitis Britannica.
 Scrophula vulgaris.
 Scrophula fugax.
 Scrophula mesenterica.
 Tinea omnis.
 Tabes mesenterica.
 Tympanitis verminosa.

O R D O II.

*Merbi Senum.**Vitia.*

Herpes omnis.
 Marisca omnis.
 Oedema flaccidum.
 Gibbositas omnis.
 Condyloma clavus.
 Varix tibiatarum.
 Oscheoceles aquosæ.
 Enterocoele omnis.
 Epiplocele omnis.
 Hysterocoele omnis.

Febris.

Typhus carcerum.
 Hæctica cachæctorum.
 Tetartophya simplex.
 Quartana omnis.

Spasmi.

Contractura omnis.
Tremor omnis.
Claudicatio a dolore.
Rigor catarrhalis.
Hysteria emphrastica.
Tussis catarrhalis.
Tussis asthmatica.
Dyspnœa rachitica.
Asthma humidum.
Asthma arthriticum.
Asthma catarrhale.
Orchopnœca pseudoperipneumonia.
Rheuma catarrhale.

Debilitates.

Cataracta omnis.
Caligo a rhyidiosi.
Caligo a nephelide.
Amblyopia proximorum.
Amaurosis multiplex.
Dyssecœa senilis 4.
Dyssecœa a tuba obstructa.
Paracusis barycoia.
Cophosis multiplex.
Anaphrodisia multiplex.
Mellismus a labario.
Paraphonia stertens.
Paralysis serosa.
Hemiplegia ex apoplexia.
Hemiplegia arthritica.
Paraplexia multiplex.
Asthenia cachectica.
Asthenia ab inanitione.
Cataphora somnolentia.
Cataphora coma.
Cataphora arthritica.
Cerus spontaneus.
Apoplexia multiplex.

Dolores.

Arthriticus multiplex.
Rheumatismus arthriticus.

Catarrhus benignus.
Pruritus arthriticus.
Algor externus.
Algor internus.
Cephalæa arthritica.
Ophthalmia trachoma.
Nephralgia arenosa.
Nephralgia calculosa.
Nephralgia hæmorrhoidalis.
Hystericalgia calculosa.
Lumbago rheumatica.
Ischias multiplex.
Proctalgia ex mariscis.
Proctalgia ab exantia.

Vesania.

Syngmus multiplex.
Hypochondriasis melancholica.
Amentia senilis.
Amentia ex fœcitate.
Amnesia senilis.
Agrypnia arthritica.

Fluxus.

Hæmaturia calculosa.
Hæmorrhoids moderata.
Vomitus pituitosus.
Ileus a buboncele.
Tenismus a scybalis.
Epiphora multiplex.
Anacatharsis asthmatica.
Enuresis herniosorum.
Enuresis paralyticorum.
Dysuria hæmorrhoidalis.
Dysuria a caruncula.
Dispermatismus aphractodes.
Dispermatismus serosus.
Dispermatismus cachexiæ.
Atrophia senilis.
Ischuria multiplex.
Scabies herpetica.
Gangræna senilis.
Elcolis scorbutica.
Scorbutus vulgaris.
Ascites serosus.
Phlegmatia ulcerosa.

T A B L E

Des Noms François des Maladies.

- A** *Ascès*, Apostema.
Accouchement, v. Abortus, Dysstocia.
Achore, Tinea.
Affection, scorbutique, Stomacace.
Agitations, Anxietas.
Aigreurs, v. Flatulencia acida.
Alopécie, Alopecia.
Alteration, Polydipsia.
Amalgrissement, Tabes, Atrophia.
Amblyopie, Amblyopia.
Amertume, v. Anorexia biliosa. Vomitus biliosus.
Ampoule, Phlyctæna, Pemphigus, Hydrua.
Anasarque, Anasarca, Phlegmatia.
Aneurysma, Aneurysma, Cardiognus.
Angine, Angina, Cynanche.
Angoisse, Anxietas.
Antipathie, Antipathia.
Antracose, Anthrax.
Anxiété, Anxietas.
Aphonie, Aponia.
Aphthes, Aphtha.
Apoplexie, Apoplexia, Carus.
Ardour, Ardor, Dysuria.
Ascarides, vid. Tenesmus.
Ascites, Ascites.
Asphyxie, Asphyxia.
Assoda, v. Tritrophia.
Assoupissement, Coma, Cl. VI.
Asthme, Asthma.
Atrophie, Atrophia.
Avant cœur, v. Pectus.
Avivres, Angina.
Avortement, Abortus.

Bâillement, Oſcedo.
Bave, Ptyalismus.
Bégayement, Pſellismus.
Berlué, Sulfusio.
Bêvue, Diplopia.
Bile répandue, Aurigo.
Blessure, Abortus, Vultus.
Bistaux, v. Claudicatio.
Borgne, Amaurosis, Caligo, Cataracta.
Bosse, Gibbositas.
Bouffissure, Anasarca, Phlegmatia, Oedema.
Bouillonnement, Ardor.
Boulémie, Bulimus.
Bourdonnement, Syrigmus.
Boursoffure, Emphysema.
Bouton, Papula, Phyma.
Brediffure,
Bruissement, Syrigmus.
Bruiseur, v. Erythema.
Bubon, Bubo.
Bubonocèle, Enterocèle, Epiplocele.

Cachexia, Cachexia, Chlorosis.
Cacoehymia, Cachexia.
Cacophonie, Paraphonia.
Caigieux, v. Lordosis, Diastasis, Rachitis.
Cal, v. Condyloma.
Calenture, v. Phrenitis, Paraphrosyne.
Calcul, v. Dysuria, Nephralgia, Nephritis.
Hepatalgia &c.
Cancer, Cancer, Carcinoma.
Carcinome, Carcinoma.
Cardialgie, Cardialgia.
Carie, Caries.
Carreau, Phylcomia.
Catalepsie, Cataleptis.
Cataporse, Cataphora.
Catarhe, Catarrhus.
Cephalalgia, Cephalalgia.
Cephalée, Cephalæa.
Chancres, Aphtha, Ulcus, Carcinoma.
Charbon, Anthrax.
Charte, Rachitis.
Chassie, v. Epiphora, Ophthalmia.
Chaudpisse, Gonorrhœa.
Chauvete, Alopecia.
Chique, v. Malis.
Chlorose, Chlorosis.
Cholera morbus, Cholera.
Chute, v. Echinomoma.
Chute de la luette, Hypostaphy.
Chute de la matrice, Hysteropia.
Chute du fondement, Exania.
Clavreau, Clavère, Malis.
Cloche, Phlyctæna, Claudicatio.
Cloze, Hemierania, Staphyloma, Furunculus.
Cochemar, Ephialtes.
Cœliquo, Cœliaca.
Colique, Colica.
Colique de Poiton, Rachialgia.
Colique du foye, Hepatalgia.
Colique renale, Nephralgia.
Colique urétrice, Hysteralgia.
Colique de misere, Ileus.
Colique d'estomac, Gastrodynia.
Condylome, Condyloma.
Consumption, Tabes, Phthisis.
Constipation, v. Tenesmus.
Contrainte, Contractura.
Contusion, Contusio, Echinomoma.
Convulsion, Convulsio.
Coqueluche, Catarrhus.
Cor, Condyloma.
Corpulence, Polyfustia.
Coup de soleil, Cephalalgia, Asphyxia.
Coup de sang, Apoplexia, Phrenitis.
Coup de vent, Pleuritis, Catarrhus.
Courbature, Lassitudo, Rheumatismus.

Couronne de Venus, Gutta rosea.
Cours de ventre, Diarrhœa, Alvi fluxus.
Corte-baine, Dyspnœa.
Crachement, Pteralimus.
de sang, Hæmoptylis.
de pus, Phthisis, Anacatharsis.
Crampes, Crampus.
Crémason, Pyrosis.
Crête, Condyloma.
Crinens, vid. Malis.
Croissans, Bubo.
Croute de lait, Tinea.
Crudité, v. Nausea, Vomitus, Anorexia, Cardialgia &c.
Cryalline, v. Oedema.
Courbures (vers), v. Nausea, Bulimia.
Cyons, v. Hordeolum.

Casse de S. Guy, Scelotyrbe.
Casse, Dente, Herpes.
Cassallance, Leptothymia, Cardialgia.
Cégonse, Anorexia, Apheusia.
Celire, Paraphrosyne, Delirium.
Cémangeaison, Pruritus, Scabies, Lepra.
Cémence, Amentia.
Cension, v. Odontalgia.
Cépe, Apostema.
Cesence, Proptoma, Exania, Enterocœle &c.
Cetorse, Exarthrema.
Cévoement, Diarrhœa.
Diabète, Diabetes.
Diarrhœa, Diarrhœa.
Dislocation, Exarthrema.
Distorsion, v. Trismus.
Douleur, Dolor, Cl. VII.
d'ostéme, Gasterodynia.
des dents, Odontalgia.
d'oreille, Otalgia.
Ragon, v. Malis.
Rapeau, vid. Pterygium.
Ruée d'oreille, Dyslocœa.
Ruillon, Condyloma.
Sensibilité, Dysenteria.
Sfurie, Dysuria.

Brouement, Apomyttosis.
Boubolear, Hydroa.
Boufement, Gonorrhœa, Tenesmus, Constipatio, Polydipsia.
Chimose, Ecchymoma.
Chouure, Excoriatio.
Coulement de lait, Galactorrhœa.
Coulement de semence, Gonorrhœa.
Couelles, Scrophula.
Clematis, Phlegmaria.
Cleme, Oedema.
Forc, v. Hernia, Vomitus, Pleuritis, Lumbago.
Empyème, Empyema.
Empyème, Empyema.
Canthris, Sarcoma.
Ichisfrenement, Coriza.
Isfure, v. Phymata, Oedema.

Engelure, Erythema pernio.
Engourdissement, Stupor, Anæsthesia.
Enrouement, Paraphonia.
Enorse, Exarthrema.
Enule, Nevus, Pica.
Eparvin, Exostosis.
Ephelides, Ephelis.
Ephemera, Ephemera.
Epiale, v. Amphimerina.
Epilepsie, Epilepsia.
Epien, Frambxia.
Epine venense, Arthrocœle.
Epraise, Tenesmus, Colica, Dysenteria.
Epulsément, Asthenia, Syncope, Atrophia.
Erailement, Blepharotofis.
Ereintement, Lumbago.
Ergot, Necrosis.
Escare, Eschara.
Esquinacle, Cynanche.
Eternuement, Sternutatio.
Esourdissement, Vertigo, Cephalalgia.
Estranguillon, Dysphagia, Cynanche.
Evanouissement, Syncope.
Excroissance, vid. Cl. I.
Exomphale, Exomphalus.
Exepte, Exostosis.
Expectoration, Anacatharsis.

Faim-canine, Bulimia.
Faim-vale, Syncope.
Farcin, Scrophula.
Fausse couche, Abortus.
Felure, Fissura.
Feu Persique, Erythema.
S. Anelino, Necrosis, Erythema.
Folage, Erythema.
Fic, Condyloma.
Fievre, Febris, Cl. 2.
ardente, Tritzophya.
bilieuse, Tritzophya.
cacochimique, Synochus.
casaribuse, Amphimerina.
colliquative, Tabes, Phthisis.
continue, Cl. 2.
épiale, Amphimerina.
éruptive, Exanthematica.
érysipélateuse, Erysipelas.
inflammatoire, Cl. 3.
intermittente, Cl. 2.
lente, Hæctica, Tabes.
muligne, Typhus.
militaire, miliaris.
pesticielle, purpura.
pourpre, purpura.
puante, Amphimerina, Synochus.
quaraine, quartana.
Fievre remittente, Cl. 2.
rouge, Scarlatina.
scarlatine, Scarlatina.
stercé, tertiana.
Filer, Dysphagia, Psellismus.
Fistule, Fistula.

F. l'ens

- Flours blancs*, Leucorhœa.
Fluxus hépatique, Hepatirhœa.
Fluxion de poitrine, Peripneumonia.
 sur les dents, Odontalgia.
 sur les yeux, Ophthalmia.
 sur la gorge, Cynanche.
 sur l'oreille, Otalgia.
Foiblesse, Asthenia, v. *Class. 6.*
 d'estomac, Anorexia, Gastrodynia.
 de la vue, Amblyopia, Caligo.
Folette, Amphimerina, Angina.
Folle, Melancholia.
Forraiture, Hysteralgia.
Foulsure, Exarthrema.
Fouches, Apostema.
Fraiture, Fractura.
Frayeur, Panophobia.
Frison, Rigor.
Francle, Furunculus.
Futeur utérine, Nymphomania.
Furcicle, Furunculus.

Gale, Scabies.
Glanglion, Condyloma.
Graugrène, Gangræna, Necrosis.
Germe, v. Abortus.
Gesure, Rhagas.
Glaiue de l'estomac, v. Vomitus.
 de la vessie, Pyuria.
Glandules, Scrophula.
Glaucome, v. Cataracta.
Gonflement d'estomac, Meteorismus, Gadorodynia.
 des articulations, Rachitis, Hydarthrus,
 Arthrocaee &c.
Gonorrhée, Gonorrhœa.
Goussure, Bronchocele.
Gutte, Arthritis.
Goutte-clampe, Crampus.
Goutte sciatique, Ischias.
Goutte seréine, Amaurosis.
Gratelle, Scabies.
Gravelle, Dysuria, Nephralgia.
Grelle, Hordeolum.
Grenouillette, v. Psellismus.
Grippe, Catarrhus.
Grossesse, Graviditas.
Gruemel (loit), v. Mastodynia.
Gupes (piquure de), v. Punctura.

Hâle, Ephelis.
Haus-mal, Epilepsia.
Héctique, Hectica.
Hémiplegie, Hemiplegia.
Hémorrhagie, Hemorrhagia.
Hémorroides, Mærisca, Hemorrhoids.
Hemvud, Nostalgia.
Hépatite, Hepatitis.
Herpe, Heipes.
Hoques, Singultus.
Humour froide, Scrophulæ.
Hydatide, Hydatis.
Hydrocele, Hydrocele.

Hydrocephale externe, Hydrocephalus. *Interne*, v.
 Convulsio, Apoplexia, Eclampsia.
Hydremphale, Exomphalus.
Hydropisie générale, Anasarca, Pneumatosis, Phleg-
 matia.
 de la tête, Hydrocephalus.
 de l'œil, v. Amblyopia.
 de poitrine, Hydrothorax, Hydrocardia.
 du bas ventre, Ascites, Tympanitis.
 de matrice, Phylometra, Hydrometra.
Hysterique passion, Hysteria.

Janen, Tarantismus.
Jaunisse, Aurigo.
Itère jaune, Aurigo.
 blanc, Chlorosis.
 noir, Melasistherus.
Iliaque passion, Ileus.
Inappétence, Anorexia.
Incontinence d'urine, Enuresis.
Ineuie, Ephialtes.
Indigestion, v. Gastrodynia, Vomitus, Flatulen-
 tia, Colica, Diarrhœa, &c.
Infiltration, Plegmatia, Oedema.
Inflammation, Phlegmasia, Phlegmo, Erysipelas.
Inquiétude, Anxietas.
Insomnia, Agrypnia.
Intermittent (pouls), v. Palpitatio, Cardiognus,
 Alvi fluxus.
Ischurie, Ichuria.

Ladrerie, Elephantiasis, Phlegmaria.
Lait répandu, v. Ephemera lactea, Oedema la-
 queum.
Langue chargée, v. Synochus, Typhus, Anore-
 xia, Vomitus.
Languueur, Asthenia.
Larmoyement, Epiphora.
Lassitude, Lassitudo.
Lentilles, Ephelis.
Lepre, Lepra.
Lethargie, Lethargus.
Leucome, Leucoma.
Leucophlegmasie, Anasarca.
Lienterie, Lienteria.
Lipothymie, Leipothymia.
Lipyrie, Tritrophya.
Louche, v. Ostrabismus, Caligo.
Loup, Carcinoma, Ulcus.
Loupe, Lupic.
Luerre, v. Angina, Hypostaphyle.
Luxation, Exarthrema.
Lycanthropie, Melancholia.

Mal d'avanture, Paronychia.
 caduc, Epilepsia.
Mal de cœur, Cardialgia, Nausea.
 des ardeurs, Necrosis.
 S. Antoine, Erysipelas.
 S. Malin, Scabies.
 S. Lazare, Elcosis.
 de mère, Hysteralgia.
 mort, Lepra.

d'estomac, Cardialgia, Anasarca.
de toe, Cephalalgia.
aux yeux, Ophthalmia.
de gorge, Cynanche, Angina.
Maladie, Pica.
Maladie noire, Mælena.
ophtalmique, Phthiriasis.
imaginaire, Hypochondriasis.
Manie, Mania.
Marasme, Atrophia.
Melancholia, Melancholia.
Membre retiré, Contractura, Ankilosis.
Météorisme, Meteorismus.
Méurtrissure, Contusio.
Migraine, Hemicrania.
Miliare, Miliaris.
Miserere, Ileus.
Morphe, Vitiligo.
Morpiens, v. Pruritus.
Morsure, v. Punctura, Hydrophobia.
due, Paraphonia, Alopecia.
dure, Erythema pernio.
ture, Condyloma, Encanthis.
turiz, Mutitas.
taufée, Nausca.
zéphratique, Nephritis, Nephralgia.
teris faibles, Asthenia, Paralysis.
zotambules, Somnambulismus.
zot me tangere, Carcinoma.
zouage, Nouera, Rachitis.
zoyes, v. Asphixia.
zua, v. Leucoma, Nephelium.
zustruitions, v. Class. X.
zontalgia, Odontalgia.
zème, Oedema.
zobrage, Leocoma.
zngles, Ophthalmia.
zpression, v. Class. V.
zcoillons, Parotis.
zgeoles, Hordeolum.
zobopnée, Orthopnoea.
zobli, Amnesia.
ziz trouble, Paracusis.
zème, Dysocia.
ziles couleurs, Chlorosis.
zipitation, Palpitation.
zsmari, Paronychia.
zralysie, Paralysis.
zraphrenesie, Paraphrenitis.
zraphymesis, Phymosis.
zraplegie, Paraplexia.
zresse du ventre, v. Tenesmus.
zrostide, Parotis.
zrome, Tetanus.
zsson coeliaca, Coeliaca.
zisterique, Hysteria.
zhypochondriaque, Hypochondriasis.
ziliague, Ileus.
zovrine, Malls.
zodus, v. Asphixia.
zipneumonie, Peripneumonia.

Perle, Leucoma.
Perte d'appetit, Anorexia.
de goût, Agheusia.
d'odorat, Anosmia.
de sang, Hæmorrhagia.
blanche, Leucorrhœa.
Pesanteur d'estomac, Gæstrodysia.
de tête, Cephalalgia.
Petechie, Purpura.
Petite-vérole, Variola.
Phlegmen, Phlegmo.
Phylidène, Phylæna.
Phrenesie, Phrenitis.
Phthisie, Phthisis.
Phymesis, Phymosis.
Pis enflés, Phlegmatia.
Piz-hot, Lordosis; Diastasis.
Pierre, Nephritis, Dysuria &c.
Pizuite, Vomitus, Anacarditis, Pyralismus.
Playe, Class. I. Ordo 7.
Pleurisie, Pleuritis.
Plique, Trichoma.
Plomb, Asphixia.
Pneumatecele, Oscheocele.
Pedagre, Arthritis.
Peil, Mastodynia.
Pis de tête, Pleurodyne.
Poirreau, Condyloma, Verruca.
Pollution, Gonorrhœa.
Poisse, Sarcoma, Palpitation.
Poulain, Bubo.
Pourpre, Purpura.
Pouffe, Asthma.
Priapisme, Priapismus.
Prurit, Pruritus.
Pyralisme, Pyralismus.
Puanteur, Punaissie, Dysodia.
Puimonia, Phthisis.
Pustule, Pustula.
Quartaine, Quartana.
Quinte, Tussis paroxysmus.
Quotidienne, Quotidiana.
Rache, Tinea.
Rage, Hydrophobia, Rabies.
Ralle, Railement, Paraphonia.
Rapport, Flatulentia.
Ratelleux, v. Splenalgia.
Relachement de l'anus, Exania.
Reprise, Accessus, Paroxysmus.
Retenue d'urine, Ichuria.
Rheumatisme, Rheumatismus.
Rheume, Rheuma.
Ricquets, Rachitis.
Ris Sardouique, Trismus.
Ronflement, Paraphonia.
Ret, Flatulentia.
Rougeole, Rubella.
Rougeur, Erythema.
des yeux, Ophthalmia.
Rouffeur, Ephelis.
Rupture, Ruptura.

Saigne.

Saignement de nés, Hæmorrhagia.

Salivation, Ptyalismus.

Sarcocèle, Oscheocele.

Sarcome, Sarcoma.

Sarette, Trismus.

Satyriase, Satyriasis.

Scarlatine, Scarlatina.

Sciatique, Ischias.

Scorbut, Scorbutus.

Sècheresse de la gorge, Dysphagia.

de poitrine, Tussis.

Seing, Nævus.

Serpentine, Oedema.

Siam, Typhus, Pestis.

Sifflement, Syrigmus.

Skirre, Scirrhus.

Soif, Polydipsia.

Solitaire, v. Boullimia.

Soubresaut, Carphologia.

Souris, Nyctagmus.

Spermatocèle, Oscheocele.

Sphacèle, Gangrena, Necrosis.

Staphilome, Staphyloma.

Stérilité, Anaphrodisia, Dysperatismus.

Strabisme, Strabismus.

Strangurie, Stranguria.

Stupor, Stupor.

Subersh Cataphora.

Suette, Ephemera, Miliaris.

Sueur, Ephidrosis.

Sueur Angloise, Ephemera.

Suffocation, Orthopnoea.

Suppression des mois, v. Hysteralgia, Nausea, Dys-

ipnoea, Anorexia.

Suppression d'urine, Ischuria.

Surdité, Cophosis.

Syncope, Syncope.

Synoque, Synochus.

Tache; Leuconia, Class. I. Ordo I.

Tania, v. Boullimia, Vomitus, Gastrodynia.

Tarantisme, Tarantismus.

Taze, Leucoma.

Telme, Tinea.

Tenesme, Tenesmus.

Terreur panique, Paraphobia.

Tetanus, Tetanus.

Tic, Trismus.

Tierce (fièvre) Tertiana.

Timonin, Syrigmus.

Tiraillement, Pandiculatio.

Torticolis, Obliptitas.

Toux, Tussis.

Tranchées, Colica, Dysenteria, Hysteralgia, Dys-

stocia.

Transport, Phrenitis, Paraphrosyne.

Tremblement, Tremor, Rigor.

Trouffe-galant, Cholera, Cephalitis, Cynanche.

Tubercule, v. Phthisis.

Tumour blanche, Gydarthrus.

Tympanite, Tympanites.

Vapours, Hysteria, Hypochondriasis.

Varice, Varix.

Varicocèle, Oscheocele.

Vents, Flarulentia.

Verequin, Phrenitis.

Vereue, Variola.

Vermine, Phthiriasis.

Varole, Syphilis.

Verolette, Variola.

Verrue, Verruca.

Vers, v. Gastrodynia, Ileus, Colica, Convul-

sio, Ecclampsia, &c.

Ulcère, Ulcus, Elcosis.

Volvulus, Ileus.

Vomique, Apostema, Phthisis, Hepatalgia.

Vomissement, Vomitus.

de sang, Hæmatemesis.

Urine sanglante, Hæmaturia.

Urine purulente, Pyuria.

Vue faible, Amalyopia, Caligo.

lancée, Strabismus, Caligo.

Vuidanger, Menorrhagia.

Yavv, Frambæsia.

Yvresse, v. Apoplexia, Vertigo &c.

I N D E X

NOMINUM GENERICORUM, SPECIFICORUM & SYNONYMORUM &c.

Numerus Romanus Tomum, Arabicus vero paginam indicans.

A Adminis dolores, II, 49. morbi. 377.
 spasmus. 220.
 Aberrationes, *Aberraciones*, I, 92.
ABORTUS, II, 164. effluxio, 166. oestime-
 stris, subsemetris. *ibid.* subsemetris, *ibid.* ab
 uteri laxitate, 167.
Abfces, I, 90. fistulæ, II, 328. *an foye*. 60.
 Abfcessus, I, 90. mammarum, II, 70. pulmo-
 num, I, 359. spirituosus, 88.
Abftinens lingue, I, 402.
Accès de fèvre, I, 181.
Accouchement accompagné de convulfion, I, 299.
 laborieux, II, 63. *contre nature*, 65. *prématuré*,
 165. 166.
 Achlys, I, 69. 380.
 Achor, Achores, II, 306.
 Acna, Acne, I, 75.
 Acrimoniosi morbi, II, 360.
 Acrochordon, I, 84.
 Adaimonia, II, 22.
 Addephagia, II, 114.
ADIPSIA primaria, secundaria, I, 403.
 Abfctio ftomachi, II, 53.
ÆDOPSOPIA, II, 220. urethrae, uterina,
ibid.
 Ægilops, II, 197.
 Ægis, I, 69. 380.
AERI-FLUXUS, II, 218.
 Aerophabia, II, 123.
 Ætus volaticus, I, 76. II, 27.
 Ætatum morbi, II, 377.
 Affectio oris fcorbutica, II, 157.
Affectus foporeus, I, 430.
 Affectus superficialis, I, 56. eorum theoria, *Libid.*
Agacmentus des dents, II, 43.
AGHEUSTIA, febrilis; paralytica, I, 393.
AGRYPNIA; arthritica, II, 144. cephalal-
 gica, *ibid.* critica, 145. a dolore; febrilis, 144.
 yfterica, *ibid.* ab indigestione, 144. ab infectis,
 45. ex pancreate, 144. a pathematis, *ibid.* ructa-
 tionis succedens, *ibid.* lenilis, 145. a vermibus, 144.
 Agrypnocoma, I, 434. 435.
 Agus (the), I, 181.
Aigreur d'estomac, II, 46.
 Aimatera, II, 170.
 Aimatimos, II, 151.
 Aimatos eccrisis, II, 157. 162.
 Aimorhois, II, 171.
Sauvages Mefologie Methodica Tom. II.

Aimorroia, II, 162.
 Alalia, I, 405.
 Albara Avicennæ, I, 70. nigra, *ibid.* II, 303
 Albugo, I, 70. 380.
 Albulæ, I, 178.
 Algarab, II, 197.
 Algedo, I, 92.
 Algernata, II, 5. 11.
 Algola Arabum, I, 240.
ALGOR, I, 298. II, 26. externus, *ibid.* fe-
 bricosus, *ibid.* internus, *ibid.*
 Alguada, I, 70.
 Alhalef, I, 75.
Alienation d'esprit, II, 128.
ALOPECIA, *Alopecie*, II, 302. 'gax. atca-
 ta, *ibid.* porriginosa, *ibid.* simplex; fymphilitica,
 volatiliū, *ibid.*
 Alphus, I, 70. II, 313.
ALVIFLUXUS, II, 167. 188. colligativus,
 190. puriformis, 191. profluvia, 167. profluvium
 album, 189.
 Alurefcchio Mazah, I, 228.
 Alyfmon, II, 22.
Amarr, I, 307. 439.
AMAUROSIS, I, 390. ab achribus repre-
 fis, 392. ab aqua in cerebri cortice finibusve,
 392. arthritica, 392. ex bombarde explosione; a
 calculo juxta nervum opticum; a capitis com-
 motione, vulnere; a catarrho, 390. congenita; ab
 epilepfia, *ibid.* exanthematica, 392. exhauftorum,
ibid. a febris acutis, 391. foricatorum, *ibid.*
 gravidarum; ab hæmorrhoidum fluxu fuppreffo,
ibid. hystrica; intermittens, 392. a menofafia,
 menftruorum fluxu fuppreffo, 391. a morbis con-
 vulfivis; a myofis, *ibid.* a narcoticis, 392. ab ocu-
 li interna fupparatione, 391. foricatorum, *ibid.*
 plethorica, *ibid.* a plica refecta vel retenta, 392.
 rachialgica, *ibid.* a fciabie fuppreffa, *ibid.* fcerophu-
 lofa, 391. a fpafmo, *ibid.* ex fteatomate in cere-
 bro, *ibid.* a fynchylis, *ibid.* traumatica; a tumo-
 re globoso nervis opticis infidente, *ibid.* vene-
 rea, 392. ob veficam nervis opticis incumben-
 tem, 391. ab uvæ phlogofi, *ibid.*
 Amblofis, II, 165.
AMBLYOPIA, *Amblyopie*, I, 382. 390. ab-
 foluta, 389. crepuscularis, 383. diffitorum, 385.
 hydropthalmica, 390. lufcorum, 388. meridia-
 na, 384. proximorum, 387.

B b Amblyof

- Amblyofmos, I, 389. II, 166.
 Amblytes, I, 389.
 Ambulatio, I, 76. 158. II, 318.
 AMENTIA, II, 132. calculosa, 133. a cro-
 co; ab hydaribus, 132. ab icteru; microcephala;
 morosa; a quartana; rachialgica; 133. fenilis;
 serosa, 132. ex siccatate, *ibid.* a transfusione san-
 guinis, a tumore, a venenis, *ibid.*
 AMNESIA, II, 143. cephalalgia; febrilesequa;
 ab hæmorrhoidibus suppressis; a lochiis suppressis;
 a pathemate; plethorica; fenilis; a tenu-
 lentia; traumatica; a venere, *ibid.*
 Amor infanus, II, 134.
 Amphemerina, AMPHIMERINA, I, 170.
 anginosa, 173. arthritica; biliosa, 175. cardiaca,
 171. catharrhalis, epiala, *ibid.* hemisternus, 171
 humorosa, *ibid.* Hungarica, 173. laica, 170. mili-
 liaris, 173. mimosa, 174. paludosa, *ibid.* perip-
 neumonia, 173. phrenitica, 174. phricodes
 172. pseudohemisternus, *ibid.* scorbutica, 174.
 semiquartana, 175. semiquintana, 176. singultua-
 sa, 173. spasmodica, 174. syncopalis, 171. tuffi-
 culosa, 173. variolosa, 175.
 AMPUTATURA, I, 118.
 Anabexis, II, 199.
 ANACATHARSIS, II, 201. asthmatica,
 203. biliosa, 201. phthifica, putiformis; a vo-
 mica, *ibid.*
 Anachrempsis, II, 199.
 ANÆSTHESIA, I, 399. melancholica; nas-
 centium, 400. plethorica; a spina bifida, 399.
 Analepsia, I, 303. 304.
 ANAPHRODISIA, I, 403. gonorrhoeica;
 magica; a mariscis, *ibid.* a paralyti, *ibid.* ab u-
 reshze vicio, *ibid.*
 Anaptylis, II, 202.
 ANASARCA, *Anasarque*, II, 148. ab adia-
 pneusia, 249. Americana, 250. exanthematica; a
 febrilibus, a fluxu, 249. gravidarum, *ibid.* hydro-
 potarum, 250. hysterica, *ibid.* metastatica, 248.
 periodica, 249. purulenta; rachialgica; urinosa,
 250.
 Anastropha, II, 178.
 Anaudia, Anade, I, 405.
 Anchylops, II, 198.
Anconur, I, 220.
 Ancyloblepharos, I, 380. II, 103.
 Andromania, II, 120.
 Andrum; Andruaiaku, I, 91.
 ANEPITHYMIÆ, I, 400.
 ANEURYSMA, I, 88. cylindroides, *ibid.*
 præcordiorum, II, 47. spurium, I, 88. ventri-
 culi dextri, II, 47. verum, I, 88.
Aneurisme, I, 88. *du cœur*, II, 47. *total*, I, 88.
 ANGINA, *Angine*, I, 354. alba, aneurys-
 matica, 357. arthritica, 259. bronchocelica,
 357. bronchus, 355. calculosa, *ibid.* canina, 259.
 a deglutitis, 356. epidemica, 173. exanthemati-
 ca, 357. ab hydrargyri, 260. hydrophobica;
 hysterica, 356. inflammatoria, 257. a laqueo;
 356. falsa larynge &c. 259. Lorreriana, 355.

- morbillosa, 259. 357. mucosa, 355. natalis, 357.
 cedematosa, 355. piruitosa, *ibid.* polyposa, 357.
 scirrhusa, 356. scorbutica, 357. spasmodica,
ibid. 12. species Boerhaave, 259. 41. species,
ibid. 92. species, 257. spuria, 259. suppuratoria,
 356. symptomatice, thymica, 357. variolosa,
 259. 357. venerea, 356.
Anguisse, II, 22. *de la mort*, *ibid.*
 ANHELATOMES, I, 312. eorum theo-
 ria, 312. OPPRESSIVÆ, 343. SPASMODI-
 CÆ, 329.
 Anhelitus difficultas, I, 343.
 Animi deliquium, I, 422.
 Ankylosis, *Ankilois*, I, 123. 124. *conditioque*,
ibid. *de la cuisse*, II, 78.
 Annulus, II, 38.
 Anoia, II, 134.
 ANOREXIA, I, 400. arthritica, 402. bi-
 liosa; 401. cachectarum, 402. catamenialis,
 401. exhaustorum, 402. febrilis; melancholica,
 401. mirabilis; Neophytorum, 402. paralytica;
 piruitosa, 401. plethorica, *ibid.* ob resolutionem
 nervorum stomachi, *ibid.* a sabarra, 402. Sevva-
 riana, *ibid.*
 ANOSMIA; catarrhalis; ab orana, I, 392.
 paralytica, 393. a polypo; a siccatate; syphili-
 ca; verminosa, *ibid.*
 ANTHRAX, I, 80. II, 328. malignus;
 Perficus, I, 81. pestilens, 220. simplex, 80. ta-
 rantatus, 81.
 Anticardia, I, 220.
 Antiglaucoma, I, 378.
 ANTIPATHIA, *Antipathie*, II, 117. huma-
 na, *ibid.*
 Anus; ejus dolor; inflammatio, II, 78. in-
 flammatio & ulcus, 192. interruptio, 78. prola-
 pus, I, 98.
 ANXIETAS, *Anxiété*, II, 12. agonistica,
ibid. cardiaca; 23. febrilis, 22. a morbo, 23.
 spasmodica, 22. ticiparum, 23.
 Aphedros, II, 102.
 APHONIA, I, 405. 407. 418. 441. aneurys-
 matica; anginosa, 408. ab antipathia, *ibid.* ca-
 tarrhalis; hysterica, *ibid.* melancholica, *ibid.*
 paralytica; pulmonica; remulentorum; traumati-
 ca, *ibid.*
 APHTHA, *Aphthes*, I, 240. in adultis;
 Belgarum; cacoethes; febrilis, *ibid.* infantililis;
 leucimem, *ibid.* maligna, 241. scorbutica; sy-
 philitica, *ibid.*
 Apilepsis, I, 441.
 Apnoea, I, 439.
 APOMYTOSIS, I, 289.
 Apophora, II, 465.
 APOPLEXIA, *Apoplexie*, I, 255. 414. 441.
 arthritica, 441. atrabilaria, 444. cerebelli, 426.
 epileptica, 443. exanthematica, *ibid.* febrili-
 cola, 444. flarulenta, 426. 429. hypochondriaco-
 spasmodica, 439. hysterica, 443. inflammatoria,
 444. mephitica, *ibid.* metastatica, 433. minor,
 437. minor sanguinea, 438. partialis, 437. pe-
 riodi-

riodica, 444. phlegmonosa, 442. pituitosa, 443. polyposa, 444. puerperarum, 443. purulenta, 445. sanguinea, 442. a scabie; scorbutica; ferola, 443. spasmodica, 439. suppuratoria, 444. tumulenta, 442. traumatica, 441. vaporosa, 443. verminosa, 444.

Apoplechia, I, 422.

Aporia, II, 22.

Apostitia, I, 400.

Apostasis, I, 90.

APOSTEMA, *Aposteme*, I, 90. abscessus; apollasis; diaphesis, *ibid.* empyocoele, *ibid.* hypopyon; onyx, parousis, *ibid.* phalangium, spina ventosa, *ibid.* synchysis, *ibid.* vomica, *ibid.*

Apostume, I, 90.

Appetit depravatus, bilis, II, 112.

Apoplechia, I, 423.

Aqua, I, 366. Aquae ex utero pregnantis effusio, II, 211.

Aquila, I, 85. 380.

Arceusell, I, 155. II, 70.

Arctura, I, 82.

Arcus fenilis, I, 70.

Ardens (mul des), I, 81. 238.

Ardens de cause interne, II, 27. *d' urine*, 105.

ARDOR; externus, internus, II, 26. 27. Romachi, ventriculi, 46. volaticus, 27. urinae, 105.

Area, II, 321.

Argema, II, 38.

Argyras, I, 378.

ARIDURA; ab arthrocace; hydropica; paralytica; rachialgica; scorbutica; spasmodica; traumatica, II, 245.

Arfura, II, 80. 206.

ARTHRITIS, II, 10. *activa*; *alba*, 14. Americana, 16. athmatica, 15. Bahamensis, 16. chlorotica, 14. a colica; capicularibus morbis subiecta; exanthematica; febricosa, 15. febrilequa, febri vel continuo, vel erysipelas vel intermittenti quartana succedens, *ibid.* hyemalis, 13. melancholica, 14. paturae succedens, 15. podagra, 12. rachialgica, 15. rachitica, 16. rheumatica, 13. scorbutica, 14. syphilitica, 15. vagina, 17. venerea, 15.

ARTHROCACE, I, 119. II, 16. 245.

Artus vari, I, 124. 125.

Artuum morbi, II, 374.

ASCITES, *Ascite*, II, 263. ab aqua sanguinolenta, nigrescente, 268. arthriticus; artificialis, 266. collidus, 267. chylosus, 268. a colligatione, 264. 266. cruentus; a cruore mero; a cruore loturae carniis similis, 268. ab exanthematis, 266. febrilis, *ibid.* flatulento-peritonaeus, 265. ab hepate, 264. ab herpetibus repressis, 266. ab inanitione & colligatione, 265. intercus, 267. intermuscularis, *ibid.* a liene, 265. a maculis repressis, 266. a mesenterio strumoso, 265. oleosus Baglivi, 268. omentalis, 267. ab oppila-

tione, 264. ovarii, 267. ab ovarii, 265. purulentus, 268. purulento-peritonaeus, 269. a quartana, 266. a rubeola repressa, *ibid.* facciatus, 267. 268. a sanguifluxibus, 265. sanguineointerius; sanguineo-peritonaeus; sanguineo-uterinus, 268. a scabie repulsa, 266. scorbuticus; *ibid.* serophalofus, 265. serosi abdominales, 263; serosi non abdominales, 267. non serosi abdominales, 268. nec serosi nec abdominales, *ibid.* stomachi, 267. a vesica disrupsa; urinosus, 268. uterinus, 267. vulgarior, 263. ejus curationis praxis, 269.

Asci, I, 75.

Asitia, I, 400.

Askites, II, 263.

Aspermatismus, II, 217.

ASPHYXIA, *Asphyxia*, I, 426. a carbone, 429. cataleptica, 428. congelatorum, 427. stupida; foticariorum, 429. a fumis, 427. hysterica, 428. immerforum, 426. a mephitide, 428. a multo, 427. neophytorum, 429. a pathemate, 428. sideratorum, 429. spinalis, *ibid.* suspensorum, 427. traumatica, 429. Valsalviana. *ibid.*

Affe, II, 21.

Affodes, I, 178.

Afforipiens, I, 430. *carotique*, 437.

ASTHENIA, I, 419. abstinentium, 421. Americana, 422. cachectica; chlorotica, 420. febrilis, *ibid.* hydrocephali, 419. hydrocephalica; hysterica, 421. ab inanitione, *ibid.* infantum, *ibid.* nativa, 422. ab ostioscarcofi; ossifraga, 421. a pathematis, 420. Pannonica, 419. scorbutica, 420. syphilitica, 421. Virginica, 419.

ASTHMA, I, 347. arthriticum, 349. cathecticum; catarrhale, 350. continuum, 344. convulsivum, 348. 353. equinum, 350. exanthematicum, *ibid.* febricofum, 351. flatulentum, 347. a gibbo, 350. humidum; humorale, 347. II, 203. hypochondriacum, I, 349. hystericum, *ibid.* metallicum, 350. nocturnum, 349. nothum, 349. occultum, 348. orthopnoea, 349. plethoricum, 350. pneumonodes, 347. 351. a polypo cordis; pulverulentorum, 349. sanguineum, 350. a scabie; ficcum, 348. spurium, 344. stomachicum, 349. venereum, 350. uterinum, 352.

Asthme, I, 347. *adipoux*, 350. *ordinaire*, 347.

Atechnia, I, 403.

Atoni morbi, II, 368.

Atrebile, II, 176.

ATROPHIA, *Atrophie*, II, 243. ab alvifluxu, 244. Anglica, 243. a crinonibus, 244. a fascino; febrisque; infantilis, 245. lactentium, 243. lateralis, 245. a leucorrhoea, 243. a lue venerea, 248. de la *moistie du corps*, 245. nervosa, 243. nutritum, a pryalismo, 244. rachitica, *ibid.* a sanguifluxu, 243. scorbutica; fenilis, 244. verminosa, 245. Virginiana, 243. a vomitu, 244.

Avant-cour, I, 221.

Auditus difficilis, I, 393. gravitas, 395.

B b a

Avi-

Exostosis.
Cancer.
Scrophula.
Rachitis.
Leontiasis.
Epinyctis.
Tarus.
Papula.
Pustula.

ORDO III.

Cystides.

Aneurysma.
Varix.
Hydatis.
Marisca.
Slaphyloma.
Lupia.
Hydarthrus.
Hydrorachitis.
Apostema.
Exomphalus.
Osteocole.
Hydrocephalus.
Physocephalus.
Ascites.
Hydrometra.
Physopectra.
Tympanites.
Meteorismus.
Ischuria.

ORDO IV.

Etiopia.

Exophthalmia.
Encephalocoele.
Blepharoptosis.
Paraglossa.
Proptoma.
Exarthrema.
Loxarthrus.
Diastasis.
Lordosis.
Gibbositas.
Exania.
Exocyste.
Hysteroptosis.
Enterocoele.
Epiplocele.
Gastrocele.
Hepatocoele.
Splenocoele.
Hysterocele.
Cystocoele.
Parorchidium.

ORDO V.

Plaga.

Vulnus.
Punctura.

Excoriatio.
Contusio.
Fractura.
Fissura.
Ruptura.
Amputatura.
Ulcus.
Elcosis.
Malis.
Carcinoma.
Frambæsia.
Tinea.
Luxulceratio.
Sinus.
Fistula.
Rhagas.
Eschara.
Caries.
Arthrocece.

CLASSIS TERTIA.

Morbi acutum.

ORDO I.

Morbi partium mollium.

Hemiplegia.
Paralysis.
Paraplexia.
Beriberia.
Tetanus.
Rigor.
Tremor.
Scelotrybe.
Crampus.
Pandiculatio.
Rheumatismus.
Convulsio.
Anxietas.
Lassitudo.
Ischias.
Pernio.
Sarcoma clavus.
Paronychia.
Arthritis podagra.
Loxarthrus.
Exarthrema.
Exostosis.
Hydarthrus.
Phlegmatia.
Lordosis.
Contractura.
Aridura.
Claudicatio.
Carpologia.

ORDO III.

Morbi partium tendino-articularum.

Arthritis.
Osteocopus.

Rachitis.
 Claudicatio..
 Contractura.
 Exarthrema.
 Loxarthrus.
 Gibbositas..
 Exollosis.
 Paronychia.
 Hydarthrus.
 Lordosis.
 Diastasis.

CLASSIS QUARTA.

Morbi Sexuum.

O R D O I.

Morbi genitalium communes.

Gonorrhœa..
 Enuresis.
 Dysuria.
 Pyuria.
 Ichuria.
 Hematuria.
 Diabetes.
 Edrophia.
 Anaphrodisia.
 Pudendagra..
 Ulcus venereum.
 Condyloma ficus.
 Condyloma porrum..
 Condyloma thymus.
 Verruca venerea.
 Rhagas venerea.

O R D O II.

Morbi virorum.

Phimosis.
 Parorchidium.
 Oscheocele.
 Triapismus.
 Jedema penis.
 Satyriasis.
 Disperatismus.

O R D O III.

Morbi mulierum.

Abortus,
 Dyslocia..
 Leucorrhœa.
 Gravitas.
 Isteria.
 Isteroloxia.
 Isteroptosis.
 Hysometra.
 Menorrhagia.
 Nymphomania.

CLASSIS QUINTA.

Morbi sensum.

O R D O I.

Morbi oculorum; 1. interni.

Amaurosis.
 Diplopia.
 Sulfusio.
 Amblyopia.
 Epiphora.
 Verrigo.

2. externi..

Caligo.
 Cataracta.
 Exophthalmia..
 Ophthalmia.
 Hordeolum.
 Pterygium.
 Staphyloma.
 Blepharoptosis.
 Nyktasmus.
 Strabismus.
 Apoplema hypopyon..
 Apoplema synchysis.
 Apoplema onyx.
 Ecchymoma palpebrarum..
 Ecchymoma hypopyon..
 Phlegmone oculi.
 Sarcoma encanthis.
 Sarcoma oculorum.

O R D O II.

Morbi aurium interni.

Cophosis.
 Dylececia.
 Paracusis.
 Syngimus.
 Otalgia.
 Otorrhœa.
 Proptoma auris..

O R D O III.

Morbi narium.

Anosmia.
 Dysodia ozœna.
 Paraphonia a polypo..
 Corœza.
 Hæmorrhagia.
 Sarcoma narium.

O R D O IV.

Morbi oris.

Aphtha.
 Ptyalismus.
 Hygostaphyle.

Paraglossæ.
 Agheusia.
 Pselismus.
 Mutitas.
 Adipsia.
 Aphonia.
 Paraphonia.
 Polydipsia.
 Stomacace.
 Angina.
 Cynanche.
 Apostema parulis.
 Odontalgia.
 Caries dentium.
 Dysphagia a labario.
 Proptoma labii.
 Pica.

Lethargus.
 Stupor.
 Convulsio.
 Eclampsia.
 Epilepsia.
 Epialtes.
 Hydrophobia.
 Rabies.
 Cephalæ.
 Cephalalgia.
 Hemisrania.
 Tarantismus.
 Antipathia.

CLASSIS SEPTIMA.

Morbi Pectoris.

1. externi.

Glaucirrhæa.
 Mastodynia.
 Trismus.
 Bronchocele.
 Catarrhus.
 Pleurodyne.

2. interni.

Rheuma.
 Tussis.
 Oscedo.
 Singultus.
 Dyspnœa.
 Asthma.
 Orthopnœa.
 Hydrothorax.
 Empyema.
 Pleuritis.
 Peripneumonia.
 Pleurodyne.
 Paraphrenesis.
 Hæmoptysis.
 Anacatharsis.
 Phthisis.
 Stertor.
 Paraphonia.
 Aphonia.
 Anxietas.
 Aphyxia.
 Syncope.
 Leipothymia.
 Palpitatio.
 Cardiognus.
 Carditis.
 Asthenia.

CLASSIS SEXTA.

Morbi capitis.

O R D O I.

Externi.

Alopecia.
 Trichome.
 Tinea.
 Hydrocephalus.
 Physocephalus.
 Phthiriasis.
 Encephalocoele.
 Lupia testudo.

Cali.

Scrophula.
 Catarrhus.
 Bronchocele.
 Angina.
 Cynanche.
 Trismus.
 Obstipitas.

O R D O II.

Morbi capitis interni.

Mania.
 Dæmonomania.
 Melancholia.
 Paraphrosyna.
 Panophobia.
 Phrenitis.
 Cephalitis.
 Agrypnia.
 Amentia.
 Amenia.
 Apoplexia.
 Anæsthesia.
 Carus.
 Cataphora.
 Catalepsis.
 Barochus.
 Ecstas.

CLASSIS OCTAVA.

Morbi Abdominis.

1. Externi.

Lumbago.
 Rachialgia.

Excerpt.

Exomphalus.
 Gastrocele.
 Hepatocele.
 Enterocoele.
 Epiplocele.
 Splenocoele.
 Cystocoele.
 Erythema intertrigo.
 Phisconia.
 Hæmorrhoids.
 Proctalgia.
 Exania.
 Marisca.
 Tympanites.
 Ascites.
 Phylometra.
 Hydrometra.
 Neteorismus.
 Bubo.

2. *Stomachi interni.*

Anorexia.
 Bulimia.
 Nausea.
 Ictus.
 Pyrosis.
 Gastrodynia.
 Flatulentia.
 Vomitus.
 Hæmatemesis.
 Gastritis.
 Cholera.
 Hypochondriasis.

3. *Intestinorum.*

Melæna.
 Ileus.
 Dysenteria.
 Diarrhoea.
 Epatirrhœa.
 Intertia.
 Cœliaca.
 Enterismus.

4. *Hepatis.*

Cirrhosis hepatis.
 Hepatalgia.
 Curigo.
 Hepatis melasicterus.

5. *Lienis.*

Plenalgia.
 Plenitis.

6. *Renum.*

Nephralgia.
 Nephritis.
 Nephuria falsa.
 Nephuria.

7. *Vesicae.*

Cystitis.
 Diabetes.
 Nephritis.
 Nephuria.
 Nephuria.
 Nephuria.

8. *Epiplois.*

Epiploitis.
 Phisconia.

CLASSIS NONA.

Morbi acutum.

O R D O I.

*Morbi Juvenum.**Vitia.*

HYDRORACHITIS, spina bifida.
 Pædarthorace omnis.
 Erythema intertrigo.
 Erythema pernicio.
 Exania ab alvi fluxu.
 Exomphalus aqueus.
 Enterocoele umbilicalis.
 Enterocoele inguinalis.
 Bubo crescentium.
 Parorchidium omne.
 Paraglossæ omnis.
 Phimosis vera.
 Phimosis circumligata.
 Hydroa sudamen.

Febres.

Hæctica infantilis.
 Hæctica nostalgica.
 Hæctica verminosa.
 Hæctica scrophulosa.

Phlegmasia.

Variola omnia.
 Rubeola omnis.
 Aphtha lactucimen.
 Cephalatis striatis.
 Cynanche gangrenosa.

Spasmi.

Convulsio febrilis.
 Convulsio ab hydrocephalo.
 Convulsio verminosa.
 Eclampsia verminosa.
 Eclampsia a dentitione.
 Eclampsia ab hydrocephalo.
 Scolotyria chorea Viti.
 Ephialtes stomachica.
 Ephialtes verminosa.
 Tetanus verminosus.
 Trismus nascentium.
 Trismus verminosus.
 Strabismus omnis.
 Claudicatio rachitica.

Anke-

Anhelationes.

Asthma a gibbo.
 Dyspnœa rachitica.
 Pleurodyne verminosa.
 Sternutatio tuberculosa.
 Tussis febrilis.
 Tussis a dentitione.
 Singultus a gula.

Debilitates.

Anæsthesia nascentium.
 Anæsthesia hydrorachitica.
 Asthenia ab hydrocephalo.
 Asthenia infantum.
 Carus verminosus.
 Carus ab hydrocephalo.
 Amblyopia luscorum.
 Anorexia Neophytorum.
 Mutitas a glossolysii.
 Mutitas surdorum.
 Mutitas elingulium.
 Pellissimus omnis.

Dolores.

Agrypnia a dolore.
 Agrypnia a crinonibus.
 Anxietas a fasciis.
 Cardialgia verminosa.
 Cardialgia lactentium.
 Catarrhus ruberolofus.
 Colica meconialis.
 Colica lactentium.
 Dysphagia a freno.
 Gastrodynia saburralis.
 Odontalgia dentitionis.
 Ophthalmia seropulosa.
 Otitocopus ab orihopnœa.
 Prostalgia ab exania.
 Pruritus pedicularis.

Vesaniæ.

Bulimia verminosa.
 Bulimia esurigo.
 Bulimia addephagia.
 Nostalgia omnis.
 Panophobia verminosa.
 Pica infantilis.

Fluxus.

Diarrhœa acrasia.
 Diarrhœa variolosa.
 Diarrhœa verminosa.
 Diarrhœa lactentium.
 Dysuria calculosa.
 Entæresis infantum.

Enuresis calculosa.
 Flatulentia acida.
 Flatulentia infantilis.
 Vomitus lacteus.
 Vomitus a saburra.
 Vomitus a dentitione.
 Vomitus verminosus.
 Ileus verminosus.
 Hæmorrhagia plethorica.
 Dysodia ab ositibœa.
 Dysodia a tinea.

Cachexiæ.

Atrophia lactentium.
 Atrophia rachitica.
 Atrophia a crinonibus.
 Atrophia verminosa.
 Aurigo neophytorum.
 Chlorosis infantum.
 Chlorosis verminosa.
 Elcosis variolosa.
 Hydrocephalus omnis.
 Malis a crinonibus.
 Phistriasis pedicularis.
 Phisconia mesenterica.
 Rachitis nodosa.
 Rachitis Britannica.
 Scrophula vulgaris.
 Scrophula fugax.
 Scrophula mesenterica.
 Tinea omnis.
 Tabes mesenterica.
 Tympanitis verminosus.

O R D O II.

*Morbi Senum.**Vitia.*

Herpes omnis.
 Marisca omnis.
 Oedema flaccidum.
 Gibbositas omnis.
 Condyloma clavus.
 Varix tibiarum.
 Oscheoceles aquosæ.
 Engerocoele omnis.
 Epiplocele omnis.
 Hysterocoele omnis.

Febris.

Typhus carcerum.
 Hectica cachectorum.
 Tetartophya simplex.
 Quartana omnis.

Spasmi.

Contractura omnis.
Tremor omnis.
Claudicatio a dolore.
Rigor catarrhalis.
Hysteria encephalica.
Tussis catarrhalis.
Tussis asthmatica.
Dyspnoea rachitica.
Asthma humidum.
Asthma arthriticum.
Asthma catarrhale.
Orthopnoea pseudoperipneumonia.
Rheuma catarrhale.

Debilitates.

Cataracta omnis.
Caligo a rhytidosi.
Caligo a nephelide.
Amblyopia proximorum.
Amaurosis multiplex.
Dyssecora senilis 4.
Dyssecora a tuba obstructa.
Paracusis barycoia.
Cophosis multiplex.
Anaphrodisia multiplex.
Psellismus a labario.
Paraphonia stertens.
Paralysis serosa.
Hemiplegia ex apoplexia.
Hemiplegia arthritica.
Paraplexia multiplex.
Asthénia cachectica.
Asthénia ab inanitione.
Cataphora somnolentia.
Cataphora coma.
Cataphora arthritica.
Carus spontaneus.
Apoplexia multiplex.

Dolores.

Arthritis multiplex.
Rheumatismus arthriticus.

Catarrhus benignus.
Pruritus arthriticus.
Algor externus.
Algor internus.
Cephalæa arthritica.
Ophthalmia trachoma.
Nephralgia arenosa.
Nephralgia calculosa.
Nephralgia hæmorrhoidalis.
Hystericalgia calculosa.
Lumbago rheumatica.
Icthus multiplex.
Proctalgia ex mariscis.
Proctalgia ab exania.

Vesania.

Syngismus multiplex.
Hypochondriasis melancholica.
Amentia senilis.
Amentia ex siccitate.
Amnesia senilis.
Agrypnia arthritica.

Fluxus.

Hæmaturia calculosa.
Hæmorrhoids moderata.
Vomitus pituitosus.
Ileus a bubonice.
Tenesmus a scybalis.
Epiphora multiplex.
Anacatharsis asthmatica.
Enuresis herniosorum.
Enuresis paralyticorum.
Dysuria hæmorrhoidalis.
Dysuria a caruncula.
Dispermatismus aphractodes.
Dispermatismus serosus.
Dispermatismus cachexie.
Atrophia senilis.
Ischuria multiplex.
Scabies herpetica.
Gangrena senilis.
Elcolis scorbutica.
Scorbutus vulgaris.
Ascies serosus.
Phlegmatia ulcerosa.

T A B L E

Des Noms François des Maladies.

- A**bscès, Apostema.
Accouchement, v. Abortus, Dystocia.
Achare, Tinea.
Affection scorbutique, Stomacace.
Agitations, Anxietas.
Aigreurs, v. Flatulencia acida.
Alopécie, Alopecia.
Alteration, Polydipsia.
Amalgissement, Tabes, Atrophia.
Amblyopie, Amblyopia.
Amercume, v. Anorexia biliosa. Vomitus biliosus.
Ampoule, Phlyctæna, Pemphigus, Hydrua.
Anasarque, Anasarca, Phlegmatia.
Aneurysme, Aneurysma, Cardiognus.
Angine, Angina, Cynanche.
Angeisse, Anxietas.
Antipathie, Antipathia.
Aneracoe, Anthrax.
Anxiété, Anxietas.
Aphonie, Aponia.
Aphibet, Aphtha.
Apoplexie, Apoplexia. Carus.
Ardour, Ardor, Dysuria.
Ascarides, vid. Tenesmus.
Asciter, Ascites.
Asphyxie, Asphyxia.
Assode, v. Tritrophia.
Assoupissement, Coma, Cl. VI.
Asthme, Asthma.
Atrophie, Atrophia.
Avant cœur, v. Pectus.
Avivret, Angina.
Avortement, Abortus.

Bâillement, Oscedo.
Bave, Ptyalismus.
Bégayement, Pselismus.
Berlué, Suffusio.
Bêvue, Diplopia.
Bile répandue, Aurigo.
Blessure, Abortus, Vulus.
Bôiteux, v. Claudicatio.
Borgne, Amaurosis, Caligo, Cataracta.
Bosse, Gibbositas.
Bouffissure, Anasarca, Phlegmatia, Oedema.
Bouillonnement, Ardor.
Boulimie, Bulimus.
Bourdonnement, Syrigmus.
Boursouffure, Emphysema.
Bouton, Papula, Phyma.
Bredissure,
Bruissement, Syrigmus.
Bruiseur, v. Erythem.
Bubon, Bubo.
Bubonocèle, Enterocèle, Epiplocele.

Cachexia, Cachexia, Chlorosis.
Cacothymia, Cachexia.
Cacophonie, Paraphonia.
Caigneu, v. Lordosis, Diastasis, Rachitis.
Cal, v. Condyloma.
Calenture, v. Phrenitis, Paraphrosyne.
Calcul, v. Dysuria, Nephralgia, Nephritis.
Hepatalgia &c.
Cancer, Cancer, Carcinoma.
Carcinome, Carcinoma.
Cardialgie, Cardialgia.
Carie, Caries.
Carreau, Phylconia.
Catalepie, Catalepsis.
Cataphore, Cataphora.
Catarrhe, Catarrhus.
Cephalalgie, Cephalalgia.
Cephalée, Cephalæa.
Chancr, Aphtha, Ulcus, Carcinoma.
Charbon, Anthrax.
Charré, Rachitis.
Chassie, v. Epiphora, Ophthalmia.
Chaudépisse, Gonorrhœa.
Chauvete, Alopecia.
Chique, v. Malis.
Chlorose, Chlorosis.
Cholera morbus, Cholera.
Chute, v. Ecchymoma.
Chute de la luette, Hypostaphy.
Chute de la marotte, Hysteropia.
Chute du fondement, Exania.
Claveau, Clavè, Malis.
Cloche, Phlyctæna, Claudicatio.
Cleu, Hemicrania, Staphyloma, Furunculus.
Cochemar, Ephialtes.
Coliaque, Coliaca.
Colique, Colica.
Colique de Poison, Rachialgia.
Colique du foye, Hepatalgia.
Colique renale, Nephralgia.
Colique urétrice, Hysteralgia.
Colique de misere, Ileus.
Colique d'estomac, Gasterodynia.
Condylome, Condyloma.
Consumption, Tabes, Phthisis.
Constipation, v. Tenesmus.
Contracture, Contractura.
Contusion, Contusio, Ecchymoma.
Convulsion, Convulsio.
Coqueluche, Catarrhus.
Cor, Condyloma.
Corpulesce, Polyfarcia.
Coup de soleil, Cephalalgia, Asphyxia.
Coup de sang, Apoplexia, Phrenitis.
Coup de vent, Pleuritis, Catarrhus.
Contrature, Lassitudo, Rheumatismus.

- Couronne de Venus*, Gutta rosea.
Cours de ventre, Diarrhœa, Alvi fluxus.
Corte-baleine, Dyspnœa.
Crachement, Pteralisms.
 de sang, Hæmoptylis.
 de put, Phthisis, Anacatharsis.
Crampes, Crampus.
Cremaison, Pyrosis.
Crête, Condyloma.
Crinons, vid. Malis.
Croissant, Bubo.
Crouse de lait, Tinea.
Cruauté, v. Nausea, Vomitus, Anorexia, Cardialgia &c.
Crysaline, v. Oedema.
Cuourbisins (vers), v. Nausea, Bulimia.
Cytos, v. Hordeolum.

Danse de S. Guy, Scelotyrbe.
Dartre, *Derre*, Herpes.
Défaillance, Leptothymia, Cardialgia.
Dégout, Anorexia, Apheusia.
Délire, Paraphrosyne, Delirium.
Démangeaison, Pruritus, Scabies, Lepa.
Démence, Amentia.
Dentition, v. Odontalgia.
Dépot, Apophema.
Déscente, Proptoma, Exania, Enterocœle &c.
Détorse, Exarthrema.
Dévoement, Diarrhœa.
Diabète, Diabetes.
Diarrhée, Diarrhœa.
Dislocation, Exarthrema.
Distension, v. Trismus.
Douleur, Dolor, Cl. VII.
 d'estomac, Gastrodynia.
 des dents, Odontalgia.
 d'oreille, Otalgia.
Dragon, v. Malis.
Drappeau, vid. Pterygium.
Durété d'oreille, Dysœœa.
Durillon, Condyloma.
Dysenterie, Dysentery.
Dysurie, Dysuria.

Ebranement, Apomyttosis.
Echanboulture, Hydroa.
Echauffement, Gonorrhœa, Tenesmus, Constipatio, Polydipsia.
Ecchymose, Ecchymoma.
Excorchure, Excoriatio.
Ecoulement de lait, Galactorrhœa.
Ecoulement de semence, Gonorrhœa.
Ecronelles, Scrophula.
Edematia, Phlegmatia.
Edème, Oedema.
Effort, v. Hernia, Vomitus, Pleuritis, Lumbago.
Empyème, Empysoma.
Empyème, Empyema.
Encanthis, Sarcoma.
Enchiffrement, Coriza.
Enflure, v. Phymata, Oedema.

Engelure, Erythema pernio.
Engourdissement, Stupor, Anæsthesia.
Enrouement, Paraphonia.
Enzorse, Exarthrema.
Envie, Nævus, Pica.
Eparvin, Exoftosis.
Ephelides, Ephelis.
Ephemere, Ephemeræ.
Epiale, v. Amphimerina.
Epilepse, Epilepsia.
Epiam, Frambxia.
Epine ventreuse, Arthrocace.
Epreinte, Tenesmus, Colica, Dysenteria.
Epuisement, Asthenia, Syncope, Atrophia.
Erailement, Blepharotofis.
Ereintement, Lumbago.
Ergot, Necrosis.
Escaie, Eclava.
Esquinancie, Cynanche.
Eternuement, Sternutatio.
Etourdissement, Vertigo, Cephalalgia.
Estranguillon, Dysphagia, Cynanche.
Evanoüissement, Syncope.
Excroissance, vid. Cl. I.
Exomphale, Exomphalus.
Exoftose, Exoftosis.
Expectoration, Anacatharsis.

Faim-canine, Bulimia.
Faim-vale, Syncope.
Farcin, Scrophula.
Fausse couche, Abortus.
Felure, Fissura.
Feu Persique, Erythema.
 S. Aneline, Necrosis, Erythema.
 velage, Erythema.
Fie, Condyloma.
Fieûre, Febris, Cl. 2.
 ardente, Tritzophya.
 bilieuse, Tritzophya.
 cachochimique, Synochus.
 catarrhique, Amphimerina.
 colliquative, Tabes, Phthisis.
 continue, Cl. 2.
 épiale, Amphimerina.
 éruptive, Exanthematica.
 érysipélateuse, Erysipelas.
 inflammatoire, Cl. 3.
 intermittente, Cl. 2.
 lente, Hætica, Tabes.
 milligne, Typhus.
 milliaire, miliaris.
 petechiale, purpura.
 pourpre, purpura.
 purride, Amphimerina, Synochus.
 quaraine, quartana.
Fieûre remittente, Cl. 2.
 rouge, Scarlatina.
 scarlatine, Scarlatina.
 tierce, tertiana.
Filet, Dysphagia, Psellismus.
Fistule, Fistula.

Flerus

Fleurs blanches, Leucorœa.
Fluxus hepaticus, Hepatirhœa.
Fluxion de poitrine, Pcripneumonia.
sur les dents, Odontalgia.
sur les yeux, Ophthalmia.
sur la gorge, Cynanche.
sur l'oreille, Otalgia.
Foiblesse, Asthenia, v. *Class.* 6.
d'estomac, Anorexia, Gastrodynia.
de la vue, Amblyopia, Caligo.
Folette, Amphimerina, Angioz.
Folie, Melancholia.
Forçature, Hysteralgia.
Foulsure, Exanthrema.
Fourches, Apoptema.
Fraîture, Fractura.
Frayeur, Panophobia.
Frissen, Rigor.
Francle, Furunculus.
Futeur utérine, Nymphomania.
Furoncle, Furunculus.

Gale, Scabies.
Glanglion, Condyloma.
Graugrene, Gangrœna, Necrosis.
Germe, v. Abortus.
Gersure, Rhagas.
Glaire de l'estomac, v. Vomitus.
de la vessie, Pyuria.
Glandules, Scrophula.
Flauhome, v. Cataracta.
Gonflement d'estomac, Meteorismus, Gadorodinia.
des articulations, Rachitis, Hyarthrus,
 Arthrocaec &c.
Gonorrhœe, Gonorrhœa.
Gouette, Bronchocle.
Gutte, Arthritis.
Goutte-crampe, Crampus.
Goutte sciatique, Ischias.
Goutte seréine, Amaurosis.
Gratelle, Scabies.
Gravelle, Dysuria, Nephralgia.
Grele, Hordeolum.
Grenouillerte, v. Psellismus.
Grippe, Catarrhus.
Grossesse, Graviditas.
Gruneli (Inie), v. Mastodynia.
Guepes (piquure de), v. Punctura.

Hâle, Ephelis.
Haut-mal, Epilepsia.
Hellique, Hœtica.
Hémiplegie, Hemiplegia.
Hémorrhagie, Hæmorrhagia.
Hémorroïdes, Mærisca, Hæmorrhoids.
Hemvè, Nostalgia.
Hépatite, Hepatitis.
Herpe, Herpes.
Hoquet, Singultus.
Humour froide, Scrophulæ.
Hydatide, Hydatis.
Hydrocele, Hydroccle.

Hydrocephale externe, Hydrocephalus. *Interne*, v.
 Convulsio, Apoplexia. Eclampsia.
Hydrophale, Exomphalus.
Hydropisie générale, Anasarca, Pheumatosis, Phleg-
 maria.
de la tête, Hydrocephalus.
de l'oeil, v. Amblyopia.
de poitrine, Hydrothorax, Hydrocardia.
du bas ventre, Ascites, Tympanitis.
de matrice, Phylometra, Hydrometra.
Hysterique passion, Hysteria.

Janen, Tarantismus.
Jaunisse, Aurigo.
Itère jaune, Aurigo.
blanc, Chlorosis.
noir, Melasæcus.
Iliaque passion, Ilcus.
Inappetence, Anorexia.
Incontinence d'urine, Eourefus.
Inerte, Hysteria.
Indigestion, v. Gastrodynia, Vomitus, Flatulen-
 tia, Colica, Diarrhœa, &c.
Infiltration, Plegmatia, Oedema.
Inflammation, Phlegmasia, Phlegmo, Erysipelas.
Inquiétude, Anxietas.
Insomnie, Agrypnia.
Intermittent (pouls), v. Palpitatio, Cardiogmus,
 Alvi fluxus.
Ischurie, Ichuria.

Eadrene, Elephantiasis, Phlegmaria.
Lait répandu, v. Ephemera lactea, Oedema la-
 ctum.
Langue chargée, v. Synochus, Typhus, Anore-
 xia, Vomitus.
Languer, Asthenia.
Larmoyement, Epiphora.
Lassitude, Lassitudo.
Lentilles, Ephelis.
Lèpre, Lepra.
Lethargie, Lethargus.
Leucome, Leucoma.
Leucophlegmarie, Anasarca.
Lienterie, Licenteria.
Lipothymie, Leipothymia.
Lipurie, Tritoxophya.
Louche, v. Strabismus, Caligo.
Loup, Carcinoma, Ulcus.
Loupe, Lupie.
Lnette, v. Angina, Hypostaphyle.
Luxation, Exarthrema.
Lycanthropie, Melancholia.
Mal d'avanture, Paronychia.
caduc, Epilepsia.
Mal de cœur, Cardialgia, Nausea.
des ardens, Necrosis.
S. Antoine, Erysipelas.
S. Main, Scabies.
S. Lazare, Elcolis.
de mère, Hysteralgia.
mort, Leptra.

- d'estomac*, Cardialgia, Anasarca.
de tête, Cephalalgia.
aux yeux, Ophthalmia.
de gorge, Cynanche, Angina.
Maladie, Pica.
Maladie noire, Mælena.
pediculaire, Phthiriasis.
imaginaires, Hypochondriasis.
Manie, Mania.
Marasme, Atrophia.
Mélancholie, Melancholia.
Membre resté, Contractura, Ankilosis.
Métemorisme, Metemorphismus.
Mentristure, Contusio.
Migraine, Hemicrania.
Miliare, Miliaris.
Misere, Ileus.
Morphée, Vitiligo.
Morpiens, v. Pruritus.
Morsure, v. Punctura, Hydrophobia.
Mue, Paraphonia, Alopecia.
Mule, Erythema pernio.
Mure, Condyloma, Encanthis.
Mutité, Mutitas.
Nausée, Nausea.
Néphrétique, Nephritis, Nephralgia.
Nerfs faibles, Asthenia, Paralysis.
Noctambules, Somnambulismus.
Noli me tangere, Carcinoma.
Nouage, Noure, Rachitis.
Noyer, v. Asphixia.
Nuage, v. Leucoma, Nephelium.
Obstructions, v. Class. X.
Odontalgie, Odontalgia.
Oedème, Oedema.
Ombre, Leocoma.
Ongle, Ophthalmia.
Oppression, v. Class. V.
Oreillons, Parotis.
Orgeole, Hordeolum.
Orthopnée, Orthopnoea.
Oubli, Amnesia.
Osie trouble, Paracusis.
Oxène, Dyslocia.
Pâles couleurs, Chlorosis.
Palpitation, Palpitatio.
Panari, Paronychia.
Paralyse, Paralysis.
Paraphrenésie, Paraphrenitis.
Paraphymosis, Phymosis.
Paraplegie, Paraplexia.
Parésie du ventre, v. Tenesmus.
Parotide, Parotis.
Pasme, Tetanus.
Passion caliaque, Cæliaca.
hystérique, Hysteria.
hypochondriaque, Hypochondriasis.
iliaque, Ileus.
bovine, Malis.
Pendus, v. Asphixia.
Peripneumonie, Peripneumonia.
Perle, Leucoma.
Perte d'appétit, Anorexia.
de goût, Agheusia.
d'odorat, Anosmia.
de sang, Hæmorrhagia.
blanche, Leucorrhœa.
Pesanteur d'estomac, Gastrodysia.
de tête, Cephalgia.
Petechie, Purpura.
Petite-vérole, Variola.
Phlegmon, Phlegmo.
Phlyctène, Phlyctæna.
Phrenésie, Phrenitis.
Phthisie, Phthisis.
Phymosis, Phymosis.
Pis enflé, Phlegmatia.
Plâ-bes, Lordosis; Distasis.
Pierre, Nephritis, Dysuria &c.
Pituite, Vomitus, Anacatharsis, Ptyalismus.
Playe, Classis I. Ordo 7.
Pleurésie, Pleuritis.
Plique, Trichoma.
Plomb, Asphixia.
Pneumatocele, Oscheocele.
Podagre, Arthritis.
Poil, Mastodynia.
Pois de cerf, Pleurodyne.
Poirreau, Condyloma, Verruca.
Pellurion, Gonorrhœa.
Poïpe, Sarcoma, Palpitatio.
Poulain, Bubo.
Pourpre, Purpura.
Pouffe, Asthma.
Priapisme, Priapismus.
Prurit, Pruritus.
Ptyalisme; Ptyalismus.
Puanteur, Punaise, Dysodia.
Puiméie, Phthisis.
Pustule, Pustula.
Quartaine, Quartana.
Quinze, Tussis paroxysmus.
Quotidienne, Quotidiana.
Rache, Tinea.
Rage, Hydrophobia, Rabies.
Ralle, Rallement, Paraphonia.
Rapport, Flatulencia.
Ratelleux, v. Splenalgia.
Relachement de l'anus, Exania.
Reprise, Accessus, Paroxysmus.
Retention d'urine, Ischuria.
Rheumatisme, Rheumatismus.
Rheume, Rheuma.
Ricquett, Rachitis.
Ris sardonique, Trismus.
Ronflement, Paraphonia.
Rot, Flatulencia.
Rougeole, Rubecola.
Rougeur, Erythema.
des yeux, Ophthalmia.
Rouffeur, Ephelis.
Rupture, Ruptura.

I N D E X

O M I N U M G E N E R I C O R U M ,

S P E C I F I C O R U M & S Y N O N I M O R U M &c.

Numerus Romanus Totum, Arabicus vero paginam indicant.

Idominis dolores, II, 49. morbi. 377.
 spasmi. 220.
 Irritationes, *Aberrations*, I, 92.
 IORTUS, II, 165. effluxio, 166. octime-
 submensuris. *ibid.* subtrimestris, *ibid.* ab
 laxitate, 167.
 Ises, I, 90. fistulosus, II, 325. an fove. 60.
 Ischius, I, 90. mammarum, II, 70. pulmo-
 I, 359. spirituosus, 88.
 Ismensis lingue, I, 402.
 Ises de fove, I, 181.
 Isouchement accompagné de convulsion, I, 299.
 Isux, II, 63. contre nature, 65. prématuré,
 166.
 Islys, I, 69. 380.
 Ischor, Achores, II, 306.
 Isna, Arne, I, 75.
 Isomios morbi, II, 360.
 Isorchodon, I, 84.
 Isaimonia, II, 22.
 Islephagia, II, 114.
 IPSIA primaria, secundaria, I, 403.
 Isridio stomachi, II, 53.
 DOPSOPHIA, II, 220. urethre, uterina,
 gilope, II, 197.
 Isis, I, 69. 380.
 ERI-FLUXUS, II, 218.
 Isrophagia, II, 123.
 Isus volaticus, I, 76. II, 27.
 Isatum morbi, II, 377.
 Isctio oris scorbutica, II, 157.
 Isctiois sepeusens, I, 430.
 Isctus superficialis, I, 56. corum theoria, *Isbid.*
 Isctament des dents, II, 43.
 GHEUSTIA, febrilis; paralytica, I, 393.
 GRYPNIA, arthritica, II, 144. cephalal-
ibid. critica, 145. a dolore; febrilis, 144.
 critica, *ibid.* ab indigestione, 144. ab infectis,
 ex pancreate, 144. a pathematis, *ibid.* ructa-
 succedens, *ibid.* lenilis. 145. a vermibus, 144.
 grypnocoma, I, 434. 435.
 Isguis (the), I, 181.
 Isguir d'elomac, II, 46.
 Ismatra, II, 170.
 Ismatismos, II, 151.
 Ismatos eccrisis, II, 157. 164.
 Ismorhois, II, 172.
 Sauvages *Methodica* Tom. II.

Aimorrois, II, 162.
 Alalia, I, 405.
 Albara Avicennae, I, 70. nigra, *ibid.* II, 301.
 Albugo, I, 70. 380.
 Albuli, I, 378.
 Algarab, II, 197.
 Algedo, I, 92.
 Algemata, II, 5. 11.
 Algola Arabum, I, 240.
 ALGOR, I, 298. II, 26. externus, *ibid.* fe-
 bricosus, *ibid.* internus, *ibid.*
 Alguada, I, 70.
 Alhalet, I, 75.
 Alimation d'esprit, II, 128.
 ALOPECIA, *Alopecie*, II, 301. 'sui. 'area-
 ta, *ibid.* porriginosa, *ibid.* simplex; syphilitica,
 volatilius, *ibid.*
 Alophus, I, 70. II, 313.
 ALVIFLUXUS, II, 167. 188. colligustivus,
 190. puriformis, 291. profluvia, 167. profluvium
 album, 189.
 Alureschin Maahab, I, 228.
 Alymon, II, 22.
 Amarry, I, 307. 439.
 AMAUROSIS, I, 390. ab achribus repres-
 sis, 392. ab aqua in cerebri cortice sinuulve,
 394. arthritica, 392. ex bombardae explosione; a
 calculo juxta nervum opticum; a capitis commo-
 tione, vulnere; a catarrho, 390. congenita; ab
 epilepsia, *ibid.* exanthematica, 392. exhaustorum,
ibid. a febris acutis, 391. foricatorum, *ibid.*
 gravidarum; ab hemorrhoidum fluxu suppressio,
ibid. hysterica; intermittens, 392. a menostasia,
 menstruorum fluxu suppressio, 391. a morbis con-
 vulsivis; a myosi, *ibid.* a narcoticis, 392. ab oculi
 interna suppuratione, 391. vulnere; pniutosa;
 plethorica, *ibid.* a plica resecta vel retenta, 392.
 rachialgica, *ibid.* a scabie suppressa, *ibid.* scrophu-
 losa. 391. a spasma, *ibid.* ex stentamento in cere-
 bro, *ibid.* a synchysis, *ibid.* traumatica; a tumo-
 re globoso nervi optici insidente, *ibid.* vene-
 rea, 392. ob vesicam nervi optici incumben-
 tem, 392. ab uvea phlogosi, *ibid.*
 Amblois, II, 165.
 AMBLYOPIA, *Amblyopie*, I, 382. 390. ab-
 soluta, 389. crepuscularis, 383. dissitorum, 385.
 hydrophthalmica, 390. luctorum, 388. meridia-
 na, 384. proximorum, 387.
 B b Amblyof

Amblyofmos, I, 389. II, 164.
 Amblytes, I, 389.
 Ambustio, I, 76. 28. II, 328.
 AMENTIA, II, 132. calculosa, 133. a eroco; ab hydatibus, 132. ab ictu; microcephala; morosis; a quartana; rachialgica; 133. senilis; serosa, 132. ex siccitate, *ibid.* a transusione sanguinis; a tumore, a venenis, *ibid.*
 AMNESIA, II, 143. cephalalgia; febrisque; ab hæmorrhoidibus suppressis; a lochiis suppressis; a pathemate; plethorica; senilis; a temulentia; traumatica; a venere, *ibid.*
 Amor infans, II, 534.
 Amphemerina, AMPHIMERINA, I, 170.
 anginosa, 173. arthritica; biliosa, 175. cardiaca, 171. catharrhalis, epiala, *ibid.* hemitritus, 172. humorosa, *ibid.* Hungarica, 173. laeica, 170. miliaris, 173. mimosa, 174. paludosa, *ibid.* peripneumonica, 173. phrenitica, 174. phricodes, 172. pseudohemitritus, *ibid.* scorbutica, 174. semiquartana, 175. semiquinea, 176. singultuosa, 173. spasmodica, 174. syncopalis, 171. tussiculosa, 173. variolosa, 175.
 AMPUTATURA, I, 128.
 Anabexis, II, 199.
 ANACATHARSIS, II, 202. asthmatica, 203. biliosa, 202. phthifica; puriformis; a vomica, *ibid.*
 Anachrempsis, II, 199.
 ANÆSTHESIA, I, 399. melancholica; nescientium. 400. plethorica; a spina bifida, 399.
 Analopsis, I, 303. 304.
 ANAPHRODISIA, I, 403. gonorrhoeica; magica; a matricis, *ibid.* a paralyti, *ibid.* ab urethrae vitio, *ibid.*
 Anaptyxis, II, 202.
 ANASARCA, *Anasarque*, II, 248. ab adiacentia, 249. Americana, 250. exanthematica; a febris, a fluxu, 249. gravidarum, *ibid.* hydroptarum, 250. hysterica, *ibid.* metastatica, 248. periodica, 249. purulenta; rachialgica; urinosa, 250.
 Anatropha, II, 178.
 Anaudia, Anauide, I, 405.
 Anchylops, II, 198.
Ancon, I, 120.
 Anchyloblepharos, I, 380. II, 103.
 Andromania, II, 120.
 Andrum; Andruvaiku, I, 91.
 ANEPITHYMIÆ, I, 400.
 ANEURYSMA, I, 88. cylindroides, *ibid.* precordiorum, II, 47. spurium, I, 88. ventriculi dextri, II, 47. verum, I, 88.
Anerisone, I, 88. du canis, II, 47. *ural*, I, 88.
 ANGINA, *Angine*, I, 354. alba, aneurymatica, 357. arthritica, 259. bronchocelica, 357. bronchus, 355. calculosa, *ibid.* canina, 259. a deglutitione, 356. epidemica, 173. exanthematica, 357. ab hydrargyri, 260. hydrophobica; hysterica, 356. inflammatoria, 257. a laqueo, 356. salva larynge &c. 259. Lovveriana, 355.

morilloso, 259. 357. mucosa, 355. nasalis, 357. cedematosa, 355. pituitosa, *ibid.* polyposa, 357. scorbutica, 357. scorbutica, 359. spasmodica, *ibid.* 22. species Boerhaave, 259. 42. species, *ibid.* 52. species, 257. spuria, 259. suppuratoria, 356. symptomatica, thymica, 357. variolosa, 259. 357. venerea, 356.
Angolles, II, 22. de la mort, *ibid.*
 ANHELATIONES, I, 312. 329. earum theoria, 312. OPPRESSIVÆ, 343. SPASMODICÆ, 329.
 Anhelitus difficultas, I, 343.
 Animi deliquium, I, 422.
 Ankylosis, *Ankylose*, I, 283. 284. *undulique*, *ibid.* de la cuisse, II, 78.
 Anngus, II, 381.
 Anola, II, 134.
 ANOREXIA, I, 400. arthritica, 402. biliosa; 401. cachectarum, 402. catamenialis, 401. exhaustorum, 402. febrilis; melancholica, 401. mirabilis; Neophytorum, 402. paralytica; pituitosa, 401. plethorica, *ibid.* ob resolutionem nervorum stomachi, *ibid.* a sabarra, 401. Sturvatiana, *ibid.*
 ANOSMIA; catarrhalis; ab ozæna, I, 392. paralytica, 393. a polypo; a siccitate; syphilitica; verminosa, *ibid.*
 ANTHRAX, I, 80. II, 328. malignus; Perficus, I, 81. pestilens, 120. simplex, 80. tantatus, 81.
 Anticardia, I, 250.
 Antiglaucoma, I, 378.
 ANTIPATHIA, *Antipathie*, II, 217. humana, *ibid.*
 Anus; ejus dolor; inflammatio, II, 78. inflammatio & ulcus, 192. interitigo, 78. prolapfus, I, 98.
 ANXIETAS, *Anxieté*, II, 22. agonistica, *ibid.* cardiaca; 23. febrilis, 22. a morfu, 23. spasmodica, 22. tipiarum, 23.
 Aphædros, II, 102.
 APHONIA, I, 405. 407. 438. 441. aneurymatica; anginosa, 408. ab antipathia, *ibid.* catarrhalis; hysterica, *ibid.* melancholica, *ibid.* paralytica; pulmonica; temulentorum; traumatica, *ibid.*
 APHTHA, *Aphthes*, I, 240. in adultis; Belgarum; cacoethes; scirrhis, *ibid.* infantilis; leucismen, *ibid.* maligna, 241. scorbutica; syphilitica, *ibid.*
 Apilepsia, I, 441.
 Apnoea, I, 439.
 APOMYOTISIS, I, 289.
 Apophora, II, 265.
 APOPLEXIA, *Apoplexie*, I, 355. 414. 441. arthritica, 441. atrabiliaria, 444. cerebelli, 426. epileptica, 443. exanthematica, 412. febricosa, 444. flarulenta, 426. 429. hypochondriaco-spasmodica, 439. hysterica, 443. inflammatoria, 444. mephitica, *ibid.* metastatica, 433. minor, 437. minor sanguinea, 438. partialis, 417. periodi-

riodica, 444. phlegmonosa, 441. pituitosa, 443. polyposa, 444. puerperarum, 443. purulenta, 445. sanguinea, 441. a scabie; scorbutica; serola, 443. spasmodica, 439. suspiriosa, 444. tumulenta, 441. traumatica, 441. vaporosa, 443. verminosa, 444.

Apopsychia, I, 421.

Aporia, II, 11.

Apositia, I, 400.

Apositis, I, 90.

APOSTEMA, *Apothema*, I, 90. abscessus; apoflasis; diapedesis, *ibid.* empyocoele, *ibid.* hypopyon; onyx, paroulis, *ibid.* phalangium, spina ventosa, *ibid.* synchysis, *ibid.* vomica, *ibid.*

Apostume, I, 90.

Appetit depravatus, bizarro, II, 111.

Apychia, I, 423.

Aqua, I, 366. Aquæ ex utero prægnantis effusio, II, 111.

Aquila, I, 85. 380.

Arceusell, I, 155. II, 70.

Arctura, I, 82.

Arcus senilis, I, 70.

Ardens (mul des), I, 81. 238.

Ardens de cause interne, II, 27. *d' urine*, 205.

ARDOR; externus, internus, II, 26. 27. Romachi, ventriculi, 46. volaticus, 27. urine, 205.

Area, II, 321.

Argema, II, 38.

Argyria, I, 378.

ARIDURA; ab arthrocace; hydropica; paralytica; rachialgica; scorbutica. s. spasmodica; traumatica, II, 245.

Arfura, II, 80. 206.

ARTHRITIS, II, 18. æstiva; alba, 14. Americana, 16. asthmatica, 15. Bahamensis, 16. chlorotica, 14. a colica; cuticularibus morbis subiecta; exanthematica; febricosa, 15. febrisque, febri vel continue, vel erysipelatose vel intermittenti quartane succedens, *ibid.* hyemalis, 13. melancholica, 14. paturæ succedens, 15. podagra, 12. rachialgica, 15. rachitica, 16. rheumatica, 13. scorbutica, 14. syphilitica, 15. vagina, 17. venerea, 15.

ARTHROCACE, I, 129. II, 16. 245.

Artus vari, I, 124. 125.

Artuum morbi, II, 374.

ASCITES, *Ascitis*, II, 163. ab aqua sanguinolenta, nigrescente; 268. arthriticus; artificialis, 266. calidus, 267. chylosus, 268. a colligatione, 265. 266. cruentus; a cruore mero; a cruore loturæ carniū similis, 268. ab exanthematis, 266. febrilis, *ibid.* flatuocento-peritonæas, 269. ab hepate, 264. ab herpetibus reoriffis, 266. ab inanitione & colligatione, 265. intercus, 267. intermuscularis, *ibid.* a lieno, 265. a maculis repressis, 266. a mesenterio strumoso, 265. oleosus Baglivi, 268. omentalis, 267. ab oppila-

tionē, 264. ovarii, 267. ab ovariiis, 265. purulentus, 268. purulento-peritonæus, 269. a quartana, 266. a rubeola repressis, *ibid.* saccatus, 267. 268. a sanguifluxibus, 265. sanguineointereus; languineo-peritonæus; sanguineo-uterinus, 268. a scabie repulsa, 266. scorbuticus; *ibid.* scrophulosus, 265. serosi abdominales, 263. serosi non abdominales, 267. non serosi abdominales, 268. nec serosi nec abdominales, *ibid.* stomachi, 267. a vesica disrupsa; urinosus, 268. uterinus, 267. vulgarior, 263. ejus curationis praxis, 269.

Aset, I, 75.

Asia, I, 400.

Astices, II, 163.

Aspermatismus, II, 217.

ASPHYXIA, *Asphyxie*, I, 426. a carbone, 429. cataleptica, 428. congelatorum, 427. flatulenta; foricariorum, 429. a fumis, 427. hysterica, 428. immerforum, 426. a mephitide, 428. a multo, 427. neophytorum, 429. a pathenare, 428. sideratorum, 429. spinalis, *ibid.* suspensorum, 427. traumatica, 429. Valsalviana. *ibid.*

Aste, II, 11.

Athodes, I, 178.

Attonpiffement, I, 430. *curettique*, 437.

ASTHENIA, I, 419. abstinentium, 421. Americana, 421. cachectica; chlorotica, 420. febrilis, *ibid.* hydrocephali, 419. hydrocephalica; hysterica, 421. ab inanitione, *ibid.* infantum, *ibid.* nativa, 422. ab osteofarctosi; ossifraga, 421. a pathematis, 420. Pannonica, 419. scorbutica, 420. syphilitica, 421. Virginica, 419.

ASTHMA, I, 347. arthriticum, 349. cathecticum; catarrhale, 350. continuum, 344. convulsivum, 338. 353. equinum, 350. exanthematicum, *ibid.* febricofum, 351. flatulentum, 347. a gibbo, 350. humidum; humorale, 347. II, 203. hypochondiacum, I, 349. hystericum, *ibid.* metallicum; 350. nocturnum, 329. nothum, 349. occultum, 348. orthopnoea, 349. plethoricum, 350. pneumonodes, 347. 351. a polypo cordis; pulverulentorum, 349. sanguineum, 350. a scabie; siccum, 348. spurium, 344. stomachicum, 349. venereum; 350. uterinum, 352.

Asthme, I, 347. *adipeux*, 350. *ordinaire*, 347.

Atecthnia, I, 403.

Atoni morbi, II, 368.

Atreble, II, 176.

ATROPHIA, *Atrophie*, II, 243. ab alvifluxu, 244. Anglica, 243. a crinombus, 244. a fascino; febrisque; infantilis, 245. lactentium, 243. lateralis, 245. a leucorrhœa, 243. a lue venerea, 238. de la molle du corps, 245. nervosa, 243. nutricum, a pyralismo, 244. rachitica, *ibid.* a sanguifluxu, 243. scorbutica; senilis, 244. verminosa, 245. Virginiana, 243. a vomitu, 244.

Avant-cour, I, 211.

Auditus difficiilis, I, 393. gravitas, 395.

B. b. 2.

Avi-

Avivus, I, 157. 249.
Avortement, II, 165. 166.
Auricularum proptoma, I, 97. *ibid.*
AURIGO, II, 309. *accidentalis*, 311. *cal-
 culosa*, 312. *a colica hysterica*, *ibid.* *febricosa*,
 311. *febrilis*, 310. *a graviditate*, 311. *hepatiti-
 ca*, *hysterica*, 312. *Indica*, 310. *a mensesum sup-
 pressionem*, 311. *Neophytorum*, 312. *ab obstru-
 ctione*, 311. *periodica*, *ibid.* *plethorica*, *ibid.*
purulenta, *ibid.* *rachialgica*, 313. *a spasms*,
 312. *typhodes*, *ibid.* *a venenis*, 310.
Aurium fluxus; *humiditas*, II, 218. *inflam-
 mario*, 40. *fluctuatio*, *sonitus*, *strepitus*, 103.
sporbi, 375.

B

Baillement, I, 330.
Balbuties, I, 409.
Baneroches, I, 114.
Barycola, I, 394.
Bave, II, 199.
Begavement, I, 408. *ibid.*
Benefice de nature, *de ventre*, II, 188.
BERIBERIA, *Indica*, I, 311. *spuria*,
ibid.

Berlus, II, 93. *erincellane*, *raisonnante*, 97.
Berise, II, 132. 133.
Bervus, II, 101.
Bex; *theriodes*, I, 339.
Bicephalum, I, 84.
Bicho, II, 79. 192. *del culo*, 193.
Biecho, II, 291.
Biliiosi morbi, II, 351.
Bisios Angolensium, II, 79. 192.
Blacciz, I, 222.
Blazitas, I, 408.
Blakleg, II, 251. 298. 313.
BLEPHAROPTOSIS, I, 85. 380. *ectropium*;
entropium, 96. *genuina*; *Græcorum*; *lagophthal-
 mus*, 95.

Bleffure, I, 126. II, 164. 165. 166.
Blestrismos, II, 22.
Bloodi flux, II, 172.
Blouvescheut, *Blouveschuyt*, II, 198.
Boast, II, 323.
Boeten Germanis, I, 222.
Boireux, I, 297.
Bolismus, II, 114.
Bombi, II, 218. *bombus*, 106.
Borborygmi, II, 218.
Bosen halfe, I, 357.
Bosse de l'épine, I, 87. *de l'omoplate*, *ibid.*
 124. 125.
Bothor, II, 39.
Botium, I, 85. 86.
Botrium, II, 38.
Bouffissure, I, 78. II, 247.
Boulmiags, *Boulmicos*, II, 114. *Boulimus*,
ibid. *viq. Bulimia*.

Bourgeois, I, 71. 78.
Bourjousiurd, I, 78.
Boutons, I, 72. 75.
Bradyepesia, II, 50.
Brus connes, I, 125.
die Braune, I, 260.
Bradysure, I, 180.
Brenig, II, 206.
Brefegue, I, 240.
BRONCHOCELE, I, 85. *aquosa*, 86. *bo-
 tium*, 85. *sarcoma*; *venosa*, 76.
Bronchos, I, 411.
Bronchisme d'oreille, II, 104.
Brulure, I, 76.
Bubas, II, 197.
Bubas, I, 72.
BUBO, I, 79. *axillaris*, *ibid.* 80. *crescen-
 tium*; *pestilens*; *scorbuiticus*, *ibid.* *simplex*;
strumofus; *syphiliticus*, 79.
Bubon, I, 79. *pestilential*, 80. *seraphuleux*,
ibid.
Bubonocoele, I, 102. 108. *altera*; *ibid.* *epiploi-
 co-enterica*, 106. *intestinalis sive vulgaris*, 104.
omentalis, 110. *prima*, 102.
Bubonoris, I, 107.
BULIMIA, II, 114. *ab acidis*, 116. *addepha-
 gia*, 115. *canina*, 114. *cardialgica*, 115. *convul-
 sorum*, *ibid.* *esurigo*, *verminosa*, *ibid.*
Buphthalmia, *Buphthalmus*, I, 93.
Burning, II, 106.

C

Cacatoria, H, 188.
CACHECTICI MORBI, II, 229. 235. *co-
 rum theoria*, 229.
Cachexia, II, 315. *icterica*, 310. **CACHE-
 XIÆ**, 233. *eorum theoria*, 229. 235. **ANOMA-
 LÆ**, 318. **ICTERITÆ**, 297.
Cacophonia, I, 410.
Cacofitia, I, 401. II, 177.
Cacurematis species, II, 208.
Caducus, I, 303. *matricis*, 352.
Celoma, II, 38.
Cal, I, 84.
Calculi des reins, II, 61.
Calculosi morbi, II, 366.
Calculus renum, II, 61. *vesicæ*, 207.
Calentura, *Calenture*, I, 243. II, 131.
CALIGO, I, 379. *ab ancyloblepharo*; *a
 blepharoptosi*, 380. *a canero*; *ceratocoele*, 381. *a
 defectu humoris aquei*, 382. *ab ectasi*, *ibid.* *hypo-
 poma*, *ibid.* *hypophagma*, 381. *lactea*, 382. *a
 leucomate*, 380. *a lupia*, 381. *a myosi*, 382. *a
 nephelio*; *a pachyoblepharosi*, 380; *a pterygio*,
 381. *a rhytidosi*, 380. *a sarcomate*, 381. *a ita-
 phylomate*, *ibid.* *a symblepharosi*, 379. *a synise-
 li*, 382. *venerea*, 381.
Callositas, II, 324. *Callosite*, I, 84.
Callus, I, 84. 378.

Calor, I, 201. febrilis, 147.
Calus, I, 84.
Cambroul, I, 75.
Cambuca, I, 80. 81. II, 190.
CANCER; lupus, I, 81. mammarum, II, 70. de la *marrice*, 66. *myrmecia*; *occulae*, I, 81. de l'*ail*, I, 94. II, 38. palpebrarum, II, *ibid.* phagedæna, I, 81. syphiliticus; *verolique* *ibid.* verrucosus, *ibid.* *ulcers*, II, 289. a l'*uterus*, II, 66. 221.
Canfacio, II, 23.
Caphora, I, 294.
Capillorum defluvium, II, 322.
Capipienium, II, 28.
Capitis ardor, I, 266. dolores, II, 27. 28. *gravedo*, *ibid.* morbi externi, 376. interni, *ibid.*
Caput oblitum, I, 282.
Caquesangue, II, 172.
Carazzo, I, 220.
Carbunculus, I, 81.
CARCINOMA, II, 289. syphiliticum, 290. carcinomata venerea, I, 81. vulgare, II, 290.
Carcinos Græcis, I, 82.
Cardiaca, II, 51.
CARDIALGIA, *Cardialgie*, II, 46. 51. arthritica, 50. atrobiliaris; biliosa, 52. bradypep-
 ta, 50. a cardiogmo, 51. a cruditatibus, 49. epilepsiam induens, 52. febricosa, 49. flatulenta, *ibid.* 51. hirsutinosia, 50. hypochondriaca, 51. in-
 flammatoria, I, 251. II, 51. ab ira effrangi, II, 52. laetentium, 51. paralytica, 50. a saburra, 49. scirrhusa, 50. sputatoria, 46. 50. a veneno, 49. verminosa, 50.
Cardilæa, II, 50.
Cardiogmos, II, 220.
CARDIOGMUS, I, 294. 295. 424. II, 47. 51. 57. aortæ, auriculæ; cordis sinistri, II, 48. Leproianus; Meckels, *ibid.* a mole cordis, *ibid.* Pelagii; polypus, 47.
Cardionchus, I, 424. II, 47. *ibid.*
CARDITIS; spontanea, I, 260. traumatica, 261.
Carebaria, II, 28.
Caris, I, 129. II, 334.
Carnevalotto delle Donne, II, 121.
Carnositas de l'urebra, II, 206.
CARPHOLOGIA; delirantium, simplex spasmodica, I, 288.
Cartilaginis mucronatæ prolapsus, II, 52.
Caruncula virgæ, II, 206.
Caruncula lacrymalis inflammatio, II, 39.
CARUS, carus, I, 437. apyretos, 439. arthriticus, *ibid.* exanthematicus, 441. febricofus, 438. febrilis, *ibid.* a frigore; ab hydrocephalo, 441. hypochondriacus, 440. hystericus, 439. ab insolatione, 440. ischurionis, 439. a parcoxitis, 440. nyctagmus, 441. a pathemate; a plumbagine, 440. spontaneus, 438. traumaticus, 439. varicofus, *ibid.* verminofus, 440.
CATALEPSIS, *Cataleptis*, I, 431. 433. de-

lirans, 432. II, 110. a fumo, I, 431. hysterica, 431. melancholica; a menostasia, 432. prima, 441. quartanaria; a resolutione, 433. sanguinea, 432. secunda, 440. somnambulans, 332. verminosa, *ibid.*
Catameniorum fluxus immodicus, II, 162. v. *Menfes*.
CATAPHORA, I, 436. arthritica, chronica, 437. coma, 436. exanthematica; hydrocephalica; scorbutica. 437. somnolentia, 436. timor, 437.
CATARACTA, *Cataracte*, I, 376. antiglaucoma, 378. argyria, *ibid.* clavata, *ibid.* glaucoma, *ibid.* luxata, *ibid.* membranacea, *ibid.* nigra, 390. purulenta, 378. secundaria, 379. a synchryli, 378. a tela, *ibid.* vera, 377. vera Veterum, 378. viva, *ibid.* virgata, *ibid.*
Catarrhales morbi, II, 354.
Catarrhe, II, 21.
CATARRHUS, I, 96. II, 21. benignus, II, *ibid.* Bellinfulanus, *ibid.* caninus, 23. epidemicus, 21. ad fauces, I, 95. cum febre epidemica, 148. ferinus, II, 21. ad nares, II, 199. pectoris, II, 22. ad pectus, I, 360. ru-beolofus, II, 202. suffocativus, I, 349. 351. vesica, II, 29.
Catafarca, II, 248.
Catagamus, II, 199.
Catastropha, II, 177.
Cazerre, II, 211.
Catharus diapharyngos, II, 199.
Bathemerina, I, 170. 180. 183. cathemerinos pyretos, *ibid.*
CATOCHUS; cervinus, I, 187. cutaneus, *ibid.* diurnus, 288. holotonicus, 287. scorbuticus *ibid.* foillus, *ibid.*
Cauma, I, 307. II, 26.
Causus, I, 179.
Celnure darrense, I, 74.
Celes, I, 92.
CEPHALÆA, II, 30. ab acrimonia scorbutica, arthritica; febricofa; a gutta rosea repulsa; hypochondriaca; a materia salina; melancholica; Polonica; scabie repulsa; serosa *ibid.* syphilitica, *ibid.*
CEPHALALGIA, II, 28. anemotropa, 30. catamenialis, 28. catarrhalis, 29. a constipatione, 28. febrilis, 29. gravidarum; *ibid.* hæmorrhoidalis, 28. hysterica, 30. inflammatoria; intermittens, 29. a meningum inflammatione, *ibid.* metatlica, 30. a phlegmone cerebri, 29. plethorica, 28. pulsatilis, 29. rara, 30. stomachica, 28. a vasis meningum sanguine turgidis, varicofis, *ibid.* verminosa, I, 159. 293.
Cenbales; *veriolique*, II, 30.
CEPHALITIS; Ægyptica, I, 255. cerebelli, 256. epidemica; Litrjana; sriasis, *ibid.* spontanea; *ibid.* traumatica, 255. verminosa, 256.
Ceratocèle, I, 382.
Cercofus, I, 83.

Cere-

Cerebri abscessus, I, 255. *ibid.* phlegmone; sphacellismus, *ibid.* sphacelus, *ibid.* *ibid.* ulcus, *ibid.*
 Chalazosis, II, 288.
 Chalazium, I, 303. II, 37.
Chaleur excessivæ; externæ; II, 26. *du foye*, I, 70.
 Chalrab, II, 236.
 Chancres, I, 240. *venériens de la bouche*, 241.
 II, 20. *aux genitoires*, II, 79. *au gosier*, I, 356.
le Chapelot, I, 71.
 Chapetonade, II, 181.
 Charbon, I, 80. *pestilential*, I, 81. 220.
 Chastre, II, 288.
 Chastemie, I, 392.
 Chasmodia, I, 331.
 Chaspe Rhafis, I, 223.
 Chaspe, II, 197. 199.
 Chautrevielle, I, 329.
 Chaudépisse, II, 213.
 Charvete, II, 321.
 Chemosis, I, 94. II, 37.
 Chiquies, II, 291.
 Chittentis, II, 112.
 CHLOROSIS, Chlorosma, II, 315. a. *maripria*, 316. *Bengualensis*, 318. *Carthagenica*, *ibid.* *gravidarum*, 317. *ab hydrothoraces*, *ibid.* *infantum*, *ibid.* *maculosa*, *ibid.* a. *menorrhagia*, 316. *rachialgica*, 318. *muliebris a menstruatione difficili*, 316. *spuriæ*, 317. *veræ*, 315. *verminosa*; *viridis*, 317. *virginica*, 316.
 Chojrades, II, 287.
 Choleptysis, II, 202.
 CHOLERA, II, 186. *arthritica*, 188. *auriginosa*, 86. a. *barbi ovis*, 187. *crapulosa*, 188. *dysenterica*; a. *stribus*; a. *stulenta*; a. *fungis venenatis*, 187. *hamarodes*, 159. *hypochondriaca*, 186. *Indica*; *inflammatoria*, 188. *intermittens*; a. *lucii ovis*, 187. *sanguinea*, 159. a. *sepiæ aramento*, 187. *sicca*, 186. *spontanea*, *ibid.* *suppressa*, *ibid.* a. *veneno*; a. *veneno animalis*; a. *venenis fossilibus*, 187. *verminosa*, 178. *xeræ*, 186.
 Cholera-morbus, II, 186. *ibid.*
 Cholirica, II, 176.
 Choloma, I, 297.
 Chordapfus, I, 252. *ibid.* II, 56. 182. 183.
 Chorea S. Viti, I, 310. II, 222.
 Chutes, I, 92. *du fondement*, II, 79. *de la matrice ou du vagin*, I, 101.
 Cibi fastidium, II, 176.
 Cicatrice, I, 70.
 Circocèle, I, 91.
 Circumligatura, I, 83.
 Ciron, I, 74. *des paupières*, 85.
 Cirfoceles, I, 84. 88. 91.
 Circomphalus, *Circomphale*; I, 91.
 Citta, Cizza, II, 112.
 Clapier, I, 128.

Classium clavis, I, 43. & *Ordinum synopsis*, 52. *xiologiarum synopsis*, II, 335.
 CLAUDICATION, I, 297. a. *contractura*; a. *debilitate*, *ibid.* a. *dolore*; a. *fractura*, *ibid.* a. *luxatione*; a. *mutilorum*, *ibid.* *rachitica*, *ibid.*
Claveau, *Clavette*, II, 291. *ibid.*
 Clavus, I, 84. II, 32. *hamorrhoidalis*, II, *ibid.* *hystericus*, *ibid.* *Clavi oculorum*, I, 378.
 Clou, I, 80. 89. II, 31. *hystericus*, II, 32. *ordinaire*, I, 80.
 Cocchemar, I, 324.
 Cecitas, I, 390.
 COELIACA, II, 189. 191. *passio*, *chylosa*, *ibid.* *lactea*; *mucofa*, *ibid.* *purulenta*, *ibid.* *Cœliacos cathos*, *ibid.* *Cœliacus abscessus*, II, 53. 170. 191.
 Coldness, II, 26.
 Colebrilla, II, 293.
 Coledon, II, 319.
 Coleza, I, 297.
 COLICA, II, 54. *accidentalis*, 58; *ab acri & scorbutico humore*; *atrabilis*; 56. *colo obstructo*, 55. *Damnoniensis*, 71. *enterocœlica*; *febricosa*, 58. *figula*, 71. *stulenta*, 55. a. *frigore*, 58. *gravidarum*, 57. *hamorrhoidalis*, 56. *hypochondriaca*, 54. *hystericæ*, 54. 57. *Japonica*, *ibid.* *inflammatoria*, 183. *ab intermittenti febre*, 71. *lactentium*, 58. *Lappynica*, 56. *meconialis*, 58. *in purgatione mentitua*, 66. *mefentericæ*; *pancreatica*; 57. *ab impedita perspiratione*, *Tronchani spec.* 52. 74. *phlogistica*, 56. *Pictorum*, 71. 72. *pituitosa*, 55. *plethorica*, 56. *plumbariorum*, 71. 72. *pulsatilis*, 57. a. *scabie repulsa*, 55. *scirrhusa*, 57. *spasmodica*, 56. *spasmodica Angelimontanorum*, 59. *species 42*. *Tronchini*, 73. *ulcerorea*, 55. *Surinamensis*, 74. a. *veneno*, 72. *ventriculi*, 51. *ab ejus emphraxis*, 54. *verminosa*, 55. a. *vesiculis aere turgidis*, *ibid.*
 Colicus dolor Pictorum s. Pictorum. & Figulorum, II, 71.
 Colique, II, 54. *des Barbonilleurs*, 72. *bileuse*, 52. *convulsive*, 56. *des enfans qui tetterent*, 58. *d'estomach*, 51. *après le froid*, 58. *glairuse*, 55. *ho-parique*, 58. *d'indigestion*, 51. 58. *inflammatoire*, 56. *intestinale*, 54. *des mois*, 66. *des Peintres*, 72. *de plomb*, *ibid.* 71. *de Poison*, *ibid.* *des Peintres*, 72. *remale*, 61. *vegetale de Poison*, 72. *ventreuse*, 51. 55. *uterine*, 66. *hystérique de l'uterus*; 67. *le Collier*, I, 72.
 Colli morbi, II, 376.
 Color icterodes. *inipum*, I, 71.
 Colotes, I, 297.
 Columella, *bicornis*; *columna*, I, 96.
 Coma, COMATA, I, 430. a. *repulso erysipellate*, 437. *ex ischuria*, 439. *lethargicum*, 434. *chronicum a repulsa podagra*; *scorbuticum*, 437. *foenulentum*, *ibid.* *foeniferum*, 442. *vigil*, 434. 434.
 Comæcephalus, I, 255. 257.

Comedones, II, 292.
 Compernes, I, 87. 225.
 Conducciones, I, 277.
CONDYLOMA, *Condylome*, I, 84. callus, *ibid.* clavus, *ibid.* flicus, ganglion; porrum; thymus, *ibid.* tylus, *ibid.*
 Congelatio, I, 428.
 Conion, II, 129.
 Consumptio, II, 238. 243.
 Conternatio, II, 218.
 Constipatio, *Constipation*, II, 192.
 Continens putrida, I, 159.
CONTRACTURA, I, 283. 415. ankylosis; arthritica, 283. Bohemica, *ibid.* catarrhalis, *ibid.* dolorifica, *ibid.* hypochondriaca, *ibid.* paralytica; scorbutica, *ibid.* spasmodica; syphilitica, 284.
 Conturbatio, II, 118.
CONTUSIO, *Contusion*, I, 72. 127. partialis; *ibid.* universalis, *ibid.*
 Convolvulus, II, 182.
CONVULSIO, *Convulsion*, I, 289. abdominalis, 291. admirabilis, 292. a capitis ictu, 290. febrilis, *ibid.* gravidarum, 292. habitualis, *ibid.* hemitonos, 293. ab hydrocephalo, 291. ab insurrectione, 289. Indica, 291. intermittens, 291. laryngis, 351. nephralgica, 291. a nervi punctura, 290. ab onanismo; pleurotonos, 292. raphania; Solonensis, 291. Suecana, 299. universalis, 291. ab ustilagine, *ibid.*
Convulsion causée par la formation des dents, I, 1, 300. des enfants, 298.
 Convulsiones, convulsivi morbi, I, 267. earum theoria, 268. clonice, 288. 289. infrequentes, 292. tonice, 277. vid. *Spasmi*.
 Convulsivi motus, I, 288. 289.
COPHOSIS, I, 396. 405. ab aphthis, a catarrho, 397. a comare; 398. congenita, 399. critica; febrisque; 397. a meatu, *ibid.* serosa, 98. a steatomate, 399. syphilitica, 398. a tuba; a tuba polypo; a mucotubam repleta; ab angina tubis obstructis; a tumore palati eubas obstruente; a tympano, 398.
 Copos, II, 23.
 Copriemesis, II, 182.
 Coqueluche, I, 256. 257. 341. II, 21. des enfants, I, 173.
Coe des pieds, I, 84.
 Cordinema, I, 289.
 Cordis & pericardii inflammatio, I, 260. cordis vulnera, 261. palpitatio, 294. dolor, II, 51. temer, I, 295.
 Corpulence, II, 246.
 Corpulenta saginosa, II, 247. febricosa, 199.
 Corybantismus, II, 238.
CORYZA; catarrhalis; ibumida; phlegmatorrhagia, II, 199. febricosa; pusulenta; variolosa, *ibid.* virulenta, *ibid.*
Conches precoces, II, 167.
 Congh, I, 399.
Comp d'arme a feu, I, 216. de Soleil, I, 440.

de la torpille, II, 25.
Couperose; dartreuse, I, 71.
Coupure, I, 128.
 Courap, II, 305.
Courbature, I, 153. II, 17. 10. 23.
Couronne de Venus, I, 71.
Cours de ventre, II, 288.
Courre haleine, I, 344.
Crachement de sang, II, 152.
Crachotement, II, 199. & *aigreurs des femmes grosses*, 201.
 Crampe, **CRAMPUS**; idiopathicus; sympathicus, I, 284.
 Cranchheit, I, 191.
 Craspedon, I, 96.
 Cremasom, II, 46.
 Crepitus, II, 218. 219.
 Cretes, I, 84.
 Cridones, Crinones, II, 291. 244.
 Crocidismus, I, 288.
Croissances, Croissans, I, 80.
 Crocidismus, II, 30.
Crosse de lait, *Cruilla lactea*, II, 306. 307.
CrySTALLI (la), I, 77. 223. 224. 115.
 Cuesis, II, 259.
 Curucucu, II, 157.
 Cutanei morbi universales, II, 373. partiales, *ibid.*
 Cutubuth, II, 136.
CYNANCHE, I, 257. arthritica, 259. canina, *ibid.* contagiosa, 257. a deglutitis, 260. epidemica, 257. exantematica, 259. gangrenosa, 258. hepatica, 259. laryngea, *ibid.* maligna, 257. mercurialis, 260. metastatica, 259. parotidea, 260. pestilens, 257. pharyngea, 259. prunella, 260. purpuro-parotidea, *ibid.* thymica, 259. tonsillaris, 257. trachealis; vera, 259. ulcerosa, 258.
 Cynorexia, II, 114. Cynorexis, *ibid.*
 Cyphosis, I, 87.
CYSTIDES, I, 88. II, 373.
 Cystiphlogia, I, 254.
CYSTITIS; a cantharidibus; spontanea; traumatica, I, 260.
 Cystobubonocoele, I, 115.
CYSTOCELE, I, 113. 116. truralis, 115. enterocelica, 116. epiploceleica, *ibid.* hypogastrica, 115. ab hysteroptosi, *ibid.* inguinalis, *ibid.* lumbaris, 116. perinealis, 115. vaginalis, 116. Cystoceleae compositae, *ibid.* simplices, 115.
 Cysto-enterocoele, I, 106.
 Cysto-epiplocele, I, 110.
 Cysto-merocoele, I, 115.

D.

DÆMONOMANIA, II, 138. a cardiogmo, 140. fanatico; hysterica, 139. Indica, 140. Polonica, *ibid.* sagarum; simulata, 138. a vermibus, 139. vampirismus, 138.

DAR

- Danse de S. Guy*, I, 310. II, 122.
Darre, I, 72. *boutonnée*, 73. *encroûtée*, *ibid.*
 II, 304. *farineuse*, I, 72. *miliaria*, 73. *noire*,
 II, 313. *vangeante*, I, 73. *serbe*, 72. *chreli-*
que, 73.
Dalymma, II, 34.
Dalnes, I, 396.
Debilitas, I, 419. *febrilis*, 420. *habitualis*,
 419.
DEBILITATES, I, 372. *eorum theoria*,
 366.
Debord, II, 306. 307.
Decolorationes, II, 308.
Decolores morbi, II, 308. 372.
Défaillances, I, 418.
Defluvium, *capillorum*, II, 321.
Defluxio, II, 21. 188.
DEFORMITATES, II, 229. v. *Cachectici*
morbi.
Deglutio difficilis, II, 43. v. *Dysphagia*.
Degout, I, 339. 340.
Dejectio cruenta critica, II, 173. *mucosa pro-*
pure habita, 191. *sanguinis periodica*, 173. *De-*
jectiones nigre, 176.
Delacrymatio, II, 197.
Deliquium, I, 422.
Délire, **DELIRIA**, *Delirium*, II, 126. 128.
febrile, *magicum*, 130. *ex narcoticis*, 139. *seni-*
le, 132. *ex venenis dementantibus*, 129.
Demangeaison, II, 25.
Dem-el-muya, I, 255.
Dementia, *Dementia*, II, 132.
Demenomania, II, 138.
Dendruipled, II, 192.
la Dentition, II, 42.
Dentium dolor, 41. *podagra*, I, 280. 281. *stri-*
dor a veribus, 280. *in morbis acutis*, *ibid.* *flu-*
por, II, 43.
Deperditio, II, 165.
Deplacement, I, 92.
Debor, I, 90. *ibid. a la cuisse*, II, 77. *dans*
l'hypogastre, 69. *aux mammelles*, 70. *lacteux sur*
le cervicau, II, 141. *sur la poitrine*, I, 250. *avec*
fièvre aigue, 254.
Defalsetio, II, 22.
Desferes, I, 92. *de la matrice*, 99. *du va-*
gin, 101.
Desmayo, I, 423.
Desmochaunosio, I, 122.
Dosmophlogia, I, 122.
Defectio, II, 245.
Destillatio, II, 21. 199.
Desvoement, II, 188. *des enfans de lait*, 290.
DIABETES, II, 208. *Angliarum*, *ibid.* *chri-*
sticus; *artificialis*; *ibid.* *febricosus*, 204. *hysteri-*
cus; *legitimus*, 203. *a vino*, *ibid.*
Diacaustis, II, 26.
Diapycsis, I, 90.
Diaria, I, 153. *ex balneo frigido*, 154. *in-*
flativa, 153. *ex matrone*; *pluvia frigida*; *terro-*
re, 154.
Diarrhee, **DIARRHOEA**, II, 288. *acrafa*,
 189. *adiposa*, 190. *ab aphthis*, 191. *aquosa*:
 189. *arthritica*, *ibid.* *atrophicorum*, 190. *bilio-*
sa, 189. *caruosa*, *ibid.* *cerebralis*; *Chilensis*,
 190. *cholericodes*, *ibid.* *chymosa* 191. *coeliaca*,
 189. *colliquativa*, 190. *a toto corpore cum fe-*
bre, 188. *sine febre*, *ibid.* *a dentitione*, 190. *fe-*
bricosa, *ibid.* *febrilis*, 188. *ab hypercatharsi*; *la-*
ctentium, 190. *lymphatica*, 189. *a miliaribus*; *ibid.*
mucosa, *puriformis & torminosa*, 191. *pituitosa*,
 189. *pleuriticorum*, 190. *purulenta*, *ibid.* *ru-*
beola subtequens, 189. *serosa*, *ibid.* *stercorosa*,
stomachalis, 188. *synthetica*, 190. *variola*,
 189. *a ventriculo & cibis corruptis*, 188. *ver-*
minosa, 190. *urinosa*, *ibid.* 203. *vulgaris*,
 188.
Diarrica Gilberti Angli, II, 188.
Diarroia ex ore, II, 203.
Diastase, **DIASTASIS**, *a causa externa*, *vio-*
lenta; *symphygium*, I, 123. *a causa interna*:
raphica; *stuturum cranii*; *harmonica*; *ossium*
nasi; *synostochondrica*, *castillaginis narium*, 124.
epiphygia, *epiphysium*, *synchondroica*, *syn-*
chondroica, *ibid.*
Diastrophe, I, 182.
Diatholis soporosa, I, 435.
Dichomene, I, 156.
Dievaren, II, 19. 293.
Difficultas intestinorum, II, 171.
Difficulté d'avaler, II, 43.
Digitum, I, 82.
Dinos, II, 89.
DIPLOPIA, II, 101. *ab ancyloblepharo*, *a*
catarrho; *a contusione*; *a paralyfi*, *pyretica*; *re-*
motorum; *a spasmo*; *a temulentia*; *a terrore*,
 103.
Dipfacus, II, 203.
Dinia, I, 344.
Dissolutio vitrei, I, 90.
Distorsio, 120. 121.
Doenca de Richo, II, 193.
Dolor, I, 207. *ejus theoria mechanica*, II, 5
psychologica, 9. *capitis*, *cephalicus*, 28. v. *Ca-*
phalgia, *cardialgicus*, *spasmodicus a veneno*,
 72. *coxendicus*, 76. *hypochondrii dextri*, 58.
ischiadicus, 76. 78. *lateris*, I, 357. II, 61. *a*
statu, I, 357. *nephriticus*, II, 66. & *spasmus o-*
ralgicus, 40. *pleuriticus ex lumbricis*, I, 357. *de*
tripas, II, 71.
DOLORES, II, 3. 5. 11. **ABDOMINIS**, 49.
CAPITALES, 27. **EXTERNI & ARTUUM**,
 69. *hysterici*, 19. **PECTORIS**, 43. *rhumatismal-*
es, 18. **VAGI**, 12.
Dolorifici morbi, II, 5.
Dormitatio gravis, I, 437.
Dorsi dolor, I, 357.
Dothien, I, 80.
Double ville, II,
Douleurs, II, 5. *d'accouchement*, 75. *des om-*
ercs des parties, 8. 80. *des cuisses*, & *des parties*,
 8. 80. *des jambes*, 77. *des fondemens*, 78. *des foyes*,
 58. *du*

78. du gland provenant du phimosis & paraphimosis, 79. des hemorrhoides, *ibid.* de hernie, *ibid.* des mammelles, 69. d'oreille, 40. des os, 26. des parties génitales, 79. de poitrine, I. 357. de la rate, II, 61. des testicules rétrécis, déplacés, II, 79. de tête, 30. au ventre, 54.

Dracontium, II, 292.

Dracunculus nostras, II, 262. *Perlarum ibid.*

Dragonæna, II, 292.

Draghiuta Suecici, I, 291.

Drapeau, I, 85. 381.

Durati d'onie, I, 393. 396.

Durillon, I, 84.

DYSÆSTHESIA, I, 376.

Dyscataposis, II, 45.

DISCINESIA, I, 404.

DYSECOEA, Disecoa, I, 393. febrilis, a kinkina, 395. malarum, a meatu obstrueto: monoton, 393. a myringæ atonia, a a myringa dura, perforata, 394. syphilitica, 395. a tuba obstrueta, a tympani fistula, hydrotympa-
no, *ibid.*

DYSENTERIA, Dysentery, *Dysenteria*, II, 172. æquinoctialis; alba, 174. atrabilaria, 173. benigna, *ibid.* carnosa, 175. castrensis, 173. catamenialis, *ibid.* a cathartica, 174. critica, 173. epidemica, *ibid.* febricosa, 175. febrilis, 175. gravidarum, *ibid.* hæmatodes, 172. hepatica, 170. incurta, 174. Indica, 173. intermittens; miliaris; 175. Parisica, 173. pectorum, 174. pestilentialis, 173. Polonica; scorbutica, 177. simulata, 173. Splenica, 176. Spontanea, 173. syphilitica, 174. vera Bontii, *ibid.* verminosa, *ibid.* a vomica mesenterii, *ibid.*

DYSODIA, II, 222. auxillarum; hircina; ab otirrhœa, 222. ozæna, 222. pedum; pulmonica, 222. a rhinostenote; stomatica, 221. stomachalis; a tinea; urinosa, 222.

Dysorexia, I, 400.

DYSERMATISMUS, II, 224. apractodes, 226. catarrhalis, *ibid.* epilepticus, hypertonicus, *ibid.* mucosus, *ibid.* nodosus, 225. phymosicus; præputialis, *ibid.* refluus, 227. serosus, *ibid.* urethralis, 2214.

DYSPHAGIA, II, 43. aneurysmatica, 46. a calculo palatum obidente; a callo aortæ adnato; 44. canina, 45. a scirrhus cardiacum obidente, 44. a datura; a deglutitis, 45. ab excrementis; fungis; verrucis œsophago innatis, 44. hydrophobia, 45. ab hypostaphyle, 46. hysterica, 43. inflammatoria, I, 259. a labario, II, 46. lactentium, 44. nauseosa, 45. ab œsophago obstrueto interveniu scirrhi; ab œsophagi induratione cartilaginea; ab œsophagea glandula; œsophagea, 44. ab ossiculo retro laryngem nato, *ibid.* paralytica; pharyngea, *ibid.* a sarcomate, 45. a scirrhus, *ibid.* a siccitate, 46. spasmodica, 43. a thymo incrassato; a tuberculo cancroso in œsophago, 44. tussiculosa, *ibid.* Val-salviana, 45.

Sauvages Nosologia Methodica Tom. II.

Dysphoria, II, 22.

DYSPNOEA, *Dyspnea*, I, 344. aneurysmatica, 346. ab auricularum aneurysmate, 345. ab aortæ angustia, 346. a bronchiis ossificatis, 345. calculosa; a calculis pulmonum, a carcinomate, 344. a corde; a costarum extremis ossis; a cartilagine ensiformi ossis, longa; a situ in intestinis, abdomine, 345. Galenica; a gastrocele, 346. a glandulis, 345. graviditate, *ibid.* ab hydatidibus, *ibid.* a liene, 346. a mana carnea crinita in abdomine; ab insigni mesenterii tumore; ab omento crassiori, 345. a pericardii scirrhus, 344. a phisconia, 345. pituitosa, 344. plethorica, 346. a pleura ossificata, a pneumata, 345. polyposa, 346. ab emphysemate pulmonum, 345. a pulmonibus exsiccatis, 344. rachitica, 345. scorbutica, 346. a steatomatis, 345. a sterni prava conformatione, *ibid.* a stomacho; trusmatica, 346. a tuberculis, 344. tympanitica, 345. a vomica, *ibid.*

Dyspnœici morbi, I, 325.

DYSTOCIA, II, 63. ab angustia; a colica; a debilitate, 64. a fœtus culpa; mole, 65. situ, morte, *ibid.* ab hysteroloxia, *ibid.* ex parte matris, 64. a mola, 66. a pathemate, 64. a secundinis relapsis, 66.

Dystocchialis, II, 33.

DYSURIA, *Dysurie*, II, 205. arsuræ, 206. atretarum, 208. calculosa, 207. a caruncula, 206. *ibid.* a cystocele, *ibid.* deceptiva a renibus, *ibid.* dem diabetica, 208. gravidarum, *ibid.* hæmorrhoidalis, 206. herpetica, ab herpette vesicæ, *ibid.* hysterica, 205. ab hysterigide; ab hysteroloxia, 207. ab insectis, lumbrico, teredonibus, 208. neontympharum, *ibid.* nephralgica, 206. peimaria, *ibid.* rachialgica, 207. syphilitica, venerica, 206. venerica sicca, 80. 206. ab ulcere renum, *ibid.* ab urethra per cicatrices gonorrhœæ angustata; ab urethre phlogosi sine ulcere, *ibid.*

E

Eaux dans le cerveau, I, 292.

Ebrouement, I, 289.

Ebullition de sang, I, 75.

Ecartement des harmonies, I, 224. des os, 123. des sutures, 124. des synchondroses, *ibid.* des synchondroses, *ibid.*

ECCHYMONA, I, 72. 381. a compressionem; hypomychon; hypopyon; hyposphagma, 72. ab ictu; melasma, *ibid.* palpebrarum; scorbuticum, *ibid.* vibex, *ibid.*

Echymose, Echymosis, I, 72.

Ecclasioma, Ecclasiomus, I, 299.

Echarde, I, 127.

Echaubouillure, Echauboulure, I, 126.

Echauffement, II, 26. 28.

ECLAMPSIA, *Eclampsis*, I, 299. ab achoribus, Cc

bus; ab atropia, 301. a cicuta, *ibid.* a colliaria, 302. a dentitione, 300. a doloribus, *ibid.* exanthematica, 301. febricosa, 302. humoralis, 300. ab hydrocephalo, 302. ab inanitione, 301. ab ischuria, 300. a miliari, 301. neophytorum, 302. nephritica; ab odontalgia, 300. ab renanthe, 301. ab otalgia, 300. parturientium, 299. a petechiis retrocellis, 301. plethorica; a purpura, *ibid.* rachicalica, 300. a rubecula, 301. a saburra, 300. traumatica, 301. typhodes, 299. a variolis retrocellis, 301. verminosa, 299.

Ecorchure, I, 117.

Ecoulement des eaux, II, 251. *de lait des mamelles*, 218. *des oreilles*, *ibid.* *par le canal de l'urètre cru vénereux par le malade*, 209.

Eclipsimus, I, 93. ex certamine athletico; ex nisu parturitio; ex strangulatu, 94.

Eclipsis, II, 28.

Ecnomelles, II, 287.

Ectesimata, I, 75.

ECTISTASIS, I, 382, 426. 433. cataleptica, *ibid.* catoche, resoluta, *ibid.*

ECTOPIÆ, I, 92. II, 374.

Ectresmor, II, 165.

Ectropium, I, 95. II, 198.

Edematis, *Edeme*, Voiez *Oedematis*, *Oedeme*.

Effemera, Effimera, I, 153.

EFFLORESCENTIAE, I, 72.

Effluxio, II, 165.

Effus des reins, II, 75.

Elcos, II, 182.

Elaphia, I, 287.

Eleoma, II, 38.

ELCOSIS, II, 322. Egyptica, 324. cancrofa, 323. fistulosa, 322. gangrenosa, 323. herpetica; hydropum, 322. scorbutica, *ibid.* scrophulosa, *ibid.* syphilitica, *ibid.* variolosa, *ibid.*

Ecdyria, I, 72. II, 306.

Ecdydrion; II, 39.

Elephanti morbus, Elephantia, II, 252. 301.

ELEPHANTIASIS, Elephas, II, 300. alba, 317. alopecia, 301. Javanensis, 302. Indica, *ibid.* legitima, 311. leonina, *ibid.* Orientalis; 300. simulata, 300. syphilitica, 301. Tyria, *ibid.* oculi, I, 93.

Elevures, I, 72.

Elodet, I, 177.

Emetos, II, 177.

Emoptois, II, 253.

Emphractic morbi, II, 364.

EMPHYSEMA, *Emphyseme*: spontaneum, I, 78. universale, II, 247.

Empigo, II, 303.

Empneumatosis, II, 247.

Emprophetonus, I, 285.

Empoc, *Empneuma passio*, II, 252.

EMPYEMA, I, 363. diaphragmatis, 364. intercostale, *ibid.* mediastini; a peripneumonia; pleura; a vomica, *ibid.*

Empyocoele, I, 90. 92.

Empyomphale. *Emphyomphalus*, I, 91.

Encanthis, I, 84. 381.

Encauma, II, 38.

ENCEPHALOCELE, I, 116. hydrocystica, 117. Lecheii, 128. simplex, 117.

Encephalofos, I, 255.

Enchisfrenement, II, 199.

Enface (état d'), II, 132.

Enflure, I, 77. *des extrémités aux femmes*, 295. *set*, II, 251. *oedemateuse*, 250.

Engelure, I, 76.

Engourdissement, II, 24.

Enrouement, I, 411.

Enrolipathia, II, 126.

ENTERITIS, I, 252. colica, *ibid.* enterocelica, 253. flatulenta; *ibid.* iliaca, 342. mesenterica, 253.

Enterolubonocoele, I, 102, 104.

ENTEROCELE, I, 102. appendicularis, 104. bubonoxis, 107. completa, 104. cruralis, 105. cystofole inducens; cystocelica, 106. epiploico-completa & incompleta, *ibid.* epiploico-cruralis, *ibid.* epiploico-ischiatrica, 107. epiploico-nvalaris, 106. epiploico-vaginalis. ventralis, umbilicalis. 107. hydrocelica, 106. hypogastroxixis, 108. incompleta, inguinalis, 104. ischiatrica; 105. merorixis; omphalorixis. 107. ovalaris, 105. parochidialis, 106. partialis. perstrictoria, 105. vaginalis, *ibid.* ventralis. *ibid.* umbilicalis, *ibid.* laborum vulvæ, 104. epiploica, 106.

Enterocoeles infsectati, I, 107. faccatae compositæ, 106. simplices, 104.

Enterocystocoele, I, 116.

Enterocystocoele, I, 108.

Enteromerocele, I, 102, 105.

Enteromphalus, I, 105. 107.

Enterorolcheocoele, I, 102. 104.

Enterophlogia, I, 252.

Emihusiasmus, II, 122. 137.

Enterese, I, 120.

Enteripado, II, 71. *ibid.*

Entropium, I, 95. 196.

Envie, I, 72. II, 34. *d'aller*, II, 192. *bizze*, II, 114. *de femme grosse*, 113. *venir*, 277.

ENURESIS, II, 204. calculosa, 205. catamenialis, *ibid.* a fistula, *ibid.* gravidarum; herniosorum; infantum; paralyticorum, 204. puerperarum, *ibid.* a spargano, 205.

Eparvin, I, 86.

EPHELIS; Celsi; gravidarum, I, 71. ab igne *ibid.* lentigo; *ibid.* lutea; scorbutica, *ibid.* a Sole, *ibid.* vibex, *ibid.*

EPHEMERA, I, 153. ab ammochasia, 155. *ibid.* Anglica pestilens, *ibid.* anniversaria, 156. a balneo, 154. 155. ex cacochylia, 154. a calore; cardiacis, 155. calu ab alto, 155. cibis calidis, 153. contusione, 155. ex crapula cruditate, 154. dichomene, 156. a dolore, 155. ab exercitio violento, *ibid.* a fractura, *ibid.* frigore, 154. furore, 155. hamathydrotica, 156. ab hypocaustis; ab insolatione; ab ira; a labore immodico, 155. lactea puer-

puerperarum; nutrimum a lactis refluxo; a lacte sepefflo, *ibid.* a liquoribus ardentibus, *ibid.* a lunctione, *ibid.* maligna; medica; menstrua; *ibid.* natalicia, 156. naufragativa, 154. ex oppilatione; ex perspiratione suppressa, 153. a pervigilio, 155. a phlogosi; *ibid.* plethorica, 153. ex satietate, 154. sudatoria, 155. a sudorificis; a thermis, *ibid.* a vino, 153. a vulnere, seu vulneraria, 155.

Ephemera praxis, I, 156.

EPHIALTES, I, 329. ex hydrocephalo, 330. hypochondriaca, *ibid.* plethorica; stomachica, *ibid.* tertianaria, verminosa, *ibid.*

EPHIDROSIS, II, 195. acida; arenosa; crerulea, 197. cruenta, *ibid.* exanthematum, 196. febricosa, *ibid.* febrilis; hecticæ, *ibid.* lactea; lateralis; lutea; nigra; oleaginosa, 197. a saburra, *ibid.* a sale crystallifato, *ibid.* scorbutica; spontanea, 196. symptomatica, *ibid.* vinosa; viridis; *ibid.* urinosa, 197.

Emphimera, I, 153.

Epiala, I, 171.

Epian, II, 193. 194.

Epibole, I, 329.

Epicauma, II, 382.

EPILEPSIA, *Epilepsie*, I, 303. ab achoribus & cinis repellis; cachectica, 307. a catameniiis retentis, a crapula, 305. a dolore, 307. ab ebrietate habituali, 305. exanthematica, 307. febricosa, *ibid.* a fistulis resicatis, *ibid.* ab hæmorrhoidibus retentis, 305. melancholica & hypochondriaca, 306. nephritica, 306. nocturna, 329. a parthenate, 306. pedisymphomatica, *ibid.* plethorica, 305. rachialgia, 307. a sanguine crasso; polyposo, 305. serosa; symptomatica a repulsa scabie, 307. simulata, 306. stomachica, 305. sympathica, 306. symptomatica, 305. syphilitica, 305. syphilitica; a lue venerea, 307. traumatica, *ibid.* a ventriculo, 305. uterina, seu ab utero, *ibid.*

Epilepticus insultus, I, 299.

Epine ventrale, I, 86. 129. II, 16.

EPINYCTIS; pruriginosa; vulgaris, I, 125.

EPIPHORA, II, 35. 197. ex æripole, *ibid.* ab anchylo, 198. arthritica; 199. calida; cruenta, 198. b. ætropicæ, *ibid.* frigida, *ibid.* lactea, 199. ophthalmica, 199. a parthenate; a rhizade; *ibid.* sebacea; serosa, 199. ex variolis, 197.

Epilepsia, I, 414.

Epiphonoccele, I, 108. 110.

EPIPHLOCELE, I, 108. completa; cruralis, 110. erythellica, *ibid.* hydrocellica, *ibid.* hydrocellico-hydridosia, 91. incompleta; inguinalis, labiorum vulvæ, 110. vaginalis; ventralis; umbilicalis, *ibid.* Epiphloceles complicata, *ibid.* simplicis saccae, *ibid.* sacco destituta, *ibid.*

Epiphlocytocele, I, 116.

Epiphlocenteroccele, I, 106. completa, *ibid.* cruralis, *ibid.* incompleta, sive inguinalis, *ibid.* ischiatica, 107. ovalaris, 106. vaginalis, 107.

EPIPLOITIS; vera, I, 253.

Epiphloceroccele, I, 108. 110.

Epiphlophalus, I, 107. 108. 110.

Epiphloon, ejus morbi, II, 376.

Epiphlooscheecle, I, 108. 109.

Epilardium, II, 248.

Epretra, II, 192.

Epuifement, I, 419.

Epulis, I, 83.

Erallment des paupiers, I, 95.

Erechthismus, II, 327.

l'Ergot, II, 329.

Erotomania, II, 134.

ERRATICA; decimana; hebdomadaria; nona; octana; quintana; septana; vaga, I, 189.

Eruption, I, 74. *latente de la peau*, 232. 235.

Eruptivi calidi morbi, II, 383. apyretici morbi, *ibid.*

Bryge cullodes; Erymatodes nousus, II, 219.

ERYSIPELAS, I, 75. 237. ambustio, 238.

Chinense, *ibid.* commune, 75. contagiosum, 238. perniciosum, 237. pestilens, 238. 237. symptomaticum, 238. typhodes, 237. a veneno, *ibid.* a vespis; zoster, 239.

ERYTHEMA, I, 75. ambustio, 76. gangrenosum, 77. intertrigo, 76. paratrma, 77. pernio, 76. a punctura, 77. spontaneum, 75. volans, 77. volaticum, 76.

Escharre, ESCHARA, I, 129.

Escalape, I, 223.

Esalfados, I, 167.

Esquinacle, I, 257. Vid. *Angina Cynanche*.

ESSERA, I, 74. 239. Sennerti, 74.

Essouffement, I, 325. 343. *convulsi*, 329.

Estomac glaireux, I, 401.

Estourfisse, II, 309.

Efurigo, II, 115.

Eternuement, I, 331.

Ethipe, II, 236.

Etourdissement, II, 28.

Erranguillon, I, 257.

Evacuatorii morbi, II, 146. 148. eorum: theoria, *ibid.* praxis, 149.

Evacuonissement, I, 243. *Vaporem*, 440.

Euphlogia, I, 222.

EXANIA, I, 98. ab alvi fluxu, a calculo; a disticta; paralytica, *ibid.* primaria, *ibid.* traumatica, *ibid.*

Exanthematici morbi, II, 341.

EXARTHREMA, I, 120. a causa externa; luxati; & completum simplex, 121. subluxatio; incompletum simplex; distortio; incompletum instantaneum a vi externa, *ibid.* complicatum; a causa interna; a convulsione, *ibid.* a paralyti, *ibid.* desmochapsoi, I, 22. a desmophlogia, *ibid.* paffaceum, *ibid.* topfaceum; *ibid.* exostolicum, 123.

Exarthrosis, I, 120.

EXCORATIO; phlegmonodes; viva, I, 127.

EXCRESCENTILE, I, 83.

Excraissances; charnus, I, 83. *du foye*, II, 60.

Cc 2

Excr-

Exertio linguz, I, 101. 102. 103.
EXOCYSTE; Noeliana; Solingeniana, I, 99.
Exomphale, **EXOMPHALUS**, I, 90. aqueus, *ibid.* alter, 108. cruentus; 91. flatulentus, 90. intestinalis; 105. omental, 110. primus, 102. purulentus, varicosus, 91.
EXOPHTHALMIA, I, 93; II, 36. cancerosa, I, 94. a chemosi; a conatibus; critica, *ibid.* hydroptica, 93. hypopycia, *ibid.* paralytica; a protuberantia, 94. purulenta, 95. a strangulatione; 94. a staphylomate, 95. traumatica, 94.
Exostose, **EXOSTOSIS**, I, 86. benigna; cancerosa, *ibid.* osteoleptoma, 87. rachitica, 86. scrophulosa, *ibid.* scrophulosa, *ibid.* spuria, syphilitica; variolosa, 87.
Expelloratio, II, 101.
 Excreatus, II, 199.
Expulsion, **Expulsio** frequens, II, 199.
Extinction de voix, I, 408.
 Extuberantia, II, 190.
 Extubescencia linguz, I, 96.
EXULCERATIO, I, 128. II, 322.

F

Faim enine, II, 114.
Faimvalle, II, 115.
 Fames bovalla; bovina; canina; lupina, II, 114.
 Fanatismus, II, 139.
 Faricimen, II, 188. benignum; malignum, *ibid.*
Farcin, II, 188. *benin*; *bifurque*; *chancreux*; *corde*; *interieur*; *malin*; *ibid.* *des Moluques*, 289. *volant*, 288.
 Fatuitas, II, 132.
 Favi, II, 306. 307.
Fausse ouie, I, 395.
Faux germe, II, 165. 166.
 Febere, I, 128.
 Febriculi morbi, II, 344.
 Febricula vespertina, I, 168.
 Febriles morbi, II, 344.
FEBRIS, I, 130. 209. eorum theoria, 130. 131. historia generalis, 130. praxis generalis, 140. 144. regulæ practice, 141. therapia Cluttoniana; Lobbinia, 190. Sylviana; Sydenhamiana, *ibid.* Hecquetana, 191.
 Febris alba, I, 168. II, 315. agida, I, 172. 209. amatoria, I, 168. II, 315. 316. anginosa, I, 157. ardens periodica, 176. biliosa, 175. 184. biliosa, putrida paludum, 174. bullosa, 126. bullosa cum dysenteria, 227. carcerum, 163. 234. cardiaca, 171. II, 49. castrensis, I, 172. 175. catarrhalis, 170. catarrhalis epidemica, II, 41. catarrhalis maligna, I, 172. catarrhalis & putrida, 235. cholericæ, 158. continens, 149. 157. 159. continens proportionata, 169. CON-

TINUA, 149. *ibid.* continua periodica, 169. continua putrida; 159. febrium continuarum principium, 150. febris continua & maligna, 173. continua tertio quoque die exacerbans, 176. ciccalis, 230. depuratoria, 160. diaphoretica, II, 196. diaria, *vid.* *Ephemera*. dichomene, I, 156. dysenterica, 161. epanadida, 169. ephemerica, *vid.* *Ephemera*. Epidemica urbevetana, 178. erythelata, 237. esserofa, 229. exacerbans, 169. exacerbans Tymonenis, 174. exquisita, 170. hectica maligna nervosa, 164. hectica lenta, *vid.* *lenta*. helodes, 232. hepatica, 170. horrida; horrida, 172. humorosa, 171. Hungarica, 172. icteriodes, 164. iliaca, 252. iliaca inflammatoria, *ibid.* inflammatoria, catarrhalis & putrida, 235. inflativa, *vid.* *Ephemera*. **INTERMITTENS**, 181. 184. intermittens dolores partus simulans, II, 67. rheumatismum simulans, II, 67. rheumatismum simulans, 19. intestinorum inflammatoria, I, 252. lactea, 178. II, 71. lactica, I, 170. lenta, 168. *vid.* *Hectica*. lenta infantum, 167. lenta nerve, 169. lenticularis, 229. 236. lethargica, 186. leypyrria, 179. lymphatica continua, 170. lyngodes, 173. maligna cum sopore; maligna spiritusosa, 165. maligna Egyptiorum, 166. maligna, 172. 220. 237. maligna cerebri, 244. malignans, 179. 186. mali moris. *vid.* *Typhus*. menstrua duplex, 156. miliaris, 229. 230. miliaris puerperarum, 229. morbillosa, 228. nautica, 234. nervosa, 164. 179. *vid.* *Typhus*. paroxysmalis, 179. periodica, 170. pestilens, 218. 220. 236. petechialis, 235. 236. petechians, 173. peticularis, 236. phlegmatica, 170. pleuritica, 161. 245. pneumonica, *ibid.* proportionata, 169. puncticularis, 229. purpurata, *ibid.* 236. putrida, 159. putrida maligna, 232. querquera, 172. quotidiana, 183. *vid.* *Quotidiana*. quotidiana continua, exquisita, 170. recidiva, 175. **REMITTENS**, 169. 179. replecionalis, 172. rheumatica, II, 19. rubra, I, 239. sanguinis, 157. scarlatina, 239. spiritusosa, 165. spirituum, 179. stomachica, 251. subcontinua; subintans, 183. 184. subcruenta, II, 171. sudatoria, 196. symptomata a doloribus orta, I, 158. syncopticis, 171. 245. synches, 169. 170. synocha, *vid.* *Synocha*. synochus, *vid.* *Synochus*. tertiana; tertiana carotica, I, 184. tertiana continua duplex, 172. typhodes, 263. 265. secunda variolarum confluentium, 175. verminosa & catarrhalis infantum, 173. vesicularis, 226. 229. vesicularis catarrhalis, 227. virginea, 168. urticata, 239.
Fer chaud, II, 46. 185.
Feu St. Antoine, I, 81. 237. 238. II, 329. *sacré*, I, 238. *volage*, 76. II, 306. *ibid.* *Foux du visage*, I, 77.
Fic, Ficus, I, 84.
Fidette continue, I, 149. *de St. Domingue* 180. *eruptive*, 217. *jaune d'Amérique*, 166. *de lait*, 153. *syncope*, 179. 225.
FISSURA, I, 128.
FISTULA, I, 129. II, 322. *Fistula lacrymalis*.

lis, 197. *Fistula a l'anus*, 78.
Flamboies, II, 27.
Flamma volans, I, 77.
Flammæ passagere du visage, II, 27.
Flatos, II, 219.
Flatulencia, FLATULENTIA, II, 218. accidentalis, 220. acida, 219. convulsiva, 220. hypochondriaca; hysterica; 219. infantilis; lochiialis; 220. nidiorola, 219.
Flatulenti morbi, II, 357.
Fleues blanches, II, 210.
Fluctuatio aurium, II, 103. 104.
Fluor albus, muliebris, II, 210.
Flusso bianco, II, 211.
Flux hepaticus, II, 170. hæmorrhoidal, immo-
 dere, 171. de sang, 172. de ventre, 188. d'urine, 204.
Fluxio, II, 21. frigida, I, 441.
Fluxion sur la dent, II, 42. la gorge, I, 354. la poitrine, 164.
 FLUXUS, II, 146. 148. eorum theoria, *ibid.*
 222. praxis, 149. 227.
Fluxus alvi hepaticus, II, 171. cibalis, 188. colliquarivus, 190. a dysenteria, 170. fulvus, 210. hæmorrhoidalis, 171. hepaticus, 170. niger & fulvus, 211. splenicus, 176. ventris, 167. virulentus, 173. variæ mesenterii abscessum sequentes, 171.
Fœci colores, II, 315. virginum, 316.
Fœtore d'estomac, II, 50. 51. 53. des mem-
 bres, des nerfs, I, 419. naturelle, 422. des sens, 376. de vue, 382. 389.
Fœtore, I, 173. II, 21.
Folle, II, 133. 140.
Fondement, sa chute, I, 98.
Fonte & dissolution du vider, I, 318.
Formica, I, 85. amatoria Celsi, 73.
Formicatio, II, 24.
Formido, I, 294.
Fortraiture, II, 66.
Follula, II, 38.
Fourbure, II, 27. 19.
Fourches, I, 90.
Fourmillement, II, 24.
 FRACTURA; scindens; atterens, I, 128.
Fracture, échançure, avec fracas; ibid.
 FRAMBÆSIA, II, 293. Americana, 294.
 Guineensis, 293.
Frayer nocturne, II, 118.
Friel (des) I, 229.
Frigiditas stomachi, I, 402.
Frigus, I, 298. febrile, 145. 298. morbosum, II, 26.
Frison, I, 288.
Froid excessif, de cause extérieure, II, 26. in-
 teriore, *ibid.*
Froidesur, II, 26.
Fulgura, II, 97.
Fulmine idi & enecrati, I, 429.
Fureur merine, II, 120.
Futuratio, II, 321.

Furfurica, II, 308.
Furonele, I, 80.
Futor, II, 140. uterinus, 120.
 FURUNCULUS, I, 80. II, 328. dothies, terminus, I, 80. phygetion, *ibid.*

G

GALACTIRRHOEA, II, 217. atra; erro-
 nea; lutea; mammarum; purulenta; serosa; vi-
 ridis; virotum, 218.

Gale, boutonée, II, 304. de chien, 305. com-
 mune, 304. critique, 305. dartrause, *ibid.* sèche-
ibid.

Galesanthropia, II, 137.

Gambares, I, 283.

Ganglion, I, 84.

GANGRÆNA, II, 324. ab ambalione, 326. a contusione; 325. a frigore nimio, gelu, 326. ab infiltrationone, 325. ab inflammatione, 326. a putredine, 327. a strangulatione, 325. a veneno, 326.

Gangrene; humide, II, 324. sèche, 329.

GASTRITIS, I, 251. erysipelatoza, *ibid.* ex-
 anthematica, 252. herniosa, *ibid.* legitima, 251.
 sterno-collalis, 252. traumatica, 251. a veneno, *ibid.*

GASTROCELE, I, 111. composita; simplex, *ibid.*

GASTRODYNIA, II, 51. adstringens, 53.
 Americana, 52. atterens, 53. biliosa, 52. cal-
 culosa, 53. chlorotica, ab emphraxi ventriculi;
 febricola, 54. flatulenta, 51. a frigore; gastroce-
 lica; hypocondriaca, 54. hysterica, *ibid.* meta-
 statica, *ibid.* a peregrinis, 53. peridynia, *ibid.*
 pulsatis, 54. saburalis, 54. a vasis cupreis; a
 veneno; a ulcrosia; a viru, 52. ventriculi, omen-
 ti, hepatis, pancreatis vitio, *ibid.* a xiphoide, 53.

Genarum rigiditas, I, 280.

Genitalium communes morbi, II, 315.

Gerontoxon, I, 70. 380. II, 38.

Gersure, I, 129. du fondement, II, 70.

GIBBOSITAS, I, 87. costalis; lordosis, *ibid.*
 scapularis, *ibid.* 124. 125. scirrhosa, 87. spinas-
 lis, *ibid.* sternalis, *ibid.*

Gibbus alatus, I, 87.

Glaire des reins, II, 209. de la vessie, *ibid.*

Glande, Giandula, I, 79. Glandes, II, 288.

Glandulæ induratae, 237.

Glaucoma, I, 376. 377. 378.

Glaucosis, I, 376. 380.

Glossalgia, II, 43.

Glossanthrax, I, 220.

Glossocoele, I, 96.

Glossolysis, I, 406.

Glossomegista, I, 97.

Glus, II, 209.

Goal-fever, I, 240.

Gods, II, 319.

Gonagra, I, 90.
 Gonflement hysterique, I, 78.
 Gonorrhoea, II, 212. pure du prepuce, 213. *simple*, 212. *tombée dans les bouffes*. I, 79. 92.
 II, 80. virulente, II, 213.
 GONORRHOEA, II, 212. balan, 213. chondrata, 213. habitualis; leprosa, 214. libidinosa, 212. onerogonosa, *ibid.* pura, *ibid.* sicca, 213. simplex, *ibid.* spuria, *ibid.* syphilitica, *ibid.* in scrotum delapsa, I, 79. 92. II, 80. 213.
 Gorgoffet, II, 406.
 Gole, II, 319.
 Gometre, I, 85.
 Gout bizarre, II, 112.
 Goutte, II, 12. vid. *Arthritidis, chaude*, 14. aux lombes, aux reins, 75. ordinaire ou reguliere, 12. rheumatismale, 13. seriatique, 78. *vague*, 18. volante, 14.
 Goutte, crampes, I, 289.
 Goutte rose, I, 71.
 Goutte seraine, I, 390.
 Grain de grele, I, 85. II, 34.
 Gramia oculi, II, 199.
 Granchio, I, 284.
 Grando, I, 85. 378. II, 34.
 Grant, II, 24.
 Graissandure, II, 190.
 Graissement, I, 498.
 Grattelle, II, 305.
 Gravedo, II, 305. capitis, 28.
 Gravelle, II, 62.
 GRAVIDITAS, II, 259. molaris, 260. a falsa mola, 261. ovarii, *ibid.* perennis, *ibid.* sarcoma, *ibid.* tubalis, *ibid.* vera, 260. vesicularis, 261.
 Gravitas, I, 437.
 Grepi, I, 24.
 Gripping of the Guts, II, 174.
 la Grippe, I, 173. 360. II, 21.
 Grossesse, II, 259.
 Gulæ spasmus, II, 43.
 Gummata, II, 17.
 GUTTA ROSEA; febrilis, herpetica; simplex; syphilitica, I, 71.
 Gutta opaca, I, 376.
 Gutta serena; amurosis, I, 390. 391. II, 51.
 Gynaicomania, II, 120.

H.

Hæmalops, I, 72. 381.
 HÆMATEMESIS, II, 157. ex sneurysmatæ, 158. ab aorta compressa; tra; carnosocruenta, 159. catamenialis, 158. cholericæ; cruenta, 159. hæmorrhoidalis, 158. ab hepate, 159. ab hirudine, 158. a lumbicis, *ibid.* ex pancreate, *ibid.* plethorica, *ibid.* scorbutica; simulata; ex splend, 159. traumatica, 168. a veneno. 159.
 Hæmatocele, I, 92.

Hæmatomphalus, I, 91.
 HÆMATURIA, II, 159. ex alliæ esu, 160. calculosa, *ibid.* ex casu, *ibid.* catamenialis. 162. deceptiva, 160. ejaculatoria, 161. equizatione, 160. in exanthematicis, *ibid.* ex fibrosis opuntia, *ibid.* hæmorrhoidalis, 161. lateritia, *ibid.* nigra, a nisu, *ibid.* purulenta, 160. ex rene, 161. ex rubis idæis, 160. spontanea, *ibid.* spuria; stillantia, 161. a transfusione, 362. traumatica, *ibid.* variolosa, 160. a verme, 162. violenta, ex vomitu, 160.
 Hæmodia, II, 43.
 Hæmoptoe, HÆMOPTYSIS, II 152. accidentalis, 153. ascitica, 156. calculosa, *ibid.* a casu ab alto; *ibid.* catamenialis, 154. catarrhalis, *ibid.* 156. a diapedesi, 154. a fluxione, 156. habitualis, 193. Helvvgiana, 159. ab hirudine; lodica, 156. periodica: a mensuris suppressis, 154. a pectore contuso, percussio, 156. periodica; peripneumonia, 154. phthisica; a pulmonis scirrhus; sephacelo, 155. vulnere, 156. scorbutica, 154. splenetica, 156. traumatica, 155. a tuberculo, *ibid.* variolosa, 154. vomica; prodromus, 155.
 HÆMORRHAGIA, II, 151. in chronicis; critica; febrilis, 152. ab hirudine, *ibid.* insalubris, *ibid.* intestinorum tenuium, 172. passiva, 151. plethorica, *ibid.* ex rene, 161. uterina, 162. 163. 164.
 Hæmorrhoides, I, 89. oris II, 157.
 HÆMORRHOIS, II, 171. alba, 191. catamenialis, 171. ab exantia, 172. immunda; moderata, 171. polyposa, 172.
 Hale, I, 71.
 HALLUCINATIONES, II, 87.
 Hausfain, I, 218.
 Haut mal, I, 303.
 Heat, II, 16.
 Hebdomadaria, I, 189.
 HECTICA; I, 167. cachectarum, 169. a calculis, 168. catarrhalis, II, 238. chlorotica, I, 168. fluxuum, 169. hydropum, 168. infantilis, 167. II, 244. lymphatica; nervæ, I, 169. nothalgica, 168. a scabie, 169. scrophulosa; syphilitica, 168. verminosa, 169. vesperitina, 168. a vomitu, 169.
 Heimvèche, II, 117.
 Hemeralopia, I, 379.
 HEMICRANIA, II, 31. a calculis, 32. clavus, *ibid.* cortex, *ibid.* a febre intermittenti latente 31. hæmorrhoidalis, 32. ab insectis, *ibid.* lunatica; nephralgica, 33. ocularis, 31. odontalgica, *ibid.* purulenta, 32. sinus, *ibid.*
 HEMIPLEGIA, Hemiplegia, Hemiplexia, I, 414. ex apoplexia, 416. apollenatodes, *ibid.* arthritica, 415. ex epilepsia, 416. exanthematica; 415. intermittens, purpurea, 416. saturnina, *ibid.* scrophulosa, 415. serosa; simulata, 416. spasmodica; syphilitica, 415. transversa, *ibid.* traumatica, 416.

Hemiplexia

Hemirritus, I, 170. 171. legitimus, *ibid.* ma-
 jor, 181. minor; nuthus, 172. petilens, *ibid.*
Hemopyse, II, 152.
Hemorrhagie du nez, II, 151.
Hemorrhoides, I, 89. II. 79.
HEPATALGIA, II, 58. ærginosa, 59. apo-
 stematosa, 60. calculosa, 58. deceptiva, 60. in-
 farctus, 59. intercus, *ibid.* Pettitiana, 60. sarco-
 matosa, *ibid.* scirrhosa, 59.
 Hepaticus fluxus, II, 170. 171. 172.
HEPATIRRHŒA, II, 170. ex abscessu he-
 patis, *ibid.* cruenta; interantennens, 172. intesti-
 nalis, 170. metenterica: *ibid.* scorbutica, 171. ve-
 ra; a vulnere, 170.
 Hepatis atonia, II, 170. infarctus, 58. inflama-
 tio, I, 263. interperies, II, 59. morbi, 376.
 obstructio, 59. scirrhus, *ibid.* tumor simplex,
ibid.
HEPATITIS, I, 263. II. 170. biliosa; a bile
 I, 264. cystica, *ibid.* erysipelasosa, *ibid.* mu-
 scularis; obscura, *ibid.* pleuritica, 249. 264. spu-
 rias, *ibid.* suppurans, 265.
HEPATOCELE, ventralis; umbilicalis, I, 111.
Hepala, I, 171.
HERNIA, *Hernie*, I, 102. 108. cerebri, 116.
 117. 118. colli emphysematica, 86. cystica uteri
 vaginæ prolapsus. inversioni accedens, 116. cy-
 stico enterica, 106. cystico-epiploica, 110. entero-
 cystica, 116. epiploico-cystica, *ibid.* epiploi-
 co-enterica; cruralis, 106. epiploico-enterica fo-
 raminis ovalis, *ibid.* in vagina eveniens, 107.
 gurturis, 85. hepatis, 111. humoralis, 92. hy-
 drocelico-enterica, 106. hydrocelico-epiploica,
 110. intestinorum completa; scrotalis, vel labio-
 rum vulvæ, 102. 104. *istid.* rupto peritonæo,
 107. incompleta seu inguinalis, 102. simplex &
 composita; saccata & infaccata, *ibid.* intestinalis
 & epiploica in inguine, 106. completa, *ibid.*
 intestini cruralis, 102. rupto peritonæo, 107. in-
 testinalis foraminis ovalaris, 105. ab ilei diverti-
 culo, 104. ischiatica, I, 102. 105. ovalaris seu
 foraminis ovalis, 101. 105. parorchido-enterica,
 106. partialis, perstrictoria ab altero intestini pa-
 riete, 105. in vagina eveniens, 102. 105. vena-
 lis, 102. 105. 106. rupto peritonæo, 108. hernia
 lienis, 112. omenti completa, scrotalis vel labio-
 rum vulvæ, 88. 110. incompleta, *ibid.* omenti
 cruralis, 108. 110. rupto peritonæo, 107.
 omenti inguinalis rupto peritonæo, *ibid.* omenti
 & intestini dorsalis, ischiatica, *ibid.* omenti &
 intestini ventralis; umbilicalis, 60. omenti vagi-
 nalis, 108. 110. ventralis, 108. 110. rupto peri-
 tonæo, 107. sanguinea, 92. stomachi, ventriculi,
 112. vesicæ urinarum, 113. 115. 116. uteri, 112.
Hernie fausse, I, 91. *intestinale de l'aine*, 104.
de l'echancrure sciatique, 105. *du nombril*, *ibid.*
 Herpe, **HERPES**, I, 72. collaris; depascens;
 effluomens; exedens, *ibid.* Indica, II, 305. mili-
 liaris, I, 73. periscelis, *ibid.* pustulosus, *ibid.*
 perispigo; *ibid.* simplex, 72. syphiliticus; vene-
 reus, 73. zoster, 74.

Hiccok, I, 332.
HIDRŒA; alba, sudamen, I, 75. symptoma-
 tica, *ibid.*
 Hieranosis, I, 291.
 Hippus, I, 288.
 Homa, I, 251.
 Hoger, I, 332. vid. *singulus*.
HORDEOLUM, I, 85. II. 86. chalazium,
 grando, hypanidofum; tiro; theatomafum; veru-
 rucolum, I, 85.
 Horripilatio, Horror, I, 298.
 Horne, II, 56. 200.
 Humiditas aurium; humiditas des oreilles, II
 218.
HYDARTHROS; flatulentus; synovialis, I, 89.
Hydatide en chapelte, I, 89. Hydatides, 227.
 Hydatidorele, I, 91.
HYDATIS; cellulosa; corollata; hygroma,
 I, 89. scroti circoeci succedens, 91.
 Hydactos, II, 247.
 Hydrachnis, I, 223.
 Hydrota, I, 226.
 Hydrocardia, I, 362.
 Hydrocele; ab hydatidibus funiculi spermatici
 omenti prolapsi; Malabarica, I, 91.
 Hydrocephale, II, 262. des, *ibid.* tegumens des,
 ventricules, *ibid.*
HYDROCEPHALUS, II, 262. artificiosus
 263. exterior; interior, *ibid.*
 Hydroencephalocoele, I, 117. spinæ bifide mix-
 ta, 118.
 Hydroenterocoele, I, 104.
 Hydroepiplocele, I, 110.
HYDROMETRA, ascitica, II, 269. gravi-
 darum, 270. hydatica, *ibid.* ovarii; puriformis;
 sanguinea, *ibid.*
 Hydromphalus, I, 90.
 Hydronofus, I, 155. II. 197.
HYDROPHOBIA, *hydrophobie*, II, 113. con-
 tagiosa, *ibid.* spontanea, 115. vulgaris, 123.
 Hydrophthalmia, I, 93. 390. II, 36. serosæ
 vitrei turgescenitiæ mixta, I, 95.
 Hydrospica; Hydrops, abdominis, II, 263. ascit-
 ces, *ibid.* cerebri, du cerneau, I, 436. enkistes,
 II, 267. par infiltration, de matrice, 228. de ma-
 trices de semines grosses, 270. ad marulam, 203.
 de l'gil, I, 93. 362. **PARTIALES**, II, 262. pec-
 toris, de poitrine, pulmonis, I, 360. *ibid.* du
 peritoine, II, 267. lictus & flatulentus, 271. du
 ventre, 263. de vomis, 271. vera, 248. vesicæ,
 275. a viscerum obstructione, 264. universalis,
 248. uteri, 269. uteri vesiculosus, 270.
 Hydropneumonia, I, 344.
 Hydropyretion, I, 155.
HYDRORACHITIS, I, 417. II, 263.
 Hydrosarocoele, I, 91.
HYDROTHORAX, I, 360. chylosus, 361.
 febricofus, 362. hydatidofus; mediastini, *ibid.* ab
 omento, 361. pericardii, 363. pleuræ, 362. a
 scabie, 363. vulgaris, 361.
 Hygroma, I, 89.

Hygro-

Hygrophthalmia, I, 93.
 Hyperaureus, I, 382.
 Hyperemesis, II, 180.
 Hyperostosis, I, 86.
 Hyperstarcosis, I, 84. ulcerosa pedum, II, 252.
 Hypnobotecis, Hypnobotex, II, 109.
 Hypochondriaca passio, Hypochondriacismus, Hypochondriacus morbus, HYPOCHONDRIASIS, *Hypochondrie*, II, 106. algida, 109. asthmatica, 108. biliosa, 107. calculosa, 109. calida & humida, 107. calida & sicca, *ibid.* frigida & sicca, 108. hysterica, *ibid.* melancholica, *ibid.* muliebris, *ibid.* phthisica, *ibid.* pituitosa, *ibid.* sanguinea, 107. tympanica, 109.
 Hypochyma, II, 93.
 Hypochysus, I, 376. hamarodes, 382.
 Hypocophosis, I, 393. iridis, 386.
 Hypogastrocele prima, I, 102. 106. epiploico-entrica, 107. intestinalis, 106. altera, 108. omentalis, 110.
 Hypogastrorixis, I, 103.
 Hypohæma, I, 382.
 Hypopychion, I, 72.
 Hypophthalmia, I, 72. 382.
 Hypopyon, I, 72. 90. 381. cecchymoma, 72.
 Hypofarica, Hypofarcidiosis, II, 248. 252.
 Hypophagma, I, 72. 381.
 HYPOSTAPHYLE, I, 96, II, 46. ab inflammatione: a laxitate, I, 96.
 HYSTERALGIA, II, 66. ex abscessu, 68. calculosa, 69. canerosa, 66. febricosa, 67. ab hysterocæle; ab hysteroloxia; ab hysteroptosi, 66. impregnatum, 68. lactea, *ibid.* lochialis, *ibid.* a menostasia, 66. ab ossæ; pruridinosa, 67. a sparganosi, 69. vaporosa, 68. ulcerosa, 67.
 HYSTERIA, I, 307. ab acutis morbis; a cathartici repetitis, 309. chlorotica, 308. emphractica, 309. febricosa, *ibid.* a leucorrhæa, *ibid.* libidinosa, *ibid.* a menorrhagia, *ibid.* ab obstructionibus; ab ovarii infarctis, *ibid.* a partu difficili; a phlebotomiis repetitis, *ibid.* a semine acri retento, *ibid.* stomachica, *ibid.* verminosa, 308.
 Hysteritis, I, 253.
 HYSTEROCÆLE, I, 112. II, 66. inguinalis; 112. ventralis, I, 113. hysterocæles nudæ, 99.
 Hysterocystocæle, I, 116.
 HYSTEROLOXIA; anterior, I, 118. citra graviditatem, 119. lateralis, posterior, 118.
 Hysteromantia, II, 120.
 HYSTEROPTOSIS, I, 99. II, 66. vaginæ prolapsus, I, 101. uteri inversio, 400. prolapsus 99. composita, 101. 116.
 Hystralgia, II, 66.

I

Jail distempers, I, 163. 234.
 Janon, II, 121. 123.
 la Jarretiere, I, 73.
 Jaundice, *Jaunisse*, II, 309. *Jaunisse critique* & *symptomatique*, 310.
 Jekon, II, 292.
 Jethere noir, II, 313. rouge, 314.
 Ictericismo, I, 307.
 ICTERITIS, II, 308. Icteritia alba, 315.
 flava, 309. nigra & viridis, 313.
 Icterodes infantum color, I, 71.
 Icterus, II, 309. albus, 315. a colica biliosa, spasmodica, 312. a colica convulsiva, *ibid.* flavus, viridis, 309. niger, 313. 314. a vitio hepatis, *ibid.* niger scorbuticus, 313. periodicus, 311. a plethora, *ibid.* a spasmus, 312. a vitio hepatis, 314.
 Idroa, I, 75.
 Idropisia minacciant, II, 265. tympanica, 273.
 Ignis S. Antonii, I, 77. 237. 238. Pestificus, 81. facer, 237. 238. sylvestris, II, 306. volaticus, I, 76. II, 306. *ibid.*
 Ileos hæmatis, II, 157. 298.
 ILEUS, II, 182. 248. ab anarthropia humorum, 183. a bubonocæle, 184. calculosus, 185. a callosa coli structura, *ibid.* a colo pituita infarcto, 184. a cydoniatis obstruente; a fecibus induratis, 183. herniosus, 184. ieterodes, 309. imperforatorum, 185. Indicus, *ibid.* inflammatorius, 183. ab intestino compresso, *ibid.* a secti intestini coalitu, 185. phlyodes, *ibid.* spasmodicus, 183. a veneno, 185. verminosus, *ibid.* volvulus, 184.
 Iliaca passio, II, 182. a vermicibus, 185.
 Illicis, II, 315.
 Illachrymatio, II, 197.
 Ilug Gabelchoveri, I, 76.
 Imantium, I, 96.
 Imbecillite, II, 132.
 IMPETIGINES, II, 132.
 Impetigo exorticativa, II, 303. Americana, *ibid.* Indica, 305. serotæ, 80.
 Impuiffance virile, I, 403. d'insulation, II, 213.
 Inappetence, Inappetentia, I, 400. a bile, 401.
 Incendium virgæ, II, 80.
 Inconscience de ventre, II, 189. d'urine, 104. apres les couches, *ibid.*
 Incube, Incubus, I, 329. vigilantium, 330.
 Infarctus, II, 59. 317.
 Infiltration, I, 77. II, 327. des jambes, II, 250. laiteuse, I, 78. II, 68. 252. Jerusalem, II, 250.
 Inflammation du fondement, II, 78.

In-

Inflammationis causa, I, 211. theoria, 196. therapia, 215. Symptomata. 201.
 Infiltratio, II, 51. linguae, I, 96. ventriculi, II, 274. uteri, 269. 271.
 Infreddatura, II, 21.
 Influenza, I, 173.
 Ingenii Rupitudo, Impor, tarditas, II, 133.
 Inquietudo, Inquietudo, II, 21.
 Infamia, II, 140.
 Infamiae, II, 244.
 Inspirationis vitia, I, 343.
 Insultus epilepticus, I, 299. a vermibus, *ibid.*
 Intemperiei morbi, II, 373.
 Intercus, II, 267. 248.
 Intertrigo, I, 76. II, 78.
 Intestin (pincement de l') I, 105.
 Intestini tenuis morbus, II, 282. intestinorum inflammatio, I, 252. laxitas, II, 244. morbi, 377. phlogosis, 56.
 INTUMESCENTIÆ, II, 245.
 Ionthos, I, 72. 75.
 Iotacismus, I, 409.
 Ipocondria, II, 106.
 Irk Medici, II, 292.
 Ischiagra, ISCHIAS, II, 76. ex abscessu, 77. arthriticum, 78. a carie, 77. a fractura, *ibid.*
 Gallica, *ibid.* gravidarum; hysterium, *ibid.* intermittens, 76. rheumaticum, 78. sanguineum; eusparagosis, 77. a subluxatione, *ibid.* syphiliticam; verminolum, *ibid.*
 Ischnophonia, I, 408.
 Ischouria, ISCHURIA, *Ischuria*, II, 275. aspadialis ab urethrae clausura, 284. atretarum, urethro-cystica a menstruis in vagina retentis, 282. carunculosa, a morbis urethrae, 283. cryptopyica, a penis intra corpus retractione, 284. cysto-lithica, a vesicæ calculo, 279. cysto-phlegmatica, a vesicæ muco, 281. cyto-plegica, a vesicæ paralyti, 280. cysto-proctica, a recto turgente, 281. cystopyica, vesicalis purulenta, *ibid.* cysto-spaltica, a vesicæ sphincteris spasmo, 280. cysto-thromboides, vesicalis a sanguinis grumo, 281. cystitica, a vesicæ inflammatione, 279. ectopocystica, a vesicæ ectopia, 281. hydrocelodes, ab urethrae ruptura in scrotum hianti, 284. hysterocystica, vesicalis ab utero, 281. nephrethmica, renalis verminosa, 277. nephritica, a renum inflammatione, 276. nephrolithica, a renum calculo, *ibid.* nephro-phlegmatica, renalis pituitosa seu mucosa, 277. nephroplegica, renalis paralytodea, 278. nephroplethorica, renalis a plethora, 276. nephropyica, a renum purulentia; nephrospaltica, renalis spasmodica; nephrothromboides, renalis a sanguine congruato, 277. notha, 275. paradoxa, 282. peridemicica, a vinculo strictiori peni injecto, 284. perinxialis, urethralis a perini tumore, 282. phymosica, urethralis a phimosis, 284. polyurica, a vesicæ lotio diutius cohibito dissenta, 280. renales, 276. renalis, *ibid.* lunatica, 277. suppleta, renalis ab alia eva-

uatione suppleta, 278. vera, 275. vesicales, 279. uretericæ, 278. ureteritica inflammatoria, *ibid.* ureterolithica, ureteritica calculosa, *ibid.* uretero-phlegmatica, ureterica a pituita, *ibid.* ureteropyica; ureterica purulenta, *ibid.* ureterostomatica, ab orificii ureterum inferioris clausura; urethrothromboides, ureterica a sanguinis grumo, *ibid.* urethrales, 282. urethrethmica, urethralis verminosa, 283. urethritica, ab urethrae inflammatione, *ibid.* urethro-carunculosa, a morbis urethrae, *ibid.* urethro-dydrocelodes, ab urethrae ruptura in scrotum hianti, 284. urethro-hymenodes, a membrana in urethram impacta, 283. urethro-lithica, a calculo urethrae impacta, 282. urethro-phlegmatica, a muco urethram infarciens; urethrophyica a pure urethram obstruente; urethrothromboides, a sanguinis grumo urethram opplente, 283.

Iteb, II, 304.
 Iraru, II, 292.
 Juvenum morbi, II, 377.
 Ixia, I, 296.

K

Kæringbad, II, 27.
 Kalmodia, vid. *Casmodia*.
 Keria, Kerion, II, 307.
 Kingcock, I, 341.
 Kings evil, II, 287.
 Kinorexia, vid. *Cynorexia*.
 Kinos, I, 88.
 Kion, I, 96.
 Kirfocele, Kirfomphalus, vid. *Cirfocele*.
 Kisses, I, 82.
 Koiaisi, II, 252.
 Kolten, Koltum, II, 319.
 Kritiche I, 85. II, 34.
 Kryos, II, 26.

L

Labarium, II, 46.
 Labii inferioris proptoma, I, 97.
 Lacrymæ morboles, II, 297. sanguineæ, 298.
 Lactei morbi, II, 355.
 Lactis concretio, II, 70. effluxus, 218. redundantia, 70. 217.
 Lactucimen, I, 240.
 Lactumina, II, 306.
 Ladrerie, II, 289. 300.
 Lagophthalmia, Lagophthalmus, I, 95. *ibid.* 279. II, 38.
 Lagostoma, I, 409.
 Lais repandu, I, 78. grumela, II, 70.
 Lallatio, Lambdacismus, I, 409.
 Langue, vid. *Lingua*.
 Langor virium, I, 419. Pannonicus, *ibid.* scorbuticus, 420.

D d

La-

- Lapfus palpebrarum superioris, I, 95. vaginae, 101. uteri, 99.
- Larves de sang, II, 198.
- Laryngismus, II, 197.
- Lassitudo, LASSITUDO, II, 23. cachectica, 23. a calore, febrilis, a fluxu, 23. a labore, *ibid.* ostocopus, a pathemate, a plethora, *ibid.* scorbutica, ulcerosa, 24.
- Lassitudines spontaneae, I, 410.
- Lateralis dolor, II, 61. a flatu, I, 358. laterum dolor, 357.
- Latica febris, I, 170.
- Lathyrophsyne, II, 543.
- Laxitas intestinorum, II, 191.
- Lebendig, II, 298.
- Leberflecke Solenandri, I, 71.
- Leienteria, II, 191.
- LEIPOPSYCHIAE, I, 218. 423.
- LEIPOTHYMIA; a pathemate; stomachica, I, 422.
- Leipyrria, I, 179.
- Lemae, Lemia, II, 199.
- Lentigo, *Lentille*, I, 71.
- LEONTIASIS, II, 290. 300. corniculata, 291. hyalix, viculina, *ibid.*
- LEPRA, *Lepre*, II, 302. allopicia, 301. Arabum, 300. Atrienlis, 303. Elephantia, 301. Graecorum, 302. herpetica, 304. *humida*, *ibid.* Ichthyosis, 303. Indica, *ibid.* des Juifs, I, 70. leonina, II, 301. malum mortuum, 304. *ordinari*, 302. Tyria, 301.
- Lethargia, LETHARGUS, I, 430. 434. 435. 436. 437. apoplematicus; arthriticus; cephalicus, 436. a febre, 435. a frigore; ingens, 436. lieteratorum, *ibid.* a narcoticis, 435. periodicus, 436. pulmonicus, 435. traumaticus; typhodes, 436.
- Lenca, Leuce, I, 70. II, 317.
- LEUCOMA, I, 69. 380. albugo, cicatrix, gerontoxon, 70. nephelium, 69.
- Leucomoria, II, 136.
- Leucophlegma, Leucophlegmatica, II, 248. 250.
- Leucophlegmatic hysterique, II, 250. *urineuse*, *ibid.*
- LEUCORRHOEA, II, 210. Americana, cancrofa, 211. fungosa, 210. gravidarum, 211. Indica, *ibid.* Nabothi, 212. scirrholders, 211. syphilitica, 210. ulcerosa, *ibid.*
- Lichen, II, 306.
- Lien ingens, II, 61. lienis inflammatio, I, 265. morbi, II, 377. obstructio, 61.
- LIENTERIA, *Enteritis*, II, 191. aphthosa, *ibid.* primaria, *ibid.* scorbutica, *ibid.* secundaria, 192. spontanea, ex stomachi irritatione; ex ulcere ventriculi, 191.
- Linguae contractio, I, 96. exortio, extrusio, *ibid.* 97. extumescencia; hernia; inflatio; intumescencia, magnitudo, voratae resolutio in fauces, *ibid.* retraction, 96. 97. tumor, *ibid.*
- Liparocele, I, 92.
- Lipoma, I, 87.
- LIPOTHYMIA, I, 422.
- Lippitudo, II, 199. Celsi, II, 33. sanguinea, 197. terosa, *ibid.*
- Lipyrria febris, I, 172.
- Livor Senneri, I, 71. totius corporis periodicus recurrens, II, 313.
- Lochia, II, 165. cathartus, *ibid.* immodica, 162.
- Lolmos, I, 218.
- Longue abstinence, I, 402.
- LORDOSIS, I, 87. compernium, *ibid.* gibbositas, 87. valgorum, varorum, 88.
- Lorum, I, 96.
- Louche, I, 388.
- Loupe, I, 79. 89. *grasseuse*, *ibid.*
- LOXARTHROSUS, I, 124. anisotonicus; gibbosis, intrarticularis, perverfus, 125.
- Ludibria Fauni, I, 329.
- Lues Indica, II, 292. vaccarum Tubingenis, 173. venerea, 296.
- Lutte basse, *sa chute*, inflammation; paralysis, relachement, I, 96. *lutte sabbie*, *ibid.* II, 97.
- LUMBAGO, II, 74. ab aneurysmate; apoplematica, 76. arthritica, 75. ab arthrocace, 76. catamenialis, febrilis, a fluore albo, haemorrhoidalis, 75. ab hydrothorace, 76. miliaris, a nisu, 75. parvus, *ibid.* plethorica, *ibid.* pseudo-ischuria, 76. psoadica, 75. rheumatica, 62. 74. a saburra, 75. a satiariis, 76. scorbutica, 75. sympathica, 76. a tubo intra musculos effuso, 75. variolosa, *ibid.*
- LUPIA, I, 79. 89. 381. cancrofa, 81. nrelceris, 89. Reatoma, *ibid.* lupiz species, II, 263.
- Lupus, cancer, I, 81.
- Lusciositas, I, 388.
- Luscitas, I, 277. 388.
- Luxatio, I, 92. 120. a caput offis & acetabulorum intumescencia, 123. a causa externa, 121. integra, *ibid.* completa, *ibid.* complicata, *ibid.* incompleta, *ibid.* instantanea a vi externa, *ibid.* a ferosa ligamentorum laxitate, 122. a phlogodea ligamentorum intumescencia, *ibid.* a musculorum convulsione, 121. paralysis, *ibid.* simplex, *ibid.* symphyum, 123. a synoviz leutefcentis concrezione, copia, 122.
- Luxationes, *luxations*, I, 92.
- Lycanke, I, 356. II, 125.
- Lycanthropia, Lycan, II, 137.
- Lycorexis, II, 114.
- Lygmon, Lyngon, I, 332.
- Lypiria, I, 172. 179.

M

Marchio de travers, I, 125.
MACIES, II, 235.
Macies, II, 75.
MACULÆ, I, 69. hepaticæ, 70. volaticæ, 76.
 Maculosi morbi, II, 373.
Mai des arides, I, 80. 220. 238. II, 329.
caduc, I, 303. *de cerf*, 187. *au cœur*, II, 49. *aux dents*, 41. *d'estomac*, 250. *de gorge*, I, 258. 354. *S. Jean*, I, 303. *de la Luna*, 295. *de mer*, II, 182. *de mer*, I, 307. 439. II, 66. *more*, II, 304. *de Paris*, 173. *di punia*, I, 245. *des reins*, II, 75. *de rofa*, 303. *de Siam*, I, 220. *subtil*, II, 238. *de la terre*, I, 303. *a la tete*, II, 128. *des femmes enceintes*, 29. *aux yeux*, 33.
 Malacia, II, 112. 113.
Maladie de geala, d'hopital, I, 163. *parvulæ*, *de glandes*, II, 21. *imaginæ*, 135. *noire*, 176. *du pays*, 117. *pediculaire*, 318. *des pifons*, I, 163. *sacres*, 291. *des somnambules*, II, 109.
 Malhundo, II, 79.
MALIS, II, 291. *acridophagorum*, 292. *Americana*; *cornipedum*, 291. *a crinonibus*, 292. *dracunculus*, *ibid.* *furialis*, 293. *humida*, 173. *hypodermatidis*, 291. *præfens*, 293. *Transylvanica*, *ibid.* *vermifosa*, 291. *VVeſtphalienſis*, 293.
Malvus, I, 81.
 Malum bilioſum, II, 71. *hysterico-hypochondriacum*, I, 307. *iſchiadicum*, II, 76. 78. *mortuum*, 304.
 Mammorum abſceſſus, II, 71. *cancer*, 70. *proptoma*, I, 97.
MANIA, *Mania*, II, 133. 140. *ab amore*, 141. *a belladonnæ baccis*; *a daturæ ſemine*, 142. *a graviditate*, 141. *ab hemikrania*, *ibid.* *ab herpete reſſo*; *hysteralgica*, 141. *lactea*, 141. *ſine materia*, *a melancholia*, *ibid.* *a menſtruis reſſis*, *metæſtaſica*; 142. *a putremate*, 141. *periodica*, 142. *a plica reſſeta*; *a ſcabie reſſeta*; *a ſemine reſſo*, *ibid.* *a terrore*, 141. *a veneniæ*; *ab ulcere ſiccato*; *vulgaris*, 142.
Manquement de ſoif, I, 403.
 Maranſis, II, 244.
 Marasme, II, 243. *Marasmius ſenilis*, II, 244.
 Marcor, I, 434. 437.
 Margarita, I, 69. 380.
MARISCA, I, 89.
 Marmariges, II, 96.
Maſcleus, II, 292.
MASTODYNIA, I, 79. II, 69. *apoſtematoſa*; 71. *buſyroſa*, II, 70. *cancroſa*, *ibid.* *emphyſematosa*, *ibid.* *phlegmonodea*, 69. *pilaris*; *polygala*, 70. *poſtentofa*, 71. *puberum*, 70.

Mater puerorum, I, 303.
Matrice, *vid.* *Uterus*.
 Maxillæ ſpasmus a vulnere; *a luxato ſeſmoi-*
de pedis, I, 280. *reſſus* in infantibus, 279. *inferioris toritura*, 125.
Meſete, I, 428.
 Megaloſplachna, Megaloſplachnos, II, 257.
 Megaloſplenica, I, 79.
MELÆNA, II, 176. *arabialis*, *ibid.* *febricoſa*, 177. *hæmorrhagica*, *ibid.* *hepatirhoica*, *prima Hippocratis*, *ibid.* *ſcorbutica*, 176. *ſplenetica*, *ibid.*
 Melaina-nouſos, II, 176.
 Melanchlotus, II, 313.
MELANCHOLIA, II, 133. *amatoria*, 134. *Anglica*, 137. *Arganis*, 135. *atonica*, 136. *enthuſiaſtica*, 137. *errabunda*, *ibid.* *hipponſtropica*, 136. *hypochondriaca*, 106. *imaginaria*, 135. *moriz*, *ibid.* *nervea*, I, 307. *phrontis*, II, 137. *religioſa*, 134. *ſaliana*, 136. *Scytharum*, 137. *ſuperſtitioſa*, 134. *uterina*, 120. *vulgaris*, 133. *zoanthropia*, 137.
 Melas, I, 70. 313.
MELASICTERUS, II, 313. *alpus*; *diverſicolor*; *ibid.* *hepaticus*, 314. *Indicus*, *ibid.* *periodicus*, 313. *ſcorbuticus*, *ibid.* *ſpleneticus*, 314. *a veneno*, 313.
 Melasma, I, 79.
 Meliceris, I, 82. II, 307.
 Mellifavium, I, 89.
 Melon, I, 381.
Membres hors, I, 124.
MENORRHAGIA, II, 162. *decolor*, 165. *difficilis*, 162. *erronea*, 164. *gravidarum*, *ibid.* *ab hysteroptosi*, *ibid.* *immodica*, 163. *lo-*
chialia; *ex marſica*, *ibid.* *ſtillatitia*, 162. *ulce-*
roſa, 165.
 Menſes ante vertentes, inordinati, II, 162.
 163. *cum moleſtia fluentes*, 162. *vizioſi*, 165. *menſium per aliena loca excretio*, 164. *fluxus ni-*
mius, 163. *ſtillicidium*, 162.
 Menſtruatio difficilis, II, 162.
 Menſtagra, II, 306.
 Mentis alienatio, II, 128.
 Merdechi, II, 187.
la Mer, I, 307.
 Merocle, I, 102. 105. *altera*, 108. *epitlo-*
ica, 110. *epitloco-entrica*, 106.
 Merorixis, I, 107.
 Meſenterii abſceſſus, II, 174. *phlegmone*, *in-*
flammatio, I, 253.
 Meſtaſtici morbi, II, 343.
METEORISME, **METEORISMUS**, I, 252. 253.
 351. II, 274. *abdominis*, *ibid.* *Hystericus*, *ibid.* *a manzanilla*, 275. *ventriculi*; 274.
 Methemerina, I, 170.
 Methodi Joſtoni & Senſerti conſpectus, I, 8.
 Meſothodæ anæſtonica morborum, II, 373.
 Meſoſis, I, 391.
METRITIS, I, 253. *lactea*, 254. *puerpera-*
rum; *typhodes*, *ibid.*

Metromania, II, 120.
 Meurtrissure, I, 72. 127.
 Mia, II, 197.
 Miarola, I, 229.
 Miasmatici morbi, II, 345.
 Mictus cruentus, sanguineus, II, 159. ex calculo renum; menstruus; in morbillis, 160. ex renum ulcere, *ibid.* simplex; spontaneus, 159. in variolis, 160. ex vesica ejusque sphinctere, 161. vermiciformis, 159. ex vesica hemorrhoidibus, 161. violentus, 160. ex urethra, 161. lumbricorum, 159.
 Le Millaire, MILIARIS, Miliarium morbus, Miller, Miller, I, 229. acutior, 230. benigna, *ibid.* Boia; 231. Britannica; 233. critica; 231. disturnior; 230. Germanica; 233. lactea; 232. maligna; 230. nautica; 234. puerperarum; 235. purpurata; 234. recidivans; 230. scorbutica; 234. 235.
 Mill-reck, II, 72.
 Mill-reck, I, 293.
 Mirachia, II, 106.
 Miserere, II, 182.
 Modorra, Modorilla, I, 434.
 Mogilalia, I, 409.
 Mola vesicularis, II, 261.
 Mollium partium morbi, II, 374.
 Molten greafe, II, 190.
 Monotes, I, 393.
 Morales morbi, II, 370.
 Morbilli, I, 228. *vid.* Rubcola. confluentes, *vid.* Scarlatina.
 Morbus arqueatus flavus; II, 309. Brasiliensis; 79. caducus, I, 303. carcerius, 234. committalis, 303. costalis, 245. coxarius, II, 76. curae gravis; 137. Deliorum, 318. dissolutus, 172. divinus; I, 303. frigidus; II, 244. Hercules; I, 303. Hungaricus; 419. hypochondriacus; II, 106. S. Lazari, 300. 312. major; I, 303. niger, II, 176. 181. pilaris, 292. puenalis Gerhaemensium, I, 98. polymorphos, polyritzos, II, 298. regius, 309. sacer, I, 303. solstitialis, 256. fonticus, 303. virgineus, II, 315.
 Morbi detegendi methodus; I, 44.
 Morbi dyspnoici, *vid.* Anhelationes, febri-les, I, 130. inflammatorii; 193. *vid.* Phlegma.
 Morborum classes aetilogicae; II, 331. praxis generalis; I, 142. principia, 39. methodus anatomica, II, 373.
 Mordetchin, Mordexin, II, 185.
 Morfondure; II, 199.
 Moria, II, 235.
 Morosis; II, 131.
 MOROSITATES, II, 110.
 Morphæa; *Morpheæ*, alba, I, 90. nigra; *ibid.* II, 313.
 Mois apparens, I, 426. subita, subitanea, *ibid.* 437.
 Morfus ventriculi, II, 49.
 Morve; II, 199.

Morus; I, 381.
 Mouvements convulsifs; I, 299.
 Mue de la voix, I, 410. des oiseaux; II, 321.
 Mule au talent, I, 107.
 Mulierum morbi, II, 375.
 Mure, I, 84. 381.
 Musce, II, 94.
 Musomania; II, 123.
 Mutacismus, I, 409.
 MUTITAS, *Murita*, I, 405. 406. elinguium; *ibid.* a glossolysii, *ibid.* hysterica; a narcoticis; prozretica; a siccitate; silentium; spasmodica, *ibid.* surdorum, 407. traumatica, 406.
 Mydriasis, I, 390.
 Myocephalum, I, 381.
 Myopia, *Myopie*, Myopismus, I, 385.
 Myosis, I, 382. 391.
 Myrmecia, I, 84.

N

NÆVUS; lenticularis; macernus; sigillum, I, 72.
 Nakir Albucahis, II, 72.
 Napta dorsi, I, 84.
 Narium morbi, II, 375.
 Narké, II, 24.
 Nasitas, I, 408.
 Natta, I, 83.
 NAUSEA, *Nausée*, Nauseosis, Nutia, II, 177. ab apostemate circa cardiacam, 178. biliosa, *ibid.* ex cacochylia; ex gastritide, *ibid.* ex gastrocele; gravidarum, 177. marina, 178. nephritica; 178. a pancreate; 177. ab enormi renis abscessu ventriculum comprimente, 178. a semine corrupto, *ibid.* a tenia, 177.
 Nebula, I, 69. 380.
 NACROSIS, II, 329. epidemica, 331. febrilis, 330. infantilis, 331. scorbutica, *ibid.* a viru, 330. ustilaginea, 329.
 Nephelium, 69. 380.
 NEPHRALGIA, II, 61. arenosa, 62. arthritica, 61. calculosa, 61. a carie, 63. febricosa; gravidarum; hamaturia, *ibid.* hemorrhoidalis; hysterica, 62. a lienis luxatione, 63. mesenterica, *ibid.* miliaris. *ibid.* monstrosa; a pancreate, *ibid.* plethorica, 62. purulenta, 63. rheumatica, 62. scirrhosa; scorbutica, 63. verminosa, *ibid.*
 Nephriticus dolor, II, 61.
 NEPHRITIS, I, 265. arthritica, 266. calculosa, *ibid.* spuria, II, 62. vera, I, 265.
 Nervus Medinensis, II, 192.
 Nialferie, II, 132.
 Nigredo a Sole, I, 71.
 Nigvor, I, 72.
 Noctambulatio, Noctergia, Nocturgium, II, 109.

Nau-

Nodus, I, 86.
 Noma tibiarum, II, 323.
 Nomenclatura Nosologia, I, 15.
 Nosologia historica, I, 7. Philosophica fundamenta, I, 19.
 Nosologica methodus, I, 7. nomenclatura, 15.
NOSTALGIA, II, 117, complicata, 118. simplex, 117. simulata, 118.
 Nostomania, Nostriasis, II, 117.
 Nouage, II, 285. *Nouveau scrophuleux*, 286.
 Nouage, I, 69.
 Nyctalopia, *Nyctalopie*, I, 383. 384.
 Nyctubasis, *Nyctobasis*, II, 109.
 Nylsbred, I, 441.
 Nymphocluia, **NYMPHOMANIA**, II, 120. fervor uteri, 121. suribunda, *ibid.* pruriginosa, *ibid.* salicinis, 120.
NYSTAGMUS, I, 288. 441. bulbi; catarrhalis; epilepticus, *ibid.*

O

Obscuritudo, I, 395. II, 105.
 Obstermitio, II, 24.
 Obesitas, II, 247.
 Oblivio morbofa, II, 143.
 Obfcuriffimus de la vne, I, 379.
OBSTIPITAS; annuus catarrhalis, I, 282. gibbosa, lateralis, *ibid.* renuens, *ibid.* spasmodica, 283.
 Obstructiones viscerum naturalium, I, 422. *du foye*, II, 59. *de la rate*, 61.
 Oculi elephantialis; expressio; magnitudo nimia; prolapsus, I, 93.
 Oculi lacrymosi, II, 197. graniosi. 199. Oculorum dolor, inflammatio, II, 33. morbi externi, 376. interni, 375. *vid. Ocul.*
Odeur de bouc, II, 222.
 Odontagra, II, 41.
ODONTALGIA, II, 41. arthritica, 43. cariiosa, 41. catarrhalis, 42. dentitionis, *ibid.* gravidarum, 41. hæmodia; hysterica, 43. scorbutica, 42. stomachica, 43.
OEDEMA, I, 77, II, 267. crystallinum; flaccidum, I, 77. hytericum; lacteum, 78. perioftici, 77. purulentum, 78. serpentina, 77. variorum dolor, inflammatio, II, 33. morbi externi, 376. interni, 375. *vid. Ocul.*
Odeur de bouc, II, 222.
 Odontagra, II, 41.
ODONTALGIA, II, 41. arthritica, 43. cariiosa, 41. catarrhalis, 42. dentitionis, *ibid.* gravidarum, 41. hæmodia; hysterica, 43. scorbutica, 42. stomachica, 43.
OEDEMA, I, 77, II, 267. crystallinum; flaccidum, I, 77. hytericum; lacteum, 78. perioftici, 77. purulentum, 78. serpentina, 77. variorum, 78. uulvæ, 96.

Oedematis, I, 77, II, 250. *des femmes grosses*, II, 251.
Oedeme; commun, I, 77. *du poutmon*, 314.
Ocell; cancer; chute, I, 93. 94. *foudus*, 90. *fa gresser contre nature; hydropisie*, 93. *de lievre*, 95. II, 38. *pochi*, 381.
Oestro di ballare, II, 121.
 Offuscatio, I, 390.
 Olfactus amissio, I, 392.
 Ombrage, I, 69.
 Omenti inflammatio, I, 253.
 Omphalocoele prima, I, 102. 105. rupto peritonæo, 107. altera, 108. 110.
 Ophthalmorix, I, 107.
 Oneirosmos, Oneirogonos, II, 212.
 Onglie, II, 24.
 Ongler, I, 85. 381.
 Onyx, I, 90. 381. II, 39.
 Ophialis, II, 321.
OPHTHALMIA, *Ophthalmie*, II, 33. ab acri-monia sanguinis, 34. angularis, 37. angulos oculi afficiens, 34. *bourgeonne*, 35. cancrofa, 38. catarrhalis, 33. chemosis, 37. choroidæ, *ibid.* a cornæ filula, 39. ab ecomate, 38. erythematosa, 35. febricula, 39. Gallica, 36. herpetica; humida, 35. 197. interna, I, 79. *interne de la retine ou de la choroïde*, II, 37. a lagophthalmo, II, 38. metastatica, 39. notha, 33. phlyctenodes, 39. pustulosa, 35. scrophulosa, *ibid.* sicca, 34. a lyncchia, 38. typhilitica, 36. taraxis, 33. tenebricosa, 36. trachoma, 34. traumatica, 37. trichialis, 33. tuberculosa, 34. venerea, 36. vera, 35. ungue, 39. ureæ, *ibid.*
 Ophthalmoponia, II, 33.
 Ophthalmoprosis, I, 93.
 Ophthalmotonos, I, 285.
 Oppressio de poitrine, I, 343.
 Orechocele, I, 91.
 Ordinum synopsis, I, 52.
 Oreillon, I, 80. 104.
 Orexia, II, 46.
 Organici morbi, II, 361.
Orgueil, I, 85. II, 34.
 Orina di sangue, II, 159.
 Ovis hæmorrhoides, II, 157. tortura paralytica, I, 282. affectio scorbutica, II, 157. morbi, 375.
Orthopnie, **ORTHOPNOEA**, I, 349. 351. ab aneurysmate, 352. ab antipathia, 353. a bronchocele, *ibid.* cardiaca, 351. a deglutitis, 352. ab emphysemate, 353. febricula, *ibid.* a gastrocele, 352. ab hydrocephalo, 354. ab hydropneumonia, 353. ab hydrothorace, 352. hysterica, *ibid.* ab inanitione, a lipomate, 353. peripneumonia, 351. a pinguedine, 352. polyposa, 354. pseudo-peripneumonia, *ibid.* scorbutica, *ibid.* sicca, spasmodica; 351. a terrore, 352. traumatica, 353. a vaporibus, *ibid.* variolosa, 354. a vermibus, 353. a vomica, 352.
OSCEDO, I, 331. febrilis; hysterica, partus, stomachica, 332.

OSCHEOCELE, I, 91. 104. 110 adiposa; ab algedine, 91. altera 108. aquosa, 91. cruenta, 92. epiploico-enterica, 106. flazulenta; hydratosa, 91. intestinalis, 104. Malabarica, 91. omental, 110. prima, 102. purulenta, 91. scintillans, 91. Variolosa, 92.

Osteo-hydrocele, I, 91.

Oscitatio, I, 331.

Ophthalmia Hippocratis, II, 75.

Ostium dolor, II, 16. reclusus, I, 123.

Osteofarctosis, I, 420. II, 17. 74.

Osteofeatoma, I, 96.

OSTOCOPUS, II, 16. ab arthroace, *ibid.* canerosus; *ibid.* a gummatibus, 17. ab osteofarctosis, *ibid.* a podarthroace, 16. scorbuticus, 17. a spina ventosa, 16. syphiliticus, 17.

OTALGIA, II, 40. catarrhalis, *ibid.* inflammatoria, *ibid.* ab infectis, ab intrusis, 41. notha, 40. verminosa, *ibid.*

OTORRHOEA; menstrua; purulenta; serosa, II, 118.

l'Oubli, II, 143.

Oule double, I, 396. engourdie, *ibid.* fanffie, 395. *arndre*, *ibid.*

Oule, I, 70. 380.

Ourlas, I, 260.

Oxycoia, I, 395. II, 105.

Oxyregmia, II, 125.

Ozena, I, 391. II, 199. 125.

P

Pacheoblepharosis, I, 380.

Pachu, II, 263.

Pachytes, I, 380.

Pædathroace, I, 86. II, 16. 152.

Pales couleurs, II, 113. 315. *des filles*, 316. *des femmes* *ibid.*

Palette demise, II, 182.

Palliores, II, 317.

Palmos, I, 194.

Palpebra superioris casus, lapsus, retraction, I, 95. palpebrarum extroversio, introversio, *ibid.*

PALPITATIO, I, 194. ab aneurysmate cordis, 195. ex aortæ aneurysmate, angustia, 196. apothematosa, *ibid.* arthritica, *ibid.* calculosa, 195. chlorotica, 196. a corde ossificato, 195. febricitosa, 197. hysterica, 196. melancholica; a pancreate, *ibid.* a pericardii abscessu; a polypo; polyposa, 195. tremula, *ibid.*

Pululimos, II, 114.

Pamaisan, I, 423.

Panaris cutane, I, 81.

PANDICULATIO, I, 129. febricitosa; hysterica; torpidiorum, *ibid.*

Panicophobor, II, 118.

Panis, Panus, I, 131.

Pannus, I, 85. 381.

PANOPHOBIA; hysterica, II, 118. infantum, *ibid.* phronitis; arabie, 119. verminosa, 118.

Pantophobia, II, 119. 123.

Papulæ, I, 72.

Paracoe, PARACUSIS, I, 395. II, 105. barycoia, I, 395. duplicata; 396. oxycoia, 395. Vvillistana, 396.

Paracynanche, I, 354.

Paracyfma, I, 395.

PARAGLOSSE; deglutitoria, I, 96. exortoria, 97. gliosmegilus, *ibid.* retractoria, 96.

Paralamplis, I, 69. 380.

Paralyse, PARALYSIS, I, 412. biliosa; a colica biliari, 413. corporis inferioris, 417. febrilis, 413. *de la langue*, 406. *de la lantre*, 96. metallicorum, 413. nervea, 414. plethorica, 413. Polonica, *ibid.* rachialgica, *ibid.* rheumatica, *ibid.* scorbutica; serophulosa; serosa, *ibid.* spuria, 417. traumatica 413. *du ventricule*, II, 50. universalis, I, 417. a vomica, 413.

Paralytoides morbi, I, 366. 372.

Paranoia, I, 83. II, 132.

PARAPHONIA, I, 409. catharralis, 411. gutturalis, 412. nasal, 411. a polypo, 412. pubicum, 410. sibilans, 412. stertens; ulcerosa, *ibid.* Paraphrensis, PARAPHRENITIS, I, 244. diaphragmatica, *ibid.* hepatica, 245. pleuritica, *ibid.*

PARAPHROSYNÉ, I, 244. II, 128. ab atropa belladonna, 129. calentura, 131. a conio, 129. a coriaria, *ibid.* critica, 131. a datura melihel, 128. a datura Hermonium, *ibid.* felaricosa, 131. febrilis, 130. ab hyposciamo nigro, 128. hysterica, 131. magica, 130. ab opio, 129. a parhormate, 131. puerperarum, *ibid.* solano hottense, 129. somnolenta, 128. venenis, *ibid.*

Parapleuritis, I, 359.

PARAPLEXIA, *Paraplexie*, I, 417. equina, 418. intermittens, 417. rachialgica, *ibid.* rheumatica; sanguinea, scorbutica, *ibid.* a spina biuida, *ibid.* syphilitica, 418. traumatica, 417.

Parapoplexia, I, 178. 417.

Parathrcma; I, 220. parathremata, 92.

Parasynanche, I, 259. 355.

Paratrima, I, 77.

Paresis, I, 414. II, 204.

PARONYCHIA, I, 81. actura, *ibid.* artificialis, 82. cutanea, 81. digitum; periostei pressura; tendinis, 82.

PARORCHIDIUM, I, 119. ab intropressione; a retractione, *ibid.* a teroto descensu, *ibid.* Parorchido-enterocoele, I, 106.

Parotide, PAROTIS; benigna; febrilis, I, 80. pestilens, 81. *simple*, 80.

Paroulis, Parulis, I, 90.

Pareus difficilis, II, 63. *vid. Dyffocia*.

Pasine, I, 175.

Passio bovina, II, 191. Passio cæliaca, *Passion calliaque*, 191. Passio hydrocolos, 136. Passio hysterica, *Passion histerique*, I, 307. Passio iliaca, II, 182. pleuretica; I, 145.

Pavor nocturnus, in somno, II, 118.

Paupietres, leur enllement, I, 94. *Suppuration, sa chute, sa relaxation*, 95.

Recher

Pezu de poule; I, 75.
 Pectoris dolor, I, 357. morbi, II, 376. externi; interni; *ibid.*
Pezu de S. Thoma, II, 252.
 Peiunk, II, 292.
 Pelade, II, 321.
 Pelidine, Græcis; I, 72.
 Pelo, II, 70.
 Pomphigos puretos. Pemphigos PEMPHIGUS, I, 226. Brasiliensis, 228. castrensis, 227. Helveticus, *ibid.* Indicus, *ibid.* major, *ibid.*
 Pomphingodes Galeni; I, 240.
 Pondequar; I, 84.
 Penis nodus; I, 215.
 Percussio; I, 214.
 Percupino-man; II, 291.
Perforation de la vessie, II, 304.
 Perical, II, 252.
 Periodyna stomachi, II, 53.
 Periphimosis, I, 83.
 Peripleumonia; I, 261.
 PEPIPNEUMONIA, *Peripneumonia*, I, 249.
 261. ardens, *ibid.* arthritica, 262. biliosa; 261. catarrhalis, 362. 354. epidemica; 249. erysipelaeosa, 262. exanthematica, 263. fausse; 354. gastrica, 263. hydrophobica, *ibid.* htemalis, 354. maligna; 262. a miliaris, 263. notha, 262. 254. pestilens, 262. phthiticozum; pituitosa; *ibid.* pura, 261. putrida, *ibid.* rachalgica; 263. a rubecula, 264. typhodes, 262. a variola, 263. vera; 261.
 Peripneumonitis, I, 261.
 Peripneumopleuritis, I, 245.
 Perirrhæa; II, 264.
 Periscelis, I, 73-74.
 Perle; I, 69.
 Pernio, I, 76.
 Perofiz, I, 378.
 Perse, II, 192.
Pertes d'appetit; I, 400. d'odorat, 392. de sentiment, 376. de voix, 407. rouges des femmes; II, 162. des femmes grosses, 164. de sang, *ibid.*
 Pertussis, I, 341.
 Perversion osium capitis ac musculorum appendicorum; I, 124. 125.
 Pervigilium, II, 144. febrile, *ibid.*
 Pes febricitans; II, 252.
Pensateur d'estomac; II, 51. de sete, 28.
 Pestilential, PESTIS; I, 218. Egyptiaca, 222. Alefienfis, 219. anticardica; 220. benigna, 219. bovilla; II, 174. carbunculosa, I, 220. 222. glossanthrax, 220. Indica, *ibid.* 222. interna, 219. Londinensis, 218. Massiliensis, 219. remittens, 221. retrocedens, 219. scorbutica, 221. Siamæa, 220. sporadica; *ibid.* vulgaris; 218.
 Petecheiz, Petecule, Petechialis febris, vera; I, 79. Petecheiz benignæ, 220. petambies accidentelles; 234.
Petite-venale; I, 222.
 Phagedæna cancer, I, 81.
 Phagedæna Czili Aureliani; II, 114.

Philopetridomania, II, 117.
 PHIMOSIS, I, 82. circumligata, 81. hydrocelica, 82. infantium, 83. syphilitica, 82. vagina, 83. vera; *verelique*, 82.
 PHLEGMASIÆ, I, 191. 216. theoria, 193. therapeja; 215. EXANTHEMATICÆ; 217. MEMBRANOSÆ; 241. PARENCHYMATOSÆ, 255. &c.
 PHLEGMATIA, Phlegmatites; II, 248. 250. cruralis; Delienfis, 250. elephantina, 252. exanthematica, *ibid.* gravidatum; hysterica; lactea, 251. Malabarica; 252. a menestasia; ulcerosa; 251. vulgaris; 250.
 Phlegmatica; I, 171.
 Phlegmatorrhagia, II, 199.
 Phlegmon, PHLEGMONE, I, 79. axillaris, *ibid.* membranz coitas succingentis, 245. mammarum, musculorum, oculi 79. testis, *ibid.*
 Plogostici morbi, II, 348.
 Phlogosis, I, 56.
 Phlyctænz, *Phlyctenes*, Phlyctides, I, 71. II, 39. cornez; *ibid.*
 Phobos, II, 118.
 PHOENIGMUS, II, 314. Indicus, 315. petechialis, 314. plethoricus, 315. a venenis; a vermic; *ibid.*
 Phrenesis, I, 242.
 Phrenitias, PHRENITIS, I, 241. aphrodisiaca; apurata, 243. a calenura, *ibid.* comatosa; 435. dolore; 244. essentialis, 242. hectica; 256. hydrophobica; 244. idiopathica; 242. inaniterum; 244. Indica; *ibid.* lacrans, II, 123. miliaris; I, 242. morbillosa; a plica, 243. symptomatica; 243. 243. synochi pleuritice; 242. synochi sanguineæ, *ibid.* a tantissimo, 244. variolosa, 243. vera, 212. verminosa 243.
 phriscamus, Phrice, Phricasis; I, 298.
 Phricodes, I, 172.
 Phronitis noufus Chalepe, II, 137.
 PHTHIRIASIS, II, 318. 321. funesta; inguinalis; interna; 319. pedicularis, 318.
Phthisis, PHTHISIS, Phthoe, II, 233. asthmatica; calculosa, 241. cellularis, 243. chlorotica, 242. chyfosa; 243. exanthematica, 242. a febris, *ibid.* hæmoptica, 241. hepatica, 242. humida, 240. hypochondriaca, 243. icterica; impetiginosa, *ibid.* incipiens, 239. a metastasi puris, 241. nephritice, 236. nervosa, 243. notias, 236. a peripneumonia, 242. a plica, 243. primariæ, 239. pulmonalis, 238. pupillæ, I, 387. 391. rheumatica-arthritis, II, 242. a stritis pulmonum, 239. scorbutica; scrophulosa; secundariæ, 240. senilis, 241. sicca, 239. syphilitica, *verelique*. *ibid.* a vomica, 243.
 Phthora, II, 165.
 Phygeton, I, 80.
 PHYMATON, I, 75. II, 373.
 PHYSCONIA, II, 252. ab adipe subcutaneo, 237. 259. calculosa, 253. 254. concreto-glomerata, 256. emphratica, 253. ab excrefcentia, 259. externa hydatidosa, 258. externa lupialis, *ibid.*

EXCEP-

- externa Scierhodes, *ibid.* fungosa, 254. hepatica, 253. hydatidosa, *ibid.* 254. 257. intestinalis, 256. lupialis externa, 258. megalophylachina, 257. menterica, 254. omentalis, 256. ab ovario, 254. polyplachina, 257. renalis, 253. sarcomatoma cyllica, 254. *ibid.* 256. 257. scierhodes, 253. *ibid.* 254. 257. simplex, 259. splenica, 253. steatomatosa: strumosa, 254. syphilitica, 259. visceralis, 257. uterina, 254.
- PHYSOCEPHALUS**; artificialis, II, 262.
- PHYSOMETRA**, II, 271. humida; sicca, *ibid.*
- le Plan*, II, 26. 293. 294.
- PICA**; **Picaceus** appetitus, **Picatio**, II, 112. antiscorbutorum, 113. ebrosantium; 112. infantilis, *ibid.* malacia, 113. simulata, 114. voluntaria, *ibid.*
- la Picote*, I, 222.
- Picottin*, I, 181.
- la Pîce*, I, 263.
- Pieds bots*, I, 124. 125. *enfîés*, II, 250.
- Pikal**, II, 252.
- Pincement de l'intestin*, I, 205.
- Piquure*, I, 126. *venimeuse*, 127. *de gupes*, *confus*, 86. 74.
- Pissement de pus*, II, 208. *de sang*, 259.
- Pityriale**, **Pityriasis**, II, 308. 321.
- Pizza**, II, 112.
- Pizuita**, Horatii, II, 33. alba, 248.
- Pizuitosi morbi**, II, 353.
- Pladarotes**, I, 381.
- PLAGE**, I, 125. II, 374.
- Plateisma**, I, 409.
- Playe simple*, I, 226.
- Pleura** *furens*, I, 245.
- Pleurésie ventreuse*, I, 358.
- Pleuritis**, **Pleuritica** febris, **PLEURITIS**, I, 245. biliosa, 248. 249. 250. catarrhalis, 249. convulsiva, *ibid.* dorsalis, 247. erysipelatosa, 249. 250. cum febre ardenti, 249. febricosa, 250. flammosa, 246. hepatica, 249. hydrothoracica, 250. impura, ingluviola, 248. intermittens, 185. lactea, 250. mediastini, 247. miliaris, 251. pericardii, 248. periodica, 250. pestilens, *ibid.* phthisica, 358. Polonica, 250. pulmonis, 247. pura, 246. putrida, 248. sanguinea, 246. secundaria, 248. sicca, 249. splenica, 251. spuria, 257. stomachalis, 248. lymphatica, 249. symptomatice, 248. traumatica, *ibid.* vera, 246. verminosa, 248.
- PLEURODYNE**, I, 357. ex abscessu, 359. ex aneurysmate, *ibid.* arthritica, *ibid.* a cacochylia, 358. catarrhalis; febricosa, 359. flatulenta, 358. hypocondriaca, hysterica, *ibid.* miliaris, 359. a rupto oesophago, *ibid.* ab ossiculo, *ibid.* parapleuritis, *ibid.* phthisica, 358. plethorica, *ibid.* rachitica, 359. rheumatica, 358. scorbutica; 359. a spasmate, 358. venerea, *ibid.* verminosa, *ibid.* a vomico, 359.
- Pleurocripneumonia**, I, 247. 248. *ibid.* 261. 262.
- Pleurototonos**, I, 292.
- Plica**, II, 320. Belgarum, 319. femina, 320. major, 319. Polonica, *ibid.*
- Plie, Plique*, II, 319. *en cordons*, *ibid.* *melle*, 320. *male*, 319.
- le Plomb*, I, 428. 429.
- Pneumatica**, I, 345.
- Pneumatocele**, I, 91.
- Pneumatophale**, **Pneumatophalus**, I, 90.
- PNEUMATOSIS**, II, 247. febrilis; 248. hysterica, 247. a veneno; a vulnere, *ibid.*
- Pneumonia**, **Pneumonitis**; **Pneumopleuitis**, I, 261.
- Enigalion**, **Enigamon**, I, 329.
- Pnix** hysterica, I, 352. 439.
- Podalgia**, **Podagra**, II, 12. capitis, 30. dentium, I, 280.
- Pœnalis morbus** **Gerhamensium**, I, 97.
- le Poll*, I, 155. II, 70.
- Poin de cor*, I, 247. 357.
- Poireau*, I, 240.
- Poirine aîlée*, I, 228.
- Pollution involontaire*, II, 212.
- POLYDIPSIA**, febrilis, II, 216. fluxuum; hydropica, *ibid.* a morbo dipsadis, a veneno, 217.
- Polype du nez*, **Polypus** narium, I, 82. uteri, *ibid.*
- POLYSARCIA**; adiposa, II, 246.
- la Porcelaine*, **Porcellana**, I, 74. 239.
- le Porc épy*, II, 290.
- Porphyræ**, I, 235.
- Portigo**, II, 306. 380. 321.
- Porrum**, **Porreau**, I, 84. 85.
- Polstia**, II, 34.
- Pothopatridomania**, II, 117.
- Poulain**, I, 79.
- Pourpre*, I, 235. *blanc*, 229.
- Pouffe*, I, 347. 350.
- Præfocatio** uterina, I, 352.
- Præputii prolapsus**, **proptoma**, I, 97.
- Præputiolium**, II, 34.
- Prægon**, II, 182.
- Presbyopia**, **Presbytia**, I, 387.
- Prestura**, I, 82. 437.
- PRIAPISMUS**, I, 284. II. 219. a cantharidibus, I, 286. dysuricus; a frigore; gonorrhœicus, 285.
- PROCTALGIA**, II, 78. **Brasiliensis**, 79. cancrofa, 78. diarrhoeica; equina, 79. exania, *ibid.* fistulosa; inflammatoria; intertiginosa, *ibid.* ex misticis, 79. ex rhagadibus, *ibid.* tenelmodis, *ibid.*
- Protocele**, I, 98.
- Productio** vulvæ a pituita, I, 96.
- Prolapsus**, I, 92. *vid.* **Proptoma**.
- Prolegomena**, I, 1.
- Propenditæ** vulvæ paralyticæ, I, 96.
- PROPTOMA**, I, 97. auricularum, *ibid.* labii inferioris; mammarum, *ibid.* præputii, *ibid.* scroti, *ibid.*

Prophyllus, I, 379.
 Pruna, I, 81.
 Prunella, I, 357. 260.
 PRURITUS, II, 25. arthriticus, exanthematicus; fugax, *ibid.* gravidarum, *ibid.* iſtericus; infantum, *ibid.* ex medufa; ex opio, *ibid.* des parties naturelles, 80. pedicularis, 25. ſymphiliticus, 26. uteri, 67. 121.
 PSELLISMUS, I, 408. 409. balbuties, *ibid.* iotacismus, *ibid.* iſchnophonia, 408. lagostomatium, 409. lambdacismus, *ibid.* metallicus, *ibid.* mogilalia, *ibid.* naſitas, *ibid.* a tanula, *ibid.* rotracismus, 408. traulotes, 409.
 Pſeudo-aſthma, I, 344.
 Pſeudo-pleuritis, I, 357. bis.
 Pſora, II, 304.
 Pſychos, II, 26.
 PSYDRACIA, I, 74. II, 306. ab acaris, I, 74. acne; diurna, 75. porcellana; a veſpis; urtica, 74.
 PTERYGIUM, I, 85. 381. pannus, ungula, I, 85.
 Prilofus, I, 380.
 Proſes, Proſis, I, 94.
 pruritus PTHALISMUS, II, 199. apthofus, 201. arthriticus, *ibid.* artificialis, 200. a calculo, 202. a carie, catarrhalis, *ibid.* febrilis, *ibid.* gravidarum, 201. hypocondriacus; hyſtericus, *ibid.* Lapponicus; a lxxitate, 200. melan- cholicus, 201. mercurialis, 200. naufeoſus, *ibid.* ab oris ulcuſculis, *ibid.* phrifiſcus, 201. purulen- tus, *ibid.* a pyroſi, 200. a ſabura nidoſa, *ibid.* ſcorbuticus, 201. ſymptomaticus, 200. ſy- philiticus, 202. varioloſus, 200. viridis, 201. urinoſus, 202.
 Puanteur, Pumaſſe, II, 221. des aiſſelles, 220. de bouche, 221. des camards, *ibid.* d'eſtomac; des oreilles; des pieds; de la ſiſte; 222.
 PUDENDAGRA, II, 79. aſura, 80. ab a- ſcaridibus, *ibid.* cancroſa; *ibid.* a gonorrhœa; *ibid.* hernioſa, 79. a parorchidio, *ibid.* ex phi- moſi; *ibid.* pruritus, 80. ſeſſium, *ibid.* ulcuſcu- loſa, 79.
 Pudendi nova diſtorſio, II, 215.
 Puerperia, II, 165.
 Pulmonaria, I, 261. 351.
 Pulmonia, Pulmonia, I, 261. II, 238. lethar- gica, I, 435.
 Puſſario, I, 204.
 de Puſſis frequentia, I, 137.
 PUNCTURA, a cuspide fracta; ſimplex, I, 226. venenata, 227.
 la Punta, I, 246.
 Puris profluviu, II, 191.
 PURPURA, I, 235. accidentalis, 236. alba, 229. apyreta, II, 314. benigna, I, 236. mali- gna, 229. 236. miliaris, 229. puerperarum, *ibid.* 234. rubra, 230. ſcorbutica, 235. ſymptomatica, 236. verminofa, *ibid.* urtica, 239.
 Purulenti morbi, II, 359.
 Puſtula, puſtules, I, 74. II, 39. oris, I, 240.
 Sauvages Noſologia Methodica Tom. II.

Pyreta dialeira, I, 181. epanadida, 169. ſyne- chonta, 146.
 PYROSIS, H, 46. bilioſa, *ibid.* a concep- tione, 47. a philoſoſi; Suecica; a viſceribus in- flammatis; 46. ulcerofa, 47. vulgaris, 46.
 PYRIA, H, 208. arthritica; 210. chyloſa, 209. a corde, *ibid.* lactea, *ibid.* a meſenterio, 210. mucoſa, 209. nigra, 210. renalis, 208. a thorace, 209. veficalis, 208. vireſcens, 210. vi- cida, 209.

Q

QUARTANA, *Quarte*, *Quartaine*, I, 187. amens, 188. arthritica; cataleptica, *ibid.* coma- toſa, 189. duplex, duplicata, 188. epileptica; hyſterica, *ibid.* infantum, 189. legitima, 187. maligna, 181. meſtaſtica, 189. nephralgica, 183 ſcorbutica, 189. ſplenetica, 188. ſymphilitica, *ibid.* triplex, *ibid.* triplicata, 189.
 Querquera febris, I, 172.
 Quinæ, I, 341. II, 21.
 QUOTIDIANA, I, 183. catarrhalis, 184. cephalalgica, *ibid.* continus, 170. deceptiva; 183. epileptica; hyſterica; iſchiatica, 184. legiti- ma, 183. nephralgica; partiâlis, 184. ſimplex, 183. ſoporofa; ſtranguioſa, 184.

R

Rabies canina, II, 123.
 Rache, II, 306. farinacea, 308. humida, 307. ſecche, 308. verrucosa, *ibid.*
 RACHIALGIA, II, 71. ab ad apneufia, 74. arthritica, 73. febricofa, 81. metallica, 72. oſteofarcolis, 74. Pſidonum, 71. Saturnina, 73. Saturnina, 74. traumatica, *ibid.*
 RACHITIS, II, 285. Britannica, *ibid.* Cal- mucana, 286. a caſtratione; elephantia, *ibid.* incipiens, nodofa, 285. Polonica; a ſcabie, 286. ſtrumofa, *ibid.* 288.
 Racoliſ, I, 97.
 Radacrie, II, 133.
 Raffredatura, I, 360.
 Rage, II, 223. 238. de l'Hamak, 240.
 Rale, Ralemens, I, 343. 412.
 Ramex varicoloſus, I, 84.
 Raphania, I, 291. 299.
 Rappert, II, 218. d'arſe couverte, 419.
 Raptus poſterganeus, I, 285.
 Raſcario, I, 341.
 Raſque, II, 306.
 Raſting, I, 343.
 Ravagio, I, 225.
 Raucedo, I, 411.
 Refrigeratio, II, 26. Raucioſa, I, 419.
 Raifred diffamens, I, 298.

E c

Reim

- Reins enter ovum*, II, 75.
 Renchos, Renxis, I, 343.
 Renum inflammatio, phlegmone, I, 265. ulcus, II, 208. morbi, 376.
 Respirandi difficultas, I, 344. respiration elevationes, 343.
 Resilientes, II, 22.
Retention de urine, II, 275.
 RHAGAS, I, 129.
 RHEUMA, I, 360. catarrhale, *ibid.* epidemicum, *ibid.* gastris, II, 288. ophthalmis, 197.
 RHEUMATISMUS, *Rheumatisme*, II, 17. 18. 188. acutus, 17. 20. arthriticus, 19. calidus; *chaud*, 17. 19. *simple chronique*, 18. convulsivus 20. cruralis, 18. dorsalis, 20. equinus, 19. febricofus; flatuosus, *ibid.* fugax, 20. *goutteux*, 18. hystericus, 19. a lymphis spissa & acris, 28. metallicus, 20. miliaris; necroscos, *ibid.* odontalgicus, 41. saltatorius, 20. scorbuticus, 18. vermifolus, 19. cum ulcere, 172. uteri, 210. vulgaris, 28.
 Rhigos, I, 298.
 Rhoides, II, 267.
Rhume de cerveau, II, 199. *d'flamme*, 288.
 201. *de poitrine*, I, 360.
 Rhytidosis, I, 382.
 Richkes, II, 185. *ibid.*
 Riedtkuchen, II, 59.
 RIGOR, I, 298. catarrhalis, *ibid.* febricofus, 299. febrilis, 298. a frigore, *ibid.* a pathemate; a purulenta, *ibid.* tertianarius, 299.
 Riptasmos, II, 22.
 Rifus caninus, I, 281.
 Regne, II, 304.
 Romadino, I, 360. II, 211.
 Ronchos, Ronchus, *Roufflement*, I, 343. 412.
 Rosa saltans, I, 74. Rosa Sennerti, 237.
 Roseola, I, 228.
 Rothlauff, I, 231.
 Ross, II, 218. *aigres: pourris*, 219.
 Rottacismus, I, 408.
 Rougeole, I, 228. *boutonnee*, 229.
 Rougeur, I, 71.
 Rouffeur, I, 71.
 Rubedo, I, 204.
 RUBEOLA, I, 228. anginosa, 229. anomala; confluent; epidemica & maligna, 228. segularis, *ibid.* variolodes, 229. vulgaris, 228.
 RUPTURA, *Rupture*, I, 128. 202. 203. 204.
 Ruptures, I, 107. 108. 110. *vid. Hernia*.
- ab hydrargyrosi, 200. mercurialis, *ibid.* de la p. site *verale confluente*, *ibid.*
 Salsus Valentini; Viti, II, 222.
 Sanglor, I, 332.
 SANGUIFLUXUS, II, 250.
 Sanguilavio, II, 211.
 Sanguinei morbi, II, 349.
 Sanguinis post partum effluxus nimius, II, 265
 profluvium, 151. *spatum*, 152. stillicidium, 151.
 ab utero, 162.
 Sanguisugum, I, 344.
 Sarcies duruosus, II, 247.
 Sarcocele, I, 84.
 SARCOMA, *Sarcome*, I, 83. 381. bicephalum, 84. bronchocele, 86. cercofis, 83. encanthis, 84. epulis, 83. fungolum, 84. marium; natta; oculorum; 83. scroci, 84. varicocele, *ibid.* uteri, II, 261. vulgare, I, 83.
 Sardinasis, I, 282.
 Sarcette, I, 279.
 Sarsipila SATYRIASIS, acuta, II, 219. chronica, *ibid.* hydrophobica, 220. muliebris, 221. neogomorum, 220. *eres fungalis*, 222. venerea, 220.
Sarsipilisme, Satyriasmus, II, 76. 300.
 SCABIES; benigna, II, 304. canina, 305. capitis venerea, 297. catamenialis, 305. critica, *ibid.* 306. felina, *ibid.* herpetica, 305. humida, 304. Indica, 305. neogomorum, 306. scorbutica, 305. venerea, 296. vermicularis, 306.
 SCARLATINA febris, I, 299. anginosa; intermittens; porriginosa; variolodes, *ibid.* urticata, *ibid.*
 Sceletyrbe, SCELOTYRBE, I, 320. II, 298. chorea Viti, I, 310. festinans, *ibid.* instabilis, *ibid.* intermittens, *ibid.* pituitosa, *ibid.* verminosa, *ibid.*
 Scharboek, Scheurbeck, Scherboek, Schoerboek, II, 298.
 Sciatica, *Sciaticque*, II, 78.
 Scirrbus, Scirrhosis, SCIRRHUS, I, 78. *au foye*, hepatis, I, *ibid.* II, 59. *a la rate*, lienis, I, 78. II, 61. lupia, I, 79. *de la matrice*, II, 67.
 Schlerophthalmia, II, 34.
 Seleryfins, I, 78.
 Scoliosis, I, 87.
 Scorbaks, II, 298.
 Scorbutica oris affectio, II, 299.
 SCORBUS, SCORBUTUS, I, 411. II, 298. vernalis, 300. cretensis, 298. incipiens, *ibid.* inveteratus, *ibid.* lividus, pallidus, petechialis, 299. ruber, 300.
 Scordinema, Scordinisinos, I, 289.
 Scotodinos, Scotoma, II, 89. Scotoma Heurmit, 93. 94.
 SCROPHULA, Scrophuliz, II, 287. Americana; 288. chalasii, 289. farcimen, fugax, 288. leprosa, 289. mesenterica, 288. Moheccana 289. periodica, *ibid.* vulgaris, 287.
 Scroci

- Saburrales morbi, II, 352.
 Sahafati, Arabum, II, 306. humidum, *ibid.*
 307. siccum, 306.
 Salacitas, II, 280.
 Salivatio, *salivation*, II, 199. anginosa, 201.

Scroti proptoma; *Scrotum fa relaxatum*, I, 97.
 Scroti impetigo, II, 80.
 Scruvy, *Scascruvy*, II, 292.
 Seasoning, I, 169.
Secheresse de la gorge, I, 339. 343. *de poitrine*, 339.
Sein, I, 72.
 Seminis tarda emissio a corporum cavernosorum nodis, II, 215. ab epilepsia spasmodica in coitu adveniente, 216. a genitalium ignavia, 217. a validiori penis erectione, 216. ab angustiori preputii orificio, 215. a morbis urethrae, 214. a mucro urethrae infarsiente, 216. Seminis in actu venetto retentio, *ibid.*
 Semitertiana, I, 292.
 Senium, II, 244.
 Sensuum morbi, II, 375.
 Senum morbi, II, 378.
Senteur du pied de muletier, II, 328.
Separation des épiphyes, I, 224.
 Septimaria; I, 157.
 SERIFLUXUS, II, 193.
 Seroi morbi, II, 346.
Serpentine, I, 77.
 Serpigo, I, 73.
 Setæ, II, 290.
 Sexuum morbi, II, 375.
Le Siam, I, 166. 220.
 Sibillius, I, 421. II, 104.
 Sideratio, I, 255. 429. 442.
Sifflement, I, 412. *d'oreille*, II, 104.
 Sigillum, I, 72.
 Silentium, I, 406.
 Singhiozzo, I, 332.
 the Singles, I, 74. 238.
 SINGULTUS, I, 173. 332. *accidentalis*, ab acrimonia alimentorum, *ibid.* ab adipsneustia, 336. ab alimentis, 332. ab alvi fluxu, 336. ab aphethis, 337. arthriticus, 335. cachecticus, 338. a cacochylia, 333. a cerebro, 338. criticus, 335. a dolore, 336. epilepticomaniacus, 339. exanthematicus, 335. ab excoriatione orophagi, ventriculi, 338. febrilis, 334. a flatibus, 333. a gangrena, 337. a gula, 332. ab hernia, 337. hypochondriacus, 338. ab inanitione, 334. ab inflammatione, 335. ab ischuria, 336. mechanicus, 339. a medicamentis, 334. a menstasi, 336. a metastasi, 335. nervosus, 338. periodicus, 334. a pressione, 339. purulentus, 337. transitorius, 332. typhodes, 334. a venenis, *ibid.* a vermicibus, 333. virulentus, 338. a vulnere, 337.
 Sinuofitas, II, 324.
 SINUS, I, 128.
 Sirialis, I, 255. 256.
 Siro, I, 85. *Sirones*, 74.
 Sirfen, I, 241.
 Sicis febrilis; morbofa, II, 126.
 Small-pox, I, 222.
 Soda, den. Sodr, II, 46.
Solf. exsiccus; des febrilens, II, 416.

Somnambule, SOMNANBULISMUS, II, 109. catalepticus, 110. vulgaris, *ibid.*
Somnolente, Somnolentia continua, I, 436.
 Sonitus aurium, II, 103. a plethora, 104.
 Sopor, I, 437.
 Soporosi morbi, I, 430.
Sombrejaux des tendons, I, 189. 294.
Sanci, II, 119. 137.
La Souette, I, 155.
Souffles convulsifs, I, 329.
Sourde, I, 396.
La Souris, I, 288.
 Sparganosis, II, 69. 70. 77. 217.
 SPASMI, I, 267. 276. 288. *coruæ theoria*, 268. 269. GENERALES CLONICI, 268. PARTIALES CLONICI, 288. GENERALES TONICI, 282. PARTIALES TONICI, 277.
 Spasmodici morbi, II, 369.
 Spasmos, I, 289.
 Spasmus, I, 285. cynicus 281. flatulentus, 284. II, 19. guiz, 43. maxillæ a luxato sesamoide pedis; a vulnere, I, 284. Sardonicus; 282.
 Spermatocoele, I, 92. syphilitica, *ibid.*
 Sphaclismus cerebri, I, 255.
Sphaelle, Sphaecelus, Sphaecerus, I, 255.
 Sphygmoccephalus, II, 19.
 Spina bifida, II, 263.
 Spina ventosa, I, 90. II, 16. 263.
 Spinola, II, 52. 263.
 a Spittle of unusual colour, II, 202.
 Spleen, I, 307.
 SPLENALGIA; infarctus, II, 62. sarcomatosa, *ibid.* scirrhus, *ibid.* suppuratoria, *ibid.*
 Splendores, II, 96.
 Splenes magni, II, 298.
 SPLENICIS, phlegmonodea, I, 265.
 SPLENOCELE; inguinalis ventralis, I, 412.
 Sputatio arthritica, II, 201.
 Squinantia, I, 257.
Squirre; au foye; a la rate, I, 78.
 Straphyle, I, 96.
 STAPHYLOMA, I, 89. 95. 222. II, 39.
 Sreatoma lupia, I, 89.
 STERNUTATIO; catarrhalis, I, 331. critica; epidemica; periodica; *ibid.* a ptarmicis; rubeculosa, *ibid.* spontanea, *ibid.* a vermicibus, *ibid.*
Sterteur, STERTOR, I, 343. apoplecticus, asthmaicus; *ibid.* 411.
 Sticilidium ardens, II, 204. urina, 205.
 STOMACACE, II, 157. 298. ab hamorrhoo; purulenta, 157. scorbutica, *ibid.* universalis, *ibid.*
 Stomachi adstrictio, II, 53. attritio; peridynia, *ibid.* dolor, 51. morbi interni, 377.
 Stomalgia, II, 43.
 Strabismus, STABISMUS, I, 277. equinoqualis, 278. Buffonii, *ibid.* calignantium, 279. catarrhalis, 278. a crystallino, *ibid.* isopthalmicus, *ibid.* a lachrysa; 277. myopium, cranicum, &c. 278.

278. a paralyti; spasmodicus, *ibid.* symptomati-
cus, *ibid.* vulgaris, *ibid.*
Stracchezza, II, 23.
Strangulatio suspensorum, I, 356. uterina, I,
352. 439.
Strangulationis metus in scorbuto, I, 354.
Stranguria, *Stranguria*, II, 205. colicum po-
pulem concomitans, II, 103.
Streptus aurium, I, 107.
Stridor dentium in morbis acutis, I, 280. a
veronibus, 281.
Strophus Celsi, II, 55.
Strume, II, 287. 288.
Stupiditas, *Stupiditas*, II, 143.
Stupor, STUPOR, I, 400. 437. II, 24. for-
micans; a gelu, *ibid.* miliaris; a necrosi, *ibid.*
a pressione, *ibid.* rachialgicus; *ibid.* saburrealis;
25. a torpore, 24.
Svanimento, I, 423.
Subet hafarim, I, 437. sabasa, 434. 437.
Subluxatio, I, 120. 121.
Submillum urinae, II, 100.
Subsultus tendinum, I, 289. 294.
Subunguim, I, 72.
Succubus, I, 329.
Sudamen, Sudamina, I, 75.
Sudatio morbofa, II, 195.
Sudor criticus, I, 156. apyretos sponte perfe-
verans; II, 196. criticus, *ibid.* diaphoreticus;
febrilis, *ibid.* morbofus, 195. syncopeticus,
196.
Sudoriferus morbus, I, 156.
La Suerre, I, 155. 159. 229. 232. II, 197. mi-
lariae, I, 232. *per Picard*, 175.
La Suerre, II, 195.
Suffocatio, *Suffocatio*; I, 351. hysterique;
mulierum; uterina, 439. 428. 352.
Suffusio, I, 376. II, 93. colorans, 99. coru-
scans; 97. Danaei, 98. dimidiatus, 101. obiecta
fulgurans, 97. metamorphosis, 100. multiplicans;
101. myodes, 94. nutans, 101. sadian, 96. se-
ctularis *ibid.* scintillans, *ibid.* 99.
Sugillatio, I, 72. 96.
Superficiarii affectus, v. *Vitia*.
Suppression, II, 268.
Suppression lymphatique du poulmon, 203.
Sordiditas, I, 397.
Surditas, I, 396. ab atonia, 398. congenita, 399.
Sursipitum, I, 346. irruptum, 264.
Suturus, II, 104.
Svealing sickness, I, 155.
Sycosis, I, 34. II, 34.
Symblepharosis, I, 379.
Synanche, I, 257.
Synchysis, I, 90. 378. 398. apostema, 90.
SYNCOPE, I, 423. ab antipathia, 424. ab
apoplexis; 425. arthritica; *ibid.* cardiaca; 351.
a cardiogmo, 424. a dolore, *ibid.* epileptica, *ibid.*
exanthematica, 426. febricula; 425. febrilis, 424.
ab hydrocardia, 425. hysterica; 424. ab inani-
tione; 423. Lantoni, 425. metastatica; parhetica,
426. a plebotomia; plethorica; 424. a poly-
ibid. scorbutica; a sphacelo, stomachica, *ibid.* a
veneno, 425. verminosa, *ibid.*
Synchysis, I, 170. vomitum simulans, 185.
Synchysis, II, 38.
Synthesis, I, 382.
SYNOCHA; vel continens febris, I, 157.
ardens; 158. catarrhalis, *ibid.* caustodes; caustoi-
nides; *ibid.* cephalalgica, 158. dolorum, 168. in-
flata; 157. miliaris; 159. plethorica, 157. putri-
da, 158. sanguinea, 157. scorbutica, 158. sin-
plex, *ibid.* traxorda; *ibid.*
Synochoi, I, 149.
SYNOCHUS; I, 159. anniversaria, 162.
ardens; biliosa, 161. cardiaca, 160. catarrhalis;
162. dysenteriodes, 161. hiemalis, 162. impu-
trix, 157. miliaris, 163. nostalgica, 168. pleu-
ritica, 161. putris, 159. rheumatica, 162.
sanguinea, 160. a scabie, 163. scorbutica, 162.
simplex, 157. soporosa, 162. spermatica, *ibid.*
sudatoria, 160. taranta, 162. variolodes, vario-
losa, 160.
Synthesis, II, 190.
SYPHILIS, II, 195. Indica; 197. Polonica,
ibid. Venerea, 195.
Syrigma, I, 412.
SYRIGMUS, I, 409. II, 103. bombus, II,
106. catarrhalis; cephalalgicus, 105. criticus; 104.
a debilitate, 103. a causa frigida; a frigiditate;
ab hypochondriaci, 105. ab oxycoea; *ibid.* per-
spiratone suppressa, *ibid.* plethoricus; sibilus;
sufurrus, 104. a ventriculo, 105. vertiginosus,
ibid.

T

Tabardillo; F, 236.

TABES, II, 236. apostematodes, 237. catar-
rhalis, 238. a diarrhoea, 243. dorsalis, 236. 238.
a dysenteria, 244. a fluore albo, 243. gallica,
238. glandularia, 237. *ibid.* a gonorrhoea, 243.
hepatica, 237. ab hepatis scirrho, *ibid.* ab hy-
drope, *ibid.* a lienteria, 244. mesenterica, 237.
nervosa, 243. nuticum, 237. ab oncosmo, 243.
peccora, 244. a pericardio, 237. rachialgica,
238. ranalis, 236. scrophulosa, 237. a stoma-
cho, *ibid.* sudatorio, *ibid.* syphilitica, a 238.
a veneno, *ibid.* ulcerosa, 237. 238. a vomica,
ibid.

Tabidi morbi, II, 375.

Tache blanche, I, 69. de bruture, 71. de la
cornee, 380. hepaticus, 71. de rouffeur, *ibid.*

Tadum vitæ, II, 137.

Tarantisme, TARANTISMUS; Apulus, II,
121. enteneasmus, 122. musomania; 123. a scor-
pio Apulo; simulatus; a Tarantula alba, stella-
ta, uvea, 122. Tingitanus, 123...

Tasaxis, II, 33.

Tarabo Aegyptorum, II, 324.

Tap.

Tarten, I, 381.
 Taze, I, 69. 380.
 Teico araba, II, 191. 193.
 Teigne, II, 306. *erouense*, *decaillense*, *farinense*, 308. *figense*; *humide a rayon de miel*, *humide simple*, 307. *lupinense*; *de son*, 308.
 Tefmos, II, 192.
 Telum, I, 245.
 Temulenta, I, 442. II, 128.
 Tenafmo, II, 192.
 Tendineocolleum partium morbi, II, 374.
 Teneſme, TENESMUS, II, 192. ab aſcaridibus, *ibid.* bilioſus; calculoſus, *ibid.* a carcinomate; dyſentericus, *ibid.* a dyſuria, *ibid.* hæmorrhoidalis, *ibid.* Indicus, *ibid.* legitimus, *ibid.* Orientalis, *ibid.* a pituita acida, *ibid.* a ſcybalis, *ibid.* ſpontaneus, *ibid.* a veſicularum ſeminalium phlegmone, *ibid.* ulceroſus, *ibid.*
 Tenſio, I, 206.
 Tentigo, II, 120.
 Tereodon, II, 16.
 Terenthius, I, 74. 80.
 Terrent panique: *de vapeurs*, II, 118. 119.
 TERTIANA, I, 184. accidentalis, 186. apoplectica, *ibid.* arthritica; aſthmatica, 185. cardiaca, 187. catotica, 186. cholericæ, 187. II, 187. continua, I, 176. continua duplex, 172. Danica, 186. diaphoretica, 187. duplex & duplicata; 186. dyſenterica, 187. enctica, 185. epileptica, 186. erratica, *ibid.* extenſa, 185. hemiplegica, 187. hypochondriaca; hiliatica, 185. intermittens, 184. legitima, *ibid.* leſthargica, 178. lypyria, 187. maligna, 176. malignans; 186. miliaris, *ibid.* pernicioſa, 176. petechialis, 185. pleuretica; *ibid.* a ſcabie, 186. ſcorbutica, *ibid.* ſoporofa, 178. ſpuria, 185. ſubcontinua, *ibid.* 186. ſyphilitica, *ibid.* triplex & verminofa, *ibid.* utricata, 187.
 Teſticularum ſerius deſcenſus, I, 119. in inguen intruſus, 120. retracſus, 119.
 TETANUS, I, 185. anticus; doſalis; emproſthotonicus, *ibid.* febricofus, hemiplegicus, 186. holotonicus, 185. hyſtericus, 186. Indicus, 185. lateralis, 186. metallicus, 183. mirandus, 186. opithotonicus, 185. rheumatifmalis mirandus, 187. ſyphiliticus, 186. tonicus, 185. traumaticus; verminofus, 186.
 Tetartaios, I, 187.
 TETARTOPHIA; carotica; hepatica; maligna; ſemiteriana; ſimplex; ſplenaigica, I, 180. 187.
 Theligotia; II, 200.
 Thorybes, II, 118.
 Thymus, I, 84.
 Tic, I, 279. 280. 281. II, 131. *douleurux*; I, 281. *de ſail*, 288.
 Tierce, I, 184.
 Tigre, II, 306.
 Tumor; I, 437.

TINEA; II, 306. cruſtacea; 308. favoſa; *licola*; 307. ſurfuracea, 308. humida; 307. lactea; 306. lupina; porrignoſa; 308. ſyphilitica; *ibid.* volatica, 306.
 Tinectus, II, 192.
 Tinsain, II, 103.
 Tiraillement; I, 189.
 Tiſſe, Tiſichezza; II, 238.
 Tophus, I, 178.
 Tormentum, II, 185. acutum, 182.
 Tormina, II, 172. recens natozum, 58.
 Torpor, I, 437.
 Torticolis, I, 282.
 Toſſe, I, 339.
 Tournement de tete, II, 89.
 Toux, I, 329. *de ronard*, 242.
 Trachoma; II, 24.
 Tracophonis, I, 410.
 Tranchees des enfans, II, 58. *naturelles des accouchées*, 68.
 Transport au cerveau, I, 242. II, 128.
 Traulotes, I, 409.
 Traumatici morbi; II, 263.
 Tremblement, TREMOR, I, 393. Aſturiensis, 394. coactus, 393. a coſſea; *ibid.* cordis, 395. a debilitate, 393. ab humiditate, ab hydrocephalo; metallurgorum, *ibid.* palpitans; paralyſiodes; a pathemate; a plethora, 394. rheumatifmalis; *ibid.* a ſabura; ſcorbuticus, *ibid.* ſenilis; a ſiccitate; temulentus, 393. tendinum, 394. traumaticus; typhodes; *ibid.* vertiginofus, 393.
 Trichiaſe, Trichiaſis, II, 34. 70. *aveo inſer- verſion des ſarſes*, I, 97.
 TRICHOMA, II, 219. cirroſum, *ibid.* Polonicum; villoſum, 210.
 TRISMUS, I, 379. arthriticus, 380. 381. Balearicus, 379. cacoethes, 380. capitratus, *ibid.* catarrhalis, 381. crepitans, 380. cynicus, 381. cynogelos, *ibid.* diaſtrophæ, 383. dolorificus, 381. equinus, 380. ſebilis, *ibid.* hypochondriacus, inflammatorius, *ibid.* maxillaris, 381. naſcentium, 379. occipitalis, 380. ſardonius, 383. ſcorbuticus, 380. traumaticus, *ibid.* verminofus, *ibid.*
 TRITEOPHYA, I, 176. Americana, 180. aliodes, 178. carotica, *ibid.* cauſus, 176. comatoſa, 178. deceptiva, 179. diaphoretica, 177. eolodes, *ibid.* II, 196. lactea, 178. leipyrria, I, 179. ſubcontinua malignans, *ibid.* ſyncopalis, 176. typhodes, 177. 179. Uratiſlaviensis, 176.
 Tritæus, I, 183.
 Tritaiophyes puretor, I, 176.
 Tritaios, I, 184. ſyneches, 176.
 Tromboſis, II, 70.
 Tromos, I, 393.
 Trouſſe galant, I, 357: bis, II, 186.
 TUBERA, II, 385.
 Tuberculum crudum, II, 239. pulmonum I, 359. II, 239.
 Tumeur blanche, I, 89. bis; *chancreuſe*, 81. ſcrophuleuſe; ſquirituſe, 79.
 Tumidi morbi, II, 373.

Tumor, I, 108. genu loco puris ventum enitens, 89. phlegmonodes, 79.
 Tumores capsulati, I, 88. hæmorrhoidales, 89.
 Turpitudinis symptomata, II, 120.
 TUSSIS, I, 339. accidentalis, 340. arthritica, 243. calculosa, *ibid.* catarrhalis, 339. elongata, 341. convulsiva, *ibid.* 342. a dentitione, 343. exanthematica, 343. ferina, 341. gravidarum, *ibid.* gutturalis, *ibid.* hæmoptoica, 342. hepatica, 341. humida, II, 202. hypochondriaca, I, 341. hysterica, 339. metallicarum 341. mucosa, 339. pteifica, 342. a polyo, *ibid.* purulenta, II, 202. rheumatica, I, 341. a scabièrepulsa, *ibid.* serosa, 339. sicca, 341. simulata, 340. stomachalis sicca, *ibid.* verminosa, 343. xeropharyngea, *ibid.*
 Tyloia, Tylus, I, 84.
 Tylosis, II, 34.
 Tympania, Tympanias, Tympanita, *Tympanitis*, TYMPANITES, II, 271. abdominalis, 272. asciticus, 273. enterophyodes, *ibid.* fugax, 220. intestinalis, 271. de la matrice, *ibid.* spasmodicus, 273. Stuvartii, *ibid.* verminosus, 274. universalis, 247. uteri, 271.
 Typhodes, I, 163. 177. 179.
 Typhomania, TYPHOMANIA, I, 434. agrypnocoma, 435. continua, 434. febricola, *ibid.* Martiniana; verminosa, 435.
 Typhos quartus, II, 271.
 TYPHUS, I, 163. ejus therapia Hecquetiana, 166. Typhus Ægyptiaca, *ibid.* carcerum, 163. 256. castrensis, 165. comatosus, *ibid.* exhaustorum, 167. hysterico-verminosus, 165. icterodes, 166. a manipura, 167. nervosus, 164.

V

Vaginae inversio; lapsus; prolapsus; relaxatio, I, 101. prolapsus completus. vesicam deorsum abripiens, *ibid.* vid. Uterus,
 Vajola, Vaiolo, I, 222.
 Valgi, I, 88. 125.
 Vampirismus, II, 138.
 Vapores, I, 307. epileptiques, 303. hypochondriacales, 440.
 Vapores molester, II, 72.
 Vapours, I, 307.
 Vari, I, 72. 75. 88. 124. 125.
 Varice, I, 88.
 Varicocele, I, 84. 91.
 Varicophala, Varicophalus, I, 89. 91. bis.
 VARIOLA, Variolæ, I, 222. anomala, 224. aquosa, 223. aurea, *ibid.* confluens, 225. confluens coherens, *ibid.* confluens, corymbosa, 226. confluens crystallina, 225. confluens hæmatodes, 226. confluens Japonica, 225. confluens nigra, 226. confluens maligna; regularis, 225. confluens sanguinea; scorbutica, 226. discreta, 223. discreta benigna, *ibid.* discreta complicata, dysenteriodes, 224. discreta miliaris; sicca; sili-

quosa; verrucosa; vesicularis, *ibid.* halitosa, 223. hermaproditica, 229. infectiva, 223. lymphatica, *ibid.* regularis, 225. volatica, *ibid.*
 VARIX, I, 88.
 Varus, F, 72. 75.
 Vercordia, II, 132.
 VVeille-Kuhr, II, 132.
 Vena Medeni, vena Medina, II, 292.
 Venenati morbi, II, 337.
 Venter propendulus, I, 118.
 Ventofole, II, 219.
 Ventriculi ardor, II, 46. debilitas, I, 402. dolor, 251. II, 51. inflammatio, I, 251. inflatio, II, 274. languor, I, 402. morbus, II, 49. morbus rarus, 50.
 Ventriculosa passio, II, 191.
 Ventris fluxus, II, 167. profluvium, 187. dolor ob apostema pancreatis, 57.
 Ver de Guinée, II, 192.
 Vercoquin, I, 243.
 Vermine inferne, II, 319.
 Verminosi morbi, II, 365.
 Vermis cerebri, I, 172. Vermis morbus dictus Brasilensis, II, 79. Vermes malum hybericum mentientes, I, 308.
 Verole, II, 295. commune, 296.
 Verole (perice), Veroleto, Verette, I, 222. vid. Variola.
 VERRUCA, Verrues, I, 84. cancrofa, 81. gregalis, 85. des paupers, *ibid.* simplex, 84. syphilitica, 85.
 Verrige, VERTIGO, 89. accidentalis, 92. a cerebri; a coriaræ foliis, *ibid.* ab ebrietate, 91. fugax, 92. a fumo lithantracis & calcei, *ibid.* hypochondriaca; hysterica, *ibid.* ab ictu, *ibid.* idiopathica, 91. ab ingluvie, *ibid.* a lolio; ab opio; 92. ovilla, 93. plethrica, 91. stomachica; ex tabaco; a venenis; a vino, 92.
 VESANIÆ, II, 81. 82. 96. eorum theoria, 82. praxis, 85. VESANIE ANOMALÆ, 442.
 HALLUCINATIONES, 87. MOROSITATES, 110.
 Vesicæ urinarie inflammatio, I, 254. catarrhus, II, 209. hydrops, 268. inversio, prolapsus ejus colli inversio; ejus tunica interioris inversio, prolapsus, I, 99. morbi, II, 377. morbus, rarus, 209. ulcus, 208.
 Vesiculæ Divæ Barbaræ, I, 225. gingivarum, 240.
 Vespertina acies, I, 384.
 Veterius, I, 419.
 Vibex, I, 71. Vibices, 72.
 Vigilie immodicæ, vigilium morbosum, II, 144.
 Virgæ carunculæ, incendium, II, 206.
 Virgum obstructions, II, 315.
 de Viribus animatis, I, 27. inanimatis, 37.
 Viridellus, I, 308.
 Virium debilitas ab animi affectu, I, 420.
 Virorum morbi, II, 375.
 Virulenti morbi, II, 339.
 Visus confusus, I, 389. debilis, 382. diurnus, 383.

383. duplicatus, II. 101. hebetudo, 382. juvenum, 385. nocturnus, 384. obtusus, 389. senilis, 387.

VITIA, I, 54. 69. eorum theoria, 56. VITILIGO, I, 70. II, 300. albus, I, 70. hepatica, *ibid.* leucæ; melas, *ibid.*

Vitre (extensio non naturelle du corps) I, 93. Vitrei dissolutio, I, 90. turgescens serosa, 93.

Ulcere, ULCUS, I, 118. II, 322. *hæmorrhoides*, *ibid.* de la bouche *scabietique*, I, 241. *canceræux*, ou *chancroux*, II, 289. 323. *carcinomateux* de la matrice, 218. cerebrum depascens, I, 255. *dartreux*, II, 322. *fongueux* a la matrice, 210. au gosier *veroleux*, I, 356. gutturi, 411. hydropum, II, 322. laryngis, I, 411. de matrice, II, 67. 210. du nez, 221. *œdemateux*, 322. *aux reins*, II, 208.

scabietique, 323. *scrophuleux*, 322. *serpiginosum*, *ibid.* *craché*, I, 411. *veroleux*, II, 323. *veroleux* a l'utero, II, 210. a la vessie, 208. ureterum, *ibid.* uteri, simplex, 210.

Ulcuscula oris I, 240. 241.

Ullem, II, 56. 200.

Umbilici vitium, I, 105.

Unguis, I, 381. II, 39.

Ungula, I, 85. 381.

Uvulus, II, 182.

Vomica, Vomique, I, 90. II, 202. 243. pulmonum latens, I, 345. 359.

Vomissement, II, 178. de sang, 157.

Vomiting of blood, II, 157.

Vomito pectico, II, 181.

Vomituritus, II, 177.

VOMITUS, II, 178. arrabilaris, bezoarticus; 181. a calculo; a carbunculo pestilenti, *ibid.* cephalalgicus, 182. a crapula, 179. cruentus, 157.

cruentus a plethora, 158. a dentitione, 179. febricofus, 180. 181. gastricus; gastrocæcus, 181.

gravidarum, 180. hæmorrhagicus, 182. sanguinis ab hæmorrhoidibus, 168. ab hepate, 181. ab hernia, 182. hypochondriacus, 180. iliacus, 182. la-

Æcus, 179. marinus, 182. sanguinis a menibus suppressis, 158. sanguinis menstruus, *ibid.* nephriticus; ab œsophago obstructo; a pancreate, 181.

pituitosus, 182. cruentus a plethora, 158. a pustulis rubris lividis, 181. a pyloro calloso, 180.

rabiosus, 181. ruminatio, 179. a saburra, *ibid.* sanguinis, 157. a veneno, 180. a ventriculi hepate, 181. steatomate; ulcere, 180. verminosus, 179. urinosus, 182. a cartilagine xiphoidea, *ibid.*

Veracite, II, 215.

Ureterum ulcus, II, 208.

Urethraæ xerophopia, II, 220.

Urina cæterea, II, 209. nigra, 161. rubra, *ibid.* ejus ardor, *ibid.* incontinentia, 204. pro-

fluvium, 205. retentio, 275. Attilididium, 204. 205. subfistulum, *ibid.* suppressio, 275.

Urinæ biancharæ & troubles, II, 209. *brigueuses*, rouges, 161.

Uteri vel vaginæ depressio, I, 100. uteri dolor, II, 66. hæmorrhoides, II, 165. inclinatio, I, 118. *ibid.* 119. inflammatio, I, 254. inflatio, II, 269. 275. intemperies humida, 165. inversio, I, 100. inversio completa vesicam deorsum abripiens, 101. uteri vel vaginæ inversio, 99. *ibid.* uteri obliquitas, 118. *ibid.* 121. perverio, 100.

procedentia completa vesicam deorsum abripiens, 101. uteri vel vaginæ procedentia, prolapsus, 99. uteri pruritus, II, 67. 121. reclinatio, I, 118. *ibid.* 119. uteri vel vaginæ relaxatio, 99. uteri rheumatismus, II, 210. sarcoma, 261. ulcus, 210.

Uva, I, 96.

Vne basse, I, 389. de chat, 384. confuse, 382. 489. courte, 384. double, II, 101. française, I, 381. de hibou, 384. de lievre, 278. longue, 387. louche, 388. a la Montmorenci, 278.

Vuidanges, II, 165.

Vulnerarii morbi, II, 363.

VULNUS, I, 126. sclopetorum, *ibid.* simplex, *ibid.* virulentum, *ibid.*

Vulvæ strangulatus, I, 439.

Uvulæ calus, catarrhus; inflammatio, œdema, paralytis; productio a pituita; prolapsus; pro-

pendens, I, 96.

VVampirismus, II, 138.

VVater-galle, II, 182.

VVater pocken, I, 225.

VVearicæ, II, 23.

VVeisse-Ruhr, II, 174.

VVichtelzoppe, II, 319.

VVorm, II, 79.

VVurmshadem, II, 322.

X

Xerophalonia, II, 34.

Y

Yavv, II, 293.

Ydros, II, 195.

Yvresse appetitigue, I, 442.

Z


Zerzera, I, 172.

Zoanthropia, II, 137.

Zona, I, 73. 74. 218. ignea, 74.


Zoster, 73. 74. 238.

FINIS INDICIS.



M-3-retro

B.17.4.15



B NCF

